

TERVISEKASSA RAVIMITE LOETELU

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                | Müügiloa hoidja                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala               | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|----------------------------------|------------------|----------|----------------------|--------|--------------|---------------|--|
| 1734768         | abirateroon,<br>500mg               | L02BX0<br>3 | ZYTIGA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Janssen - Cilag<br>International | 100              | C61-C61  | Onkoloog,<br>Uroloog |        |              |               | metastaatilise hormoonsensitiivse eesnäärmevähi raviks ning metastaatilise kastratsioonresistentse eesnäärmevähi raviks patsientidele, kes ei ole enne haiguse metastaseerumist saanud ravi teise põlvkonna androgeenireseptori inhibiitoriga ja patsientidele, kelle haigus on dotsetakseelil põhineva kemoteraapia ajal või järgselt progresseerunud. Ravimi kasutamisele ei või eelneada metastaatilise haiguse ravi apalutamiidi, darolutamiidi, ensalutamiidi või abiraterooniga varasemas ravireas, kuid lubatud on ravimi vahetus talumatute kõrvaltoimete ilmnemisel |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala               | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|---------------------|------------------|----------|----------------------|--------|--------------|---------------|---|
| 1801022         | abirateroon,<br>500mg               | L02BX0<br>3 | ABIRATERONE<br>NORAMEDA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK    | Norameda UAB        | 100              | C61-C61  | Onkoloog,<br>Uroloog |        |              |               | metastaatilise hormoonsensitiivse eesnäärmevähi raviks ning metastaatilise kastratsioonresistentse eesnäärmevähi raviks patsientidele, kes ei ole enne haiguse metastaseerumist saanud ravi teise põlvkonna androgeenireseptori inhibiitoriga ja patsientidele, kelle haigus on dotsetakseelil põhineva kemoterapia ajal või järgselt progresseerunud. Ravimi kasutamisele ei või eelneeda metastaatilise haiguse ravi apalutamiidi, darolutamiidi, ensalutamiidi või abiraterooniga varasemas ravireas, kuid lubatud on ravimi vahetus talumatute kõrvaltoimete ilmnemisel |
| 1801055         | abirateroon,<br>500mg               | L02BX0<br>3 | ABIRATERONE G.L.<br>PHARMA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | G.L. Pharma<br>GmbH | 100              | C61-C61  | Uroloog,<br>Onkoloog |        |              |               | metastaatilise hormoonsensitiivse eesnäärmevähi raviks ning metastaatilise kastratsioonresistentse eesnäärmevähi raviks patsientidele, kes ei ole enne haiguse metastaseerumist saanud ravi teise põlvkonna androgeenireseptori inhibiitoriga ja patsientidele, kelle haigus on dotsetakseelil põhineva kemoterapia ajal või järgselt progresseerunud. Ravimi kasutamisele ei või eelneeda metastaatilise haiguse ravi apalutamiidi, darolutamiidi, ensalutamiidi või abiraterooniga varasemas ravireas, kuid lubatud on ravimi vahetus talumatute kõrvaltoimete ilmnemisel |
| 1827952         | abirateroon,<br>500mg               | L02BX0<br>3 | ABIRATERONE<br>VIASANA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK     | Viasana UAB         | 100              | C61-C61  | Uroloog,<br>Onkoloog |        |              |               | metastaatilise hormoonsensitiivse eesnäärmevähi raviks ning metastaatilise kastratsioonresistentse eesnäärmevähi raviks patsientidele, kes ei ole enne haiguse metastaseerumist saanud ravi teise põlvkonna androgeenireseptori inhibiitoriga ja patsientidele, kelle haigus on dotsetakseelil põhineva kemoterapia ajal või järgselt progresseerunud. Ravimi kasutamisele ei või eelneeda metastaatilise haiguse ravi apalutamiidi, darolutamiidi, ensalutamiidi või abiraterooniga varasemas ravireas, kuid lubatud on ravimi vahetus talumatute kõrvaltoimete ilmnemisel |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala               | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|---------------------------|------------------|----------|----------------------|--------|--------------|---------------|---|
| 1829998         | abirateroon,<br>500mg               | L02BX0<br>3 | ABIRATERONE<br>ZENTIVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Zentiva k.s.              | 100              | C61-C61  | Uroloog,<br>Onkoloog |        |              |               | metastaatilise hormoonsensitiivse eesnäärmevähi raviks ning metastaatilise kastratsioonresistentse eesnäärmevähi raviks patsientidele, kes ei ole enne haiguse metastaseerumist saanud ravi teise põlvkonna androgeenireseptori inhibiitoriga ja patsientidele, kelle haigus on dotsetakseelil põhineva kemoterapia ajal või järgselt progresseerunud. Ravimi kasutamisele ei või eelneeda metastaatilise haiguse ravi apalutamiidi, darolutamiidi, ensalutamiidi või abiraterooniga varasemas ravireas, kuid lubatud on ravimi vahetus talumatute kõrvaltoimete ilmnemisel |
| 1847426         | abirateroon,<br>500mg               | L02BX0<br>3 | ABIRATERONE<br>ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK  | Accord Healthcare<br>S.L. | 100              | C61-C61  | Uroloog,<br>Onkoloog |        |              |               | metastaatilise hormoonsensitiivse eesnäärmevähi raviks ning metastaatilise kastratsioonresistentse eesnäärmevähi raviks patsientidele, kes ei ole enne haiguse metastaseerumist saanud ravi teise põlvkonna androgeenireseptori inhibiitoriga ja patsientidele, kelle haigus on dotsetakseelil põhineva kemoterapia ajal või järgselt progresseerunud. Ravimi kasutamisele ei või eelneeda metastaatilise haiguse ravi apalutamiidi, darolutamiidi, ensalutamiidi või abiraterooniga varasemas ravireas, kuid lubatud on ravimi vahetus talumatute kõrvaltoimete ilmnemisel |
| 1880580         | abirateroon,<br>500mg               | L02BX0<br>3 | ABIRATERONE TEVA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK    | Teva B.V.                 | 100              | C61-C61  | Onkoloog,<br>Uroloog |        |              |               | metastaatilise hormoonsensitiivse eesnäärmevähi raviks ning metastaatilise kastratsioonresistentse eesnäärmevähi raviks patsientidele, kes ei ole enne haiguse metastaseerumist saanud ravi teise põlvkonna androgeenireseptori inhibiitoriga ja patsientidele, kelle haigus on dotsetakseelil põhineva kemoterapia ajal või järgselt progresseerunud. Ravimi kasutamisele ei või eelneeda metastaatilise haiguse ravi apalutamiidi, darolutamiidi, ensalutamiidi või abiraterooniga varasemas ravireas, kuid lubatud on ravimi vahetus talumatute kõrvaltoimete ilmnemisel |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja       | Soodus-tus % | Diagnoos                 | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-------------|-------------------------------|----------|---|-----------------------|--------------|--------------------------|--|--------|-----------|------------|--|
| 1881514     | abirateroon, 500mg            | L02BX03  | ABIRATERONE STADA, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK     | Stada Arzneimittel AG | 100          | C61-C61                  | Onkoloog, Uroloog                                    |        |           |            | metastaatilise hormoonsensitiivse eesnäärmevähi raviks ning metastaatilise kastratsioonresistentse eesnäärmevähi raviks patsientidele, kes ei ole enne haiguse metastaseerumist saanud ravi teise põlvkonna androgeenireseptori inhibiitoriga ja patsientidele, kelle haigus on dotsetakseelil põhineva kemoterapia ajal või järgselt progresseerunud. Ravimi kasutamisele ei või eelneda metastaatilise haiguse ravi apalutamiidi, darolutamiidi, ensalutamiidi või abiraterooniga varasemas ravireas, kuid lubatud on ravimi vahetus talumatute kõrvaltoimete ilmnemisel |
| 1887633     | abirateroon, 500mg            | L02BX03  | ABIRATERONE MYLAN, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK     | Mylan Ireland Limited | 100          | C61-C61                  | Onkoloog, Uroloog                                    |        |           |            | metastaatilise hormoonsensitiivse eesnäärmevähi raviks ning metastaatilise kastratsioonresistentse eesnäärmevähi raviks patsientidele, kes ei ole enne haiguse metastaseerumist saanud ravi teise põlvkonna androgeenireseptori inhibiitoriga ja patsientidele, kelle haigus on dotsetakseelil põhineva kemoterapia ajal või järgselt progresseerunud. Ravimi kasutamisele ei või eelneda metastaatilise haiguse ravi apalutamiidi, darolutamiidi, ensalutamiidi või abiraterooniga varasemas ravireas, kuid lubatud on ravimi vahetus talumatute kõrvaltoimete ilmnemisel |
| 3023154     | abirateroon, 500mg            | L02BX03  | ABIRATERONE OLAINFARM, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Olainfarm AS          | 100          | C61-C61                  | Onkoloog, Uroloog                                    |        |           |            | metastaatilise hormoonsensitiivse eesnäärmevähi raviks ning metastaatilise kastratsioonresistentse eesnäärmevähi raviks patsientidele, kes ei ole enne haiguse metastaseerumist saanud ravi teise põlvkonna androgeenireseptori inhibiitoriga ja patsientidele, kelle haigus on dotsetakseelil põhineva kemoterapia ajal või järgselt progresseerunud. Ravimi kasutamisele ei või eelneda metastaatilise haiguse ravi apalutamiidi, darolutamiidi, ensalutamiidi või abiraterooniga varasemas ravireas, kuid lubatud on ravimi vahetus talumatute kõrvaltoimete ilmnemisel |
| 1868474     | abrotsitiniib, 100mg          | D11AH08  | CIBINQO, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK               | Pfizer Europe MA EEIG | 100          | L20.8-L20.8, L20.9-L20.9 | Pediaater, Allergoloog-immunoloog, Dermatoveneroloog |        |           |            | mõõduka või raske haigusega (EASI $\geq$ 16, DLQI $\geq$ 10) patsiendile, kes ei allu süsteemsele konventsionaalsele ravile tsüklosporiiniga 8–12 nädala jooksul või kellele see on vastunäidustatud või põhjustanud talumatuid kõrvaltoimeid  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                    | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|--------------------------|------------------|-----------------------------|--|--------|--------------|---------------|---|
| 1868520         | abrotsitiniib,<br>200mg             | D11AH0<br>8 | CIBINQO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Pfizer Europe MA<br>EEIG | 100              | L20.8-L20.8,<br>L20.9-L20.9 | Dermatovenerol<br>oog, Pediaater,<br>Allergoloog-<br>immunoloog    |        |              |               | mõõduka või raske haigusega (EASI $\geq$ 16, DLQI $\geq$ 10)<br>patsiendile, kes ei allu süsteemsele konventsionaalsele<br>ravile tsüklosporiiniga 8–12 nädala jooksul või kellele see<br>on vastunäidustatud või põhjustanud talumatuid<br>kõrvaltoimeid |
| 1868429         | abrotsitiniib, 50mg                 | D11AH0<br>8 | CIBINQO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Pfizer Europe MA<br>EEIG | 100              | L20.8-L20.8,<br>L20.9-L20.9 | Pediaater,<br>Dermatovenerol<br>oog,<br>Allergoloog-<br>immunoloog |        |              |               | mõõduka või raske haigusega (EASI $\geq$ 16, DLQI $\geq$ 10)<br>patsiendile, kes ei allu süsteemsele konventsionaalsele<br>ravile tsüklosporiiniga 8–12 nädala jooksul või kellele see<br>on vastunäidustatud või põhjustanud talumatuid<br>kõrvaltoimeid |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                    | Müügiloa hoidja                        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|--|------------------|----------|---------------------------|--------|--------------|---------------|---|
| 1766662         | adalimumab,<br>20mg 0.2ml           | L04AB0<br>4 | HUMIRA, süstelahus<br>süstlis, 0.2ml 2TK | AbbVie<br>Deutschland<br>GmbH & Co. KG | 100              | M08-M08  | Reumatoloog,<br>Pediaater |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala                         | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--------|--------------|---------------|---|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | K51-K51, K50-<br>K50 | Pediaater,<br>Gastroenteroloog |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimetu, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimetu |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala                           | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|---|----------------------------------|--------|--------------|---------------|---|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | H20.1-H20.1,<br>H44.1-H44.1,<br>H20.0-H20.0,<br>H35.0-H35.0,<br>H30-H30 | Oftalmoloog                      |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel mitteinfektsioosse intermediaalse, posterioorse ja panuveiidi raviks täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveidi raviks lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav, kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus immunosupressantidel e (tsüklosporiin, asatiopriin, metotreksaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või on need vastunäidustatud  |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | L73.2-L73.2   | Dermatovenerol<br>oog            |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimusel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamütsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitretiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud  |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M05-M05, M08-<br>M08, M06-M06   | Reumatoloog,<br>Pediaater        |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks  |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | L40-L40   | Dermatovenerol<br>oog, Pediaater |        |              |               | patsient vastab järgmistele tingimustele: haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor $\geq 10$ ja/või DLQI $\geq 10$ ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoterapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas) |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M46-M46, M45-<br>M45, M07.0-<br>M07.3                                   | Reumatoloog,<br>Pediaater        |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.   |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                     | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                              | Eriala                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|-----------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------|--------------|---------------|---|
| 1816398         | adalimumab,<br>20mg 0.4ml           | L04AB0<br>4 | HYRIMOZ, süstelahus<br>süstlis, 0.4ml 2TK | Sandoz GmbH     | 100              | M45-M45, M46-<br>M46, M07.0-<br>M07.3 | Pediaater,<br>Reumatoloog |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks. |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|--------|--------------|---------------|--|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M05-M05, M08-<br>M08, M06-M06 | Reumatoloog,<br>Pediaater |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala                         | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--------|--------------|---------------|---|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | K51-K51, K50-<br>K50 | Gastroenteroloog,<br>Pediaater |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimetu, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimetu |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala                              | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|---|-------------------------------------|--------|--------------|---------------|---|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M08-M08   | Pediaater,<br>Reumatoloog           |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav   |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | L40-L40   | Pediaater,<br>Dermatovenerol<br>oog |        |              |               | patsient vastab järgmistele tingimustele: haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor $\geq 10$ ja/või DLQI $\geq 10$ ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoterapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas) |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | H20.1-H20.1,<br>H44.1-H44.1,<br>H20.0-H20.0,<br>H35.0-H35.0,<br>H30-H30 | Oftalmoloog                         |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel mitteinfektsioosse intermediaalse, posterioorse ja panuveiidi raviks täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveiidi raviks lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav, kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus immunosupressantidel e (tsüklosporiin, asatiopriin, metotreksaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või on need vastunäidustatud   |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | L73.2-L73.2   | Dermatovenerol<br>oog               |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimusel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konvetsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamütsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitretiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                        | Müügiloa hoidja                        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|--|------------------|-------------------------------|---------------------------|--------|--------------|---------------|--|
| 1715251         | adalimumab,<br>40mg 0.4ml           | L04AB0<br>4 | HUMIRA, süstelahus<br>pen-süstlis, 0.4ml 2TK | AbbVie<br>Deutschland<br>GmbH & Co. KG | 100              | M05-M05, M08-<br>M08, M06-M06 | Reumatoloog,<br>Pediaater |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                              | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------------------------|--------|--------------|---------------|---|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | L40-L40  | Pediaater,<br>Dermatovenerol<br>oog |        |              |               | patsient vastab järgmistele tingimustele: haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor $\geq 10$ ja/või DLQI $\geq 10$ ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitreiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoterapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasivorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas) |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|---------------------------|--------|--------------|---------------|---|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M08-M08  | Reumatoloog,<br>Pediaater |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala                         | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|---|--------------------------------|--------|--------------|---------------|--|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M45-M45, M46-<br>M46  | Reumatoloog,<br>Pediaater      |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.  |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | K51-K51, K50-<br>K50  | Gastroenteroloog,<br>Pediaater |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeta, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeta  |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | L73.2-L73.2   | Dermatoveneroloog              |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimusel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamütsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitreiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud  |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | H20.1-H20.1,<br>H44.1-H44.1,<br>H20.0-H20.0,<br>H35.0-H35.0,<br>H30-H30 | Oftalmoloog                    |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel mitteinfektsioosse intermediaalse, posterioorse ja panuveiidi raviks täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveiidi raviks lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav, kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus immunosupressantidele (tsüklosporiin, asatiopriin, metotreksaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või on need vastunäidustatud |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M07.0-M07.3   | Reumatoloog,<br>Pediaater      |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.  |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                         | Müügiloa hoidja                         | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala                         | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|---|------------------|----------------------|--------------------------------|--------|--------------|---------------|---|
| 1841161         | adalimumab,<br>40mg 0.4ml           | L04AB0<br>4 | YUFLYMA, süstelahus<br>pen-süstlis, 0.4ml 2TK | Celltrion<br>Healthcare<br>Hungary Kft. | 100              | K51-K51, K50-<br>K50 | Gastroenteroloog,<br>Pediaater |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeta, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeta |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                              | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------------------------|--------|--------------|---------------|--|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | L40-L40  | Pediaater,<br>Dermatovenerol<br>oog |        |              |               | patsient vastab järgmistele tingimustele: haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor $\geq 10$ ja/või DLQI $\geq 10$ ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoterapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasivorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas) |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|---|---------------------------|--------|--------------|---------------|--|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M08-M08   | Reumatoloog,<br>Pediaater |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav  |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M45-M45, M46-<br>M46  | Reumatoloog,<br>Pediaater |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.  |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | H20.1-H20.1,<br>H44.1-H44.1,<br>H20.0-H20.0,<br>H35.0-H35.0,<br>H30-H30 | Oftalmoloog               |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel mitteinfektsioosse intermediaalse, posterioorse ja panuveidi raviks täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveidi raviks lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav, kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus immunosuppressantidel e (tsüklosporiin, asatiopriin, metotreksaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või on need vastunäidustatud |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M07.0-M07.3   | Reumatoloog,<br>Pediaater |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.  |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M05-M05, M08-<br>M08, M06-M06   | Pediaater,<br>Reumatoloog |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks   |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | L73.2-L73.2   | Dermatovenerol<br>oog     |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimusel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamütsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitreiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                      | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|--------------------------|------------------|----------------------|---------------------------|--------|--------------|---------------|---|
| 1867608         | adalimumab,<br>40mg 0.4ml           | L04AB0<br>4 | HUKYNDRA, süstelahus<br>süstlis, 0.4ml 2TK | Stada Arzneimittel<br>AG | 100              | M45-M45, M46-<br>M46 | Pediaater,<br>Reumatoloog |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks. |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------------|--------|--------------|---------------|---|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | L73.2-L73.2 | Dermatovenerol<br>oog |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimusel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamütsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitreiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|---------------------------|--------|--------------|---------------|---|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M07.0-M07.3 | Pediaater,<br>Reumatoloog |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks. |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala                              | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|---|-------------------------------------|--------|--------------|---------------|---|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | H20.1-H20.1,<br>H44.1-H44.1,<br>H20.0-H20.0,<br>H35.0-H35.0,<br>H30-H30 | Oftalmoloog                         |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel mitteinfektsioosse intermediaalse, posterioorse ja panuveidi raviks täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveidi raviks lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav, kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus immunosupressantidel e (tsüklosporiin, asatiopriin, metotreksaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või on need vastunäidustatud   |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M08-M08   | Pediaater,<br>Reumatoloog           |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav   |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M05-M05, M08-<br>M08, M06-M06   | Reumatoloog,<br>Pediaater           |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks  |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | L40-L40   | Pediaater,<br>Dermatovenerol<br>oog |        |              |               | patsient vastab järgmistele tingimustele: haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor $\geq 10$ ja/või DLQI $\geq 10$ ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoterapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas) |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | K51-K51, K50-<br>K50  | Gastroenteroloog,<br>Pediaater      |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimetu, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimetu   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                          | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|--------------------------|------------------|----------|---------------------------|--------|--------------|---------------|---|
| 1867631         | adalimumab,<br>40mg 0.4ml           | L04AB0<br>4 | HUKYNDRA, süstelahus<br>pen-süstlis, 0.4ml 2TK | Stada Arzneimittel<br>AG | 100              | M08-M08  | Reumatoloog,<br>Pediaater |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|----------------------|---------------------------|--------|--------------|---------------|---|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M45-M45, M46-<br>M46 | Pediaater,<br>Reumatoloog |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks. |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|---------------------------|--------|--------------|---------------|---|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M07.0-M07.3 | Reumatoloog,<br>Pediaater |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks. |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala                           | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|---|----------------------------------|--------|--------------|---------------|---|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | L40-L40   | Dermatovenerol<br>oog, Pediaater |        |              |               | patsient vastab järgmistele tingimustele: haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor $\geq 10$ ja/või DLQI $\geq 10$ ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoterapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas) |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M05-M05, M08-<br>M08, M06-M06   | Reumatoloog,<br>Pediaater        |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks  |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | H44.1-H44.1,<br>H30.0-H30.0,<br>H35.0-H35.0,<br>H20.1-H20.1,<br>H20.0-H20.0 | Oftalmoloog                      |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel mitteinfektsioosse intermediaalse, posterioorse ja panuveidi raviks täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveidi raviks lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav, kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus immunosuppressantidele (tsüklosporiin, asatiopriin, metotreksaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või on need vastunäidustatud   |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | K51-K51, K50-<br>K50  | Gastroenteroloog,<br>Pediaater   |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeta, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeta   |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | L73.2-L73.2   | Dermatovenerol<br>oog            |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimusel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamütsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitretiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                     | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|-----------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|--------|--------------|---------------|--|
| 3044179         | adalimumab,<br>40mg 0.4ml           | L04AB0<br>4 | HYRIMOZ, süstelahus<br>süstlis, 0.4ml 2TK | Sandoz GmbH     | 100              | M05-M05, M08-<br>M08, M06-M06 | Pediaater,<br>Reumatoloog |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|---------------------------|--------|--------------|---------------|---|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M07.0-M07.3 | Pediaater,<br>Reumatoloog |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks. |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|----------------------|---------------------------|--------|--------------|---------------|---|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M45-M45, M46-<br>M46 | Reumatoloog,<br>Pediaater |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks. |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------------|--------|--------------|---------------|---|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | L73.2-L73.2 | Dermatovenerol<br>oog |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimusel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamütsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitreiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala                          | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|---|---------------------------------|--------|--------------|---------------|--|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | K51-K51, K50-<br>K50  | Gastroenteroloog,<br>Pediaater  |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimetu, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimetu  |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | L40-L40   | Pediaater,<br>Dermatoveneroloog |        |              |               | patsient vastab järgmistele tingimustele: haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor $\geq 10$ ja/või DLQI $\geq 10$ ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas) |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | H20.1-H20.1,<br>H44.1-H44.1,<br>H20.0-H20.0,<br>H35.0-H35.0,<br>H30-H30 | Oftalmoloog                     |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel mitteinfektsioosse intermediaalse, posterioorse ja panuveidi raviks täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveidi raviks lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav, kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus immunosupressantidele (tsüklosporiin, asatiopriin, metotreksaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või on need vastunäidustatud   |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M08-M08   | Pediaater,<br>Reumatoloog       |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav  |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                         | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|-----------------|------------------|-------------|---------------------------|--------|--------------|---------------|---|
| 3044214         | adalimumab,<br>40mg 0.4ml           | L04AB0<br>4 | HYRIMOZ, süstelahus<br>pen-süstlis, 0.4ml 2TK | Sandoz GmbH     | 100              | M07.0-M07.3 | Pediaater,<br>Reumatoloog |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks. |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                           | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|----------------------------------|--------|--------------|---------------|---|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | L40-L40  | Dermatovenerol<br>oog, Pediaater |        |              |               | patsient vastab järgmistele tingimustele: haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor $\geq 10$ ja/või DLQI $\geq 10$ ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitreiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoterapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasivorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas) |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala                         | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|---|--------------------------------|--------|--------------|---------------|--|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M05-M05, M08-M08, M06-M06   | Pediaater,<br>Reumatoloog      |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks   |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | L73.2-L73.2   | Dermatovenerol<br>oog          |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimusel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamütsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitreiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud  |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M45-M45, M46-M46  | Reumatoloog,<br>Pediaater      |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.  |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | K51-K51, K50-K50  | Gastroenteroloog,<br>Pediaater |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeta, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeta  |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M08-M08   | Reumatoloog,<br>Pediaater      |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav  |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | H20.1-H20.1,<br>H44.1-H44.1,<br>H20.0-H20.0,<br>H35.0-H35.0,<br>H30-H30 | Oftalmoloog                    |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel mitteinfektsioosse intermediaalse, posterioorse ja panuveiidi raviks täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveidi raviks lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav, kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus immunosupressantidel e (tsüklosporiin, asatiopriin, metotreksaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või on need vastunäidustatud |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                         | Müügiloa hoidja            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|----------------------------|------------------|----------|---------------------------|--------|--------------|---------------|---|
| 3070921         | adalimumab,<br>40mg 0.4ml           | L04AB0<br>4 | IMRALDI, süstelahus<br>pen-süstlis, 0.4ml 2TK | Samsung Bioepis<br>NL B.V. | 100              | M08-M08  | Reumatoloog,<br>Pediaater |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala                         | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--------|--------------|---------------|---|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | K51-K51, K50-<br>K50 | Gastroenteroloog,<br>Pediaater |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimetu, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimetu |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|---|-------------|--------|--------------|---------------|---|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | H44.1-H44.1,<br>H30.0-H30.0,<br>H35.0-H35.0,<br>H20.1-H20.1,<br>H20.0-H20.0 | Oftalmoloog |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel mitteinfektsioosse intermediaalse, posterioorse ja panuveiidi raviks täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveiidi raviks lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav, kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus immunosupressantidel e (tsüklosporiin, asatiopriin, metotreksaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või on need vastunäidustatud |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                  | Eriala                           | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|---------------------------|----------------------------------|--------|--------------|---------------|--|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M05-M05, M08-M08, M06-M06 | Pediaater,<br>Reumatoloog        |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.  |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M45-M45, M46-M46          | Reumatoloog,<br>Pediaater        |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.  |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M07.0-M07.3               | Reumatoloog,<br>Pediaater        |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.  |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | L40-L40                   | Dermatovenerol<br>oog, Pediaater |        |              |               | patsient vastab järgmistele tingimustele: haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor $\geq 10$ ja/või DLQI $\geq 10$ ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas) |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | L73.2-L73.2               | Dermatovenerol<br>oog            |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimusel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamütsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitretiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                      | Müügiloa hoidja      | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|----------------------|------------------|-------------|---------------------------|--------|--------------|---------------|---|
| 1742251         | adalimumab,<br>40mg 0.8ml           | L04AB0<br>4 | AMGEVITA, süstelahus<br>süstlis, 0.8ml 2TK | Amgen Europe<br>B.V. | 100              | M07.0-M07.3 | Pediaater,<br>Reumatoloog |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks. |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala                         | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--------|--------------|---------------|---|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | K51-K51, K50-<br>K50 | Pediaater,<br>Gastroenteroloog |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimetu, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimetu |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------------|--------|--------------|---------------|---|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | L73.2-L73.2 | Dermatovenerol<br>oog |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimusel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamütsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitreiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala                              | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|---|-------------------------------------|--------|--------------|---------------|--|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | H20.1-H20.1,<br>H44.1-H44.1,<br>H20.0-H20.0,<br>H35.0-H35.0,<br>H30-H30 | Oftalmoloog                         |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel mitteinfektsioosse intermediaalse, posterioorse ja panuveidi raviks täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveidi raviks lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav, kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus immunosupressantidel e (tsüklosporiin, asatiopriin, metotreksaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või on need vastunäidustatud  |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | L40-L40   | Pediaater,<br>Dermatovenerol<br>oog |        |              |               | patsient vastab järgmistele tingimustele: haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor $\geq 10$ ja/või DLQI $\geq 10$ ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas) |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M45-M45, M46-<br>M46  | Pediaater,<br>Reumatoloog           |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.  |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M05-M05, M08-<br>M08, M06-M06   | Pediaater,<br>Reumatoloog           |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks   |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M08-M08   | Reumatoloog,<br>Pediaater           |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                          | Müügiloa hoidja      | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|----------------------|------------------|----------------------|---------------------------|--------|--------------|---------------|---|
| 1742295         | adalimumab,<br>40mg 0.8ml           | L04AB0<br>4 | AMGEVITA, süstelahus<br>pen-süstlis, 0.8ml 2TK | Amgen Europe<br>B.V. | 100              | M45-M45, M46-<br>M46 | Pediaater,<br>Reumatoloog |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks. |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|--------|--------------|---------------|--|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M05-M05, M08-<br>M08, M06-M06 | Reumatoloog,<br>Pediaater |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                           | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|----------------------------------|--------|--------------|---------------|---|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | L40-L40  | Dermatovenerol<br>oog, Pediaater |        |              |               | patsient vastab järgmistele tingimustele: haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor $\geq 10$ ja/või DLQI $\geq 10$ ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasivorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas) |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala                         | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|---|--------------------------------|--------|--------------|---------------|---|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | K51-K51, K50-<br>K50  | Gastroenteroloog,<br>Pediaater |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeta, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeta   |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | H20.1-H20.1,<br>H44.1-H44.1,<br>H20.0-H20.0,<br>H35.0-H35.0,<br>H30-H30 | Oftalmoloog                    |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel mitteinfektsioosse intermediaalse, posterioorse ja panuveiidi raviks täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveiidi raviks lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav, kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus immunosupressantidel e (tsüklosporiin, asatiopriin, metotreksaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või on need vastunäidustatud |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M07.0-M07.3   | Pediaater,<br>Reumatoloog      |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.   |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | L73.2-L73.2   | Dermatovenerol<br>oog          |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimusel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamütsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitreiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud   |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M08-M08   | Reumatoloog,<br>Pediaater      |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                     | Müügi-<br>loa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|----------------------|------------------|-------------|-----------------------|--------|--------------|---------------|---|
| 1777305         | adalimumab,<br>40mg 0.8ml           | L04AB0<br>4 | HYRIMOZ, süstelahus<br>süstlis, 0.8ml 2TK | Sandoz GmbH          | 100              | L73.2-L73.2 | Dermatovenerol<br>oog |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimisel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamütsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitreiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|--------|--------------|---------------|--|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M05-M05, M08-<br>M08, M06-M06 | Pediaater,<br>Reumatoloog |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala                              | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|---|-------------------------------------|--------|--------------|---------------|--|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | H20.1-H20.1,<br>H44.1-H44.1,<br>H20.0-H20.0,<br>H35.0-H35.0,<br>H30-H30 | Oftalmoloog                         |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel mitteinfektsioosse intermediaalse, posterioorse ja panuveidi raviks täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveidi raviks lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav, kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus immunosupressantidel e (tsüklosporiin, asatiopriin, metotreksaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või on need vastunäidustatud  |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | L40-L40   | Pediaater,<br>Dermatovenerol<br>oog |        |              |               | patsient vastab järgmistele tingimustele: haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor $\geq 10$ ja/või DLQI $\geq 10$ ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas) |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | K51-K51, K50-<br>K50  | Gastroenteroloog,<br>Pediaater      |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimetu, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimetu  |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M45-M45,<br>M07.0-M07.3,<br>M46-M46                                     | Pediaater,<br>Reumatoloog           |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.  |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M08-M08   | Reumatoloog,<br>Pediaater           |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                         | Müügi-<br>loa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                              | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|----------------------|------------------|----------|-------------------------------------|--------|--------------|---------------|--|
| 1777338         | adalimumab,<br>40mg 0.8ml           | L04AB0<br>4 | HYRIMOZ, süstelahus<br>pen-süstlis, 0.8ml 2TK | Sandoz GmbH          | 100              | L40-L40  | Pediaater,<br>Dermatovenerol<br>oog |        |              |               | patsient vastab järgmistele tingimustele: haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor $\geq 10$ ja/või DLQI $\geq 10$ ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitreiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasivorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas) |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala                         | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|---|--------------------------------|--------|--------------|---------------|--|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M07.0-M07.3,<br>M45-M45, M46-<br>M46                                    | Reumatoloog,<br>Pediaater      |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.  |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M08-M08   | Pediaater,<br>Reumatoloog      |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav  |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M05-M05, M08-<br>M08, M06-M06   | Reumatoloog,<br>Pediaater      |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks   |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | H20.1-H20.1,<br>H44.1-H44.1,<br>H20.0-H20.0,<br>H35.0-H35.0,<br>H30-H30 | Oftalmoloog                    |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel mitteinfektsioosse intermediaalse, posterioorse ja panuveiidi raviks täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveiidi raviks lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav, kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus immunosupressantidele (tsüklosporiin, asatiopriin, metotreksaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või on need vastunäidustatud |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | K51-K51, K50-<br>K50  | Gastroenteroloog,<br>Pediaater |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimetu, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimetu  |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | L73.2-L73.2   | Dermatoveneroloog              |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimisel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamütsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitreiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                        | Müügiloa hoidja                       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|--------|--------------|---------------|--|
| 1792571         | adalimumab,<br>40mg 0.8ml           | L04AB0<br>4 | IDACIO, süstelahus<br>pen-süstlis, 0.8ml 2TK | Fresenius Kabi<br>Deutschland<br>GmbH | 100              | M05-M05, M08-<br>M08, M06-M06 | Pediaater,<br>Reumatoloog |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|---------------------------|--------|--------------|---------------|---|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M07.0-M07.3 | Reumatoloog,<br>Pediaater |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks. |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------------|--------|--------------|---------------|---|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | L73.2-L73.2 | Dermatovenerol<br>oog |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimusel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamütsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitreiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala                          | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|---|---------------------------------|--------|--------------|---------------|---|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M45-M45, M46-<br>M46  | Reumatoloog,<br>Pediaater       |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.   |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M08-M08   | Reumatoloog,<br>Pediaater       |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav   |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | H20.1-H20.1,<br>H44.1-H44.1,<br>H20.0-H20.0,<br>H35.0-H35.0,<br>H30-H30 | Oftalmoloog                     |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel mitteinfektsioosse intermediaalse, posterioorse ja panuveidi raviks täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveidi raviks lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav, kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus immunosupressantidel e (tsüklosporiin, asatiopriin, metotreksaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või on need vastunäidustatud   |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | K51-K51, K50-<br>K50  | Gastroenteroloog,<br>Pediaater  |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimetu, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimetu   |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | L40-L40   | Dermatoveneroloog,<br>Pediaater |        |              |               | patsient vastab järgmistele tingimustele: haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor $\geq 10$ ja/või DLQI $\geq 10$ ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoterapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas) |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                      | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|--------------------------|------------------|---|-------------|--------|--------------|---------------|---|
| 1867653         | adalimumab,<br>80mg 0.8ml           | L04AB0<br>4 | HUKYNDRA, süstelahus<br>süstlis, 0.8ml 1TK | Stada Arzneimittel<br>AG | 100              | H20.1-H20.1,<br>H44.1-H44.1,<br>H20.0-H20.0,<br>H35.0-H35.0,<br>H30-H30 | Oftalmoloog |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel mitteinfektsioosse<br>intermediaalse, posterioorse ja panuveidi raviks<br>täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveidi raviks<br>lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav,<br>kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või<br>kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus<br>immunosupressantidel e (tsüklosporiin, asatiopriin,<br>metotreksaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või on need<br>vastunäidustatud |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala                         | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--------|--------------|---------------|---|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | K51-K51, K50-<br>K50 | Gastroenteroloog,<br>Pediaater |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimetu, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimetu |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala                              | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------|--------------|---------------|---|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M07.0-M07.3                   | Pediaater,<br>Reumatoloog           |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.   |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M45-M45, M46-<br>M46          | Reumatoloog,<br>Pediaater           |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.   |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | L73.2-L73.2                   | Dermatovenerol<br>oog               |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimusel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamüsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitreiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud  |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M05-M05, M08-<br>M08, M06-M06 | Pediaater,<br>Reumatoloog           |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks  |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | L40-L40                       | Pediaater,<br>Dermatovenerol<br>oog |        |              |               | patsient vastab järgmistele tingimustele: haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor $\geq 10$ ja/või DLQI $\geq 10$ ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitreiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas) |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M08-M08                       | Pediaater,<br>Reumatoloog           |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                         | Müügiloa hoidja                         | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|---|------------------|----------|---------------------------|--------|--------------|---------------|---|
| 3059704         | adalimumab,<br>80mg 0.8ml           | L04AB0<br>4 | YUFLYMA, süstelahus<br>pen-süstlis, 0.8ml 1TK | Celltrion<br>Healthcare<br>Hungary Kft. | 100              | M08-M08  | Reumatoloog,<br>Pediaater |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala                         | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--------|--------------|---------------|---|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | K51-K51, K50-<br>K50 | Pediaater,<br>Gastroenteroloog |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimetu, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimetu |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|----------------------|---------------------------|--------|--------------|---------------|---|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M45-M45, M46-<br>M46 | Reumatoloog,<br>Pediaater |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks. |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala                              | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|---|-------------------------------------|--------|--------------|---------------|---|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M05-M05, M08-M08, M06-M06   | Pediaater,<br>Reumatoloog           |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks  |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | H20.1-H20.1,<br>H44.1-H44.1,<br>H20.0-H20.0,<br>H35.0-H35.0,<br>H30-H30 | Oftalmoloog                         |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel mitteinfektsioosse intermediaalse, posterioorse ja panuveiidi raviks täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveiidi raviks lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav, kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus immunosupressantidel e (tsüklosporiin, asatiopriin, metotreksaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või on need vastunäidustatud   |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | L73.2-L73.2   | Dermatovenerol<br>oog               |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimusel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamütsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitreiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud   |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M07.0-M07.3   | Reumatoloog,<br>Pediaater           |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.   |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | L40-L40   | Pediaater,<br>Dermatovenerol<br>oog |        |              |               | patsient vastab järgmistele tingimustele: haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor $\geq 10$ ja/või DLQI $\geq 10$ ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitreiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas) |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                          | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|--------------------------|------------------|---|-------------|--------|--------------|---------------|---|
| 3091542         | adalimumab,<br>80mg 0.8ml           | L04AB0<br>4 | HUKYNDRA, süstelahus<br>pen-süstlis, 0.8ml 1TK | Stada Arzneimittel<br>AG | 100              | H20.1-H20.1,<br>H44.1-H44.1,<br>H20.0-H20.0,<br>H35.0-H35.0,<br>H30-H30 | Oftalmoloog |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel mitteinfektsioosse<br>intermediaalse, posterioorse ja panuveidi raviks<br>täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveidi raviks<br>lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav,<br>kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või<br>kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus<br>immunosupressantidel e (tsüklosporiin, asatiopriin,<br>metotreksaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või on need<br>vastunäidustatud |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                           | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|----------------------------------|--------|--------------|---------------|---|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | L40-L40  | Dermatovenerol<br>oog, Pediaater |        |              |               | patsient vastab järgmistele tingimustele: haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor $\geq 10$ ja/või DLQI $\geq 10$ ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoterapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas) |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                            | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                    | Eriala                         | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|-----------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------|--------------|---------------|---|
|                 |                                     |             |  |                             | 100              | M05-M05, M08-M08, M06-M06   | Reumatoloog,<br>Pediaater      |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks  |
|                 |                                     |             |  |                             | 100              | M45-M45, M46-M46            | Pediaater,<br>Reumatoloog      |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.   |
|                 |                                     |             |  |                             | 100              | M07.0-M07.3                 | Reumatoloog,<br>Pediaater      |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.   |
|                 |                                     |             |  |                             | 100              | L73.2-L73.2                 | Dermatovenerol<br>oog          |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimusel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamütsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitreiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud   |
|                 |                                     |             |  |                             | 100              | K51-K51, K50-K50            | Gastroenteroloog,<br>Pediaater |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimetu, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimetu |
|                 |                                     |             |  |                             | 100              | M08-M08                     | Reumatoloog,<br>Pediaater      |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutu  |
| 1412334         | agomelatiin, 25mg                   | N06AX2<br>2 | VALDOXAN, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Les Laboratoires<br>Servier | 50               |                             |                                |        |              |               |   |
|                 |                                     |             |  |                             | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater                    | esmane |              |               |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus  | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                    | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |
|-----------------|--------------------------------------|-------------|--|-----------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|--------|--------------|---------------|--|
| 1738469         | agomelatiin, 25mg                    | N06AX2<br>2 | ZILBEA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK         | Zentiva k.s.                | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |  |
|                 |                                      |             |  |                             | 50               |                             |             |        |              |               |  |
| 1763872         | agomelatiin, 25mg                    | N06AX2<br>2 | LAMEGOM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK        | KRKA, d.d., Novo<br>mesto   | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |  |
|                 |                                      |             |  |                             | 50               |                             |             |        |              |               |  |
| 1831946         | akalabrutiniib,<br>100mg             | L01EL02     | CALQUENCE,<br>kõvakapsel, 60TK                               | Astrazeneca AB              | 100              | C91.1-C91.1                 | Hematoloog  |        |              |               | monoteraapiana patsientidele, kellel esineb 17p<br>deletsioon või TP53 mutatsioon, kes ei ole eelnevalt ravi<br>saanud või kes on eelnevalt saanud vähemalt ühe<br>ravikuuri ja haigus ei ole ravile allunud või on taastekkinud<br>lühema aja kui 36 kuu jooksul eelneva ravi alustamisest<br>alates ning patsientidele, kellel esineb 11q deletsioon, kes<br>ei ole eelnevalt ravi saanud või kes on eelnevalt saanud<br>vähemalt ühe ravikuuri ja haigus ei ole ravile allunud või<br>on taastekkinud. Soodustus ei laiene patsientidele, kelle<br>ravi akalabrutiniibiga on ravimitootja vastutusel alustatud<br>ja tagatud enne 01.07.2022. |
| 1891863         | akalabrutiniib,<br>100mg             | L01EL02     | CALQUENCE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK      | Astrazeneca AB              | 100              | C91.1-C91.1                 | Hematoloog  |        |              |               | monoteraapiana patsientidele, kellel esineb 17p<br>deletsioon või TP53 mutatsioon, kes ei ole eelnevalt ravi<br>saanud või kes on eelnevalt saanud vähemalt ühe<br>ravikuuri ja haigus ei ole ravile allunud või on taastekkinud<br>lühema aja kui 36 kuu jooksul eelneva ravi alustamisest<br>alates ning patsientidele, kellel esineb 11q deletsioon, kes<br>ei ole eelnevalt ravi saanud või kes on eelnevalt saanud<br>vähemalt ühe ravikuuri ja haigus ei ole ravile allunud või<br>on taastekkinud. Soodustus ei laiene patsientidele, kelle<br>ravi akalabrutiniibiga on ravimitootja vastutusel alustatud<br>ja tagatud enne 01.07.2022. |
| 1590106         | aklidiinium,<br>322mcg<br>1mõõtannus | R03BB0<br>5 | BRETARIS GENUAIR,<br>inhalatsioonipulber,<br>60mõõtannus 1TK | Covis Pharma<br>Europe B.V. | 50               |                             |             |        |              |               |  |
|                 |                                      |             |  |                             | 75               | J43-J44                     | Pulmonoloog | esmane |              |               |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala     | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|--|-------------|--|---------------------------------------|------------------|----------|------------|--------|--------------|---------------|---|
| 1593312         | aksitiniib, 1mg                                    | L01EK0<br>1 | INLYTA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK           | Pfizer Europe MA<br>EEIG              | 100              | C64-C64  | Onkoloog   |        |              |               | IV staadiumis heledarakulise neeru kartsinoomi teise rea ravina pärast esimese rea sunitiniib- või pasopaniibravi patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine aksitiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1, haiguse prognoos Hengi kriteeriumide järgi hea või keskmine ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena |
| 1593345         | aksitiniib, 5mg                                    | L01EK0<br>1 | INLYTA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK           | Pfizer Europe MA<br>EEIG              | 100              | C64-C64  | Onkoloog   |        |              |               | IV staadiumis heledarakulise neeru kartsinoomi teise rea ravina pärast esimese rea sunitiniib- või pasopaniibravi patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine aksitiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1, haiguse prognoos Hengi kriteeriumide järgi hea või keskmine ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena |
| 1739437         | alektiniib, 150mg                                  | L01ED0<br>3 | ALECENSA,<br>kõvakapsel, 224TK                                 | Roche<br>Registration<br>GmbH         | 100              | C34-C34  | Onkoloog   |        |              |               | anaplastilise lümfoomkineaas-positiivse kaugelearenenud varem ravimata mitteväikerakk-kopsuvähi raviks heas üldseisundis (ECOG 0-2) täiskasvanud patsientidele  |
| 1339141         | alendroonhape+ko<br>lekaltsiferool,<br>70mg+5600RÜ | M05BB0<br>3 | FOSAVANCE, tablett,<br>4TK                                     | Organon N.V.                          | 75               | M80-M80  |            |        |              |               | patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna   |
|                 |  |             |  |                                       | 50               |          |            |        |              |               |   |
| 1695067         | alendroonhape+ko<br>lekaltsiferool,<br>70mg+5600RÜ | M05BB0<br>3 | ALENDRONIC<br>ACID/COLECALCIFER<br>OL ZENTIVA, tablett,<br>4TK | Zentiva k.s.                          | 50               |          |            |        |              |               |   |
|                 |  |             |  |                                       | 75               | M80-M80  |            |        |              |               | patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna   |
| 1789577         | alfa-2b-<br>ropeginterferoon,<br>250mcg 0.5ml      | L03AB1<br>5 | BESREMI, süstelahus<br>pen-süstlis, 0.5ml 1TK                  | AOP Orphan<br>Pharmaceuticals<br>GmbH | 100              | D45-D45  | Hematoloog |        |              |               | monoteraapiana teise rea raviks hüdroksüüurea ebapiisavuse või talumatuse korral ja esimese rea ravina noorematele patsientidele, kellel puhul hematoloogide konsiilium otsustab, et pikaajaline hüdroksüüurea ravi ei ole kõrvaltoimete profiili tõttu sobiv   |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus  | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                  | Müügiloo hoidja   | Soodus-tus % | Diagnoos             | Eriala                        | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-------------|--------------------------------|----------|--|-------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1207493     | alfadarbepoetiin, 100mcg 0.5ml | B03XA02  | ARANESP, süstelahus süstlis, 0.5ml 1TK | Amgen Europe B.V. | 100          | D46-D46, D47.1-D47.1 | Hematoloog                    |        |           |            |  |
|             |                                |          |  |                   | 100          | D63-D63, T86-T86     | Nefroloog, Pediaater, Uroloog |        |           |            | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral |
|             |                                |          |  |                   | 50           |                      |                               |        |           |            |  |
| 1207527     | alfadarbepoetiin, 150mcg 0.3ml | B03XA02  | ARANESP, süstelahus süstlis, 0.3ml 1TK | Amgen Europe B.V. | 100          | D46-D46, D47.1-D47.1 | Hematoloog                    |        |           |            |  |
|             |                                |          |  |                   | 100          | D63-D63, T86-T86     | Nefroloog, Pediaater, Uroloog |        |           |            | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral |
|             |                                |          |  |                   | 50           |                      |                               |        |           |            |  |
| 1176218     | alfadarbepoetiin, 20mcg 0.5ml  | B03XA02  | ARANESP, süstelahus süstlis, 0.5ml 1TK | Amgen Europe B.V. | 50           |                      |                               |        |           |            |  |
|             |                                |          |  |                   | 100          | D63-D63, T86-T86     | Pediaater, Uroloog, Nefroloog |        |           |            | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral |
|             |                                |          |  |                   | 100          | D46-D46, D47.1-D47.1 | Hematoloog                    |        |           |            |  |
| 1207314     | alfadarbepoetiin, 30mcg 0.3ml  | B03XA02  | ARANESP, süstelahus süstlis, 0.3ml 1TK | Amgen Europe B.V. | 50           |                      |                               |        |           |            |  |
|             |                                |          |  |                   | 100          | D63-D63, T86-T86     | Uroloog, Nefroloog, Pediaater |        |           |            | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral |
|             |                                |          |  |                   | 100          | D46-D46, D47.1-D47.1 | Hematoloog                    |        |           |            |  |
| 1207370     | alfadarbepoetiin, 40mcg 0.4ml  | B03XA02  | ARANESP, süstelahus süstlis, 0.4ml 1TK | Amgen Europe B.V. | 50           |                      |                               |        |           |            |  |
|             |                                |          |  |                   | 100          | D46-D46, D47.1-D47.1 | Hematoloog                    |        |           |            |  |
|             |                                |          |  |                   | 100          | D63-D63, T86-T86     | Pediaater, Nefroloog, Uroloog |        |           |            | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                            | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                    | Eriala                              | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla   | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|-----------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------|--------------|---|---|
| 1207415         | alfadarbepoetiin,<br>50mcg 0.5ml    | B03XA0<br>2 | ARANESP, süstelahus<br>süstlis, 0.5ml 1TK        | Amgen Europe<br>B.V.        | 100              | D46-D46,<br>D47.1-D47.1     | Hematoloog                          |        |              |   |   |
|                 |                                     |             |  |                             | 100              | D63-D63, T86-<br>T86        | Uroloog,<br>Nefroloog,<br>Pediaater |        |              | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral                                      |   |
|                 |                                     |             |  |                             | 50               |                             |                                     |        |              |   |   |
| 1207437         | alfadarbepoetiin,<br>60mcg 0.3ml    | B03XA0<br>2 | ARANESP, süstelahus<br>süstlis, 0.3ml 1TK        | Amgen Europe<br>B.V.        | 50               |                             |                                     |        |              |   |   |
|                 |                                     |             |  |                             | 100              | D63-D63, T86-<br>T86        | Uroloog,<br>Nefroloog,<br>Pediaater |        |              | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral                                      |   |
|                 |                                     |             |  |                             | 100              | D46-D46,<br>D47.1-D47.1     | Hematoloog                          |        |              |   |   |
| 1207471         | alfadarbepoetiin,<br>80mcg 0.4ml    | B03XA0<br>2 | ARANESP, süstelahus<br>süstlis, 0.4ml 1TK        | Amgen Europe<br>B.V.        | 100              | D63-D63, T86-<br>T86        | Nefroloog,<br>Uroloog,<br>Pediaater |        |              |   | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral                                      |
|                 |                                     |             |  |                             | 100              | D46-D46,<br>D47.1-D47.1     | Hematoloog                          |        |              |   |   |
|                 |                                     |             |  |                             | 50               |                             |                                     |        |              |   |   |
| 1022960         | alfadornaas, 1mg<br>1ml             | R05CB1<br>3 | PULMOZYME,<br>nebuliseeritav lahus,<br>2.5ml 6TK | Roche Eesti<br>Osühing      | 100              | E84-E84                     | Pediaater,<br>Pulmonoloog           | esmane |              |   |   |
|                 |                                     |             |  |                             | 50               |                             |                                     |        |              |   |   |
| 1644904         | alfafollitropiin,<br>150RÜ 0.25ml   | G03GA0<br>5 | BEMFOLA, süstelahus<br>pen-süstlis, 0.25ml 1TK   | Gedeon Richter<br>Plc.      | 50               |                             |                                     |        |              |   |   |
|                 |                                     |             |  |                             | 100              | N97.0-N97.9,<br>Z31.0-Z31.9 |                                     |        | 41,00        | kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise<br>tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks |   |
| 1644915         | alfafollitropiin,<br>225RÜ 0.375ml  | G03GA0<br>5 | BEMFOLA, süstelahus<br>pen-süstlis, 0.375ml 1TK  | Gedeon Richter<br>Plc.      | 50               |                             |                                     |        |              |   |   |
|                 |                                     |             |  |                             | 100              | N97.0-N97.9,<br>Z31.0-Z31.9 |                                     |        | 41,00        | kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise<br>tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks |   |
| 1173855         | alfafollitropiin,<br>300RÜ 0.5ml    | G03GA0<br>5 | GONAL-F, süstelahus<br>pen-süstlis, 0.5ml 1TK    | Merck Europe B.V.           | 100              | N97.0-N97.9,<br>Z31.0-Z31.9 |                                     |        |              | 41,00   | kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise<br>tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks |
|                 |                                     |             |  |                             | 50               |                             |                                     |        |              |   |   |
| 1628636         | alfafollitropiin,<br>300RÜ 0.5ml    | G03GA0<br>5 | OVALEAP, süstelahus,<br>0.5ml 1TK                | Theramex Ireland<br>Limited | 50               |                             |                                     |        |              |   |   |
|                 |                                     |             |  |                             | 100              | N97.0-N97.9,<br>Z31.0-Z31.9 |                                     |        | 41,00        | kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise<br>tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks |   |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus                      | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                           | Müügiloa hoidja                 | Soodus-tus % | Diagnoos                 | Eriala                   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla   | Märkused   |
|-------------|--|----------|---|---------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------|-----------|--|--|
| 1644926     | alfafollitropiin, 300RÜ 0.5ml                      | G03GA05  | BEMFOLA, süstelahus pen-süstlis, 0.5ml 1TK      | Gedeon Richter Plc.             | 50           |                          |                          |        |           |  |  |
|             |  |          |   |                                 | 100          | N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9 |                          |        | 41,00     | kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks |  |
| 1213513     | alfafollitropiin, 450RÜ 0.75ml                     | G03GA05  | GONAL-F, süstelahus pen-süstlis, 0.75ml 1TK     | Merck Europe B.V.               | 100          | N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9 |                          |        |           | 41,00  | kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks |
|             |  |          |   |                                 | 50           |                          |                          |        |           |  |  |
| 1628647     | alfafollitropiin, 450RÜ 0.75ml                     | G03GA05  | OVALEAP, süstelahus, 0.75ml 1TK                 | Theramex Ireland Limited        | 100          | N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9 |                          |        |           | 41,00  | kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks |
|             |  |          |   |                                 | 50           |                          |                          |        |           |  |  |
| 1644937     | alfafollitropiin, 450RÜ 0.75ml                     | G03GA05  | BEMFOLA, süstelahus pen-süstlis, 0.75ml 1TK     | Gedeon Richter Plc.             | 100          | N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9 |                          |        |           | 41,00  | kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks |
|             |  |          |   |                                 | 50           |                          |                          |        |           |  |  |
| 1644892     | alfafollitropiin, 75RÜ 0.125ml                     | G03GA05  | BEMFOLA, süstelahus pen-süstlis, 0.125ml 1TK    | Gedeon Richter Plc.             | 100          | N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9 |                          |        |           | 41,00  | kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks |
|             |  |          |   |                                 | 50           |                          |                          |        |           |  |  |
| 1173866     | alfafollitropiin, 900RÜ 1.5ml                      | G03GA05  | GONAL-F, süstelahus pen-süstlis, 1.5ml 1TK      | Merck Europe B.V.               | 50           |                          |                          |        |           |  |  |
|             |  |          |   |                                 | 100          | N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9 |                          |        | 41,00     | kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks |  |
| 1628658     | alfafollitropiin, 900RÜ 1.5ml                      | G03GA05  | OVALEAP, süstelahus, 1.5ml 1TK                  | Theramex Ireland Limited        | 100          | N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9 |                          |        |           | 41,00  | kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks |
|             |  |          |   |                                 | 50           |                          |                          |        |           |  |  |
| 1745007     | alfafollitropiin+alfalutropiin, 450RÜ+225RÜ 0.72ml | G03GA30  | PERGOVERIS, süstelahus pen-süstlis, 0.72ml 1TK  | Merck Europe B.V.               | 50           |                          |                          |        |           |  |  |
|             |  |          |   |                                 | 100          | N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9 |                          |        | 41,00     | kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks |  |
| 1745018     | alfafollitropiin+alfalutropiin, 900RÜ+450RÜ 1.44ml | G03GA30  | PERGOVERIS, süstelahus pen-süstlis, 1.44ml 1TK  | Merck Europe B.V.               | 50           |                          |                          |        |           |  |  |
|             |  |          |   |                                 | 100          | N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9 |                          |        | 41,00     | kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks |  |
| 1879454     | alfakaltsidool, 0,25mcg                            | A11CC03  | ALFACALCIDOL STRIDES PHARMA, pehmekapsel, 100TK | Strides Pharma (Cyprus) Limited | 100          | N25-N25, N18-N18         | Pediaater, Nefroloog     |        |           |  |  |
|             |  |          |   |                                 | 100          | E89.2-E89.2, E20-E20     | Pediaater, Endokrinoloog |        |           |  |  |
|             |  |          |   |                                 | 50           |                          |                          |        |           |  |  |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus          | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja           | Soodus-tus % | Diagnoos                      | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla   | Märkused  |
|-------------|--|----------|---|---------------------------|--------------|-------------------------------|------------|--------|-----------|--|---|
| 1580969     | alfakooriongonadotropiin, 250mcg 0.5ml | G03GA08  | OVITRELLE, süstelahus pen-süstlis, 0.5ml 1TK                      | Merck Europe B.V.         | 100          | N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9      |            |        |           | 41,00  | kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks  |
|             |  |          |   |                           | 50           |                               |            |        |           |  |   |
| 1046810     | alfalutropiin, 75RÜ                    | G03GA07  | LUVERIS, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK                       | Merck Europe B.V.         | 50           |                               |            |        |           |  |   |
|             |  |          |   |                           | 100          | N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9      |            |        | 41,00     | kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks   |   |
| 1064247     | alfusosiin, 10mg                       | G04CA01  | XATRAL SR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK      | Sanofi Winthrop Industrie | 50           |                               |            |        |           |  |   |
| 1278176     | alfusosiin, 10mg                       | G04CA01  | ALFUZOSIN-TEVA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | Teva Pharma B.V.          | 50           |                               |            |        |           |  |   |
| 3055227     | alfusosiin, 10mg                       | G04CA01  | XATRAL SR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK      | Ideal Trade Links UAB     | 50           |                               |            |        |           |  |   |
| 1698127     | alirokumab, 150mg 1ml                  | C10AX14  | PRALUENT, süstelahus pen-süstlis, 1ml 2TK                         | Sanofi-Aventis Groupe     | 100          | I25.2-I25.2, I21-I21, I22-I22 | Kardioloog | esmane |           |  | ravi alustamine ägeda südamelihase infarkti järgselt (möödunud <=12 kuud) kombinatsioonis statiini ja esetimiibiga patsientidel, kellel vaatamata 1-3 kuud kestnud ravile maksimaalses talutavas annuses statiini ja esetimiibiga ei ole saavutatud LDL-kolesterooli eesmärkväärtust (<1,4mmol/L) ning patsiendi LDL-C väärtus on seejuures >=3,0 mmol/L või kellele statiin/esetimiib on vastunäidustatud ning patsiendi LDL-C väärtus on seejuures >=3,0 mmol |
|             |  |          |   |                           | 100          | E78.0-E78.0                   | Kardioloog | esmane |           | kroonilise perekondliku hüperkolesteroleemia raviks dokumenteeritud ateroskleroosiga patsientidele, kui varasem ravi maksimaalselt talutavas annuses statiini ja esetimiibiga on osutunud ebapiisavaks või on need ravimid olnud vastunäidustatud ning patsiendi LDL-C väärtus on >=3,0 mmol/L |   |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                          | Eriala     | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------|--------|--------------|---------------|---|
| 1698150         | alirokumab, 75mg<br>1ml             | C10AX1<br>4 | PRALUENT, süstelahus<br>pen-süstlis, 1ml 2TK                                      | Sanofi-Aventis<br>Groupe          | 100              | I25.2-I25.2, I21-<br>I21, I22-I22 | Kardioloog | esmane |              |               | ravi alustamine ägeda südamelihase infarkti järgselt (möödunud <=12 kuud) kombinatsioonis statiini ja esetimiibiga patsientidel, kellel vaatamata 1-3 kuud kestnud ravile maksimaalses talutavas annuses statiini ja esetimiibiga ei ole saavutatud LDL-kolesterooli eesmärkväärtust (<1,4mmol/L) ning patsiendi LDL-C väärtus on seejuures >=3,0 mmol/L või kellele statiin/esetimiib on vastunäidustatud ning patsiendi LDL-C väärtus on seejuures >=3,0 mmol |
|                 |                                     |             |   |                                   | 100              | E78.0-E78.0                       | Kardioloog | esmane |              |               | kroonilise perekondliku hüperkolesteroleemia raviks dokumenteeritud ateroskleroosiga patsientidele, kui varasem ravi maksimaalselt talutavas annuses statiini ja esetimiibiga on osutunud ebapiisavaks või on need ravimid olnud vastunäidustatud ning patsiendi LDL-C väärtus on >=3,0 mmol/L  |
| 1001619         | allopurinool,<br>100mg              | M04AA0<br>1 | ALLOPURINOL<br>ORIFARM, tablett, 50TK   | Orifarm<br>Healthcare A/S         | 50               |                                   |            |        |              |               |   |
|                 |                                     |             |   |                                   | 75               | M10-M10, N20-<br>N23              |            |        |              |               |   |
| 1685505         | allopurinool,<br>100mg              | M04AA0<br>1 | ALLOPURINOL<br>SANDOZ, tablett, 50TK  | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 50               |                                   |            |        |              |               |   |
|                 |                                     |             |   |                                   | 75               | M10-M10, N20-<br>N23              |            |        |              |               |   |
| 1001686         | allopurinool,<br>300mg              | M04AA0<br>1 | ALLOPURINOL<br>ORIFARM, tablett, 50TK   | Orifarm<br>Healthcare A/S         | 50               |                                   |            |        |              |               |   |
|                 |                                     |             |   |                                   | 75               | M10-M10, N20-<br>N23              |            |        |              |               |   |
| 1685628         | allopurinool,<br>300mg              | M04AA0<br>1 | ALLOPURINOL<br>SANDOZ, tablett, 100TK   | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 50               |                                   |            |        |              |               |   |
|                 |                                     |             |   |                                   | 75               | M10-M10, N20-<br>N23              |            |        |              |               |   |
| 1754131         | allopurinool,<br>300mg              | M04AA0<br>1 | ALLOPURINOL<br>ACCORD, tablett, 50TK  | Accord Healthcare<br>B.V.         | 75               | M10-M10, N20-<br>N23              |            |        |              |               |   |
|                 |                                     |             |   |                                   | 50               |                                   |            |        |              |               |   |
| 1064517         | amantadiin,<br>100mg                | N04BB0<br>1 | AMANTADIN-<br>RATIOPHARM 100 MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK | Ratiopharm GmbH                   | 50               |                                   |            |        |              |               |   |
|                 |                                     |             |   |                                   | 100              | G20-G20                           | Neuroloog  | esmane |              |               |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                      | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|--------------------------------------|------------------|-------------|--|--------|--------------|---------------|---|
| 1349872         | ambrisentaan,<br>10mg               | C02KX0<br>2 | VOLIBRIS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited | 100              | I27.0-I27.0 | Pediaater,<br>Pulmonoloog,<br>Reumatoloog,<br>Kardioloog |        |              |               | NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse<br>sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega<br>seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks<br>patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala<br>spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafili ja bosentaan on<br>vastunäidustatud, osutunud ebaefektiivseks või<br>põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid |
|                 |                                     |             |   |                                      | 50               |             |  |        |              |               |   |
| 1775011         | ambrisentaan,<br>10mg               | C02KX0<br>2 | AMBRISENTAN<br>NORAMEDA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Norameda UAB                         | 100              | I27.0-I27.0 | Pulmonoloog,<br>Pediaater,<br>Reumatoloog,<br>Kardioloog |        |              |               | NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse<br>sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega<br>seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks<br>patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala<br>spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafili ja bosentaan on<br>vastunäidustatud, osutunud ebaefektiivseks või<br>põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid |
|                 |                                     |             |   |                                      | 50               |             |  |        |              |               |   |
| 1797071         | ambrisentaan,<br>10mg               | C02KX0<br>2 | AMBRISENTAN<br>ZENTIVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK  | Zentiva k.s.                         | 50               |             |  |        |              |               |   |
|                 |                                     |             |   |                                      | 100              | I27.0-I27.0 | Kardioloog,<br>Reumatoloog,<br>Pediaater,<br>Pulmonoloog |        |              |               | NYHA III-IV kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse<br>või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse<br>arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi<br>(vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui<br>sildenafil on vastunäidustatud, ostunud ebaefektiivseks<br>või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid                                |
| 1798555         | ambrisentaan,<br>10mg               | C02KX0<br>2 | AMBRISENTAN<br>MYLAN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK    | Mylan<br>Pharmaceuticals<br>Limited  | 100              | I27.0-I27.0 | Kardioloog,<br>Reumatoloog,<br>Pediaater,<br>Pulmonoloog |        |              |               | NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse<br>sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega<br>seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks<br>patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala<br>spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafili ja bosentaan on<br>vastunäidustatud, osutunud ebaefektiivseks või<br>põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid |
|                 |                                     |             |   |                                      | 50               |             |  |        |              |               |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                      | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|--------------------------------------|------------------|-------------|--|--------|--------------|---------------|---|
| 1349850         | ambrisentaan,<br>5mg                | C02KX0<br>2 | VOLIBRIS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited | 100              | I27.0-I27.0 | Reumatoloog,<br>Kardioloog,<br>Pulmonoloog,<br>Pediaater |        |              |               | NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse<br>sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega<br>seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks<br>patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala<br>spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafili ja bosentaan on<br>vastunäidustatud, osutunud ebaefektiivseks või<br>põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid |
|                 |                                     |             |   |                                      | 50               |             |  |        |              |               |   |
| 1774975         | ambrisentaan,<br>5mg                | C02KX0<br>2 | AMBRISENTAN<br>NORAMEDA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Noramedia UAB                        | 50               |             |  |        |              |               |   |
|                 |                                     |             |   |                                      | 100              | I27.0-I27.0 | Reumatoloog,<br>Pediaater,<br>Kardioloog,<br>Pulmonoloog |        |              |               | NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse<br>sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega<br>seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks<br>patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala<br>spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafili ja bosentaan on<br>vastunäidustatud, osutunud ebaefektiivseks või<br>põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid |
| 1797060         | ambrisentaan,<br>5mg                | C02KX0<br>2 | AMBRISENTAN<br>ZENTIVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK  | Zentiva k.s.                         | 100              | I27.0-I27.0 | Pulmonoloog,<br>Reumatoloog,<br>Kardioloog,<br>Pediaater |        |              |               | NYHA III-IV kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse<br>või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse<br>arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi<br>(vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui<br>sildenafili on vastunäidustatud, osutunud ebaefektiivseks<br>või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid                              |
|                 |                                     |             |   |                                      | 50               |             |  |        |              |               |   |
| 1798533         | ambrisentaan,<br>5mg                | C02KX0<br>2 | AMBRISENTAN<br>MYLAN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK    | Mylan<br>Pharmaceuticals<br>Limited  | 50               |             |  |        |              |               |   |
|                 |                                     |             |   |                                      | 100              | I27.0-I27.0 | Kardioloog,<br>Reumatoloog,<br>Pediaater,<br>Pulmonoloog |        |              |               | NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse<br>sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega<br>seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks<br>patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala<br>spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafili ja bosentaan on<br>vastunäidustatud, osutunud ebaefektiivseks või<br>põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala                   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|------------------------------|------------------|---|--------------------------|--------|--------------|---------------|---|
| 7017959         | aminohapped,                        |             | Neocate Junior, pulber,<br>400g N6                             | Nutrimedical OÜ              | 75               | K52.2-K52.2,<br>L27.2-L27.2,<br>L50-L50, T78.1-<br>T78.1, K22.8-<br>K22.8, K90.4-<br>K90.4, T78.2-<br>T78.2, L20.8-<br>L20.8, T78.0-<br>T78.0 | Pediaater                |        | 1,00         | 2,00          | lehmapiimavalgu talumatusega 1-2- aastastele lastele, kes on esimesel eluaastal tarvitanud aminohapete segu ning kes täielikult hüdrolüüsitud piimasegu ei talu. Jätkuv vajadus aminohapete segule peab olema tõestatud preparaadi esmasel määramisel ja 6 kuu möödudes |
| 1016244         | amiodaroon,<br>200mg                | C01BD0<br>1 | CORDARONE 200 MG,<br>tablett, 30TK                             | Sanofi Winthrop<br>Industrie | 75               | I47-I49   | Pediaater,<br>Kardioloog | esmane |              |               |   |
|                 |                                     |             |  |                              | 50               |   |                          |        |              |               |   |
| 1044616         | amiodaroon,<br>200mg                | C01BD0<br>1 | AMIOKORDIN, tablett,<br>60TK                                   | KRKA d.d. Novo<br>mesto      | 75               | I47-I49   | Pediaater,<br>Kardioloog | esmane |              |               |   |
|                 |                                     |             |  |                              | 50               |   |                          |        |              |               |   |
| 1041141         | amisulpriid, 200mg                  | N05AL0<br>5 | SOLIAN, tablett, 30TK  | Sanofi Winthrop<br>Industrie | 100              | F20-F29, F30-<br>F31  | Psühhiaater              |        |              |               |   |
|                 |                                     |             |  |                              | 50               |   |                          |        |              |               |   |
| 1342213         | amisulpriid, 200mg                  | N05AL0<br>5 | AMISAN 200 MG,<br>tablett, 30TK                                | Pro.Med.Cs Praha<br>a.s.     | 50               |   |                          |        |              |               |   |
|                 |                                     |             |  |                              | 100              | F20-F29, F30-<br>F31  | Psühhiaater              |        |              |               |   |
| 1343438         | amisulpriid, 400mg                  | N05AL0<br>5 | AMISAN 400 MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Pro.Med.Cs Praha<br>a.s.     | 50               |   |                          |        |              |               |   |
|                 |                                     |             |  |                              | 100              | F20-F29, F30-<br>F31  | Psühhiaater              |        |              |               |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|-----------------|------------------|---|-------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1107391         | amitriptüliin, 10mg                 | N06AA09     | AMITRIPTYLINE-GRINDEKS, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK | Grindeks AS     | 75               | G63-G63, G43-G43, G62.0-G62.0   |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                 | 100              | F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                 | 50               |   |             |        |              |               |          |
| 1012475         | amitriptüliin, 25mg                 | N06AA09     | AMITRIPTYLINE-GRINDEKS, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK | Grindeks AS     | 50               |   |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                 | 75               | G63-G63, G43-G43, G62.0-G62.0   |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                 | 100              | F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                            | Müügiloo hoidja                 | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                     | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|---------------------------------|------------------|------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1109900         | amlodipiin, 10mg                    | C08CA0<br>1 | AGEN 10MG, tablett,<br>30TK                      | Zentiva k.s.                    | 75               | I15-I15, I10-I13,<br>I20-I20 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                 | 50               |                              |        |        |              |               |          |
| 1122972         | amlodipiin, 10mg                    | C08CA0<br>1 | HIPRES, tablett, 30TK                            | KRKA d.d. Novo<br>mesto         | 50               |                              |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                 | 75               | I15-I15, I10-I13,<br>I20-I20 |        |        |              |               |          |
| 1147003         | amlodipiin, 10mg                    | C08CA0<br>1 | AMLODIPIN-<br>RATIOPHARM 10 MG,<br>tablett, 30TK | Ratiopharm GmbH                 | 75               | I15-I15, I10-I13,<br>I20-I20 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                 | 50               |                              |        |        |              |               |          |
| 1241514         | amlodipiin, 10mg                    | C08CA0<br>1 | AMLODIGAMMA 10MG,<br>tablett, 30TK               | Woerwag Pharma<br>GmbH & Co. KG | 75               | I15-I15, I10-I13,<br>I20-I20 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                 | 50               |                              |        |        |              |               |          |
| 1243088         | amlodipiin, 10mg                    | C08CA0<br>1 | AMLOCARD 10MG,<br>tablett, 60TK                  | Hexal AG                        | 50               |                              |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                 | 75               | I15-I15, I10-I13,<br>I20-I20 |        |        |              |               |          |
| 1445419         | amlodipiin, 10mg                    | C08CA0<br>1 | AMLODIPINE<br>VITABALANS, tablett,<br>100TK      | Vitabalans Oy                   | 50               |                              |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                 | 75               | I15-I15, I10-I13,<br>I20-I20 |        |        |              |               |          |
| 1551406         | amlodipiin, 10mg                    | C08CA0<br>1 | HIPRES, tablett, 60TK                            | KRKA d.d. Novo<br>mesto         | 75               | I15-I15, I10-I13,<br>I20-I20 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                 | 50               |                              |        |        |              |               |          |
| 1865718         | amlodipiin, 10mg                    | C08CA0<br>1 | AMLODIPINE<br>VITABALANS, tablett,<br>90TK       | Vitabalans Oy                   | 75               | I15-I15, I10-I13,<br>I20-I20 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                 | 50               |                              |        |        |              |               |          |
| 1087871         | amlodipiin, 5mg                     | C08CA0<br>1 | AMLOCARD 5 MG,<br>tablett, 30TK                  | Hexal AG                        | 75               | I15-I15, I10-I13,<br>I20-I20 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                 | 50               |                              |        |        |              |               |          |
| 1109775         | amlodipiin, 5mg                     | C08CA0<br>1 | AMLODIPIN-<br>RATIOPHARM 5 MG,<br>tablett, 30TK  | Ratiopharm GmbH                 | 50               |                              |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                 | 75               | I15-I15, I10-I13,<br>I20-I20 |        |        |              |               |          |
| 1109887         | amlodipiin, 5mg                     | C08CA0<br>1 | AGEN 5MG, tablett,<br>30TK                       | Zentiva k.s.                    | 75               | I15-I15, I10-I13,<br>I20-I20 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                 | 50               |                              |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                     | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|--------------------------------|------------------|------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1122961         | amlodipiin, 5mg                     | C08CA0<br>1 | HIPRES, tablett, 30TK   | KRKA d.d. Novo mesto           | 75               | I15-I15, I10-I13,<br>I20-I20 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                                | 50               |                              |        |        |              |               |          |
| 1241424         | amlodipiin, 5mg                     | C08CA0<br>1 | AMLODIGAMMA 5MG,<br>tablett, 30TK   | Woerwag Pharma GmbH & Co. KG   | 75               | I15-I15, I10-I13,<br>I20-I20 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                                | 50               |                              |        |        |              |               |          |
| 1242863         | amlodipiin, 5mg                     | C08CA0<br>1 | AMLOCARD 5 MG,<br>tablett, 60TK   | Hexal AG                       | 75               | I15-I15, I10-I13,<br>I20-I20 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                                | 50               |                              |        |        |              |               |          |
| 1445307         | amlodipiin, 5mg                     | C08CA0<br>1 | AMLODIPINE<br>VITABALANS, tablett,<br>100TK   | Vitabalans Oy                  | 50               | I15-I15, I10-I13,<br>I20-I20 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                                | 75               |                              |        |        |              |               |          |
| 1551383         | amlodipiin, 5mg                     | C08CA0<br>1 | HIPRES, tablett, 60TK   | KRKA d.d. Novo mesto           | 50               | I15-I15, I10-I13,<br>I20-I20 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                                | 75               |                              |        |        |              |               |          |
| 1865707         | amlodipiin, 5mg                     | C08CA0<br>1 | AMLODIPINE<br>VITABALANS, tablett,<br>90TK  | Vitabalans Oy                  | 50               | I15-I15, I20-I20,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                                | 75               |                              |        |        |              |               |          |
| 1008919         | amoksitsilliin,<br>1000mg           | J01CA0<br>4 | AMOXICILLIN-<br>RATIOPHARM 1000<br>MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK | Ratiopharm GmbH                | 50               | H65-H67, J13-<br>J18         |        |        |              | 16,00         |          |
|                 |                                     |             |   |                                | 75               |                              |        |        |              |               |          |
| 1066463         | amoksitsilliin,<br>1000mg           | J01CA0<br>4 | AMOXICILLIN-<br>RATIOPHARM 1000<br>MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>20TK | Ratiopharm GmbH                | 50               | H65-H67, J13-<br>J18         |        |        |              | 16,00         |          |
|                 |                                     |             |   |                                | 75               |                              |        |        |              |               |          |
| 1306921         | amoksitsilliin,<br>1000mg           | J01CA0<br>4 | OSPAMOX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>20TK                               | Sandoz Pharmaceuticals<br>d.d. | 75               | H65-H67, J13-<br>J18         |        |        |              | 16,00         |          |
|                 |                                     |             |   |                                | 50               |                              |        |        |              |               |          |
| 1000382         | amoksitsilliin,<br>50mg 1ml         | J01CA0<br>4 | AMOXICILLIN-<br>RATIOPHARM TS,<br>suukaudse suspensiooni<br>pulber, 100ml 1TK       | Ratiopharm GmbH                | 75               | H65-H67, J13-<br>J18         |        |        |              | 16,00         |          |
|                 |                                     |             |   |                                | 50               |                              |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                  | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla   | Märkused  |
|-----------------|--|-------------|--|--|------------------|----------------------|--------|--------|--------------|---|---|
| 1000450         | amoksitsilliin,<br>750mg                             | J01CA0<br>4 | AMOXICILLIN-<br>RATIOPHARM 750 MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK | Ratiopharm GmbH                                | 50               |                      |        |        |              |   |   |
|                 |  |             |  |  | 75               | H65-H67, J13-<br>J18 |        |        | 16,00        |   |   |
| 1066722         | amoksitsilliin+klav<br>ulaanhape,<br>500mg+125mg     | J01CR0<br>2 | AMOKSIKLAV, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK                           | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.              | 75               | H65-H67, J13-<br>J18 |        |        |              | 16,00   | kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või<br>fenoksümetüülpenitsilliiniga |
|                 |  |             |  |  | 50               |                      |        |        |              |   |   |
| 1066711         | amoksitsilliin+klav<br>ulaanhape,<br>80mg+11,4mg 1ml | J01CR0<br>2 | AMOKSIKLAV,<br>suukaudse suspensiooni<br>pulber, 70ml 1TK                          | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.              | 75               | H65-H67, J13-<br>J18 |        |        |              | 16,00   | kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või<br>fenoksümetüülpenitsilliiniga |
|                 |  |             |  |  | 50               |                      |        |        |              |   |   |
| 1701155         | amoksitsilliin+klav<br>ulaanhape,<br>80mg+11,4mg 1ml | J01CR0<br>2 | MEDOCLAV, suukaudse<br>suspensiooni pulber,<br>70ml 1TK                            | Medochemie<br>Limited                          | 75               | H65-H67, J13-<br>J18 |        |        |              | 16,00   | kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või<br>fenoksümetüülpenitsilliiniga |
|                 |  |             |  |  | 50               |                      |        |        |              |   |   |
| 1718333         | amoksitsilliin+klav<br>ulaanhape,<br>80mg+11,4mg 1ml | J01CR0<br>2 | AUGMENTIN FRUIT,<br>suukaudse suspensiooni<br>pulber, 70ml 1TK                     | GlaxoSmithKline<br>Trading Services<br>Limited | 50               |                      |        |        |              |   |   |
|                 |  |             |  |  | 75               | H65-H67, J13-<br>J18 |        |        | 16,00        | kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või<br>fenoksümetüülpenitsilliiniga |   |
| 1822700         | amoksitsilliin+klav<br>ulaanhape,<br>80mg+11,4mg 1ml | J01CR0<br>2 | AUGMENTIN FRUIT,<br>suukaudse suspensiooni<br>pulber, 70ml 1TK                     | First Pharma OÜ                                | 75               | H65-H67, J13-<br>J18 |        |        |              | 16,00   | kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või<br>fenoksümetüülpenitsilliiniga |
|                 |  |             |  |  | 50               |                      |        |        |              |   |   |
| 1840722         | amoksitsilliin+klav<br>ulaanhape,<br>80mg+11,4mg 1ml | J01CR0<br>2 | AUGMENTIN FRUIT,<br>suukaudse suspensiooni<br>pulber, 70ml 1TK                     | Ideal Trade Links<br>UAB                       | 75               | H65-H67, J13-<br>J18 |        |        |              | 16,00   | kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või<br>fenoksümetüülpenitsilliiniga |
|                 |  |             |  |  | 50               |                      |        |        |              |   |   |
| 1066700         | amoksitsilliin+klav<br>ulaanhape,<br>875mg+125mg     | J01CR0<br>2 | AMOKSIKLAV, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK                           | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.              | 75               | H65-H67, J13-<br>J18 |        |        |              | 16,00   | kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või<br>fenoksümetüülpenitsilliiniga |
|                 |  |             |  |  | 50               |                      |        |        |              |   |   |
| 1066733         | amoksitsilliin+klav<br>ulaanhape,<br>875mg+125mg     | J01CR0<br>2 | AUGMENTIN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK                            | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited           | 50               |                      |        |        |              |   |   |
|                 |  |             |  |  | 75               | H65-H67, J13-<br>J18 |        |        | 16,00        | kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või<br>fenoksümetüülpenitsilliiniga |   |
| 1175431         | amoksitsilliin+klav<br>ulaanhape,<br>875mg+125mg     | J01CR0<br>2 | AMOKSIKLAV,<br>dispergeeruv tablett,<br>14TK                                       | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.              | 75               | H65-H67, J13-<br>J18 |        |        |              | 16,00   | kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või<br>fenoksümetüülpenitsilliiniga |
|                 |  |             |  |  | 50               |                      |        |        |              |   |   |
| 1635230         | amoksitsilliin+klav<br>ulaanhape,<br>875mg+125mg     | J01CR0<br>2 | BETAKLAV, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK                             | KRKA, d.d., Novo<br>mesto                      | 75               | H65-H67, J13-<br>J18 |        |        |              | 16,00   | kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või<br>fenoksümetüülpenitsilliiniga |
|                 |  |             |  |  | 50               |                      |        |        |              |   |   |



| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus             | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                     | Soodus-tus % | Diagnoos         | Eriala                          | Esmane | Vanus üle | Vanus alla   | Märkused   |
|-------------|---|----------|---|-------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------------|--------|-----------|--|--|
| 1660474     | amoksitsilliin+klavulaanhape, 875mg+125mg | J01CR02  | AMOXICILLIN/CLAVULANIC ACID ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK | Teva B.V.                           | 50           |                  |                                 |        |           |  |  |
|             |   |          |   |                                     | 75           | H65-H67, J13-J18 |                                 |        | 16,00     | kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliiniga |  |
| 1723092     | amoksitsilliin+klavulaanhape, 875mg+125mg | J01CR02  | AUGMENTIN, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK                           | First Pharma OÜ                     | 75           | H65-H67, J13-J18 |                                 |        |           | 16,00  | kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliiniga   |
|             |   |          |   |                                     | 50           |                  |                                 |        |           |  |  |
| 1743971     | amoksitsilliin+klavulaanhape, 875mg+125mg | J01CR02  | MEDOCLAV, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK                            | Medochemie Limited                  | 75           | H65-H67, J13-J18 |                                 |        |           | 16,00  | kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliiniga   |
|             |   |          |   |                                     | 50           |                  |                                 |        |           |  |  |
| 1840700     | amoksitsilliin+klavulaanhape, 875mg+125mg | J01CR02  | AUGMENTIN, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK                           | Ideal Trade Links UAB               | 50           |                  |                                 |        |           |  |  |
|             |   |          |   |                                     | 75           | H65-H67, J13-J18 |                                 |        | 16,00     | kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliiniga |  |
| 1009572     | amorolfiin, 50mg 1ml                      | D01AE16  | LOCERYL, ravimküünelakk, 2.5ml 1TK  | Galderma International              | 50           |                  |                                 |        |           |  |  |
| 1736580     | amorolfiin, 50mg 1ml                      | D01AE16  | EXOLORFIN, ravimküünelakk, 2.5ml 1TK  | Sandoz Pharmaceuticals d.d.         | 50           |                  |                                 |        |           |  |  |
| 1860555     | amorolfiin, 50mg 1ml                      | D01AE16  | LOCERYL, ravimküünelakk, 2.5ml 1TK  | Ideal Trade Links UAB               | 50           |                  |                                 |        |           |  |  |
| 1765649     | anagreliid, 0,5mg                         | L01XX35  | ANAGRELIDE VIATRIS, kõvakapsel, 100TK                                       | Viatrix Limited                     | 100          | D47.3-D47.3      | Hematoloog                      |        |           |  | patsientidele, kellel ravi alustamine on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: esmavaliku ravi (hüdroksüürea annuses vähemalt 2 g päevas vähemalt 3 kuu jooksul või alfa-interferoon) on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks ning esineb trombotsütoos 1000x109/l või on ilmnunud trombohemorraagilised juhud |
| 1033546     | anastrosool, 1mg                          | L02BG03  | ARIMIDEX, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK                            | Laboratoires Juvisé Pharmaceuticals | 50           |                  |                                 |        |           |  |  |
|             |   |          |   |                                     | 100          | C50-C50          | Günekoloog, Onkoloog, Üldkirurg |        |           |  | günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks   |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja               | Soodus-tus % | Diagnoos | Eriala                          | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-------------|-------------------------------|----------|--|-------------------------------|--------------|----------|---------------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1240490     | anastrosool, 1mg              | L02BG03  | ANASTROZOLE SANOSWISS 1 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Sanoswiss UAB                 | 50           |          |                                 |        |           |            |   |
|             |                               |          |  |                               | 100          | C50-C50  | Üldkirurg, Onkoloog, Günekoloog |        |           |            | günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks  |
| 1244438     | anastrosool, 1mg              | L02BG03  | ANASTROZOLE-TEVA 1MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK       | Teva Pharma B.V.              | 50           |          |                                 |        |           |            |   |
|             |                               |          |  |                               | 100          | C50-C50  | Üldkirurg, Günekoloog, Onkoloog |        |           |            | günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks  |
| 1293870     | anastrosool, 1mg              | L02BG03  | ANASTROZOLE ACCORD 1MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK     | Accord Healthcare B.V.        | 100          | C50-C50  | Günekoloog, Onkoloog, Üldkirurg |        |           |            | günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks  |
|             |                               |          |  |                               | 50           |          |                                 |        |           |            |   |
| 1825365     | anastrosool, 1mg              | L02BG03  | ANASTROZOLE ELVIM, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK          | SIA Elvim                     | 100          | C50-C50  | Onkoloog, Günekoloog, Üldkirurg |        |           |            | günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks  |
|             |                               |          |  |                               | 50           |          |                                 |        |           |            |   |
| 3043235     | apalutamiid, 240mg            | L02BB05  | ERLEADA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK                    | Janssen - Cilag International | 100          | C61-C61  | Uroloog, Onkoloog               |        |           |            | metastaatilise hormoonsensitiivse eesnäärmevähi raviks. Kõrge riskiga haiguse korral võib apalutamiidi määrata patsientidele, kellel abirateroon on vastunäidustatud või abiraterooni kasutamisel esinevad talumatud kõrvaltoimeid. Patsient ei tohi olla varasemalt saanud ravi teise põlvkonna androgeenireseptori inhibiitoriga, v.a. juhul, kui ravi on katkestatud kõrvaltoimete tõttu. Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi apalutamiidiga on ravimootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 01.01.2023 |
| 1787441     | apalutamiid, 60mg             | L02BB05  | ERLEADA, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK                   | Janssen - Cilag International | 100          | C61-C61  | Uroloog, Onkoloog               |        |           |            | metastaatilise hormoonsensitiivse eesnäärmevähi raviks. Kõrge riskiga haiguse korral võib apalutamiidi määrata patsientidele, kellel abirateroon on vastunäidustatud või abiraterooni kasutamisel esinevad talumatud kõrvaltoimeid. Patsient ei tohi olla varasemalt saanud ravi teise põlvkonna androgeenireseptori inhibiitoriga, v.a. juhul, kui ravi on katkestatud kõrvaltoimete tõttu. Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi apalutamiidiga on ravimootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 01.01.2023 |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                           | Müügiloa hoidja                        | Soodus-tus % | Diagnoos                          | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla                               | Märkused  |
|-------------|-------------------------------|----------|---|--|--------------|-----------------------------------|-------------|--------|-----------|--|---|
| 1531448     | apiksabaan, 2,5mg             | B01AF02  | ELIQUIS, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG       | 75           | M16-M17, S72.0-S72.2, S72.7-S72.7 |             |        |           |  | kuni 30 päevaks   |
|             |                               |          |   |  | 75           | I48-I48                           |             |        |           |  |   |
|             |                               |          |   |  | 50           |                                   |             |        |           |  |   |
|             |                               |          |   |  | 100          | I67.6-I67.6, I80-I82, I26-I26     |             |        |           | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |   |
| 1603741     | apiksabaan, 5mg               | B01AF02  | ELIQUIS, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG       | 75           | I48-I48                           |             |        |           |  |   |
|             |                               |          |   |  | 100          | I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6     |             |        |           | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |   |
|             |                               |          |   |  | 50           |                                   |             |        |           |  |   |
| 1504808     | apomorfiin, 10mg 1ml          | N04BC07  | APO-GO, süstelahus pen-süstlis, 3ml 5TK         | Stada Arzneimittel AG                  | 100          | G20-G20                           | Neuroloog   |        |           |  | konsiiliumi (vähemalt 3 neuroloogi) otsuse alusel patsientidele, kellel esineb vaatamata optimaalsele suukaudsele ravile raskekujuline motoorikahäire kestvate või sagedaste mootorsete fluktuatsioonidega (MDS-UPDRS III skoor off-perioodis on >40 punkti, off-perioodi kestus >25% ärkvelolekuajast) ning ravivastus apomorfiinile on hea (MDS-UPDRS III skoor paraneb >40%) |
| 1649796     | aripiprasool, 10mg            | N05AX12  | ZYKALOR, tablett, 30TK                          | Medochemie Limited                     | 100          | F20-F29, F30-F31                  | Psühhiaater |        |           |  |   |
|             |                               |          |   |  | 100          | F32.3-F32.3, F33.3-F33.3          | Psühhiaater | esmane |           |  |   |
|             |                               |          |   |  | 50           |                                   |             |        |           |  |   |
| 1649819     | aripiprasool, 10mg            | N05AX12  | ZYKALOR, tablett, 60TK                          | Medochemie Limited                     | 50           |                                   |             |        |           |  |   |
|             |                               |          |   |  | 100          | F32.3-F32.3, F33.3-F33.3          | Psühhiaater | esmane |           |  |   |
|             |                               |          |   |  | 100          | F20-F29, F30-F31                  | Psühhiaater |        |           |  |   |
| 1203578     | aripiprasool, 15mg            | N05AX12  | ABILIFY, tablett, 28TK                          | Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. | 50           |                                   |             |        |           |  |   |
|             |                               |          |   |  | 100          | F32.3-F32.3, F33.3-F33.3          | Psühhiaater | esmane |           |  |   |
|             |                               |          |   |  | 100          | F20-F29, F30-F31                  | Psühhiaater |        |           |  |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                 | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                    | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1649651         | aripiprasool, 15mg                  | N05AX1<br>2 | ARIPIPRAZOLE TEVA,<br>tablett, 28TK   | Teva B.V.                   | 50               |                             |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                       |                             | 100              | F20-F29, F30-<br>F31        | Psühhiaater |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                       |                             | 100              | F32.3-F32.3,<br>F33.3-F33.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
| 1649853         | aripiprasool, 15mg                  | N05AX1<br>2 | ZYKALOR, tablett, 30TK                | Medochemie<br>Limited       | 100              | F20-F29, F30-<br>F31        | Psühhiaater |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                       |                             | 50               |                             |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                       |                             | 100              | F32.3-F32.3,<br>F33.3-F33.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
| 1650271         | aripiprasool, 15mg                  | N05AX1<br>2 | ARISPPA, tablett, 60TK                | KRKA, d.d., Novo<br>mesto   | 50               |                             |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                       |                             | 100              | F32.3-F32.3,<br>F33.3-F33.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                       |                             | 100              | F20-F29, F30-<br>F31        | Psühhiaater |        |              |               |          |
| 1703630         | aripiprasool, 15mg                  | N05AX1<br>2 | ARIPIPRAZOLE<br>ACCORD, tablett, 28TK | Accord Healthcare<br>S.L.U. | 50               |                             |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                       |                             | 100              | F32.3-F32.3,<br>F33.3-F33.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                       |                             | 100              | F20-F29, F30-<br>F31        | Psühhiaater |        |              |               |          |
| 1650349         | aripiprasool, 30mg                  | N05AX1<br>2 | ARISPPA, tablett, 30TK                | KRKA, d.d., Novo<br>mesto   | 50               |                             |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                       |                             | 100              | F20-F29, F30-<br>F31        | Psühhiaater |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                       |                             | 100              | F32.3-F32.3,<br>F33.3-F33.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja                 | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                          | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|---------------------------------|------------------|-----------------------------------|--|--------|--------------|---------------|----------|
| 1004500         | asatiopriin, 50mg                   | L04AX0<br>1 | IMURAN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK | Aspen Pharma<br>Trading Limited | 100              | Z94-Z94, T86-<br>T86              |  |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                                 | 75               | L12-L12, L13.0-<br>L13.0, L10-L10 | Pediaater,<br>Dermatovenerol<br>oog,<br>Allergoloog-<br>immunoloog |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                                 | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46     | Pediaater,<br>Reumatoloog  |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                                 | 75               | K50-K51, K73-<br>K74              | Pediaater,<br>Gastroenteroloog                                     |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                                 | 50               |                                   |  |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                                 | 100              | G70-G70                           | Pediaater,<br>Neuroloog  | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                                 | 75               | N00-N08                           | Pediaater,<br>Nefroloog  |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                                 | 75               | L40-L40                           | Dermatovenerol<br>oog, Pediaater                                   |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                                 | 75               | L20-L20                           | Dermatovenerol<br>oog  |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood             | Ravim, pakendi suurus                                    | Müügiloa hoidja                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                          | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------|--|----------------------------------|------------------|-----------------------------------|--|--------|--------------|---------------|----------|
| 1667325         | asatiopriin, 50mg                   | L04AX0<br>1             | ATSIMUTIN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK | Bausch Health<br>Ireland Limited | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46     | Pediaater,<br>Reumatoloog  |        |              |               |          |
|                 |                                     |                         |  |                                  | 100              | G70-G70                           | Neuroloog,<br>Pediaater  | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |                         |  |                                  | 75               | L20-L20                           | Dermatovenerol<br>oog  |        |              |               |          |
|                 |                                     |                         |  |                                  | 50               |                                   |  |        |              |               |          |
|                 |                                     |                         |  |                                  | 75               | L40-L40                           | Pediaater,<br>Dermatovenerol<br>oog                                |        |              |               |          |
|                 |                                     |                         |  |                                  | 75               | L12-L12, L13.0-<br>L13.0, L10-L10 | Pediaater,<br>Dermatovenerol<br>oog,<br>Allergoloog-<br>immunoloog |        |              |               |          |
|                 |                                     |                         |  |                                  | 100              | Z94-Z94, T86-<br>T86              |  |        |              |               |          |
|                 |                                     |                         |  |                                  | 75               | K50-K51, K73-<br>K74              | Gastroenteroloog,<br>Pediaater                                     |        |              |               |          |
| 75              | N00-N08                             | Nefroloog,<br>Pediaater |  |                                  |                  |                                   |  |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                          | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|---------------------------|------------------|-----------------------------------|--|--------|--------------|---------------|----------|
| 1865099         | asatiopriin, 50mg                   | L04AX0<br>1 | IMURAN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK             | Ideal Trade Links<br>UAB  | 75               | L20-L20                           | Dermatovenerol<br>oog  |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                           | 75               | L40-L40                           | Pediaater,<br>Dermatovenerol<br>oog                                |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                           | 75               | M45-M46, M05-<br>M08, M30-M35     | Reumatoloog,<br>Pediaater  |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                           | 75               | L10-L10, L13.0-<br>L13.0, L12-L12 | Allergoloog-<br>immunoloog,<br>Pediaater,<br>Dermatovenerol<br>oog |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                           | 75               | N00-N08                           | Nefroloog,<br>Pediaater  |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                           | 50               |                                   |  |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                           | 100              | G70-G70                           | Pediaater,<br>Neuroloog  | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                           | 75               | K50-K51, K73-<br>K74              | Pediaater,<br>Gastroenteroloog                                     |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                           | 100              | Z94-Z94, T86-<br>T86              |  |        |              |               |          |
| 1005736         | aselaiinhape,<br>200mg 1g           | D10AX0<br>3 | SKINOREN, kreem, 30g<br>1TK                                       | LEO Pharma A/S            | 50               |                                   |  |        |              |               |          |
| 1831979         | aselaiinhape,<br>200mg 1g           | D10AX0<br>3 | SKINOREN, kreem, 30g<br>1TK                                       | Lex Ano UAB               | 50               |                                   |  |        |              |               |          |
| 1019775         | asitromütsiin,<br>250mg             | J01FA10     | SUMAMED, kõvakapsel,<br>6TK                                       | Teva Pharma B.V.          | 100              | E84-E84                           | Pulmonoloog,<br>Pediaater  | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                           | 50               |                                   |  |        |              |               |          |
| 1614439         | asitromütsiin,<br>250mg             | J01FA10     | AZITHROMYCIN KRKA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>6TK | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 50               |                                   |  |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                           | 100              | E84-E84                           | Pulmonoloog,<br>Pediaater  | esmane |              |               |          |
| 1267309         | asitromütsiin,<br>40mg 1ml          | J01FA10     | SUMAMED FORTE,<br>suukaudse suspensiooni<br>pulber, 30ml 1TK      | Teva Pharma B.V.          | 50               |                                   |  |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                           | 100              | E84-E84                           | Pediaater,<br>Pulmonoloog  | esmane |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|---------------------------|------------------|---|---------------------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1019797         | asitromütsiin,<br>500mg             | J01FA10     | SUMAMED, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>3TK                         | Teva Pharma B.V.          | 50               |   |                           |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 100              | E84-E84   | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane |              |               |          |
| 1113398         | asitromütsiin,<br>500mg             | J01FA10     | AZITROX 500 MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>3TK               | Zentiva k.s.              | 50               |   |                           |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 100              | E84-E84   | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane |              |               |          |
| 1184992         | asitromütsiin,<br>500mg             | J01FA10     | AZITHROMYCIN<br>SANDOZ 500MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>3TK | Sandoz GmbH               | 100              | E84-E84   | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 50               |   |                           |        |              |               |          |
| 1549548         | asitromütsiin,<br>500mg             | J01FA10     | AZITHROMYCIN<br>GRINDEKS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>3TK        | Grindeks AS               | 50               |   |                           |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 100              | E84-E84   | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane |              |               |          |
| 1563342         | asitromütsiin,<br>500mg             | J01FA10     | ZYLUMIT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>3TK                         | Rivopharm Limited         | 100              | E84-E84   | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 50               |   |                           |        |              |               |          |
| 1614451         | asitromütsiin,<br>500mg             | J01FA10     | AZITHROMYCIN KRKA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>3TK            | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 50               |   |                           |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 100              | E84-E84   | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane |              |               |          |
| 1045796         | aspart-insuliin,<br>100ühik 1ml     | A10AB0<br>5 | NOVORAPID PENFILL,<br>süstelahus kolbampullis,<br>3ml 5TK                    | Novo Nordisk A/S          | 50               |   |                           |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 100              | O24-O24, E13-<br>E14, E10-E11,<br>P70.2-P70.2,<br>E89.1-E89.1 |                           |        |              |               |          |
| 1084788         | aspart-insuliin,<br>100ühik 1ml     | A10AD0<br>5 | NOVOMIX 30<br>FLEXPEN,<br>süstesuspensioon pen-<br>süstlis, 3ml 5TK          | Novo Nordisk A/S          | 50               |   |                           |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 100              | O24-O24, E13-<br>E14, E10-E11,<br>P70.2-P70.2,<br>E89.1-E89.1 |                           |        |              |               |          |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala     | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|----------------------------------|------------------|---|------------|--------|--------------|---------------|---|
| 1092541         | aspart-insuliin,<br>100ühik 1ml     | A10AB0<br>5 | NOVORAPID<br>FLEXPEN, süstelahus<br>pen-süstlis, 3ml 5TK                       | Novo Nordisk A/S                 | 50               |   |            |        |              |               |   |
|                 |                                     |             |  |                                  | 100              | O24-O24, E13-<br>E14, E10-E11,<br>P70.2-P70.2,<br>E89.1-E89.1 |            |        |              |               |   |
| 1736917         | aspart-insuliin,<br>100ühik 1ml     | A10AB0<br>5 | FIASP, süstelahus pen-<br>süstlis, 3ml 5TK                                     | Novo Nordisk A/S                 | 100              | O24-O24, E13-<br>E14, E10-E11,<br>P70.2-P70.2,<br>E89.1-E89.1 |            |        |              |               |   |
|                 |                                     |             |  |                                  | 50               |   |            |        |              |               |   |
| 1736940         | aspart-insuliin,<br>100ühik 1ml     | A10AB0<br>5 | FIASP, süstelahus<br>kolbampullis, 3ml 5TK                                     | Novo Nordisk A/S                 | 100              | O24-O24, E13-<br>E14, E10-E11,<br>P70.2-P70.2,<br>E89.1-E89.1 |            |        |              |               |   |
|                 |                                     |             |  |                                  | 50               |   |            |        |              |               |   |
| 1888735         | astsiminiib, 20mg                   | L01EA0<br>6 | SCSEMBLIX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK                        | Novartis<br>Europharm<br>Limited | 100              | C92.1-C92.1   | Hematoloog |        |              |               | konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi ühise) otsuse alusel<br>patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist<br>vastust indutseeriv ravi ja kelle eelnev ravi kahe või<br>enama türosiinikinaasi inhibiitoriga on ebaõnnestunud |
| 1888757         | astsiminiib, 40mg                   | L01EA0<br>6 | SCSEMBLIX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK                        | Novartis<br>Europharm<br>Limited | 100              | C92.1-C92.1   | Hematoloog |        |              |               | konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi ühise) otsuse alusel<br>patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist<br>vastust indutseeriv ravi ja kelle eelnev ravi kahe või<br>enama türosiinikinaasi inhibiitoriga on ebaõnnestunud |
| 1007851         | atenolool, 100mg                    | C07AB0<br>3 | ATENOLOL-<br>RATIOPHARM 100MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Ratiopharm GmbH                  | 50               |   |            |        |              |               |   |
|                 |                                     |             |  |                                  | 75               | I10-I13, I15-I15,<br>I20-I20, I47-I49                         |            |        |              |               |   |
| 1007895         | atenolool, 25mg                     | C07AB0<br>3 | ATENOLOL-<br>RATIOPHARM 25MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK  | Ratiopharm GmbH                  | 50               |   |            |        |              |               |   |
|                 |                                     |             |  |                                  | 75               | I10-I13, I15-I15,<br>I20-I20, I47-I49                         |            |        |              |               |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                              | Eriala    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|--|------------------|---------------------------------------|-----------|--------|--------------|---------------|---|
| 1007873         | atenolool, 50mg                     | C07AB03     | ATENOLOL-<br>RATIOPHARM 50MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Ratiopharm GmbH                        | 50<br>75         | I10-I13, I15-I15,<br>I20-I20, I47-I49 |           |        |              |               |   |
| 3041738         | atogepant, 10mg                     | N02CD07     | AQUIPTA, tablett, 28TK  | AbbVie<br>Deutschland<br>GmbH & Co. KG | 75               | G43-G43                               | Neuroloog | esmane |              |               | kroonilise migreeni profülaktiliseks raviks täiskasvanutel, kellel esinevad peavalud >=15 päeval kuus, millest vähemalt 8 päeval on tegemist migreeni kriteeriume täitvate hoogudega ja kellel on vähemalt 3 eelnevat Eesti või rahvusvahelistes ravijuhistes mainitud profülaktilist ravi dokumenteeritult ebaõnnestunud. Ravivastust hinnatakse 6 ravikuu möödumisel ning soodustusega väljakirjutamise õigus jätkub patsientidele, kellel raviarsti hinnangul on dokumenteeritult >=50% vähenemine peavalupäevade arvus kuus. Edaspidi tuleb ravi jätkamise vajadust hinnata regulaarselt 6-12 kuu järel, ravi jätkamise eelduseks on püsiv ravivastus. Ravi lõpetatakse, kui peavalupäevade arv on alla 4 päeva kuus vähemalt 6 järjestikuse kuu vältel |
| 3041750         | atogepant, 60mg                     | N02CD07     | AQUIPTA, tablett, 28TK  | AbbVie<br>Deutschland<br>GmbH & Co. KG | 75               | G43-G43                               | Neuroloog | esmane |              |               | kroonilise migreeni profülaktiliseks raviks täiskasvanutel, kellel esinevad peavalud >=15 päeval kuus, millest vähemalt 8 päeval on tegemist migreeni kriteeriume täitvate hoogudega ja kellel on vähemalt 3 eelnevat Eesti või rahvusvahelistes ravijuhistes mainitud profülaktilist ravi dokumenteeritult ebaõnnestunud. Ravivastust hinnatakse 6 ravikuu möödumisel ning soodustusega väljakirjutamise õigus jätkub patsientidele, kellel raviarsti hinnangul on dokumenteeritult >=50% vähenemine peavalupäevade arvus kuus. Edaspidi tuleb ravi jätkamise vajadust hinnata regulaarselt 6-12 kuu järel, ravi jätkamise eelduseks on püsiv ravivastus. Ravi lõpetatakse, kui peavalupäevade arv on alla 4 päeva kuus vähemalt 6 järjestikuse kuu vältel |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus              | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|--|--------|--------------|---------------|--|
| 1610536         | atomoksetiin,<br>10mg               | N06BA0<br>9 | ATOMINEX 10MG,<br>kõvakapsel, 56TK | Zentiva k.s.    | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater –<br>laste- ja<br>noorukitepsühhi<br>aater,<br>Psühhiaater | esmane | 20,00        |               | ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: esineb mõõdukas kuni raske funktsionaalne kahjustus vähemalt kahes olukorras (sotsiaalne, akadeemiline ja/või tööalane tegevus), haigus mõjutab konkreetse inimese elu mitmeid aspekte ning viide haiguse esinemisele on tõendatult tuvastatav lapseeest. Ravimi väljakirjutamise õigus esmavalikuna on kaasuva sõltuvushäire esinemisel ning teise valikuna kaasuva sõltuvushäire puudumisel, kui metüülfenidaat on olnud ebaefektiivne või talumatu. Ravi efektiivsus on hinnatav 6-nädalase perioodi jooksul kasutamisel adekvaatses annuses. |
|                 |                                     |             |                                    |                 | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater –<br>laste- ja<br>noorukitepsühhi<br>aater                 | esmane | 6,00         | 20,00         | ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: farmakoterapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (2 Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti 2 erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, CGAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega;    |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus              | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla  | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|--|--------|--------------|--|--|
| 1610615         | atomoksetiin,<br>18mg               | N06BA0<br>9 | ATOMINEX 18MG,<br>kõvakapsel, 56TK | Zentiva k.s.    | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater –<br>laste- ja<br>noorukitepsühhi<br>aater                 | esmane | 6,00         | 20,00  | ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel:<br>farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud<br>lastepsühhiaatriline meeskond (2 Eesti Psühhiaatrite<br>Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega<br>psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-<br>eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti 2<br>erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega<br>kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb<br>mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi<br>kirjelduse alusel, CGAS skoor <=50 punkti); ravi toimub<br>koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete<br>rakendamisega; |
|                 |                                     |             |                                    |                 | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater,<br>Psühhiaater –<br>laste- ja<br>noorukitepsühhi<br>aater | esmane | 20,00        | ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: esineb<br>mõõdukas kuni raske funktsionaalne kahjustus vähemalt<br>kahes olukorras (sotsiaalne, akadeemiline ja/või tööalane<br>tegevus), haigus mõjutab konkreetse inimese elu mitmeid<br>aspekte ning viide haiguse esinemisele on tõendatult<br>tuvastatav lapseeast. Ravimi väljakirjutamise õigus<br>esmavalikuna on kaasuva sõltuvushäire esinemisel ning<br>teise valikuna kaasuva sõltuvushäire puudumisel, kui<br>metüülfenidaat on olnud ebaefektiivne või talumatu. Ravi<br>efektiivsus on hinnatav 6-nädalase perioodi jooksul<br>kasutamisel adekvaatses annuses. |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus               | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|--|--------|--------------|---------------|--|
| 1610693         | atomoksetiin,<br>25mg               | N06BA0<br>9 | ATOMINEX 25 MG,<br>kõvakapsel, 56TK | Zentiva k.s.    | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater,<br>Psühhiaater –<br>laste- ja<br>noorukitepsühhi<br>aater | esmane | 20,00        |               | ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: esineb mõõdukas kuni raske funktsionaalne kahjustus vähemalt kahes olukorras (sotsiaalne, akadeemiline ja/või tööalane tegevus), haigus mõjutab konkreetse inimese elu mitmeid aspekte ning viide haiguse esinemisele on tõendatult tuvastatav lapseeest. Ravimi väljakirjutamise õigus esmavalikuna on kaasuva sõltuvushäire esinemisel ning teise valikuna kaasuva sõltuvushäire puudumisel, kui metüülfenidaat on olnud ebaefektiivne või talumatu. Ravi efektiivsus on hinnatav 6-nädalase perioodi jooksul kasutamisel adekvaatses annuses. |
|                 |                                     |             |                                     |                 | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater –<br>laste- ja<br>noorukitepsühhi<br>aater                 | esmane | 6,00         | 20,00         | ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (2 Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti 2 erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, CGAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega;   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus               | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla  | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|--|--------|--------------|--|--|
| 1610772         | atomoksetiin,<br>40mg               | N06BA0<br>9 | ATOMINEX 40 MG,<br>kõvakapsel, 56TK | Zentiva k.s.    | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater –<br>laste- ja<br>noorukitepsühhi<br>aater                 | esmane | 6,00         | 20,00  | ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel:<br>farmakoterapia alustamise otsuse on langetanud<br>lastepsühhiaatriline meeskond (2 Eesti Psühhiaatrite<br>Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega<br>psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-<br>eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti 2<br>erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega<br>kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb<br>mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi<br>kirjelduse alusel, CGAS skoor ≤50 punkti); ravi toimub<br>koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete<br>rakendamisega; |
|                 |                                     |             |                                     |                 | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater –<br>laste- ja<br>noorukitepsühhi<br>aater,<br>Psühhiaater | esmane | 20,00        | ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: esineb<br>mõõdukas kuni raske funktsionaalne kahjustus vähemalt<br>kahes olukorras (sotsiaalne, akadeemiline ja/või tööalane<br>tegevus), haigus mõjutab konkreetse inimese elu mitmeid<br>aspekte ning viide haiguse esinemisele on tõendatult<br>tuvastatav lapseeast. Ravimi väljakirjutamise õigus<br>esmavalikuna on kaasuva sõltuvushäire esinemisel ning<br>teise valikuna kaasuva sõltuvushäire puudumisel, kui<br>metüülfenidaat on olnud ebaefektiivne või talumatu. Ravi<br>efektiivsus on hinnatav 6-nädalase perioodi jooksul<br>kasutamisel adekvaatses annuses. |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                | Müügiloa hoidja         | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla   | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|-------------------------|------------------|--|--|--------|--------------|---|--|
| 1610851         | atomoksetiin,<br>60mg               | N06BA0<br>9 | ATOMINEX 60 MG,<br>kõvakapsel, 56TK                  | Zentiva k.s.            | 75               | F90.0-F90.1  | Psühhiaater –<br>laste- ja<br>noorukitepsühhiaater                 | esmane | 6,00         | 20,00   | ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (2 Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti 2 erinevas keskkonnas (perekeskond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, CGAS skoor ≤50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega; |
|                 |                                     |             |  |                         | 75               | F90.0-F90.1  | Psühhiaater –<br>laste- ja<br>noorukitepsühhiaater,<br>Psühhiaater | esmane | 20,00        | ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: esineb mõõdukas kuni raske funktsionaalne kahjustus vähemalt kahes olukorras (sotsiaalne, akadeemiline ja/või tööalane tegevus), haigus mõjutab konkreetse inimese elu mitmeid aspekte ning viide haiguse esinemisele on tõendatult tuvastatav lapseeas. Ravimi väljakirjutamise õigus esmavalikuna on kaasuva sõltuvushäire esinemisel ning teise valikuna kaasuva sõltuvushäire puudumisel, kui metüülfenidaat on olnud ebaefektiivne või talumatu. Ravi efektiivsus on hinnatav 6-nädalase perioodi jooksul kasutamisel adekvaatses annuses. |  |
| 1138047         | atorvastatiin,<br>10mg              | C10AA0<br>5 | ATORIS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | KRKA d.d. Novo<br>mesto | 100              | N18-N18  |  |        |              |   |  |
|                 |                                     |             |  |                         | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |  |        |              |   |  |
|                 |                                     |             |  |                         | 50               |  |  |        |              |   |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|-----------------------------------|------------------|--|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1397741         | atorvastatiin,<br>10mg              | C10AA0<br>5 | TULIP 10 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK          | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                   | 100              | N18-N18  |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                   | 50               |  |        |        |              |               |          |
| 1410657         | atorvastatiin,<br>10mg              | C10AA0<br>5 | ATORVASTATIN TEVA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Teva Pharma B.V.                  | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                   | 100              | N18-N18  |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                   | 50               |  |        |        |              |               |          |
| 1541911         | atorvastatiin,<br>10mg              | C10AA0<br>5 | ATORVASTATIN TAD,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK  | TAD Pharma<br>GmbH                | 50               |  |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                   | 100              | N18-N18  |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                   | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |              |               |          |
| 1878880         | atorvastatiin,<br>10mg              | C10AA0<br>5 | SORTIS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK               | Ideal Trade Links<br>UAB          | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                   | 100              | N18-N18  |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                   | 50               |  |        |        |              |               |          |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|-----------------------------------|------------------|--|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1138058         | atorvastatiin,<br>20mg              | C10AA0<br>5 | ATORIS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK               | KRKA d.d. Novo<br>mesto           | 50               |  |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                   | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                   | 100              | N18-N18  |        |        |              |               |          |
| 1397909         | atorvastatiin,<br>20mg              | C10AA0<br>5 | TULIP 20 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK          | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                   | 100              | N18-N18  |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                   | 50               |  |        |        |              |               |          |
| 1397932         | atorvastatiin,<br>20mg              | C10AA0<br>5 | TULIP 20 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>90TK          | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                   | 100              | N18-N18  |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                   | 50               |  |        |        |              |               |          |
| 1410792         | atorvastatiin,<br>20mg              | C10AA0<br>5 | ATORVASTATIN TEVA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Teva Pharma B.V.                  | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                   | 50               |  |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                   | 100              | N18-N18  |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|--------------------------|------------------|---|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1542057         | atorvastatiin,<br>20mg              | C10AA0<br>5 | ATORVASTATIN TAD,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK             | TAD Pharma<br>GmbH       | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12  |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                          | 100              | N18-N18   |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                          | 50               |   |        |        |              |               |          |
| 1626140         | atorvastatiin,<br>20mg              | C10AA0<br>5 | ATORVASTATIN<br>ZENTIVA 20MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Zentiva k.s.             | 100              | N18-N18   |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                          | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12  |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                          | 50               |   |        |        |              |               |          |
| 1626184         | atorvastatiin,<br>20mg              | C10AA0<br>5 | ATORVASTATIN<br>ZENTIVA 20MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>90TK | Zentiva k.s.             | 75               | E10-E11, Z45-<br>Z45, I63-I63,<br>Z95-Z95, I21-<br>I21, I65-I66, I25-<br>I25, E13-E14,<br>E78-E78, I70.2-<br>I70.2, I11-I12 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                          | 50               |   |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                          | 100              | N18-N18   |        |        |              |               |          |
| 1879027         | atorvastatiin,<br>20mg              | C10AA0<br>5 | SORTIS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                          | Ideal Trade Links<br>UAB | 50               |   |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                          | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12  |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                          | 100              | N18-N18   |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja         | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|-------------------------|------------------|--|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1220993         | atorvastatiin,<br>40mg              | C10AA0<br>5 | ATORIS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK               | KRKA d.d. Novo<br>mesto | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                         | 50               |  |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                         | 100              | N18-N18  |        |        |              |               |          |
| 1410927         | atorvastatiin,<br>40mg              | C10AA0<br>5 | ATORVASTATIN TEVA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Teva Pharma B.V.        | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                         | 50               |  |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                         | 100              | N18-N18  |        |        |              |               |          |
| 1542192         | atorvastatiin,<br>40mg              | C10AA0<br>5 | ATORVASTATIN TAD,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK  | TAD Pharma<br>GmbH      | 100              | N18-N18  |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                         | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                         | 50               |  |        |        |              |               |          |
| 1124996         | atorvastatiin,<br>80mg              | C10AA0<br>5 | SORTIS 80 MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK      | Upjohn EESV             | 100              | N18-N18  |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                         | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                         | 50               |  |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus    | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla   | Märkused   |
|-----------------|--|-------------|---|-----------------|------------------|---|--------|--------|--------------|---|--|
| 1768316         | atorvastatiin+eseti<br>miib, 10mg+10mg | C10BA0<br>5 | TORZELIP, tablett,<br>30TK  | Zentiva k.s.    | 75               | E13-E14, E10-<br>E11  |        |        |              |   | kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse<br>kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust  |
|                 |  |             |   |                 | 75               | I70.2-I70.2, Z45-<br>Z45, I25-I25,<br>I21-I22, I63-I63,<br>I65-I66, Z95-Z95 |        |        |              |   |  |
|                 |  |             |   |                 | 100              | N18-N18   |        |        |              | patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III<br>staadiumist ja vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse<br>kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust |  |
|                 |  |             |   |                 | 75               | I11-I12   |        |        |              | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni<br>esinemisel kui vaatamata atorvastatiini optimaalse<br>annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust      |  |
|                 |  |             |   |                 | 50               |   |        |        |              |   |  |
| 3006560         | atorvastatiin+eseti<br>miib, 10mg+10mg | C10BA0<br>5 | ATORVASTATIN/EZETI<br>MIBE TEVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Teva B.V.       | 75               | I11-I12   |        |        |              |   | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni<br>esinemisel kui vaatamata atorvastatiini optimaalse<br>annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust |
|                 |  |             |   |                 | 75               | E13-E14   |        |        |              | kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse<br>kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust   |  |
|                 |  |             |   |                 | 50               |   |        |        |              |   |  |
|                 |  |             |   |                 | 75               | I70.2-I70.2, Z45-<br>Z45, I25-I25,<br>I21-I22, I63-I63,<br>I65-I66, Z95-Z95 |        |        |              |   |  |
|                 |  |             |   |                 | 100              | N18-N18   |        |        |              | patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III<br>staadiumist ja vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse<br>kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus    | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla  | Märkused |
|-----------------|--|-------------|---|-----------------|------------------|---|--------|--------|--------------|--|----------|
| 1768349         | atorvastatiin+eseti<br>miib, 20mg+10mg | C10BA0<br>5 | TORZELIP, tablett,<br>30TK  | Zentiva k.s.    | 50               |   |        |        |              |  |          |
|                 |  |             |   |                 | 100              | N18-N18   |        |        |              | patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust |          |
|                 |  |             |   |                 | 75               | I70.2-I70.2, Z45-Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95 |        |        |              |  |          |
|                 |  |             |   |                 | 75               | I11-I12   |        |        |              | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust      |          |
|                 |  |             |   |                 | 75               | E13-E14, E10-E11  |        |        |              | kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust  |          |
| 3003994         | atorvastatiin+eseti<br>miib, 20mg+10mg | C10BA0<br>5 | EZETIMIBE/ATORVAST<br>ATIN OLAINFARM,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Olainfarm AS    | 75               | I70.2-I70.2, Z45-Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95 |        |        |              |  |          |
|                 |  |             |   |                 | 75               | E13-E14, E10-E11  |        |        |              | kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust  |          |
|                 |  |             |   |                 | 50               |   |        |        |              |  |          |
|                 |  |             |   |                 | 100              | N18-N18   |        |        |              | patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust |          |
|                 |  |             |   |                 | 75               | I11-I12   |        |        |              | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust      |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus    | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla   | Märkused   |
|-----------------|--|-------------|--|--------------------------|------------------|---|--------|--------|--------------|---|--|
| 3006122         | atorvastatiin+eseti<br>miib, 20mg+10mg | C10BA0<br>5 | EZETIMIBE/ATORVAST<br>ATIN STADA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Stada Arzneimittel<br>AG | 50               |   |        |        |              |   |  |
|                 |  |             |  |                          | 75               | I11-I12   |        |        |              | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni<br>esinemisel kui vaatamata atorvastatiini optimaalse<br>annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust      |  |
|                 |  |             |  |                          | 75               | E13-E14, E10-<br>E11  |        |        |              | kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse<br>kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust   |  |
|                 |  |             |  |                          | 75               | I70.2-I70.2, Z45-<br>Z45, I25-I25,<br>I21-I22, I63-I63,<br>I65-I66, Z95-Z95 |        |        |              |   |  |
|                 |  |             |  |                          | 100              | N18-N18   |        |        |              | patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III<br>staadiumist ja vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse<br>kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust |  |
| 3006638         | atorvastatiin+eseti<br>miib, 20mg+10mg | C10BA0<br>5 | ATORVASTATIN/EZETI<br>MIBE TEVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK  | Teva B.V.                | 75               | I11-I12   |        |        |              |   | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni<br>esinemisel kui vaatamata atorvastatiini optimaalse<br>annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust |
|                 |  |             |  |                          | 50               |   |        |        |              |   |  |
|                 |  |             |  |                          | 75               | I70.2-I70.2, Z45-<br>Z45, I25-I25,<br>I21-I22, I63-I63,<br>I65-I66, Z95-Z95 |        |        |              |   |  |
|                 |  |             |  |                          | 75               | E13-E14   |        |        |              | kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse<br>kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust   |  |
|                 |  |             |  |                          | 100              | N18-N18   |        |        |              | patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III<br>staadiumist ja vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse<br>kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus    | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus      | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla  | Märkused   |
|-----------------|--|-------------|----------------------------|--------------------------|------------------|---|--------|--------|--------------|--|--|
| 3029486         | atorvastatiin+eseti<br>miib, 20mg+10mg | C10BA0<br>5 | TORZELIP, tablett,<br>30TK | Ideal Trade Links<br>UAB | 75               | I70.2-I70.2, Z45-<br>Z45, I25-I25,<br>I21-I22, I63-I63,<br>I65-I66, Z95-Z95 |        |        |              |  |  |
|                 |  |             |                            |                          | 100              | N18-N18   |        |        |              | patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust |  |
|                 |  |             |                            |                          | 50               |   |        |        |              |  |  |
|                 |  |             |                            |                          | 75               | E10-E11, E13-<br>E14  |        |        |              | kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust  |  |
|                 |  |             |                            |                          | 75               | I11-I12   |        |        |              | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust      |  |
| 1768372         | atorvastatiin+eseti<br>miib, 40mg+10mg | C10BA0<br>5 | TORZELIP, tablett,<br>30TK | Zentiva k.s.             | 100              | N18-N18   |        |        |              |  | patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust |
|                 |  |             |                            |                          | 75               | I11-I12   |        |        |              | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust      |  |
|                 |  |             |                            |                          | 75               | I70.2-I70.2, Z45-<br>Z45, I25-I25,<br>I21-I22, I63-I63,<br>I65-I66, Z95-Z95 |        |        |              |  |  |
|                 |  |             |                            |                          | 75               | E13-E14, E10-<br>E11  |        |        |              | kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust  |  |
|                 |  |             |                            |                          | 50               |   |        |        |              |  |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus    | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla   | Märkused   |
|-----------------|--|-------------|---|--------------------------|------------------|---|--------|--------|--------------|---|--|
| 3004030         | atorvastatiin+eseti<br>miib, 40mg+10mg | C10BA0<br>5 | EZETIMIBE/ATORVAST<br>ATIN OLAINFARM,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Olainfarm AS             | 100              | N18-N18   |        |        |              |   | patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust |
|                 |  |             |   |                          | 75               | E13-E14, E10-E11  |        |        |              | kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust   |  |
|                 |  |             |   |                          | 50               |   |        |        |              |   |  |
|                 |  |             |   |                          | 75               | I11-I12   |        |        |              | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust |  |
|                 |  |             |   |                          | 75               | I70.2-I70.2, Z45-Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95 |        |        |              |   |  |
| 3006302         | atorvastatiin+eseti<br>miib, 40mg+10mg | C10BA0<br>5 | EZETIMIBE/ATORVAST<br>ATIN STADA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK        | Stada Arzneimittel<br>AG | 100              | N18-N18   |        |        |              |   | patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust |
|                 |  |             |   |                          | 50               |   |        |        |              |   |  |
|                 |  |             |   |                          | 75               | I11-I12   |        |        |              | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust |  |
|                 |  |             |   |                          | 75               | E13-E14, E10-E11  |        |        |              | kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust   |  |
|                 |  |             |   |                          | 75               | I70.2-I70.2, Z45-Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95 |        |        |              |   |  |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus    | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla   | Märkused  |
|-----------------|--|-------------|---|--------------------------|------------------|---|--------|--------|--------------|---|---|
| 3006706         | atorvastatiin+eseti<br>miib, 40mg+10mg | C10BA0<br>5 | ATORVASTATIN/EZETI<br>MIBE TEVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Teva B.V.                | 100              | N18-N18   |        |        |              |   | patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III<br>staadiumist ja vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse<br>kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust |
|                 |  |             |   |                          | 75               | E13-E14   |        |        |              | kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse<br>kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust   |   |
|                 |  |             |   |                          | 50               |   |        |        |              |   |   |
|                 |  |             |   |                          | 75               | I70.2-I70.2, Z45-<br>Z45, I25-I25,<br>I21-I22, I63-I63,<br>I65-I66, Z95-Z95 |        |        |              |   |   |
|                 |  |             |   |                          | 75               | I11-I12   |        |        |              | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni<br>esinemisel kui vaatamata atorvastatiini optimaalse<br>annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust      |   |
| 3029587         | atorvastatiin+eseti<br>miib, 40mg+10mg | C10BA0<br>5 | TORZELIP, tablett,<br>30TK  | Ideal Trade Links<br>UAB | 50               |   |        |        |              |   |   |
|                 |  |             |   |                          | 75               | I11-I12   |        |        |              | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni<br>esinemisel kui vaatamata atorvastatiini optimaalse<br>annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust      |   |
|                 |  |             |   |                          | 75               | E10-E11, E13-<br>E14  |        |        |              | kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse<br>kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust   |   |
|                 |  |             |   |                          | 100              | N18-N18   |        |        |              | patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III<br>staadiumist ja vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse<br>kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust |   |
|                 |  |             |   |                          | 75               | I70.2-I70.2, Z45-<br>Z45, I25-I25,<br>I21-I22, I63-I63,<br>I65-I66, Z95-Z95 |        |        |              |   |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus    | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla   | Märkused   |
|-----------------|--|-------------|---|-----------------|------------------|---|--------|--------|--------------|---|--|
| 1768406         | atorvastatiin+eseti<br>miib, 80mg+10mg | C10BA0<br>5 | TORZELIP, tablett,<br>30TK  | Zentiva k.s.    | 75               | I11-I12   |        |        |              |   | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust      |
|                 |  |             |   |                 | 100              | N18-N18   |        |        |              |   | patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust |
|                 |  |             |   |                 | 50               |   |        |        |              |   |  |
|                 |  |             |   |                 | 75               | E10-E11, E13-<br>E14  |        |        |              | kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust |  |
|                 |  |             |   |                 | 75               | I70.2-I70.2, Z45-<br>Z45, I25-I25,<br>I21-I22, I63-I63,<br>I65-I66, Z95-Z95 |        |        |              |   |  |
| 3004074         | atorvastatiin+eseti<br>miib, 80mg+10mg | C10BA0<br>5 | EZETIMIBE/ATORVAST<br>ATIN OLAINFARM,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Olainfarm AS    | 50               |   |        |        |              |   |  |
|                 |  |             |   |                 | 75               | E13-E14, E10-<br>E11  |        |        |              | kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust |  |
|                 |  |             |   |                 | 75               | I11-I12   |        |        |              |   | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust      |
|                 |  |             |   |                 | 75               | I70.2-I70.2, Z45-<br>Z45, I25-I25,<br>I21-I22, I63-I63,<br>I65-I66, Z95-Z95 |        |        |              |   |  |
|                 |  |             |   |                 | 100              | N18-N18   |        |        |              |   | patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus    | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla   | Märkused   |
|-----------------|--|-------------|--|--------------------------|------------------|---|--------|--------|--------------|---|--|
| 3006425         | atorvastatiin+eseti<br>miib, 80mg+10mg | C10BA0<br>5 | EZETIMIBE/ATORVAST<br>ATIN STADA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Stada Arzneimittel<br>AG | 75               | I11-I12   |        |        |              |   | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni<br>esinemisel kui vaatamata atorvastatiini optimaalse<br>annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust |
|                 |  |             |  |                          | 75               | E10-E11, E13-<br>E14  |        |        |              | kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse<br>kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust   |  |
|                 |  |             |  |                          | 75               | I70.2-I70.2, Z45-<br>Z45, I25-I25,<br>I21-I22, I63-I63,<br>I65-I66, Z95-Z95 |        |        |              |   |  |
|                 |  |             |  |                          | 100              | N18-N18   |        |        |              | patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III<br>staadiumist ja vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse<br>kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust |  |
|                 |  |             |  |                          | 50               |   |        |        |              |   |  |
| 3006818         | atorvastatiin+eseti<br>miib, 80mg+10mg | C10BA0<br>5 | ATORVASTATIN/EZETI<br>MIBE TEVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK  | Teva B.V.                | 75               | I70.2-I70.2, Z45-<br>Z45, I25-I25,<br>I21-I22, I63-I63,<br>I65-I66, Z95-Z95 |        |        |              |   |  |
|                 |  |             |  |                          | 100              | N18-N18   |        |        |              | patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III<br>staadiumist ja vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse<br>kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust |  |
|                 |  |             |  |                          | 75               | I11-I12   |        |        |              | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni<br>esinemisel kui vaatamata atorvastatiini optimaalse<br>annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust      |  |
|                 |  |             |  |                          | 75               | E13-E14   |        |        |              | kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse<br>kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust   |  |
|                 |  |             |  |                          | 50               |   |        |        |              |   |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus    | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                    | Müügiloa hoidja                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla   | Märkused |
|-----------------|--|-------------|--|-----------------------------------|------------------|---|---------------------------|--------|--------------|---|----------|
| 3029598         | atorvastatiin+eseti<br>miib, 80mg+10mg | C10BA0<br>5 | TORZELIP, tablett,<br>30TK               | Ideal Trade Links<br>UAB          | 50               |   |                           |        |              |   |          |
|                 |  |             |  |                                   | 75               | E13-E14, E10-<br>E11  |                           |        |              | kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse<br>kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust   |          |
|                 |  |             |  |                                   | 75               | I11-I12   |                           |        |              | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni<br>esinemisel kui vaatamata atorvastatiini optimaalse<br>annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust      |          |
|                 |  |             |  |                                   | 100              | N18-N18   |                           |        |              | patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III<br>staadiumist ja vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse<br>kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust |          |
|                 |  |             |  |                                   | 75               | I70.2-I70.2, Z45-<br>Z45, I25-I25,<br>I21-I22, I63-I63,<br>I65-I66, Z95-Z95 |                           |        |              |   |          |
| 1039250         | atsetüültsüsteiin,<br>600mg            | R05CB0<br>1 | ACC LONG, kihisev<br>tablett, 10TK       | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 50               | J84-J84   |                           |        |              |   |          |
|                 |  |             |  |                                   | 100              | E84-E84   | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane |              |   |          |
| 1515248         | atsetüültsüsteiin,<br>600mg            | R05CB0<br>1 | MUCOVIT, kihisev<br>tablett, 12TK        | PharmaEstica<br>Manufacturing OÜ  | 100              | E84-E84   | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane |              |   |          |
|                 |  |             |  |                                   | 50               | J84-J84   |                           |        |              |   |          |
| 1778542         | atsikloviir, 30mg<br>1g                | S01AD0<br>3 | ACICLOVIR AGEPHA,<br>silmasalv, 4.5g 1TK | AGEPHA Pharma<br>s.r.o.           | 50               |   |                           |        |              |   |          |
| 1165384         | atsikloviir, 400mg                     | J05AB01     | ACIC 400 MG, tablett,<br>35TK            | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 100              | Z94-Z94, T86-<br>T86  |                           |        |              |   |          |
|                 |  |             |  |                                   | 100              | D60-D64   | Pediaater,<br>Hematoloog  |        |              |   |          |
|                 |  |             |  |                                   | 50               |   |                           |        |              |   |          |
| 1836413         | atsikloviir, 400mg                     | J05AB01     | ACIC 400 MG, tablett,<br>35TK            | Lex Ano UAB                       | 100              | Z94-Z94, T86-<br>T86  |                           |        |              |   |          |
|                 |  |             |  |                                   | 50               |   |                           |        |              |   |          |
|                 |  |             |  |                                   | 100              | D60-D64   | Pediaater,<br>Hematoloog  |        |              |   |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja                              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala                              | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|--|------------------|---|-------------------------------------|--------|--------------|---------------|--|
| 1889196         | atsikloviir, 400mg                  | J05AB01     | ACIC 400 MG, tablett,<br>35TK                         | Ideal Trade Links<br>UAB                     | 100              | Z94-Z94, T86-<br>T86  |                                     |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |   |  | 50               |   |                                     |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |   |  | 100              | D60-D64   | Pediaater,<br>Hematoloog            |        |              |               |  |
| 1000731         | atsitreiin, 10mg                    | D05BB0<br>2 | NEOTIGASON,<br>kõvakapsel, 30TK                       | Teva B.V.                                    | 50               |   |                                     |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |   |  | 75               | L40-L40, Q82.8-<br>Q82.8, L86-L86,<br>M07-M07, Q80-<br>Q80, L43-L43 | Pediaater,<br>Dermatovenerol<br>oog |        |              |               |  |
| 1834365         | atsitreiin, 10mg                    | D05BB0<br>2 | NEOTIGASON,<br>kõvakapsel, 30TK                       | First Pharma OÜ                              | 50               |   |                                     |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |   |  | 75               | L40-L40, Q82.8-<br>Q82.8, L86-L86,<br>M07-M07, Q80-<br>Q80, L43-L43 | Dermatovenerol<br>oog, Pediaater    |        |              |               |  |
| 1890895         | atsitreiin, 10mg                    | D05BB0<br>2 | NEOTIGASON,<br>kõvakapsel, 30TK                       | Ideal Trade Links<br>UAB                     | 50               |   |                                     |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |   |  | 75               | L40-L40, Q82.8-<br>Q82.8, L86-L86,<br>M07-M07, Q80-<br>Q80, L43-L43 | Pediaater,<br>Dermatovenerol<br>oog |        |              |               |  |
| 1828201         | avapritiniib, 100mg                 | L01EX1<br>8 | AYVAKYT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Blueprint<br>Medicines<br>(Netherlands) B.V. | 100              | C96.2-C96.2,<br>C94.3-C94.3   | Hematoloog,<br>Onkoloog             |        |              |               | monoteraapiana täiskasvanud patsientide raviks, kellel on agressiivne süsteemne mastotsütoos, süsteemne mastotsütoos koos kaasneva hematoloogilise kasvajaga või nuumrakkleukeemia, pärast vähemalt ühte süsteemset ravi. Ravi jätkatakse kuni haiguse progresseerumiseni või vastuvõetamatu toksilisuse tekkimiseni |
| 1828212         | avapritiniib, 200mg                 | L01EX1<br>8 | AYVAKYT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Blueprint<br>Medicines<br>(Netherlands) B.V. | 100              | C96.2-C96.2,<br>C94.3-C94.3   | Hematoloog,<br>Onkoloog             |        |              |               | monoteraapiana täiskasvanud patsientide raviks, kellel on agressiivne süsteemne mastotsütoos, süsteemne mastotsütoos koos kaasneva hematoloogilise kasvajaga või nuumrakkleukeemia, pärast vähemalt ühte süsteemset ravi. Ravi jätkatakse kuni haiguse progresseerumiseni või vastuvõetamatu toksilisuse tekkimiseni |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloa hoidja                              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                    | Eriala                  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|--|------------------|-----------------------------|-------------------------|--------|--------------|---------------|--|
| 1878509         | avapritiniib, 25mg                  | L01EX1<br>8 | AYVAKYT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK  | Blueprint<br>Medicines<br>(Netherlands) B.V. | 100              | C96.2-C96.2,<br>C94.3-C94.3 | Hematoloog,<br>Onkoloog |        |              |               | monoteraapiana täiskasvanud patsientide raviks, kellel on agressiivne süsteemne mastotsütoos, süsteemne mastotsütoos koos kaasneva hematoloogilise kasvajaga või nuumrakkleukeemia, pärast vähemalt ühte süsteemset ravi. Ravi jätkatakse kuni haiguse progresseerumiseni või vastuvõetamatu toksilisuse tekkimiseni   |
| 1878510         | avapritiniib, 50mg                  | L01EX1<br>8 | AYVAKYT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK  | Blueprint<br>Medicines<br>(Netherlands) B.V. | 100              | C96.2-C96.2,<br>C94.3-C94.3 | Hematoloog,<br>Onkoloog |        |              |               | monoteraapiana täiskasvanud patsientide raviks, kellel on agressiivne süsteemne mastotsütoos, süsteemne mastotsütoos koos kaasneva hematoloogilise kasvajaga või nuumrakkleukeemia, pärast vähemalt ühte süsteemset ravi. Ravi jätkatakse kuni haiguse progresseerumiseni või vastuvõetamatu toksilisuse tekkimiseni   |
| 1798678         | avatrombopaag,<br>20mg              | B02BX0<br>8 | DOPTELET, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK | Swedish Orphan<br>Biovitrum AB<br>(publ)     | 100              | D69.4-D69.4                 |                         |        |              |               | patsientidele, kelle ravi alustamine on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematooloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele - muu suukaudne ravi (kortikosteroidi, immuunsupressandiga) on osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud, splenektoomia on osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud (sh splenektoomia ettevalmistamiseks, kui intravenoosne immuunglobuliin ei ole piisavalt tõhus) ning esineb trombotsütopeenia <20 000/µl |
| 1798689         | avatrombopaag,<br>20mg              | B02BX0<br>8 | DOPTELET, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>15TK | Swedish Orphan<br>Biovitrum AB<br>(publ)     | 100              | D69.4-D69.4                 |                         |        |              |               | patsientidele, kelle ravi alustamine on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematooloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele - muu suukaudne ravi (kortikosteroidi, immuunsupressandiga) on osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud, splenektoomia on osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud (sh splenektoomia ettevalmistamiseks, kui intravenoosne immuunglobuliin ei ole piisavalt tõhus) ning esineb trombotsütopeenia <20 000/µl |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloa hoidja                          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                    | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla   | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|--|------------------|-----------------------------|--|--------|--------------|---|---|
| 1888533         | avatrombopaag,<br>20mg              | B02BX0<br>8 | DOPTLET, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK  | Swedish Orphan<br>Biovitrum AB<br>(publ) | 100              | D69.4-D69.4                 |  |        |              |   | patsientidele, kelle ravi alustamine on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele - muu suukaudne ravi (kortikosteroidi, immuunsupressandiga) on osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud, splenektoomia on osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud (sh splenektoomia ettevalmistamiseks, kui intravenoosne immuunglobuliin ei ole piisavalt tõhus) ning esineb trombotsütopeenia <20 000/µl |
| 1739190         | baritsitiniib, 2mg                  | L04AF02     | OLUMIANT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Eli Lilly Nederland<br>B.V.              | 100              | M05-M06                     | Reumatoloog,<br>Pediaater  |        |              |   | ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt kahe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud                       |
|                 |                                     |             |  |  | 100              | L20.8-L20.8,<br>L20.9-L20.9 | Dermatovenerol<br>oog,<br>Allergoloog-<br>immunoloog,<br>Pediaater |        |              | mõõduka või raske haigusega (EASI≥16, DLQI≥10) patsientidele, kes ei allu süsteemsele konventsionaalsele ravile tsüklosporiiniga 8–12 nädala jooksul või kellele see on vastunäidustatud või põhjustanud talumatuid kõrvaltoimeid   |   |
| 1739257         | baritsitiniib, 4mg                  | L04AF02     | OLUMIANT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Eli Lilly Nederland<br>B.V.              | 100              | L20.8-L20.8,<br>L20.9-L20.9 | Allergoloog-<br>immunoloog,<br>Pediaater,<br>Dermatovenerol<br>oog |        |              |   | mõõduka või raske haigusega (EASI≥16, DLQI≥10) patsientidele, kes ei allu süsteemsele konventsionaalsele ravile tsüklosporiiniga 8–12 nädala jooksul või kellele see on vastunäidustatud või põhjustanud talumatuid kõrvaltoimeid   |
|                 |                                     |             |  |  | 100              | M05-M06                     | Reumatoloog,<br>Pediaater  |        |              | ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt kahe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud |   |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus              | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                | Müügiloa hoidja            | Soodus-tus % | Diagnoos | Eriala    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-------------|--|----------|--|----------------------------|--------------|----------|-----------|--------|-----------|------------|--|
| 1019483     | batsitratsiin+neomütsiin, 250RÜ+5000RÜ 1g  | D06AX80  | BANEOCIN, salv, 20g 1TK                              | Sandoz GmbH                | 50           |          |           |        |           |            |  |
| 1591286     | beeta-1a-interferoon, 30mcg 0.5ml          | L03AB07  | AVONEX, süstelahus pen-süstlis, 0.5ml 4TK            | Biogen Netherlands B.V.    | 100          | G35-G35  | Neuroloog | esmane |           |            | konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel hulgiskleroosi raviks                                     |
| 1117640     | beeta-1a-interferoon, 44mcg 0.5ml          | L03AB07  | REBIF, süstelahus süstlis, 0.5ml 12TK                | Merck Europe B.V.          | 100          | G35-G35  | Neuroloog | esmane |           |            | konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel hulgiskleroosi raviks                                     |
| 1430671     | beeta-1a-interferoon, 44mcg 0.5ml          | L03AB07  | REBIF, süstelahus kolbampullis, 1.5ml 4TK            | Merck Europe B.V.          | 100          | G35-G35  | Neuroloog | esmane |           |            | konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel hulgiskleroosi raviks                                     |
| 1657953     | beeta-1a-peginterferoon, 125mcg 0.5ml      | L03AB13  | PLEGRIDY, süstelahus, 0.5ml 2TK                      | Biogen Netherlands B.V.    | 100          | G35-G35  | Neuroloog | esmane |           |            | konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel (ägenemiste ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks |
| 1657975     | beeta-1a-peginterferoon, 63mcg/94mcg 0.5ml | L03AB13  | PLEGRIDY, süstelahus, 1TK / 1TK                      | Biogen Netherlands B.V.    | 100          | G35-G35  | Neuroloog | esmane |           |            | konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel (ägenemiste ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks |
| 1071245     | beeta-1b-interferoon, 250mcg 1ml           | L03AB08  | BETAFERON, süstelahuse pulber ja lahusti, 1.2ml 15TK | Bayer AG                   | 100          | G35-G35  | Neuroloog | esmane |           |            | konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel hulgiskleroosi raviks                                     |
| 1236912     | beetahistiin, 16mg                         | N07CA01  | BETAHISTINE ACTAVIS, tablett, 60TK                   | Teva B.V.                  | 50           | H81-H81  |           |        |           |            |  |
| 1480878     | beetahistiin, 16mg                         | N07CA01  | VERTIMED 16MG, tablett, 60TK                         | Medochemie Limited         | 50           | H81-H81  |           |        |           |            |  |
| 1115738     | beetahistiin, 24mg                         | N07CA01  | BETASERC, tablett, 50TK                              | Viatris SIA                | 50           | H81-H81  |           |        |           |            |  |
| 1480957     | beetahistiin, 24mg                         | N07CA01  | VERTIMED 24MG, tablett, 50TK                         | Medochemie Limited         | 50           | H81-H81  |           |        |           |            |  |
| 1515833     | beetahistiin, 24mg                         | N07CA01  | BETAHISTINE ACTAVIS, tablett, 50TK                   | Teva B.V.                  | 50           | H81-H81  |           |        |           |            |  |
| 1620245     | beetahistiin, 24mg                         | N07CA01  | BETASERC, suus dispergeeruv tablett, 60TK            | VIATRIS HEALTHCARE Limited | 50           | H81-H81  |           |        |           |            |  |



| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus               | ATC kood | Ravim, pakendi suurus             | Müügiloo hoidja                   | Soodus-tus % | Diagnoos    | Eriala                 | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-------------|---|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------|------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1741834     | beetahistiin, 24mg                          | N07CA01  | BETAHISTINE ACCORD, tablett, 50TK | Accord Healthcare B.V.            | 50           | H81-H81     |                        |        |           |            |   |
| 1827064     | beetahistiin, 24mg                          | N07CA01  | BETASERC, tablett, 60TK           | Lex Ano UAB                       | 50           | H81-H81     |                        |        |           |            |   |
| 1004870     | beetametasoon, 1mg 1g                       | D07AC01  | BETNOVATE CREAM, kreem, 15g 1TK   | GlaxoSmithKline (Ireland) Limited | 50           |             |                        |        |           |            |   |
| 1862861     | beetametasoon, 1mg 1g                       | D07AC01  | BETNOVATE, kreem, 30g 1TK         | Lex Ano UAB                       | 50           |             |                        |        |           |            |   |
| 1007514     | beetametasoon+fusiidiinhape, 1mg+20mg 1g    | D07CC80  | FUCICORT, kreem, 15g 1TK          | LEO Pharma A/S                    | 50           |             |                        |        |           |            |   |
| 3030905     | beetametasoon+fusiidiinhape, 1mg+20mg 1g    | D07CC80  | FUCICORT, kreem, 20g 1TK          | Ideal Trade Links UAB             | 50           |             |                        |        |           |            |   |
| 1006041     | beetametasoon+saliitsüülhape, 0,5mg+20mg 1g | D07BC80  | DIPROSALIC, nahalahus, 30ml 1TK   | Organon N.V.                      | 50           |             |                        |        |           |            |   |
| 1865123     | beetametasoon+saliitsüülhape, 0,5mg+20mg 1g | D07BC80  | DIPROSALIC, nahalahus, 30ml 1TK   | Lex Ano UAB                       | 50           |             |                        |        |           |            |   |
| 1880816     | beetametasoon+saliitsüülhape, 0,5mg+20mg 1g | D07BC80  | DIPROSALIC, nahalahus, 30ml 2TK   | Ideal Trade Links UAB             | 50           |             |                        |        |           |            |   |
| 1847437     | berotralstaat, 150mg                        | B06AC06  | ORLADEYO, kõvakapsel, 28TK        | BioCryst Ireland Limited          | 100          | D84.1-D84.1 | Allergoloog-immunoloog |        |           |            | ekspertkomisjoni (kuhu kuulub vähemalt 3 HAE-ravi kogemusega spetsialisti, kellest 2 on allergoloog-immunoloogid) otsuse alusel päriliku angioödeemi korduvate hoogude rutiinseks ennetamiseks täiskasvanutel ja vähemalt 12-aastastel noorukitel, kellel on $\geq 2$ kliiniliselt olulist akuutset ravi vajavat haigushoogu kuus. Ravivastust hinnatakse 3 kuud peale ravi alustamist, seejärel iga kuue kuu tagant ning ravi lõpetatakse, kui ravi on ebaefektne (akuutsete atakkide arv ei vähene või suureneb võrreldes patsiendi ravieelsete atakkide arvuga). |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja                      | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|--------------------------------------|------------------|-------------|---|--------|--------------|---------------|---|
| 1286197         | betain, 1g 1g                       | A16AA06     | CYSTADANE, suukaudne pulber, 180g 1TK                             | Recordati Rare Diseases              | 100              | E72.1-E72.1 | Pediaater, Endokrinoloog, Kardioloog, Neuroloog, Sisearst | esmane |              |               | lisaraviks tsüstatiini beetasüntaasi, 5,10-metüleentetrahydrofolaadi reduktaasi, kobalamiini kofaktori metabolismi puudulikkuse korral patsientidele, kelle ravi vitamiin B6, foolhappe, vitamiin B12 ja eridieediga pole piisav  |
| 1034042         | betaksolool, 2,5mg 1ml              | S01ED02     | BETOPTIC S, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK                     | Immedica Pharma AB                   | 50               |             |   |        |              |               |   |
|                 |                                     |             |   |                                      | 100              | H40-H42     | Oftalmoloog   | esmane |              |               |   |
| 1012194         | bikalutamiid, 150mg                 | L02BB03     | CASODEX, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK                   | Laboratoires Juvisse Pharmaceuticals | 50               |             |   |        |              |               |   |
|                 |                                     |             |   |                                      | 100              | C61-C61     | Uroloog, Onkoloog   |        |              |               | juhul, kui haigus on pärast kirurgilist või medikamentoosset kastratsiooni progresseerunud, metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravi alustamisel LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest või medikamentoosset kastratsioonist) |
| 1258017         | bikalutamiid, 150mg                 | L02BB03     | BICALUTAMIDE - TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK       | Teva Pharma B.V.                     | 50               |             |   |        |              |               |   |
|                 |                                     |             |   |                                      | 100              | C61-C61     | Onkoloog, Uroloog   |        |              |               | juhul, kui haigus on pärast kirurgilist või medikamentoosset kastratsiooni progresseerunud, metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravi alustamisel LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest või medikamentoosset kastratsioonist) |
| 1266173         | bikalutamiid, 150mg                 | L02BB03     | BICALUTAMID ACTAVIS 150MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Actavis Group Ptc ehf.               | 50               |             |   |        |              |               |   |
|                 |                                     |             |   |                                      | 100              | C61-C61     | Uroloog, Onkoloog   |        |              |               | juhul, kui haigus on pärast kirurgilist või medikamentoosset kastratsiooni progresseerunud, metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravi alustamisel LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest või medikamentoosset kastratsioonist) |
| 1776900         | bikalutamiid, 150mg                 | L02BB03     | BICALUTAMIDE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK       | Accord Healthcare B.V.               | 100              | C61-C61     | Uroloog, Onkoloog   |        |              |               | juhul, kui haigus on pärast kirurgilist või medikamentoosset kastratsiooni progresseerunud, metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravi alustamisel LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest või medikamentoosset kastratsioonist) |
|                 |                                     |             |   |                                      | 50               |             |   |        |              |               |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                              | Eriala               | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|--|------------------|---------------------------------------|----------------------|--------|--------------|---------------|---|
| 1026560         | bikalutamiid, 50mg                  | L02BB0<br>3 | CASODEX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                        | Laboratoires<br>Juvisse<br>Pharmaceuticals | 50               |                                       |                      |        |              |               |   |
|                 |                                     |             |  |  | 100              | C61-C61                               | Onkoloog,<br>Uroloog |        |              |               | juhul, kui haigus on pärast kirurgilist või<br>medikamentoosset kastratsiooni progresseerunud,<br>metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravi alustamisel<br>LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul<br>kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest<br>või medikamentoossest kastratsioonist) |
| 1257803         | bikalutamiid, 50mg                  | L02BB0<br>3 | BICALUTAMIDE -<br>TEVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK         | Teva Pharma B.V.                           | 100              | C61-C61                               | Uroloog,<br>Onkoloog |        |              |               | juhul, kui haigus on pärast kirurgilist või<br>medikamentoosset kastratsiooni progresseerunud,<br>metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravi alustamisel<br>LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul<br>kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest<br>või medikamentoossest kastratsioonist) |
|                 |                                     |             |  |  | 50               |                                       |                      |        |              |               |   |
| 1265891         | bikalutamiid, 50mg                  | L02BB0<br>3 | BICALUTAMID<br>ACTAVIS 50MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Actavis Group Ptc<br>ehf.                  | 50               |                                       |                      |        |              |               |   |
|                 |                                     |             |  |  | 100              | C61-C61                               | Uroloog,<br>Onkoloog |        |              |               | juhul, kui haigus on pärast kirurgilist või<br>medikamentoosset kastratsiooni progresseerunud,<br>metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravi alustamisel<br>LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul<br>kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest<br>või medikamentoossest kastratsioonist) |
| 1293791         | bikalutamiid, 50mg                  | L02BB0<br>3 | BICALUTAMIDE<br>ACCORD 50MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Accord Healthcare<br>B.V.                  | 100              | C61-C61                               | Uroloog,<br>Onkoloog |        |              |               | juhul, kui haigus on pärast kirurgilist või<br>medikamentoosset kastratsiooni progresseerunud,<br>metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravi alustamisel<br>LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul<br>kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest<br>või medikamentoossest kastratsioonist) |
|                 |                                     |             |  |  | 50               |                                       |                      |        |              |               |   |
| 1258983         | bisoprolol, 10mg                    | C07AB0<br>7 | BISOPROLOL<br>VITABALANS, tablett,<br>30TK                                   | Vitabalans Oy                              | 75               | I10-I13, I15-I15,<br>I20-I20, I47-I49 |                      |        |              |               |   |
|                 |                                     |             |  |  | 50               |                                       |                      |        |              |               |   |
| 1259029         | bisoprolol, 10mg                    | C07AB0<br>7 | BISOPROLOL<br>VITABALANS, tablett,<br>100TK                                  | Vitabalans Oy                              | 50               |                                       |                      |        |              |               |   |
|                 |                                     |             |  |  | 75               | I10-I13, I15-I15,<br>I20-I20, I47-I49 |                      |        |              |               |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                              | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|---------------------------|------------------|---------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1596427         | bisoprolool, 10mg                   | C07AB0<br>7 | SOBYCOR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK              | KRKA d.d. Novo<br>mesto   | 50               |                                       |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 75               | I10-I13, I15-I15,<br>I20-I20, I47-I49 |        |        |              |               |          |
| 1683952         | bisoprolool, 10mg                   | C07AB0<br>7 | BISOPROLOL<br>ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Accord Healthcare<br>B.V. | 50               |                                       |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 75               | I10-I13, I15-I15,<br>I20-I20, I47-I49 |        |        |              |               |          |
| 1804115         | bisoprolool, 10mg                   | C07AB0<br>7 | BISOPROLOL<br>ZENTIVA, tablett, 30TK                               | Zentiva k.s.              | 75               | I10-I13, I15-I15,<br>I20-I20, I47-I49 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 50               |                                       |        |        |              |               |          |
| 1865606         | bisoprolool, 10mg                   | C07AB0<br>7 | BISOPROLOL<br>VITABALANS, tablett,<br>90TK                         | Vitabalans Oy             | 50               |                                       |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 75               | I10-I13, I15-I15,<br>I20-I20, I47-I49 |        |        |              |               |          |
| 1683794         | bisoprolool, 2,5mg                  | C07AB0<br>7 | BISOPROLOL<br>ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Accord Healthcare<br>B.V. | 50               |                                       |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 75               | I10-I13, I15-I15,<br>I20-I20, I47-I49 |        |        |              |               |          |
| 1258905         | bisoprolool, 5mg                    | C07AB0<br>7 | BISOPROLOL<br>VITABALANS, tablett,<br>30TK                         | Vitabalans Oy             | 50               |                                       |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 75               | I10-I13, I15-I15,<br>I20-I20, I47-I49 |        |        |              |               |          |
| 1258949         | bisoprolool, 5mg                    | C07AB0<br>7 | BISOPROLOL<br>VITABALANS, tablett,<br>100TK                        | Vitabalans Oy             | 75               | I10-I13, I15-I15,<br>I20-I20, I47-I49 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 50               |                                       |        |        |              |               |          |
| 1596326         | bisoprolool, 5mg                    | C07AB0<br>7 | SOBYCOR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK              | KRKA d.d. Novo<br>mesto   | 75               | I10-I13, I15-I15,<br>I20-I20, I47-I49 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 50               |                                       |        |        |              |               |          |
| 1683873         | bisoprolool, 5mg                    | C07AB0<br>7 | BISOPROLOL<br>ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Accord Healthcare<br>B.V. | 50               |                                       |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 75               | I10-I13, I15-I15,<br>I20-I20, I47-I49 |        |        |              |               |          |
| 1804058         | bisoprolool, 5mg                    | C07AB0<br>7 | BISOPROLOL<br>ZENTIVA, tablett, 30TK                               | Zentiva k.s.              | 50               |                                       |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 75               | I10-I13, I15-I15,<br>I20-I20, I47-I49 |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügi-<br>loa hoidja      | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                              | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|---------------------------|------------------|---------------------------------------|--|--------|--------------|---------------|--|
| 1865594         | bisoprolol, 5mg                     | C07AB0<br>7 | BISOPROLOL<br>VITABALANS, tablett,<br>90TK                                    | Vitabalans Oy             | 50               |                                       |  |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |   |                           | 75               | I10-I13, I15-I15,<br>I20-I20, I47-I49 |  |        |              |               |  |
| 1586718         | bosentaan, 125mg                    | C02KX0<br>1 | BOSENTAN<br>NORAMEDA 125 MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK  | Norameda UAB              | 100              | I27.0-I27.0                           | Reumatoloog,<br>Pulmonoloog,<br>Kardioloog,<br>Pediaater |        |              |               | NYHA III-IV kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse<br>või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse<br>arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi<br>(vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui<br>sildenafil on vastunäidustatud, ostunud ebaefektiivseks<br>või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid |
|                 |                                     |             |   |                           | 50               |                                       |  |        |              |               |  |
| 1628759         | bosentaan, 125mg                    | C02KX0<br>1 | BOSENTAN ACCORD,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK              | Accord Healthcare<br>B.V. | 50               |                                       |  |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |   |                           | 100              | I27.0-I27.0                           | Pulmonoloog,<br>Kardioloog,<br>Reumatoloog,<br>Pediaater |        |              |               | NYHA III-IV kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse<br>või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse<br>arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi<br>(vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui<br>sildenafil on vastunäidustatud, ostunud ebaefektiivseks<br>või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid |
| 1586684         | bosentaan,<br>62,5mg                | C02KX0<br>1 | BOSENTAN<br>NORAMEDA 62,5 MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK | Norameda UAB              | 50               |                                       |  |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |   |                           | 100              | I27.0-I27.0                           | Reumatoloog,<br>Kardioloog,<br>Pediaater,<br>Pulmonoloog |        |              |               | NYHA III-IV kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse<br>või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse<br>arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi<br>(vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui<br>sildenafil on vastunäidustatud, ostunud ebaefektiivseks<br>või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid |
| 1628737         | bosentaan,<br>62,5mg                | C02KX0<br>1 | BOSENTAN ACCORD,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK              | Accord Healthcare<br>B.V. | 100              | I27.0-I27.0                           | Pulmonoloog,<br>Kardioloog,<br>Pediaater,<br>Reumatoloog |        |              |               | NYHA III-IV kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse<br>või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse<br>arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi<br>(vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui<br>sildenafil on vastunäidustatud, ostunud ebaefektiivseks<br>või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid |
|                 |                                     |             |   |                           | 50               |                                       |  |        |              |               |  |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                            | Müügiloa hoidja            | Soodus-tus % | Diagnoos    | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-------------|-------------------------------|----------|--|----------------------------|--------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1612055     | bosutiniib, 100mg             | L01EA04  | BOSULIF, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK  | Pfizer Europe MA EEIG      | 100          | C92.1-C92.1 | Hematoloog  |        |           |            | konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi, eelnev ravi imatiniibiga annuses 600mg on ebaõnnestunud või osutunud talumatuks (imatiniibravi on põhjustanud III või IV astme kõrvaltoime või üle 3 kuu püsinud II astme kõrvaltoime CTC klassifikatsiooni järgi) ning ravi alustatakse kuni 3. rea ravina; ravi võib jätkata kuni hematoloogilise ravivastuse püsimiseni (haigus ei progresseeru bosutiniibravi foonil). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi bosutiniibiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1.07.2016. a. |
| 1612077     | bosutiniib, 500mg             | L01EA04  | BOSULIF, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK  | Pfizer Europe MA EEIG      | 100          | C92.1-C92.1 | Hematoloog  |        |           |            | konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi, eelnev ravi imatiniibiga annuses 600mg on ebaõnnestunud või osutunud talumatuks (imatiniibravi on põhjustanud III või IV astme kõrvaltoime või üle 3 kuu püsinud II astme kõrvaltoime CTC klassifikatsiooni järgi) ning ravi alustatakse kuni 3. rea ravina; ravi võib jätkata kuni hematoloogilise ravivastuse püsimiseni (haigus ei progresseeru bosutiniibravi foonil). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi bosutiniibiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1.07.2016. a. |
| 1783289     | brigatiniib, 180mg            | L01ED04  | ALUNBRIG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Takeda Pharma A/S          | 100          | C34-C34     | Onkoloog    |        |           |            | anaplastilise lümfoomkinaas-positiivse kaugelearenenud varem ravimata mitteväikerakk-kopsuvähi raviks heas üldseisundis (ECOG 0-2) täiskasvanud patsientidele   |
| 1806870     | brigatiniib, 30mg             | L01ED04  | ALUNBRIG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Takeda Pharma A/S          | 100          | C34-C34     | Onkoloog    |        |           |            | anaplastilise lümfoomkinaas-positiivse kaugelearenenud varem ravimata mitteväikerakk-kopsuvähi raviks heas üldseisundis (ECOG 0-2) täiskasvanud patsientidele   |
| 1783256     | brigatiniib, 90mg             | L01ED04  | ALUNBRIG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Takeda Pharma A/S          | 100          | C34-C34     | Onkoloog    |        |           |            | anaplastilise lümfoomkinaas-positiivse kaugelearenenud varem ravimata mitteväikerakk-kopsuvähi raviks heas üldseisundis (ECOG 0-2) täiskasvanud patsientidele   |
| 1042782     | brinsolamiid, 10mg<br>1ml     | S01EC04  | AZOPT, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK         | Novartis Europharm Limited | 50           |             |             |        |           |            |   |
|             |                               |          |  |                            | 100          | H40-H42     | Oftalmoloog | esmane |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus           | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala                      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|---|-------------|--|-----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1581230         | brinsolamiid, 10mg<br>1ml                     | S01EC0<br>4 | BRINZOLAMIDE<br>ELVIM, silmatilgad,<br>suspensioon, 5ml 1TK          | SIA Elvim                         | 100              | H40-H42              | Oftalmoloog                 | esmane |              |               |          |
|                 |   |             |  |                                   | 50               |                      |                             |        |              |               |          |
| 1723047         | brinsolamiid, 10mg<br>1ml                     | S01EC0<br>4 | BRINZOLAMIDE<br>SANDOZ, silmatilgad,<br>suspensioon, 5ml 1TK         | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 50               |                      |                             |        |              |               |          |
|                 |   |             |  |                                   | 100              | H40-H42              | Oftalmoloog                 | esmane |              |               |          |
| 1657694         | brinsolamiid+brimo<br>nidiin, 10mg+2mg<br>1ml | S01EC8<br>0 | SIMBRINZA, silmatilgad,<br>suspensioon, 5ml 1TK                      | Novartis<br>Europharm<br>Limited  | 100              | H40-H42              | Oftalmoloog                 | esmane |              |               |          |
|                 |   |             |  |                                   | 50               |                      |                             |        |              |               |          |
| 1531459         | bromofenak,<br>0,9mg 1ml                      | S01BC1<br>1 | YELLOX, silmatilgad,<br>lahus, 5ml 1TK                               | Bausch + Lomb<br>Ireland Limited  | 50               |                      |                             |        |              |               |          |
| 1008098         | bromokriptiin,<br>2,5mg                       | G02CB0<br>1 | BROMOCRIPTIN-<br>RICHTER, tablett, 30TK                              | Gedeon Richter<br>Plc.            | 50               |                      |                             |        |              |               |          |
|                 |   |             |  |                                   | 100              | G20-G20              | Neuroloog                   | esmane |              |               |          |
|                 |   |             |  |                                   | 100              | E24-E24, E22-<br>E22 | Pediaater,<br>Endokrinoloog | esmane |              |               |          |
| 1038316         | budesoniid,<br>0,25mg 1ml                     | R03BA0<br>2 | PULMICORT,<br>nebuliseeritav<br>suspensioon, 2ml 20TK                | Astrazeneca AB                    | 75               | J45-J45              |                             |        |              |               |          |
|                 |   |             |  |                                   | 50               |                      |                             |        |              |               |          |
| 1875078         | budesoniid, 0,5mg<br>2ml                      | R03BA0<br>2 | BUDESONIDE TEVA,<br>nebuliseeritav<br>suspensioon, 2ml 20TK          | Teva B.V.                         | 50               |                      |                             |        |              |               |          |
|                 |   |             |  |                                   | 75               | J45-J45              |                             |        |              |               |          |
| 1124390         | budesoniid,<br>200mcg                         | R03BA0<br>2 | MIFLONIDE<br>BREEZHALER,<br>inhalatsioonipulber<br>kõvakapslis, 60TK | Novartis Baltics<br>SIA           | 50               |                      |                             |        |              |               |          |
|                 |   |             |  |                                   | 75               | J45-J45              |                             |        |              |               |          |
| 1174160         | budesoniid,<br>200mcg 1annus                  | R03BA0<br>2 | GIONA EASYHALER,<br>inhalatsioonipulber,<br>200annus 1TK             | Orion Corporation                 | 50               |                      |                             |        |              |               |          |
|                 |   |             |  |                                   | 75               | J45-J45              |                             |        |              |               |          |
| 1124413         | budesoniid,<br>400mcg                         | R03BA0<br>2 | MIFLONIDE<br>BREEZHALER,<br>inhalatsioonipulber<br>kõvakapslis, 60TK | Novartis Baltics<br>SIA           | 50               |                      |                             |        |              |               |          |
|                 |   |             |  |                                   | 75               | J45-J45              |                             |        |              |               |          |
| 1174182         | budesoniid,<br>400mcg 1annus                  | R03BA0<br>2 | GIONA EASYHALER,<br>inhalatsioonipulber,<br>100annus 1TK             | Orion Corporation                 | 75               | J45-J45              |                             |        |              |               |          |
|                 |   |             |  |                                   | 50               |                      |                             |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala                                | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla                            | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|--|------------------|---|---------------------------------------|--------|--------------|--|---|
| 1896521         | budesoniid, 4mg                     | A07EA0<br>6 | KINPEYGO, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>kõvakapsel, 120TK         | Stada Arzneimittel<br>AG                         | 100              | N02.8-N02.8   | Nefroloog                             |        |              |  | patsientidele, kellel on biopsiaga tõestatud IgA<br>nefropaatia, UPCR väärtus =>1,5 g/g ja eGFR => 35<br>ml/min/1,73 m2 ning maksimaalses talutavas doosis AKEI<br>või ARB ei ole andnud efektiivsust kolm kuud kestva ravi<br>korral |
| 1643655         | budesoniid, 9mg                     | A07EA0<br>6 | BUDESONIDE<br>FERRING, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | Ferring GmbH                                     | 75               | K52.8-K52.8   | Gastroenteroloog,<br>Pediaater        |        |              |  | remissiooni induktsiooniks aktiivse mikroskoopilise<br>koliidiga patsiendile  |
| 1232660         | bupropioon,<br>150mg                | N06AX1<br>2 | ELONTRIL, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 30TK             | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited             | 50               | F33-F33, F32-<br>F32  |                                       |        |              |  |   |
| 1232693         | bupropioon,<br>300mg                | N06AX1<br>2 | ELONTRIL, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 30TK             | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited             | 50               | F33-F33, F32-<br>F32  |                                       |        |              |  |   |
| 1005006         | busulfaan, 2mg                      | L01AB0<br>1 | MYLERAN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK                         | Aspen Pharma<br>Trading Limited                  | 50               |   |                                       |        |              |  |   |
|                 |                                     |             |  |  | 100              | C00-D48   | Onkoloog,<br>Pediaater,<br>Hematoloog |        |              |  |   |
| 1343382         | dabigatraaneteksil<br>aat, 110mg    | B01AE0<br>7 | PRADAXA, kõvakapsel,<br>10TK   | Boehringer<br>Ingelheim<br>International<br>GmbH | 100              | I80-I82, I26-I26,<br>I67.6-I67.6  |                                       |        |              |  | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel  |
|                 |                                     |             |  |  | 75               | S72.7-S72.7,<br>I26-I26, S72.0-<br>S72.2, I80-I82,<br>I48-I48, I67.6-<br>I67.6, M16-M17 |                                       |        |              |  |   |
|                 |                                     |             |  |  | 50               |   |                                       |        |              |  |   |
| 1343393         | dabigatraaneteksil<br>aat, 110mg    | B01AE0<br>7 | PRADAXA, kõvakapsel,<br>30TK   | Boehringer<br>Ingelheim<br>International<br>GmbH | 50               |   |                                       |        |              |  |   |
|                 |                                     |             |  |  | 75               | S72.7-S72.7,<br>I26-I26, S72.0-<br>S72.2, I80-I82,<br>I48-I48, I67.6-<br>I67.6, M16-M17 |                                       |        |              |  |   |
|                 |                                     |             |  |  | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6  |                                       |        |              | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |   |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus        | Müügiloa hoidja                                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla                            | Märkused                                 |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------|--|------------------|---|--------|--------|--------------|--|--|
| 1343405         | dabigatraaneteksil<br>aat, 110mg    | B01AE0<br>7 | PRADAXA, kõvakapsel,<br>60TK | Boehringer<br>Ingelheim<br>International<br>GmbH | 50               |   |        |        |              |  |  |
|                 |                                     |             |                              |  | 100              | I26-I26, I67.6-<br>I67.6, I80-I82   |        |        |              | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |  |
|                 |                                     |             |                              |  | 75               | S72.7-S72.7,<br>I26-I26, S72.0-<br>S72.2, I80-I82,<br>I48-I48, I67.6-<br>I67.6, M16-M17 |        |        |              |  |  |
| 1826737         | dabigatraaneteksil<br>aat, 110mg    | B01AE0<br>7 | GRIBERO, kõvakapsel,<br>60TK | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.                | 75               | S72.7-S72.7,<br>I26-I26, S72.0-<br>S72.2, I80-I82,<br>I48-I48, I67.6-<br>I67.6, M16-M17 |        |        |              |  |  |
|                 |                                     |             |                              |  | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6  |        |        |              | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |  |
|                 |                                     |             |                              |  | 50               |   |        |        |              |  |  |
| 1850813         | dabigatraaneteksil<br>aat, 110mg    | B01AE0<br>7 | TELEXER, kõvakapsel,<br>60TK | Gedeon Richter<br>Plc.                           | 75               | S72.7-S72.7,<br>I26-I26, S72.0-<br>S72.2, I80-I82,<br>I48-I48, I67.6-<br>I67.6, M16-M17 |        |        |              |  |  |
|                 |                                     |             |                              |  | 50               |   |        |        |              |  |  |
|                 |                                     |             |                              |  | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6  |        |        |              | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |  |
| 1869330         | dabigatraaneteksil<br>aat, 110mg    | B01AE0<br>7 | DANENGO, kõvakapsel,<br>60TK | TAD Pharma<br>GmbH                               | 100              | I26-I26, I67.6-<br>I67.6, I80-I82   |        |        |              |  | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |
|                 |                                     |             |                              |  | 50               |   |        |        |              |  |  |
|                 |                                     |             |                              |  | 75               | S72.7-S72.7,<br>I26-I26, S72.0-<br>S72.2, I80-I82,<br>I48-I48, I67.6-<br>I67.6, M16-M17 |        |        |              |  |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla                            | Märkused                                 |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|-----------------------------|------------------|---|--------|--------|--------------|--|--|
| 1898523         | dabigatraaneteksil<br>aat, 110mg    | B01AE0<br>7 | DABIGATRAN<br>ETEXILATE ACCORD,<br>kõvakapsel, 30TK  | Accord Healthcare<br>S.L.U. | 50               |   |        |        |              |  |  |
|                 |                                     |             |  |                             | 100              | I26-I26, I67.6-<br>I67.6, I80-I82   |        |        |              | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |  |
|                 |                                     |             |  |                             | 75               | S72.7-S72.7,<br>I26-I26, S72.0-<br>S72.2, I80-I82,<br>I48-I48, I67.6-<br>I67.6, M16-M17 |        |        |              |  |  |
| 1898534         | dabigatraaneteksil<br>aat, 110mg    | B01AE0<br>7 | DABIGATRAN<br>ETEXILATE ACCORD,<br>kõvakapsel, 60TK  | Accord Healthcare<br>S.L.U. | 75               | S72.7-S72.7,<br>I26-I26, S72.0-<br>S72.2, I80-I82,<br>I48-I48, I67.6-<br>I67.6, M16-M17 |        |        |              |  |  |
|                 |                                     |             |  |                             | 100              | I80-I82, I26-I26,<br>I67.6-I67.6  |        |        |              | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |  |
|                 |                                     |             |  |                             | 50               |   |        |        |              |  |  |
| 3005671         | dabigatraaneteksil<br>aat, 110mg    | B01AE0<br>7 | DABIGATRAN<br>ETEXILATE VIATRIS,<br>kõvakapsel, 60TK | Viatris Limited             | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6  |        |        |              |  | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |
|                 |                                     |             |  |                             | 50               |   |        |        |              |  |  |
|                 |                                     |             |  |                             | 75               | S72.7-S72.7,<br>I26-I26, S72.0-<br>S72.2, I80-I82,<br>I48-I48, I67.6-<br>I67.6, M16-M17 |        |        |              |  |  |
| 3008719         | dabigatraaneteksil<br>aat, 110mg    | B01AE0<br>7 | DABIGATRAN<br>ETEXILATE STADA,<br>kõvakapsel, 60TK   | Stada Arzneimittel<br>AG    | 100              | I26-I26, I67.6-<br>I67.6, I80-I82   |        |        |              |  | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |
|                 |                                     |             |  |                             | 75               | S72.7-S72.7,<br>I26-I26, S72.0-<br>S72.2, I80-I82,<br>I48-I48, I67.6-<br>I67.6, M16-M17 |        |        |              |  |  |
|                 |                                     |             |  |                             | 50               |   |        |        |              |  |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                               | Müügiloo hoidja                                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                      | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla                              | Märkused                                   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|--|------------------|---|--------|--------|--------------|--|--|
| 1538759         | dabigatraaneteksil<br>aat, 150mg    | B01AE0<br>7 | PRADAXA, kõvakapsel,<br>60TK                        | Boehringer<br>Ingelheim<br>International<br>GmbH | 75               | I48-I48, I67.6-<br>I67.6, I80-I82,<br>I26-I26 |        |        |              |  |  |
|                 |                                     |             |   |  | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6              |        |        |              | kaasuva pahaloolumulise kasvaja esinemisel |  |
|                 |                                     |             |   |  | 50               |   |        |        |              |  |  |
| 1826939         | dabigatraaneteksil<br>aat, 150mg    | B01AE0<br>7 | GRIBERO, kõvakapsel,<br>60TK                        | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.                | 100              | I26-I26, I67.6-<br>I67.6, I80-I82             |        |        |              |  | kaasuva pahaloolumulise kasvaja esinemisel |
|                 |                                     |             |   |  | 50               |   |        |        |              |  |  |
|                 |                                     |             |   |  | 75               | I48-I48, I67.6-<br>I67.6, I80-I82,<br>I26-I26 |        |        |              |  |  |
| 1850891         | dabigatraaneteksil<br>aat, 150mg    | B01AE0<br>7 | TELEXER, kõvakapsel,<br>60TK                        | Gedeon Richter<br>Plc.                           | 50               |   |        |        |              |  |  |
|                 |                                     |             |   |  | 75               | I48-I48, I67.6-<br>I67.6, I80-I82,<br>I26-I26 |        |        |              |  |  |
|                 |                                     |             |   |  | 100              | I26-I26, I67.6-<br>I67.6, I80-I82             |        |        |              | kaasuva pahaloolumulise kasvaja esinemisel |  |
| 1869396         | dabigatraaneteksil<br>aat, 150mg    | B01AE0<br>7 | DANENGO, kõvakapsel,<br>60TK                        | TAD Pharma<br>GmbH                               | 100              | I26-I26, I67.6-<br>I67.6, I80-I82             |        |        |              |  | kaasuva pahaloolumulise kasvaja esinemisel |
|                 |                                     |             |   |  | 50               |   |        |        |              |  |  |
|                 |                                     |             |   |  | 75               | I48-I48, I67.6-<br>I67.6, I80-I82,<br>I26-I26 |        |        |              |  |  |
| 1898635         | dabigatraaneteksil<br>aat, 150mg    | B01AE0<br>7 | DABIGATRAN<br>ETEXILATE ACCORD,<br>kõvakapsel, 60TK | Accord Healthcare<br>S.L.U.                      | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6              |        |        |              |  | kaasuva pahaloolumulise kasvaja esinemisel |
|                 |                                     |             |   |  | 50               |   |        |        |              |  |  |
|                 |                                     |             |   |  | 75               | I48-I48, I67.6-<br>I67.6, I80-I82,<br>I26-I26 |        |        |              |  |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                | Müügiloa hoidja                                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla   | Märkused                                 |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|--|------------------|--|----------|--------|--------------|---|--|
| 3005772         | dabigatraaneteksil<br>aat, 150mg    | B01AE0<br>7 | DABIGATRAN<br>ETEXILATE VIATRIS,<br>kõvakapsel, 60TK | Viatris Limited                                  | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6   |          |        |              |   | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |
|                 |                                     |             |  |  | 50               |  |          |        |              |   |  |
|                 |                                     |             |  |  | 75               | I48-I48, I67.6-<br>I67.6, I80-I82,<br>I26-I26                                    |          |        |              |   |  |
| 3008742         | dabigatraaneteksil<br>aat, 150mg    | B01AE0<br>7 | DABIGATRAN<br>ETEXILATE STADA,<br>kõvakapsel, 60TK   | Stada Arzneimittel<br>AG                         | 100              | I80-I82, I26-I26,<br>I67.6-I67.6   |          |        |              |   | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |
|                 |                                     |             |  |  | 75               | I48-I48, I67.6-<br>I67.6, I80-I82,<br>I26-I26                                    |          |        |              |   |  |
|                 |                                     |             |  |  | 50               |  |          |        |              |   |  |
| 1343360         | dabigatraaneteksil<br>aat, 75mg     | B01AE0<br>7 | PRADAXA, kõvakapsel,<br>30TK                         | Boehringer<br>Ingelheim<br>International<br>GmbH | 50               |  |          |        |              |   |  |
|                 |                                     |             |  |  | 100              | I26-I26, I67.6-<br>I67.6, I80-I82  |          |        |              | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel  |  |
|                 |                                     |             |  |  | 75               | I80-I82, M16-<br>M17, S72.7-<br>S72.7, S72.0-<br>S72.2, I67.6-<br>I67.6, I26-I26 |          |        |              |   |  |
| 1898444         | dabigatraaneteksil<br>aat, 75mg     | B01AE0<br>7 | DABIGATRAN<br>ETEXILATE ACCORD,<br>kõvakapsel, 30TK  | Accord Healthcare<br>S.L.U.                      | 75               | I80-I82, M16-<br>M17, S72.7-<br>S72.7, S72.0-<br>S72.2, I67.6-<br>I67.6, I26-I26 |          |        |              |   |  |
|                 |                                     |             |  |  | 50               |  |          |        |              |   |  |
|                 |                                     |             |  |  | 100              | I80-I82, I26-I26,<br>I67.6-I67.6   |          |        |              | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel  |  |
| 1624160         | dabrafeniib, 75mg                   | L01EC0<br>2 | TAFINLAR, kõvakapsel,<br>120TK                       | Novartis<br>Europharm<br>Limited                 | 100              | C43-C43  | Onkoloog |        |              | <p>konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) otsuse alusel BRAF V600 mutatsiooniga kaugelarenenud mitteresetseeritava või metastaatilise (IIIc-IV st) melanoomi raviks juhul, kui patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1 ja 3-kuulise intervalliga hinnatuna püsib haigus vähemalt stabiilsena (KT- või/ja muu asjakohase uuringu alusel hinnatuna haiguse progressiooni ei esine)</p> |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala               | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla  | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|-----------------|------------------|----------------------|----------------------|--------|--------------|--|--|
| 1598654         | dapaglifloosin,<br>10mg             | A10BK0<br>1 | FORXIGA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Astrazeneca AB  | 75               | I50-I50              |                      |        |              |  | patsiendile, kes kuulub NYHA II-IV funktsionaalklassi, kellel ravikoostöö on hea ning kellel AKE-inhibiitor või ARB ja beetablokaatori kaksikravigil südamepuudulikkuse sümptomid endiselt püsivad või süvenevad   |
|                 |                                     |             |   |                 | 75               | N18-N18              |                      |        |              | lisatuna standardravile (AKE- inhibiitor või ARB) või standardravi vastunäidustuse korral monoterapiiana   |  |
|                 |                                     |             |   |                 | 50               |                      |                      |        |              |  |  |
|                 |                                     |             |   |                 | 75               | E14-E14, E11-<br>E11 |                      |        |              | II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks või monoraviks, kui metformiin on vastunäidustatud või kaasuvana esineb sümptomaatiline südamepuudulikkus või krooniline neeruhaigus                                       |  |
| 1598609         | dapaglifloosin, 5mg                 | A10BK0<br>1 | FORXIGA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Astrazeneca AB  | 75               | E11-E11, E14-<br>E14 |                      |        |              |  | II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks või monoraviks, kui metformiin on vastunäidustatud või kaasuvana esineb sümptomaatiline südamepuudulikkus või krooniline neeruhaigus   |
|                 |                                     |             |   |                 | 75               | I50-I50              |                      |        |              | patsiendile, kes kuulub NYHA II-IV funktsionaalklassi, kellel ravikoostöö on hea ning kellel AKE-inhibiitor või ARB ja beetablokaatori kaksikravigil südamepuudulikkuse sümptomid endiselt püsivad või süvenevad |  |
|                 |                                     |             |   |                 | 50               |                      |                      |        |              |  |  |
| 1814699         | darolutamiid,<br>300mg              | L02BB0<br>6 | NUBEQA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>112TK | Bayer AG        | 100              | C61-C61              | Uroloog,<br>Onkoloog |        |              |  | mittemetastaatilise kastratsioonresistentse eesnäärmevähi raviks heas üldseisundis (ECOG 0-1) patsientidele, kellel on kõrge risk (PSADT<=10 kuud) metastaatilise haiguse tekkeks. Metastaatilise hormoonsensitiivse eesnäärmevähi raviks, kõrge riskiga haiguse korral võib ravi määrata patsientidele, kellel abirateroon on vastunäidustatud või abiraterooni kasutamisel esinevad talumatud kõrvaltoimeid. Kummagi näidustuse korral ei tohi patsient olla varasemalt saanud ravi teise põlvkonna androgeenireseptori inhibiitoriga, v.a. juhul, kui ravi on katkestatud kõrvaltoimete tõttu |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala     | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|--|------------------|-------------|------------|--------|--------------|---------------|--|
| 1275768         | dasatiniib, 50mg                    | L01EA0<br>2 | SPRYCEL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK               | Bristol-Myers<br>Squibb Pharma<br>EEIG | 100              | C92.1-C92.1 | Hematoloog |        |              |               | konsiiliumi(vähemalt 3 hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele,kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi, eelnev ravi imatiniibiga annuses 600mg on ebaõnnestunud või osutunud talumatuks (imatiniibravi on põhjustanud III või IV astme kõrvaltoime või üle 3 kuu püsinud II astme kõrvaltoime CTC klassifikatsiooni järgi) ning ravi alustatakse kuni kolmanda rea ravina; ravi võib jätkata kuni hematoloogilise ravivastuse püsimiseni (haigus ei progresseeru dasatiniibravi foonil). |
| 1755569         | dasatiniib, 50mg                    | L01EA0<br>2 | DASATINIB TEVA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK     | Teva B.V.                              | 100              | C92.1-C92.1 | Hematoloog |        |              |               | konsiiliumi(vähemalt 3 hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele,kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi, eelnev ravi imatiniibiga annuses 600mg on ebaõnnestunud või osutunud talumatuks (imatiniibravi on põhjustanud III või IV astme kõrvaltoime või üle 3 kuu püsinud II astme kõrvaltoime CTC klassifikatsiooni järgi) ning ravi alustatakse kuni kolmanda rea ravina; ravi võib jätkata kuni hematoloogilise ravivastuse püsimiseni (haigus ei progresseeru dasatiniibravi foonil). |
| 1781276         | dasatiniib, 50mg                    | L01EA0<br>2 | DASATINIB<br>NORAMEDA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Norameda UAB                           | 100              | C92.1-C92.1 | Hematoloog |        |              |               | konsiiliumi(vähemalt 3 hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele,kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi, eelnev ravi imatiniibiga annuses 600mg on ebaõnnestunud või osutunud talumatuks (imatiniibravi on põhjustanud III või IV astme kõrvaltoime või üle 3 kuu püsinud II astme kõrvaltoime CTC klassifikatsiooni järgi) ning ravi alustatakse kuni kolmanda rea ravina; ravi võib jätkata kuni hematoloogilise ravivastuse püsimiseni (haigus ei progresseeru dasatiniibravi foonil). |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala     | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|-----------------------------|------------------|---|------------|--------|--------------|---------------|--|
| 1781467         | dasatiniib, 50mg                    | L01EA0<br>2 | DASATINIB ZENTIVA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK  | Zentiva k.s.                | 100              | C92.1-C92.1   | Hematoloog |        |              |               | konsiiliumi(vähemalt 3 hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele,kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi, eelnev ravi imatiniibiga annuses 600mg on ebaõnnestunud või osutunud talumatuks (imatiniibravi on põhjustanud III või IV astme kõrvaltoime või üle 3 kuu püsinud II astme kõrvaltoime CTC klassifikatsiooni järgi) ning ravi alustatakse kuni kolmanda rea ravina; ravi võib jätkata kuni hematoloogilise ravivastuse püsimiseni (haigus ei progresseeru dasatiniibravi foonil). |
| 1781478         | dasatiniib, 50mg                    | L01EA0<br>2 | DASATINIB VIATRIS,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK  | Viatrix Limited             | 100              | C92.1-C92.1   | Hematoloog |        |              |               | konsiiliumi(vähemalt 3 hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele,kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi, eelnev ravi imatiniibiga annuses 600mg on ebaõnnestunud või osutunud talumatuks (imatiniibravi on põhjustanud III või IV astme kõrvaltoime või üle 3 kuu püsinud II astme kõrvaltoime CTC klassifikatsiooni järgi) ning ravi alustatakse kuni kolmanda rea ravina; ravi võib jätkata kuni hematoloogilise ravivastuse püsimiseni (haigus ei progresseeru dasatiniibravi foonil). |
| 1809570         | deferasioks,<br>180mg               | V03AC0<br>3 | DEFERASIROX<br>ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Accord Healthcare<br>S.L.U. | 100              | D57-D57,<br>D47.1-D47.1,<br>D56-D56, D60-<br>D61, C81-C96,<br>D46-D46 | Hematoloog |        |              |               | konsiiliumi (vähemasti 3 hematoloogi) otsuse alusel järgmistele kriteeriumidele vastavate patsientide raviks: seerumi ferritiinitase on >1000mcg/l; esineb jätkuv regulaarne vereülekannete vajadus (vähemasti 1 aasta jooksul on manustatud vähemasti 2 erütrotsüütide doosi kuu kohta ning sarnane vereülekannete vajadus püsib) või plaanitakse vereloome tüvirakkude siirdamist; müelodüsplastilise sündroomi või müelofibroosiga (D46, D47.1) patsientide riskiskoor on madal või madal-mõõdukas (IPSS 0-1)         |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                             | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala     | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |
|-----------------|---|-------------|---|----------------------------------|------------------|---|------------|--------|--------------|---------------|--|
| 1713989         | deferasiroks,<br>360mg  | V03AC0<br>3 | EXJADE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                | Novartis<br>Europharm<br>Limited | 100              | D57-D57,<br>D47.1-D47.1,<br>D56-D56, D60-<br>D61, C81-C96,<br>D46-D46 | Hematoloog |        |              |               | konsiiliumi (vähemasti 3 hematoloogi) otsuse alusel järgmistele kriteeriumidele vastavate patsientide raviks: seerumi ferritiinitase on >1000mcg/l; esineb jätkuv regulaarne vereülekannete vajadus (vähemasti 1 aasta jooksul on manustatud vähemasti 2 erütrotsüütide doosi kuu kohta ning sarnane vereülekannete vajadus püsib) või plaanitakse vereloome tüvirakkude siirdamist; müelodüsplastilise sündroomi või müelofibroosiga (D46, D47.1) patsientide riskiskoor on madal või madal-mõõdukas (IPSS 0-1) |
| 1809615         | deferasiroks,<br>360mg  | V03AC0<br>3 | DEFERASIROX<br>ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Accord Healthcare<br>S.L.U.      | 100              | D57-D57,<br>D47.1-D47.1,<br>D56-D56, D60-<br>D61, C81-C96,<br>D46-D46 | Hematoloog |        |              |               | konsiiliumi (vähemasti 3 hematoloogi) otsuse alusel järgmistele kriteeriumidele vastavate patsientide raviks: seerumi ferritiinitase on >1000mcg/l; esineb jätkuv regulaarne vereülekannete vajadus (vähemasti 1 aasta jooksul on manustatud vähemasti 2 erütrotsüütide doosi kuu kohta ning sarnane vereülekannete vajadus püsib) või plaanitakse vereloome tüvirakkude siirdamist; müelodüsplastilise sündroomi või müelofibroosiga (D46, D47.1) patsientide riskiskoor on madal või madal-mõõdukas (IPSS 0-1) |
| 1605574         | degludek-insuliin,<br>100ühik 1ml                               | A10AE0<br>6 | TRESIBA, süstelahus<br>pen-süstlis, 3ml 5TK                         | Novo Nordisk A/S                 | 100              | O24-O24, E13-<br>E14, E10-E11,<br>P70.2-P70.2,<br>E89.1-E89.1         |            |        |              |               |  |
| 1605619         | degludek-insuliin,<br>200ühik 1ml                               | A10AE0<br>6 | TRESIBA, süstelahus<br>pen-süstlis, 3ml 3TK                         | Novo Nordisk A/S                 | 100              | O24-O24, E13-<br>E14, E10-E11,<br>P70.2-P70.2,<br>E89.1-E89.1         |            |        |              |               |  |
| 1607295         | degludek-<br>insuliin+aspart-<br>insuliin,<br>70ühik+30ühik 1ml | A10AD0<br>6 | RYZODEG, süstelahus,<br>3ml 5TK                                     | Novo Nordisk A/S                 | 100              | E10-E11, E13-<br>E14  |            |        |              |               |  |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                         | Müügiloa hoidja                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|----------------------------------|------------------|---|--|--------|--------------|---------------|----------|
| 1014972         | deksametasoon,<br>0,5mg             | H02AB0<br>2 | DEXAMETHASON<br>KRKA, tablett, 10TK           | KRKA d.d. Novo<br>mesto          | 100              | E89.6-E89.6,<br>E27-E27, E89.3-<br>E89.3, E23-E23,<br>E25-E25 | Pediaater,<br>Endokrinoloog  | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                                  | 75               | L12-L12, L23-<br>L23, L13.0-<br>L13.0, L10-L10,<br>L20-L20    | Allergoloog-<br>immunoloog,<br>Dermatovenerol<br>oog, Pediaater    |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                                  | 50               |   |  |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                                  | 100              | Z94-Z94, T86-<br>T86  |  |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                                  | 100              | C00-D48   |  |        |              |               |          |
| 1647143         | deksametasoon,<br>0,985mg 1g        | S01BA0<br>1 | DEXAGEL, silmageel,<br>5g 1TK                 | Bausch + Lomb<br>Ireland Limited | 50               |   |  |        |              |               |          |
| 1007479         | deksametasoon,<br>1mg 1ml           | S01BA0<br>1 | OFTAN DEXA,<br>silmatilgad, lahus, 5ml<br>1TK | Santen Oy                        | 50               |   |  |        |              |               |          |
| 1124288         | deksametasoon,<br>1mg 1ml           | S01BA0<br>1 | MAXIDEX, silmatilgad,<br>suspensioon, 5ml 1TK | Novartis Baltics<br>SIA          | 50               |   |  |        |              |               |          |
| 1671780         | deksametasoon,<br>20mg              | H02AB0<br>2 | DEXAMETHASON<br>KRKA, tablett, 20TK           | KRKA, d.d., Novo<br>mesto        | 75               | L12-L12, L23-<br>L23, L13.0-<br>L13.0, L10-L10,<br>L20-L20    | Pediaater,<br>Dermatovenerol<br>oog,<br>Allergoloog-<br>immunoloog |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                                  | 100              | C00-D48   |  |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                                  | 100              | E89.6-E89.6,<br>E27-E27, E89.3-<br>E89.3, E23-E23,<br>E25-E25 | Pediaater,<br>Endokrinoloog  | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                                  | 100              | Z94-Z94, T86-<br>T86  |  |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                                  | 50               |   |  |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus               | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|---|--|--------|--------------|---------------|----------|
| 1792874         | deksametasoon,<br>20mg              | H02AB0<br>2 | DEXAMETHASON<br>KRKA, tablett, 20TK | First Pharma OÜ | 75               | L12-L12, L23-<br>L23, L13.0-<br>L13.0, L10-L10,<br>L20-L20    | Dermatovenerol<br>oog,<br>Allergoloog-<br>immunoloog,<br>Pediaater |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                     |                 | 100              | C00-D48   |  |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                     |                 | 100              | E89.6-E89.6,<br>E27-E27, E89.3-<br>E89.3, E23-E23,<br>E25-E25 | Endokrinoloog,<br>Pediaater  | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                     |                 | 100              | Z94-Z94, T86-<br>T86  |  |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                     |                 | 50               |   |  |        |              |               |          |
| 1808748         | deksametasoon,<br>20mg              | H02AB0<br>2 | NODEXON, tablett,<br>20TK           | Norameda UAB    | 75               | L12-L12, L23-<br>L23, L13.0-<br>L13.0, L10-L10,<br>L20-L20    | Dermatovenerol<br>oog,<br>Allergoloog-<br>immunoloog,<br>Pediaater |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                     |                 | 100              | T86-T86, C00-<br>D48, Z94-Z94                                 |  |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                     |                 | 50               |   |  |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                     |                 | 100              | E89.6-E89.6,<br>E27-E27, E89.3-<br>E89.3, E23-E23,<br>E25-E25 | Pediaater,<br>Endokrinoloog  | esmane |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus               | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------|---|--|--------|--------------|---------------|----------|
| 1889231         | deksametasoon,<br>20mg              | H02AB0<br>2 | DEXAMETHASON<br>KRKA, tablett, 20TK | Ideal Trade Links<br>UAB  | 100              | E89.6-E89.6,<br>E27-E27, E89.3-<br>E89.3, E23-E23,<br>E25-E25 | Endokrinoloog,<br>Pediaater  | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                     |                           | 100              | C00-D48   |  |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                     |                           | 50               |   |  |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                     |                           | 75               | L12-L12, L23-<br>L23, L13.0-<br>L13.0, L10-L10,<br>L20-L20    | Allergoloog-<br>immunoloog,<br>Pediaater,<br>Dermatovenerol<br>oog |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                     |                           | 100              | Z94-Z94, T86-<br>T86  |  |        |              |               |          |
| 1671667         | deksametasoon,<br>4mg               | H02AB0<br>2 | DEXAMETHASON<br>KRKA, tablett, 20TK | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 50               |   |  |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                     |                           | 100              | Z94-Z94, T86-<br>T86  |  |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                     |                           | 75               | L12-L12, L23-<br>L23, L13.0-<br>L13.0, L10-L10,<br>L20-L20    | Allergoloog-<br>immunoloog,<br>Dermatovenerol<br>oog, Pediaater    |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                     |                           | 100              | C00-D48   |  |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                     |                           | 100              | E89.6-E89.6,<br>E27-E27, E89.3-<br>E89.3, E23-E23,<br>E25-E25 | Endokrinoloog,<br>Pediaater  | esmane |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus               | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus %   | Diagnoos  | Eriala  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|--|---|---|--------|--------------|---------------|----------|
| 1792773         | deksametasoon,<br>4mg               | H02AB0<br>2 | DEXAMETHASON<br>KRKA, tablett, 20TK | First Pharma OÜ | 100  | Z94-Z94, T86-<br>T86  |   |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                     |                 | 100  | C00-D48   |   |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                     |                 | 100  | E89.6-E89.6,<br>E27-E27, E89.3-<br>E89.3, E23-E23,<br>E25-E25   | Pediaater,<br>Endokrinoloog                                     | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                     |                 | 50   |   |   |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                     | 75              | L12-L12, L23-<br>L23, L13.0-<br>L13.0, L10-L10,<br>L20-L20 | Allergoloog-<br>immunoloog,<br>Dermatovenerol<br>oog, Pediaater |   |        |              |               |          |
| 1808669         | deksametasoon,<br>4mg               | H02AB0<br>2 | NODEXON, tablett,<br>20TK           | Norameda UAB    | 50   |   |   |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                     |                 | 100  | T86-T86, C00-<br>D48, Z94-Z94                                   |   |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                     |                 | 75   | L12-L12, L23-<br>L23, L13.0-<br>L13.0, L10-L10,<br>L20-L20      | Dermatovenerol<br>oog, Pediaater,<br>Allergoloog-<br>immunoloog |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                     |                 | 100  | E89.6-E89.6,<br>E27-E27, E89.3-<br>E89.3, E23-E23,<br>E25-E25   | Pediaater,<br>Endokrinoloog                                     | esmane |              |               |          |
| 1862669         | deksametasoon,<br>4mg               | H02AB0<br>2 | DEXAMETHASON<br>KRKA, tablett, 20TK | Lex Ano UAB     | 100  | T86-T86, C00-<br>D48, Z94-Z94                                   |   |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                     |                 | 100  | E89.6-E89.6,<br>E27-E27, E89.3-<br>E89.3, E23-E23,<br>E25-E25   | Pediaater,<br>Endokrinoloog                                     | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                     |                 | 75   | L12-L12, L23-<br>L23, L13.0-<br>L13.0, L10-L10,<br>L20-L20      | Allergoloog-<br>immunoloog,<br>Dermatovenerol<br>oog, Pediaater |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                     |                 | 50   |   |   |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus               | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|---|-------------|--|--------------------------|------------------|---|--|--------|--------------|---------------|----------|
| 1889376         | deksametasoon,<br>4mg                             | H02AB0<br>2 | DEXAMETHASON<br>KRKA, tablett, 20TK                    | Ideal Trade Links<br>UAB | 50               |   |  |        |              |               |          |
|                 |   |             |  |                          | 75               | L12-L12, L23-<br>L23, L13.0-<br>L13.0, L10-L10,<br>L20-L20    | Dermatovenerol<br>oog,<br>Allergoloog-<br>immunoloog,<br>Pediaater |        |              |               |          |
|                 |   |             |  |                          | 100              | Z94-Z94, T86-<br>T86  |  |        |              |               |          |
|                 |   |             |  |                          | 100              | C00-D48   |  |        |              |               |          |
|                 |   |             |  |                          | 100              | E89.6-E89.6,<br>E27-E27, E89.3-<br>E89.3, E23-E23,<br>E25-E25 | Pediaater,<br>Endokrinoloog  | esmane |              |               |          |
| 1008414         | deksametasoon,<br>4mg 1ml                         | H02AB0<br>2 | DEXAMETHASON<br>KRKA, süstelahus, 1ml<br>25TK          | KRKA d.d. Novo<br>mesto  | 100              | C00-D48   |  |        |              |               |          |
|                 |   |             |  |                          | 50               |   |  |        |              |               |          |
| 1808704         | deksametasoon,<br>8mg                             | H02AB0<br>2 | NODEXON, tablett,<br>20TK                              | Norameda UAB             | 50               |   |  |        |              |               |          |
|                 |   |             |  |                          | 75               | L12-L12, L23-<br>L23, L13.0-<br>L13.0, L10-L10,<br>L20-L20    | Pediaater,<br>Dermatovenerol<br>oog,<br>Allergoloog-<br>immunoloog |        |              |               |          |
|                 |   |             |  |                          | 100              | T86-T86, C00-<br>D48, Z94-Z94                                 |  |        |              |               |          |
|                 |   |             |  |                          | 100              | E89.6-E89.6,<br>E27-E27, E89.3-<br>E89.3, E23-E23,<br>E25-E25 | Endokrinoloog,<br>Pediaater  | esmane |              |               |          |
| 1044379         | deksametasoon+kl<br>ooramfenikool,<br>1mg+2mg 1g  | S01CA8<br>2 | OFTAN DEXA-<br>CHLORA, silmasalv,<br>3.5g 1TK          | Santen Oy                | 50               |   |  |        |              |               |          |
| 1044368         | deksametasoon+kl<br>ooramfenikool,<br>1mg+2mg 1ml | S01CA8<br>2 | OFTAN DEXA-<br>CHLORA, silmatilgad,<br>lahus, 10ml 1TK | Santen Oy                | 50               |   |  |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus  | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                    | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |
|-----------------|--|-------------|---|-----------------------------------|------------------|-----------------------------|--------|--------|--------------|---------------|--|
| 1124301         | deksametasoon+n<br>eomütsiin+polümü<br>ksiin B,<br>1mg+3500RÜ+60<br>00RÜ 1ml | S01CA8<br>0 | MAXITROL, silmatilgad,<br>suspensioon, 5ml 1TK                              | Novartis Baltics<br>SIA           | 50               |                             |        |        |              |               |  |
| 1150276         | deksametasoon+t<br>obramütsiin,<br>1mg+3mg 1g                                | S01CA8<br>1 | TOBRADEX, silmasalv,<br>3.5g 1TK  | Novartis Baltics<br>SIA           | 50               |                             |        |        |              |               |  |
| 1124266         | deksametasoon+t<br>obramütsiin,<br>1mg+3mg 1ml                               | S01CA8<br>1 | TOBRADEX,<br>silmatilgad,<br>suspensioon, 5ml 1TK                           | Novartis Baltics<br>SIA           | 50               |                             |        |        |              |               |  |
| 1834961         | deksametasoon+t<br>obramütsiin,<br>1mg+3mg 1ml                               | S01CA8<br>1 | TOBRAMYCIN/DEXAM<br>ETHASONE ELVIM,<br>silmatilgad,<br>suspensioon, 5ml 1TK | SIA Elvim                         | 50               |                             |        |        |              |               |  |
| 1772018         | deltafollitropiin,<br>36mcg 1.08ml   | G03GA1<br>0 | REKOVELLE,<br>süstelahus pen-süstlis,<br>1.08ml 1TK                         | Ferring<br>Pharmaceuticals<br>A/S | 100              | N97.0-N97.9,<br>Z31.0-Z31.9 |        |        |              | 41,00         | kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise<br>tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks  |
|                 |  |             |   |                                   | 50               |                             |        |        |              |               |  |
| 1772029         | deltafollitropiin,<br>72mcg 2.16ml   | G03GA1<br>0 | REKOVELLE,<br>süstelahus pen-süstlis,<br>2.16ml 1TK                         | Ferring<br>Pharmaceuticals<br>A/S | 50               | N97.0-N97.9,<br>Z31.0-Z31.9 |        |        |              | 41,00         | kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise<br>tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks  |
|                 |  |             |   |                                   | 100              |                             |        |        |              |               |  |
| 1481857         | denosumab, 60mg<br>1ml   | M05BX0<br>4 | PROLIA, süstelahus<br>süstlis, 1ml 1TK                                      | Amgen Europe<br>B.V.              | 75               | M80-M80                     |        |        |              |               | patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne<br>tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna<br>ja kellel esineb kaasuvalt raske neerupuudulikkus või<br>söögitoru akalaasia, striktuur, düskineesia või põletik<br>(N17-19; K22.0; K22.2; K22.4; K20) |
|                 |  |             |   |                                   | 50               |                             |        |        |              |               |  |
| 1653937         | desloratadiin,<br>0,5mg 1ml  | R06AX2<br>7 | DESLORATADINE<br>SOPHARMA,<br>suukaudne lahus, 120ml<br>1TK                 | Sopharma AD                       | 50               |                             |        |        |              |               |  |
| 1550797         | desloratadiin, 5mg   | R06AX2<br>7 | DASSELTA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                      | KRKA d.d. Novo<br>mesto           | 50               |                             |        |        |              |               |  |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus               | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja             | Soodus-tus % | Diagnoos    | Eriala                   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-------------|---|----------|---|-----------------------------|--------------|-------------|--------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1554140     | desloratadiin, 5mg                          | R06AX27  | DESLORATADINE ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Actavis Group Ptc ehf.      | 50           |             |                          |        |           |            |   |
| 1064348     | desmopressiin, 10mcg 1annus                 | H01BA02  | MINIRIN, ninasprei, lahus, 2.5ml 1TK                          | Ferring GmbH                | 100          | E23.2-E23.2 | Pediaater, Endokrinoloog | esmane |           |            |   |
|             |   |          |   |                             | 50           |             |                          |        |           |            |   |
| 1225594     | desmopressiin, 120mcg                       | H01BA02  | MINIRIN, suukaudne lüofilisaat, 30TK                          | Ferring GmbH                | 100          | E23.2-E23.2 | Endokrinoloog, Pediaater | esmane |           |            |   |
|             |   |          |   |                             | 50           |             |                          |        |           |            |   |
| 3035832     | desmopressiin, 120mcg                       | H01BA02  | MITACLAU, keelealune tablett, 30TK                            | Norameda UAB                | 100          | E23.2-E23.2 | Pediaater, Endokrinoloog | esmane |           |            |   |
|             |   |          |   |                             | 50           |             |                          |        |           |            |   |
| 1225561     | desmopressiin, 60mcg                        | H01BA02  | MINIRIN, suukaudne lüofilisaat, 30TK                          | Ferring GmbH                | 100          | E23.2-E23.2 | Pediaater, Endokrinoloog | esmane |           |            |   |
|             |   |          |   |                             | 50           |             |                          |        |           |            |   |
| 3035685     | desmopressiin, 60mcg                        | H01BA02  | MITACLAU, keelealune tablett, 30TK                            | Norameda UAB                | 50           |             |                          |        |           |            |   |
|             |   |          |   |                             | 100          | E23.2-E23.2 | Endokrinoloog, Pediaater | esmane |           |            |   |
| 1063303     | desogestrel, 75mcg                          | G03AC09  | CERAZETTE, õhukese polümeerikattega tablett, 84TK             | Organon N.V.                | 75           | Z30-Z30     |                          |        |           |            | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
|             |   |          |   |                             | 50           |             |                          |        |           |            |   |
| 1505450     | desogestrel, 75mcg                          | G03AC09  | DESIRETT 75 MCG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK       | Exeltis Baltics UAB         | 75           | Z30-Z30     |                          |        |           |            | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
|             |   |          |   |                             | 50           |             |                          |        |           |            |   |
| 1656143     | desogestrel, 75mcg                          | G03AC09  | DELAMONIE, õhukese polümeerikattega tablett, 84TK             | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 50           |             |                          |        |           |            |   |
|             |   |          |   |                             | 75           | Z30-Z30     |                          |        |           |            | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
| 1062920     | desogestrel+etünüülöstradiol, 0,15mg+0,02mg | G03AA09  | NOVYNETTE, õhukese polümeerikattega tablett, 63TK             | Gedeon Richter Plc.         | 75           | Z30-Z30     |                          |        |           |            | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
|             |   |          |   |                             | 50           |             |                          |        |           |            |   |
| 1867574     | desogestrel+etünüülöstradiol, 0,15mg+0,02mg | G03AA09  | NOVYNETTE, õhukese polümeerikattega tablett, 63TK             | Lex Ano UAB                 | 75           | Z30-Z30     |                          |        |           |            | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
|             |   |          |   |                             | 50           |             |                          |        |           |            |   |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus                | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja           | Soodus-tus % | Diagnoos  | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-------------|--|----------|---|---------------------------|--------------|---|------------|--------|-----------|------------|---|
| 1880535     | desogestreel+etünüülöstradiol, 0,15mg+0,02mg | G03AA09  | NOVYNETTE, õhukese polümeerikattega tablett, 63TK             | Ideal Trade Links UAB     | 75           | Z30-Z30   |            |        |           |            | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
|             |  |          |   |                           | 50           |   |            |        |           |            |   |
| 1062931     | desogestreel+etünüülöstradiol, 0,15mg+0,03mg | G03AA09  | REGULON, õhukese polümeerikattega tablett, 63TK               | Gedeon Richter Plc.       | 50           |   |            |        |           |            |   |
|             |  |          |   |                           | 75           | Z30-Z30   |            |        |           |            | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
| 1208045     | detemir-insuliin, 100ühik 1ml                | A10AE05  | LEVEMIR FLEXPEN, süstelahus pen-süstlis, 3ml 5TK              | Novo Nordisk A/S          | 50           |   |            |        |           |            |   |
|             |  |          |   |                           | 100          | O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1 |            |        |           |            |   |
| 1007659     | diasepaam, 10mg 2.5ml                        | N05BA01  | DIAZEPAM DESITIN, rektaallahus, 2.5ml 5TK                     | Desitin Arzneimittel GmbH | 50           |   |            |        |           |            |   |
| 1007682     | diasepaam, 5mg 2.5ml                         | N05BA01  | DIAZEPAM DESITIN, rektaallahus, 2.5ml 5TK                     | Desitin Arzneimittel GmbH | 50           |   |            |        |           |            |   |
| 1385276     | dienogest, 2mg                               | G03DB08  | VISANNETTE, tablett, 28TK                                     | Bayer AG                  | 75           | N80-N80   | Günekoloog |        |           |            |   |
|             |  |          |   |                           | 50           |   |            |        |           |            |   |
| 3050143     | dienogest, 2mg                               | G03DB08  | VISANNETTE, tablett, 28TK                                     | Lex Ano UAB               | 75           | N80-N80   | Günekoloog |        |           |            |   |
|             |  |          |   |                           | 50           |   |            |        |           |            |   |
| 3063631     | dienogest, 2mg                               | G03DB08  | VISANNETTE, tablett, 28TK                                     | Ideal Trade Links UAB     | 75           | N80-N80   | Günekoloog |        |           |            |   |
|             |  |          |   |                           | 50           |   |            |        |           |            |   |
| 1587146     | dienogest+etünüülöstradiol, 0+0/2mg+0,03mg   | G03AA16  | SIBILLA PLUS, õhukese polümeerikattega tablett, 7TK / 21TK    | Gedeon Richter Plc.       | 50           |   |            |        |           |            |   |
|             |  |          |   |                           | 75           | Z30-Z30   |            |        |           |            | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
| 1066834     | dienogest+etünüülöstradiol, 2mg+0,03mg       | G03AA16  | JEANINE, kaetud tablett, 21TK                                 | Bayer AG                  | 50           |   |            |        |           |            |   |
|             |  |          |   |                           | 75           | Z30-Z30   |            |        |           |            | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
| 1305818     | dienogest+etünüülöstradiol, 2mg+0,03mg       | G03AA16  | AMMILY 2 MG / 0,03 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 21TK | Orivas UAB                | 50           |   |            |        |           |            |   |
|             |  |          |   |                           | 75           | Z30-Z30   |            |        |           |            | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
| 1070592     | digoksiin, 0,25mg                            | C01AA05  | DIGOXIN-GRINDEKS, tablett, 50TK                               | Grindeks AS               | 50           |   |            |        |           |            |   |
|             |  |          |   |                           | 75           | I50-I50   |            |        |           |            |   |
| 1222209     | digoksiin, 0,25mg                            | C01AA05  | DIGOXIN ORIFARM 0,25 MG, tablett, 60TK                        | Orifarm Healthcare A/S    | 50           |   |            |        |           |            |   |
|             |  |          |   |                           | 75           | I50-I50   |            |        |           |            |   |



| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                     | Soodus-tus % | Diagnoos                  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-------------|-------------------------------|----------|---|-------------------------------------|--------------|---------------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1222197     | digoksiin, 62,5mcg            | C01AA05  | DIGOXIN ORIFARM 62,5 MCG, tablett, 60TK                                     | Orifarm Generics A/S                | 75           | I50-I50                   |        |        |           |            |          |
|             |                               |          |   |                                     | 50           |                           |        |        |           |            |          |
| 1361786     | dihüdrokodeiin, 60mg          | N02AA08  | DHC CONTINUS, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 10TK             | Ennogen Healthcare (Europe) Limited | 50           |                           |        |        |           |            |          |
| 1016109     | diklofenak, 100mg             | M01AB05  | DICLOBERL RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 50TK      | Berlin-Chemie AG                    | 75           | M30-M35, M05-M08, M45-M46 |        |        |           |            |          |
|             |                               |          |   |                                     | 75           | M15-M19                   |        | 63,00  |           |            |          |
|             |                               |          |   |                                     | 50           |                           |        |        |           |            |          |
|             |                               |          |   |                                     | 100          | C00-D48                   |        |        |           |            |          |
| 1017133     | diklofenak, 100mg             | M01AB05  | DICLOFENAC-RATIOPHARM 100 MG, rektaalsuposiit, 10TK                         | Ratiopharm GmbH                     | 100          | C00-D48                   |        |        |           |            |          |
|             |                               |          |   |                                     | 50           |                           |        |        |           |            |          |
|             |                               |          |   |                                     | 75           | M15-M19                   |        | 63,00  |           |            |          |
|             |                               |          |   |                                     | 75           | M30-M35, M05-M08, M45-M46 |        |        |           |            |          |
| 1032589     | diklofenak, 100mg             | M01AB05  | DICLOMELAN RETARD 100 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | G.L. Pharma GmbH                    | 50           |                           |        |        |           |            |          |
|             |                               |          |   |                                     | 75           | M30-M35, M05-M08, M45-M46 |        |        |           |            |          |
|             |                               |          |   |                                     | 75           | M15-M19                   |        | 63,00  |           |            |          |
|             |                               |          |   |                                     | 100          | C00-D48                   |        |        |           |            |          |
| 1039632     | diklofenak, 100mg             | M01AB05  | OLFEN DEPOCAPS, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 20TK        | Teva B.V.                           | 100          | C00-D48                   |        |        |           |            |          |
|             |                               |          |   |                                     | 75           | M30-M35, M05-M08, M45-M46 |        |        |           |            |          |
|             |                               |          |   |                                     | 50           |                           |        |        |           |            |          |
|             |                               |          |   |                                     | 75           | M15-M19                   |        | 63,00  |           |            |          |
| 1078163     | diklofenak, 100mg             | M01AB05  | DICLAC 100 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 50TK            | Sandoz Pharmaceuticals d.d.         | 75           | M30-M35, M05-M08, M45-M46 |        |        |           |            |          |
|             |                               |          |   |                                     | 100          | C00-D48                   |        |        |           |            |          |
|             |                               |          |   |                                     | 50           |                           |        |        |           |            |          |
|             |                               |          |   |                                     | 75           | M15-M19                   |        | 63,00  |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala                   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|--------|--------------|---------------|---|
| 1071920         | diklofenak, 150mg                   | M01AB0<br>5 | DICLAC ID 150 MG,<br>toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 20TK      | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 50               |                               |                          |        |              |               |   |
|                 |                                     |             |  |                                   | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46 |                          |        |              |               |   |
|                 |                                     |             |  |                                   | 100              | C00-D48                       |                          |        |              |               |   |
|                 |                                     |             |  |                                   | 75               | M15-M19                       |                          | 63,00  |              |               |   |
| 1071942         | diklofenak, 150mg                   | M01AB0<br>5 | DICLAC ID 150 MG,<br>toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 100TK     | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46 |                          |        |              |               |   |
|                 |                                     |             |  |                                   | 100              | C00-D48                       |                          |        |              |               |   |
|                 |                                     |             |  |                                   | 75               | M15-M19                       |                          | 63,00  |              |               |   |
|                 |                                     |             |  |                                   | 50               |                               |                          |        |              |               |   |
| 1012048         | diklofenak, 75mg                    | M01AB0<br>5 | OLFEN DEPOTABS,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK         | Teva B.V.                         | 100              | C00-D48                       |                          |        |              |               |   |
|                 |                                     |             |  |                                   | 50               |                               |                          |        |              |               |   |
|                 |                                     |             |  |                                   | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46 |                          |        |              |               |   |
|                 |                                     |             |  |                                   | 75               | M15-M19                       |                          | 63,00  |              |               |   |
| 1071986         | diklofenak, 75mg                    | M01AB0<br>5 | DICLAC ID 75 MG,<br>toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 100TK      | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 100              | C00-D48                       |                          |        |              |               |   |
|                 |                                     |             |  |                                   | 50               |                               |                          |        |              |               |   |
|                 |                                     |             |  |                                   | 75               | M15-M19                       |                          | 63,00  |              |               |   |
|                 |                                     |             |  |                                   | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46 |                          |        |              |               |   |
| 1031634         | diltiaseem, 180mg                   | C08DB0<br>1 | DILTIAZEM<br>LANNACHER,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | G.L. Pharma<br>GmbH               | 50               |                               |                          |        |              |               |   |
|                 |                                     |             |  |                                   | 75               | I47-I49                       | Pediaater,<br>Kardioloog | esmane |              |               |   |
|                 |                                     |             |  |                                   | 100              | I27.0-I27.0                   |                          |        |              |               |   |
| 1031645         | diltiaseem, 90mg                    | C08DB0<br>1 | DILTIAZEM<br>LANNACHER,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 20TK | G.L. Pharma<br>GmbH               | 100              | I27.0-I27.0                   |                          |        |              |               |   |
|                 |                                     |             |  |                                   | 50               |                               |                          |        |              |               |   |
|                 |                                     |             |  |                                   | 75               | I47-I49                       | Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |              |               |   |
| 1638693         | dimetüülfumaraat,<br>120mg          | L04AX0<br>7 | TECFIDERA,<br>gastroresistentne<br>kõvakapsel, 14TK                                | Biogen<br>Netherlands B.V.        | 100              | G35-G35                       | Neuroloog                | esmane |              |               | konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel (ägenemiste<br>ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja         | Soodus-tus % | Diagnoos | Eriala    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-------------|-------------------------------|----------|---|-------------------------|--------------|----------|-----------|--------|-----------|------------|--|
| 1865954     | dimetüülfumaraat, 120mg       | L04AX07  | DIMETHYL FUMARATE STADA, gastroresistentne kõvakapsel, 14TK       | Stada Arzneimittel AG   | 100          | G35-G35  | Neuroloog | esmane |           |            | konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel (ägenemiste ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks |
| 1638705     | dimetüülfumaraat, 240mg       | L04AX07  | TECFIDERA, gastroresistentne kõvakapsel, 56TK                     | Biogen Netherlands B.V. | 100          | G35-G35  | Neuroloog | esmane |           |            | konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel (ägenemiste ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks |
| 1866067     | dimetüülfumaraat, 240mg       | L04AX07  | DIMETHYL FUMARATE STADA, gastroresistentne kõvakapsel, 56TK       | Stada Arzneimittel AG   | 100          | G35-G35  | Neuroloog | esmane |           |            | konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel (ägenemiste ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks |
| 1866607     | diroksimeelfumaraat, 231mg    | L04AX09  | VUMERITY, gastroresistentne kõvakapsel, 120TK                     | Biogen Netherlands B.V. | 100          | G35-G35  | Neuroloog | esmane |           |            | konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel (ägenemiste ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks |
| 1028214     | doksasosiin, 2mg              | C02CA04  | CARDURA, tablett, 30TK  | Upjohn EESV             | 50           |          |           |        |           |            |  |
| 1071391     | doksasosiin, 2mg              | C02CA04  | KAMIREN, tablett, 30TK  | KRKA d.d. Novo mesto    | 50           |          |           |        |           |            |  |
| 3027248     | doksasosiin, 2mg              | C02CA04  | CARDURA, tablett, 30TK  | Ideal Trade Links UAB   | 50           |          |           |        |           |            |  |
| 1028225     | doksasosiin, 4mg              | C02CA04  | CARDURA, tablett, 30TK  | Upjohn EESV             | 50           |          |           |        |           |            |  |
| 1071379     | doksasosiin, 4mg              | C02CA04  | KAMIREN, tablett, 30TK  | KRKA d.d. Novo mesto    | 50           |          |           |        |           |            |  |
| 1129799     | doksasosiin, 4mg              | C02CA04  | CARDURA XL 4MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | Upjohn EESV             | 50           |          |           |        |           |            |  |
| 1205895     | doksasosiin, 4mg              | C02CA04  | DOXALFA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK        | Stada Arzneimittel AG   | 50           |          |           |        |           |            |  |
| 3027260     | doksasosiin, 4mg              | C02CA04  | CARDURA, tablett, 30TK  | Ideal Trade Links UAB   | 50           |          |           |        |           |            |  |
| 3028744     | doksasosiin, 4mg              | C02CA04  | CARDURA XL 4MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK | Ideal Trade Links UAB   | 50           |          |           |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|---------------------------|------------------|----------|-----------------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1018303         | doksütsükliin,<br>100mg             | J01AA02     | DOXYCYCLIN STADA,<br>tablett, 10TK                                 | Stada Arzneimittel<br>AG  | 50               |          |                       |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 100              | A50-A53  | Dermatovenerol<br>oog |        |              |               |          |
| 1065877         | doksütsükliin,<br>100mg             | J01AA02     | DOXYCYCLINE<br>VITABALANS, tablett,<br>10TK                        | Vitabalans Oy             | 50               |          |                       |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 100              | A50-A53  | Dermatovenerol<br>oog |        |              |               |          |
| 1065899         | doksütsükliin,<br>100mg             | J01AA02     | DOXYLAN, tablett, 10TK   | G.L. Pharma<br>GmbH       | 100              | A50-A53  | Dermatovenerol<br>oog |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 50               |          |                       |        |              |               |          |
| 1144976         | doksütsükliin,<br>100mg             | J01AA02     | DOXY-M-RATIOPHARM<br>100 MG, tablett, 10TK                         | Ratiopharm GmbH           | 100              | A50-A53  | Dermatovenerol<br>oog |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 50               |          |                       |        |              |               |          |
| 1240366         | domperidoon,<br>10mg                | A03FA0<br>3 | DOMPERIDON<br>ACTAVIS, tablett, 30TK                               | Teva B.V.                 | 50               |          |                       |        |              |               |          |
| 1292206         | donepesiil, 10mg                    | N06DA0<br>2 | DONEPEZIL ACTAVIS,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Teva B.V.                 | 50               |          |                       |        |              |               |          |
| 1391217         | donepesiil, 10mg                    | N06DA0<br>2 | DONEPEZIL ACCORD,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK  | Accord Healthcare<br>B.V. | 50               |          |                       |        |              |               |          |
| 1873560         | donepesiil, 10mg                    | N06DA0<br>2 | DONEPEZIL ACTAVIS,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | First Pharma OÜ           | 50               |          |                       |        |              |               |          |
| 1292105         | donepesiil, 5mg                     | N06DA0<br>2 | DONEPEZIL ACTAVIS,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Teva B.V.                 | 50               |          |                       |        |              |               |          |
| 1391116         | donepesiil, 5mg                     | N06DA0<br>2 | DONEPEZIL ACCORD,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK  | Accord Healthcare<br>B.V. | 50               |          |                       |        |              |               |          |
| 1014961         | dorsolamiid, 2%                     | S01EC0<br>3 | TRUSOPT, silmatilgad,<br>lahus, 5ml 1TK                            | Santen Oy                 | 100              | H40-H42  | Oftalmoloog           | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 50               |          |                       |        |              |               |          |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus                        | ATC kood    | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                   | Soodus-tus % | Diagnoos | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused   |
|-------------|--|-------------|--|-----------------------------------|--------------|----------|-------------|--------|-----------|---|--|
| 1420108     | dorsolamiid, 20mg<br>1ml                             | S01EC0<br>3 | DORZOLAMIDE ELVIM,<br>silmatilgad, lahus, 5ml<br>1TK                 | SIA Elvim                         | 50           |          |             |        |           |   |  |
|             |  |             |  |                                   | 100          | H40-H42  | Oftalmoloog | esmane |           |   |  |
| 1755480     | dorsolamiid, 20mg<br>1ml                             | S01EC0<br>3 | VIZIDOR, silmatilgad,<br>lahus, 5ml 1TK                              | Bausch + Lomb<br>Ireland Limited  | 50           |          |             |        |           |   |  |
|             |  |             |  |                                   | 100          | H40-H42  | Oftalmoloog | esmane |           |   |  |
| 1454093     | dronedaroon,<br>400mg                                | C01BD0<br>7 | MULTAQ, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK                 | Sanofi Winthrop<br>Industrie      | 50           |          | Kardioloog  | esmane |           |   | ravimi esmase väljakirjutamise õigus kardioloogil<br>siinusrütmi säilitamiseks kodade virvendusarütmia puhul<br>pärast kardioversiooni, kui teised antiarütmikumid on<br>ebasobivad (IC klassi antiarütmikumid ja sotalool on<br>vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks ning<br>amiodaroon on vastunäidustatud) ning patsiendil ei esine<br>südamepuudulikkust ega vasaku vatsakese<br>düsfunktsiooni |
| 1316090     | drospirenoon+etün<br>üülöstradiol,<br>0+0/3mg+0,02mg | G03AA1<br>2 | YAZ, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>4TK / 24TK              | Bayer AG                          | 50           |          |             |        |           |   |  |
| 1331378     | drospirenoon+etün<br>üülöstradiol,<br>0+0/3mg+0,02mg | G03AA1<br>2 | MARIONELLE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>7TK / 21TK       | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 50           |          |             |        |           |   |  |
|             |  |             |  |                                   | 75           | Z30-Z30  |             |        |           | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |  |
| 1453766     | drospirenoon+etün<br>üülöstradiol,<br>0+0/3mg+0,02mg | G03AA1<br>2 | DAYLETTE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>4TK / 24TK         | Gedeon Richter<br>Plc.            | 50           |          |             |        |           |   |  |
|             |  |             |  |                                   | 75           | Z30-Z30  |             |        |           | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |  |
| 1220487     | drospirenoon+etün<br>üülöstradiol,<br>3mg+0,02mg     | G03AA1<br>2 | YASMINELE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>21TK              | Bayer AG                          | 50           |          |             |        |           |   |  |
| 1330759     | drospirenoon+etün<br>üülöstradiol,<br>3mg+0,02mg     | G03AA1<br>2 | MADELEINE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>21TK              | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 75           | Z30-Z30  |             |        |           |   | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral  |
|             |  |             |  |                                   | 50           |          |             |        |           |   |  |
| 1331019     | drospirenoon+etün<br>üülöstradiol,<br>3mg+0,02mg     | G03AA1<br>2 | JANGEE 0,02 MG/3<br>MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>21TK | Exeltis Baltics<br>UAB            | 75           | Z30-Z30  |             |        |           |   | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral  |
|             |  |             |  |                                   | 50           |          |             |        |           |   |  |
| 1043536     | drospirenoon+etün<br>üülöstradiol,<br>3mg+0,03mg     | G03AA1<br>2 | YARINA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>21TK                 | Bayer AG                          | 75           | Z30-Z30  |             |        |           |   | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral  |
|             |  |             |  |                                   | 50           |          |             |        |           |   |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus              | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                 | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                    | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla  | Märkused  |
|-----------------|--|-------------|--|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|--------|--------------|--|---|
| 1331053         | drospirenoon+etün<br>üülöstradiol,<br>3mg+0,03mg | G03AA1<br>2 | JANGEE 0,03 MG/3<br>MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>21TK | Exeltis Baltics<br>UAB          | 50               |                             |             |        |              |  |   |
|                 |  |             |  |                                 | 75               | Z30-Z30                     |             |        |              | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral  |   |
| 1165711         | drospirenoon+östr<br>adiol, 2mg+1mg              | G03FA1<br>7 | ANGELIQ, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                | Bayer AG                        | 50               |                             |             |        |              |  |   |
| 1670745         | dulaglutiid, 1,5mg<br>0.5ml                      | A10BJ05     | TRULICITY, süstelahus<br>pen-süstlis, 0.5ml 4TK                      | Eli Lilly Nederland<br>B.V.     | 50               | E14-E14, E11-<br>E11        |             |        |              |  | II tüüpi diabeedi raviks juhul, kui ravi suukaudsete<br>diabeediravimitega ei ole efektiivne või on<br>vastunäidustatud |
|                 |  |             |  |                                 | 75               | E14-E14, E11-<br>E11        |             |        |              | II tüüpi diabeedi raviks rasvumusega<br>patsientidel(KMI>=35kg/m2), kellel suukaudsed<br>diabeediravidid (metformiin, sulfonüüluurea preparaat,<br>PPAR agonist, DPP-4 inhibiitor) maksimaalsetes<br>talutavates annustes ei ole andnud rahuldavat efekti või<br>on vastunäidustatud |   |
| 1195624         | duloksetiin, 30mg                                | N06AX2<br>1 | CYMBALTA,<br>gastroresistentne<br>kõvakapsel, 28TK                   | Eli Lilly Nederland<br>B.V.     | 50               |                             |             |        |              |  |   |
|                 |  |             |  |                                 | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |  |   |
|                 |  |             |  |                                 | 75               | G43-G43                     |             |        |              |  |   |
| 1660643         | duloksetiin, 30mg                                | N06AX2<br>1 | DULSEVIA,<br>gastroresistentne<br>kõvakapsel, 30TK                   | KRKA, d.d., Novo<br>mesto       | 75               | G43-G43                     |             |        |              |  |   |
|                 |  |             |  |                                 | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |  |   |
| 1661701         | duloksetiin, 30mg                                | N06AX2<br>1 | DULOXGAMMA,<br>gastroresistentne<br>kõvakapsel, 28TK                 | Woerwag Pharma<br>GmbH & Co. KG | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |  |   |
|                 |  |             |  |                                 | 75               | G43-G43                     |             |        |              |  |   |
|                 |  |             |  |                                 | 50               |                             |             |        |              |  |   |
| 1670419         | duloksetiin, 30mg                                | N06AX2<br>1 | ONELAR,<br>gastroresistentne<br>kõvakapsel, 30TK                     | Medochemie<br>Limited           | 50               |                             |             |        |              |  |   |
|                 |  |             |  |                                 | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |  |   |
|                 |  |             |  |                                 | 75               | G43-G43                     |             |        |              |  |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja                 | Soodus-<br>tus %  | Diagnoos                    | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla   | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|---------------------------------|---|-----------------------------|-------------|--------|--------------|---|----------|
| 1694921         | duloksetiin, 30mg                   | N06AX2<br>1 | DULOXETINE<br>ZENTIVA,<br>gastroresistentne<br>kõvakapsel, 28TK | Zentiva k.s.                    | 100   | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |   |          |
|                 |                                     |             |   |                                 | 75  | G43-G43                     |             |        |              |   |          |
|                 |                                     |             |   |                                 | 50  |                             |             |        |              |   |          |
| 1195635         | duloksetiin, 60mg                   | N06AX2<br>1 | CYMBALTA,<br>gastroresistentne<br>kõvakapsel, 28TK              | Eli Lilly Nederland<br>B.V.     | 100   | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |   |          |
|                 |                                     |             |   |                                 | 50  |                             |             |        |              |   |          |
|                 |                                     |             |   |                                 | 75  | G63.2-G63.2                 |             |        |              | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |          |
| 75              | G43-G43                             |             |   |                                 |   |                             |             |        |              |   |          |
| 1660733         | duloksetiin, 60mg                   | N06AX2<br>1 | DULSEVIA,<br>gastroresistentne<br>kõvakapsel, 30TK              | KRKA, d.d., Novo<br>mesto       | 100   | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |   |          |
|                 |                                     |             |   |                                 | 50  |                             |             |        |              |   |          |
|                 |                                     |             |   |                                 | 75  | G43-G43                     |             |        |              |   |          |
| 75              | G63.2-G63.2                         |             |   |                                 | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |                             |             |        |              |   |          |
| 1661745         | duloksetiin, 60mg                   | N06AX2<br>1 | DULOXGAMMA,<br>gastroresistentne<br>kõvakapsel, 28TK            | Woerwag Pharma<br>GmbH & Co. KG | 50  |                             |             |        |              |   |          |
|                 |                                     |             |   |                                 | 75  | G63.2-G63.2                 |             |        |              | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |          |
|                 |                                     |             |   |                                 | 100   | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |   |          |
|                 |                                     |             |   |                                 | 75  | G43-G43                     |             |        |              |   |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                    | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|-----------------------|------------------|-----------------------------|-------------|--------|--------------|---------------|---|
| 1670510         | duloksetiin, 60mg                   | N06AX2<br>1 | ONELAR,<br>gastroresistentne<br>kõvakapsel, 30TK                | Medochemie<br>Limited | 75               | G43-G43                     |             |        |              |               |   |
|                 |                                     |             |   |                       | 50               |                             |             |        |              |               |   |
|                 |                                     |             |   |                       | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |   |
|                 |                                     |             |   |                       | 75               | G63.2-G63.2                 |             |        |              |               | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |
| 1694954         | duloksetiin, 60mg                   | N06AX2<br>1 | DULOXETINE<br>ZENTIVA,<br>gastroresistentne<br>kõvakapsel, 28TK | Zentiva k.s.          | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |   |
|                 |                                     |             |   |                       | 75               | G63.2-G63.2                 |             |        |              |               | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |
|                 |                                     |             |   |                       | 50               |                             |             |        |              |               |   |
|                 |                                     |             |   |                       | 75               | G43-G43                     |             |        |              |               |   |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                       | Müügiloa hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla  | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|------------------------------|------------------|-------------|--|--------|--------------|--|---|
| 1796182         | dupilumab, 200mg<br>1.14ml          | D11AH0<br>5 | DUPIXENT, süstelahus<br>süstlis, 1.14ml 2TK | Sanofi Winthrop<br>Industrie | 100              | L20.8-L20.9 | Allergoloog-<br>immunoloog,<br>Pediaater,<br>Dermatovenerol<br>oog |        |              |  | mõõduka või raske haigusega (EASI $\geq$ 16, DLQI $\geq$ 10)<br>patsiendile, kes ei allu süsteemsele konventsionaalsele<br>ravile tsüklosporiiniga 8–12 nädala jooksul või kellele see<br>on vastunäidustatud või põhjustanud talumatuid<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                     |             |   |                              | 100              | J45-J45     | Pulmonoloog,<br>Allergoloog-<br>immunoloog                         |        |              | vähemalt kolmest pulmonoloogist või allergoloog-<br>immunoloogist koosneva eksperdikomisjoni otsusel 2.<br>tüüpi põletikust juhitud astmaga patsiendile, kelle astma<br>on vaatamata eelnevale pikaajalisele kolmikravile<br>(inhaleeritav glükokortikosteroid ja pikatoimeline beeta-2-<br>agonist koos antileukotrieeni või pikatoimelise<br>teofülliinpreparaadi või pikatoimelise antikoliinergilise<br>ainega) puudulikult kontrollitud. Kui 3 kuu möödumisel<br>ravi alustamisest ei ole ekspertkomisjoni hinnangul astma<br>ravi tulemused kliiniliselt oluliselt paranenud, lõpetatakse<br>ravi selle preparaadiga |   |
|                 |                                     |             |   |                              | 100              | J32-J33     | Allergoloog-<br>immunoloog,<br>Otorinolarüngolo<br>og              |        |              | vähemalt kolmeliikmelise kõrva-nina-kurguarstidest<br>koosneva eksperdikomisjoni otsuse alusel patsiendile,<br>kellel on raske krooniline rinosinusiit ning ninapolüpooside<br>raviks on viimase 2 aasta jooksul teostatud vähemalt 2<br>endoskoopilist siinuse operatsiooni või üle kolme<br>endoskoopilise siinuse operatsiooni elu jooksul. Kui 16<br>nädala möödudes ravi alustamisest ei ole patsiendi NPS<br>skoor vähenenud vähemalt ühe ühiku võrra, siis ravi<br>katkestatakse  |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                           | Müügiloa hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla   | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|------------------------------|------------------|-------------|--|--------|--------------|---|--|
| 1796227         | dupilumab, 200mg<br>1.14ml          | D11AH0<br>5 | DUPIXENT, süstelahus<br>pen-süstlis, 1.14ml 2TK | Sanofi Winthrop<br>Industrie | 100              | J45-J45     | Pulmonoloog,<br>Allergoloog-<br>immunoloog                         |        |              |   | vähemalt kolmest pulmonoloogist või allergoloog-<br>immunoloogist koosneva eksperdikomisjoni otsusel 2.<br>tüüpi põletikust juhitud astmaga patsiendile, kelle astma<br>on vaatamata eelnevale pikaajalisele kolmikravile<br>(inhaleeritav glükokortikosteroid ja pikatoimeline beeta-2-<br>agonist koos antileukotrieeni või pikatoimelise<br>teofülliinpreparaadi või pikatoimelise antikoliinergilise<br>ainega) puudulikult kontrollitud. Kui 3 kuu möödumisel<br>ravi alustamisest ei ole ekspertkomisjoni hinnangul astma<br>ravi tulemused kliiniliselt oluliselt paranenud, lõpetatakse<br>ravi selle preparaadiga |
|                 |                                     |             |   |                              | 100              | J32-J33     | Allergoloog-<br>immunoloog,<br>Otorinolarüngolo<br>og              |        |              | vähemalt kolmeliikmelise kõrva-nina-kurguarstidest<br>koosneva eksperdikomisjoni otsuse alusel patsiendile,<br>kellel on raske krooniline rinosiniit ning ninapolüpooside<br>raviks on viimase 2 aasta jooksul teostatud vähemalt 2<br>endoskoopilist siinuse operatsiooni või üle kolme<br>endoskoopilise siinuse operatsiooni elu jooksul. Kui 16<br>nädala möödudes ravi alustamisest ei ole patsiendi NPS<br>skoor vähenenud vähemalt ühe ühiku võrra, siis ravi<br>katkestatakse |  |
|                 |                                     |             |   |                              | 100              | L20.8-L20.9 | Pediaater,<br>Allergoloog-<br>immunoloog,<br>Dermatovenerol<br>oog |        |              | mööduka või raske haigusega (EASI $\geq$ 16, DLQI $\geq$ 10)<br>patsiendile, kes ei allu süsteemsele konventsionaalsele<br>ravile tsüklosporiiniga 8–12 nädala jooksul või kellele see<br>on vastunäidustatud või põhjustanud talumatuid<br>kõrvaltoimeid   |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                    | Müügiloa hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla   | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|------------------------------|------------------|-------------|--|--------|--------------|---|--|
| 1753938         | dupilumab, 300mg<br>2ml             | D11AH0<br>5 | DUPIXENT, süstelahus<br>süstlis, 2ml 2TK | Sanofi Winthrop<br>Industrie | 100              | J45-J45     | Pulmonoloog,<br>Allergoloog-<br>immunoloog                         |        |              |   | vähemalt kolmest pulmonoloogist või allergoloog-<br>immunoloogist koosneva eksperdikomisjoni otsusel 2.<br>tüüpi põletikust juhitud astmaga patsiendile, kelle astma<br>on vaatamata eelnevale pikaajalisele kolmikravile<br>(inhaleeritav glükokortikosteroid ja pikatoimeline beeta-2-<br>agonist koos antileukotrieeni või pikatoimelise<br>teofülliinpreparaadi või pikatoimelise antikoliinergilise<br>ainega) puudulikult kontrollitud. Kui 3 kuu möödumisel<br>ravi alustamisest ei ole ekspertkomisjoni hinnangul astma<br>ravi tulemused kliiniliselt oluliselt paranenud, lõpetatakse<br>ravi selle preparaadiga |
|                 |                                     |             |  |                              | 100              | L20.8-L20.9 | Allergoloog-<br>immunoloog,<br>Pediaater,<br>Dermatovenerol<br>oog |        |              | mõõduka või raske haigusega (EASI $\geq$ 16, DLQI $\geq$ 10)<br>patsiendile, kes ei allu süsteemsele konventsionaalsele<br>ravile tsüklosporiiniga 8–12 nädala jooksul või kellele see<br>on vastunäidustatud või põhjustanud talumatuid<br>kõrvaltoimeid   |  |
|                 |                                     |             |  |                              | 100              | J32-J33     | Allergoloog-<br>immunoloog,<br>Otorinolarüngolo<br>og              |        |              | vähemalt kolmeliikmelise kõrva-nina-kurguarstidest<br>koosneva eksperdikomisjoni otsuse alusel patsiendile,<br>kellel on raske krooniline rinosinusiit ning ninapolüpooside<br>raviks on viimase 2 aasta jooksul teostatud vähemalt 2<br>endoskoopilist siinuse operatsiooni või üle kolme<br>endoskoopilise siinuse operatsiooni elu jooksul. Kui 16<br>nädala möödudes ravi alustamisest ei ole patsiendi NPS<br>skoor vähenenud vähemalt ühe ühiku võrra, siis ravi<br>katkestatakse |  |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood    | Ravim, pakendi suurus                        | Müügiloa hoidja                                | Soodus-tus % | Diagnoos    | Eriala  | Esmane | Vanus üle | Vanus alla   | Märkused  |
|-------------|-------------------------------|-------------|--|--|--------------|-------------|---|--------|-----------|--|---|
| 1818479     | dupilumab, 300mg<br>2ml       | D11AH0<br>5 | DUPIXENT, süstelahus<br>pen-süstlis, 2ml 2TK | Sanofi Winthrop<br>Industrie                   | 100          | J32-J33     | Allergoloog-<br>immunoloog,<br>Otorinolarüngolo<br>og           |        |           |  | vähemalt kolmeliikmelise kõrva-nina-kurguarstidest koosneva eksperdikomisjoni otsuse alusel patsiendile, kellel on raske krooniline rinosiniit ning ninapolüpooside raviks on viimase 2 aasta jooksul teostatud vähemalt 2 endoskoopilist siinuse operatsiooni või üle kolme endoskoopilise siinuse operatsiooni elu jooksul. Kui 16 nädala möödudes ravi alustamisest ei ole patsiendi NPS skoor vähenenud vähemalt ühe ühiku võrra, siis ravi katkestatakse |
|             |                               |             |  |  | 100          | J45-J45     | Pulmonoloog,<br>Allergoloog-<br>immunoloog                      |        |           | vähemalt kolmest pulmonoloogist või allergoloog-<br>immunoloogist koosneva eksperdikomisjoni otsusel 2. tüüpi põletikust juhitud astmaga patsiendile, kelle astma on vaatamata eelnevale pikaajalisele kolmikravile (inhaleeritav glükokortikosteroid ja pikatoimeline beeta-2-agonist koos antileukotrieeni või pikatoimelise teofülliinpreparaadi või pikatoimelise antikoliinergilise ainega) puudulikult kontrollitud. Kui 3 kuu möödumisel ravi alustamisest ei ole ekspertkomisjoni hinnangul astma ravi tulemused kliiniliselt oluliselt paranenud, lõpetatakse ravi selle preparaadiga |   |
|             |                               |             |  |  | 100          | L20.8-L20.9 | Allergoloog-<br>immunoloog,<br>Dermatovenerolo<br>og, Pediaater |        |           | mõõduka või raske haigusega (EASI $\geq$ 16, DLQI $\geq$ 10) patsiendile, kes ei allu süsteemsele konventsionaalsele ravile tsüklosporiiniga 8–12 nädala jooksul või kellele see on vastunäidustatud või põhjustanud talumatuid kõrvaltoimeid  |   |
| 1155440     | dutasteriid, 0,5mg            | G04CB0<br>2 | AVODART,<br>pehmekapsel, 30TK                | GlaxoSmithKline<br>Trading Services<br>Limited | 50           |             |   |        |           |  |   |
| 1539929     | dutasteriid, 0,5mg            | G04CB0<br>2 | DUTASTERIDE TEVA,<br>pehmekapsel, 30TK       | Teva Pharma B.V.                               | 50           |             |   |        |           |  |   |
| 1707241     | dutasteriid, 0,5mg            | G04CB0<br>2 | DUTRYS, pehmekapsel,<br>30TK                 | KRKA, d.d., Novo<br>mesto                      | 50           |             |   |        |           |  |   |
| 1787137     | dutasteriid, 0,5mg            | G04CB0<br>2 | DUTASTERIDE ELVIM,<br>pehmekapsel, 30TK      | SIA Elvim                                      | 50           |             |   |        |           |  |   |
| 1886339     | dutasteriid, 0,5mg            | G04CB0<br>2 | AVODART,<br>pehmekapsel, 30TK                | First Pharma OÜ                                | 50           |             |   |        |           |  |   |
| 3017562     | dutasteriid, 0,5mg            | G04CB0<br>2 | AVODART,<br>pehmekapsel, 30TK                | Ideal Trade Links<br>UAB                       | 50           |             |   |        |           |  |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus             | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |  |
|-----------------|---|-------------|---|-------------------------------|------------------|---|---|--------|--------------|---------------|--|--|
| 1054752         | düdrogesteron,<br>10mg                          | G03DB0<br>1 | DUPHASTON, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>20TK                       | MagnaPharm SK<br>s.r.o.       | 50               |   |   |        |              |               |  |  |
|                 |   |             |   |                               | 100              | E89.4-E89.4,<br>E28.3-E28.3,<br>E23.0-E23.0,<br>Q96-Q97 | Günekoloog,<br>Pediaater –<br>endokrinoloog,<br>Endokrinoloog | esmane |              | 50,00         | haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient<br>on alla 50. eluaasta vana |  |
| 1013803         | düdrogesteron+ö<br>stradiool,<br>0+1mg/10mg+1mg | G03FB0<br>8 | FEMOSTON, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK / 14TK                 | MagnaPharm SK<br>s.r.o.       | 50               |   |   |        |              |               |  |  |
|                 |   |             |   |                               | 100              | E89.4-E89.4,<br>E28.3-E28.3,<br>E23.0-E23.0,<br>Q96-Q97 | Pediaater –<br>endokrinoloog,<br>Endokrinoloog,<br>Günekoloog | esmane |              | 50,00         | haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient<br>on alla 50. eluaasta vana |  |
| 1375332         | düdrogesteron+ö<br>stradiool,<br>2,5mg+0,5mg    | G03FA1<br>4 | FEMOSTON CONTI 0,5<br>MG/2,5 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | MagnaPharm SK<br>s.r.o.       | 50               |   |   |        |              |               |  |  |
|                 |   |             |   |                               | 100              | E89.4-E89.4,<br>E28.3-E28.3,<br>E23.0-E23.0,<br>Q96-Q97 | Günekoloog,<br>Pediaater –<br>endokrinoloog,<br>Endokrinoloog | esmane |              | 50,00         | haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient<br>on alla 50. eluaasta vana |  |
| 1082528         | düdrogesteron+ö<br>stradiool,<br>5mg+1mg        | G03FA1<br>4 | FEMOSTON CONTI,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK               | MagnaPharm SK<br>s.r.o.       | 50               |   |   |        |              |               |  |  |
|                 |   |             |   |                               | 100              | E89.4-E89.4,<br>E28.3-E28.3,<br>E23.0-E23.0,<br>Q96-Q97 | Günekoloog,<br>Endokrinoloog,<br>Pediaater –<br>endokrinoloog | esmane |              | 50,00         | haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient<br>on alla 50. eluaasta vana |  |
| 1077937         | ebastiin, 20mg                                  | R06AX2<br>2 | KESTINE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                         | Almirall S.A.                 | 50               |   |   |        |              |               |  |  |
| 1691546         | edoksabaan,<br>30mg                             | B01AF0<br>3 | LIXIANA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                         | Daiichi Sankyo<br>Europe GmbH | 75               | I48-I48   |   |        |              |               |  |  |
|                 |   |             |   |                               | 50               |   |   |        |              |               |  |  |
|                 |   |             |   |                               | 100              | I80-I82, I26-I26,<br>I67.6-I67.6                        |   |        |              |               | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel   |  |
| 1691658         | edoksabaan,<br>60mg                             | B01AF0<br>3 | LIXIANA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                         | Daiichi Sankyo<br>Europe GmbH | 50               |   |   |        |              |               |  |  |
|                 |   |             |   |                               | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6                        |   |        |              |               | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel   |  |
|                 |   |             |   |                               | 75               | I48-I48   |   |        |              |               |  |  |
| 1020373         | ekonasool, 150mg                                | G01AF0<br>5 | GYNO-PEVARYL,<br>vaginaalsuposiit, 3TK  | Karo Pharma AB                | 50               |   |   |        |              |               |  |  |
| 1039036         | ekonasool, 50mg                                 | G01AF0<br>5 | GYNO-PEVARYL,<br>vaginaalsuposiit, 15TK                                       | Karo Pharma AB                | 50               |   |   |        |              |               |  |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus    | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|--|-------------|---|----------------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------|--------|--------------|---------------|---|
| 1011148         | eksemestaan,<br>25mg                   | L02BG0<br>6 | AROMASIN, kaetud<br>tablett, 30TK                                     | Pfizer Europe MA<br>EEIG         | 50               |             |                                       |        |              |               |   |
|                 |  |             |   |                                  | 100              | C50-C50     | Üldkirurg,<br>Onkoloog,<br>Günekoloog |        |              |               | günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks  |
| 1392780         | eksemestaan,<br>25mg                   | L02BG0<br>6 | ESCEPRAN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                | KRKA d.d. Novo<br>mesto          | 50               |             |                                       |        |              |               |   |
|                 |  |             |   |                                  | 100              | C50-C50     | Üldkirurg,<br>Günekoloog,<br>Onkoloog |        |              |               | günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks  |
| 1392960         | eksemestaan,<br>25mg                   | L02BG0<br>6 | EXEMESTANE<br>ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK    | Accord Healthcare<br>B.V.        | 100              | C50-C50     | Onkoloog,<br>Üldkirurg,<br>Günekoloog |        |              |               | günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks  |
|                 |  |             |   |                                  | 50               |             |                                       |        |              |               |   |
| 1423134         | eksemestaan,<br>25mg                   | L02BG0<br>6 | EXEMESTANE<br>ZENTIVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK   | Zentiva k.s.                     | 50               |             |                                       |        |              |               |   |
|                 |  |             |   |                                  | 100              | C50-C50     | Günekoloog,<br>Onkoloog,<br>Üldkirurg |        |              |               | günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks  |
| 1453632         | eksemestaan,<br>25mg                   | L02BG0<br>6 | EXEMESTANE<br>SANOSWISS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Sanoswiss UAB                    | 100              | C50-C50     | Onkoloog,<br>Günekoloog,<br>Üldkirurg |        |              |               | günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks  |
|                 |  |             |   |                                  | 50               |             |                                       |        |              |               |   |
| 1725870         | elbasviir+grasopre<br>viir, 50mg+100mg | J05AP54     | ZEPATIER, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                | Merck Sharp &<br>Dohme B.V.      | 100              | B18.2-B18.2 | Infektsionist,<br>Gastroenteroloog    |        |              |               | 1. ja 4. genotüübi kroonilise progresseeruva C-<br>viirushepatiidi raviks   |
| 1462003         | eltrombopaag,<br>25mg                  | B02BX0<br>5 | REVLADE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                 | Novartis<br>Europharm<br>Limited | 100              | D69.4-D69.4 |                                       |        |              |               | patsientidele, kelle ravi alustamine on hinnatud konsiiliumi<br>(vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele<br>kriteeriumidele - muu suukaudne ravi (kortikosteroidi,<br>immuunsupressandiga) on osutunud ebaefektiivseks või<br>on vastunäidustatud, splenektoomia on osutunud<br>ebaefektiivseks või on vastunäidustatud (sh<br>splenektoomia ettevalmistamiseks, kui intravenoosne<br>immuunglobuliin ei ole piisavalt tõhus) ning esineb<br>trombotsütopeenia <20 000/µl |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus              | Müügiloa hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla   | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|----------|---|--------|--------------|---|---|
| 1765795         | emitsizumab,<br>105mg 0.7ml         | B02BX0<br>6 | HEMLIBRA, süstelahus,<br>0.7ml 1TK | Roche<br>Registration<br>GmbH | 100              | D66-D66  | Hematoloog,<br>Pediaater,<br>Pediaater –<br>hematoloog-<br>onkoloog |        |              |   | hüübimisfaktori inhibiitorite esinemise korral  |
|                 |                                     |             |                                    |                               | 100              | D66-D66  | Pediaater –<br>hematoloog-<br>onkoloog,<br>Pediaater,<br>Hematoloog |        |              | verejooksu episoodide ennetamiseks raske ja mõõduka A-hemofiiliaga patsientide (VIII faktori tase <5% normiväärtusest) järgnevatele rühmadele, kui neil eelneva parima võimaliku profülaktilise raviga ei ole saavutatud piisavalt head kontrolli veritsuste osas (ABR>=3): lapsed ja alla 19-aastased noorukid kellel on raskendatud veenisestest süstete teostamine ja probleemse veeniteega täiskasvanud (kellel veenisisene ravi on võimalik vaid meditsiinipersonali poolt teostatult) |   |
| 1765807         | emitsizumab,<br>150mg 1ml           | B02BX0<br>6 | HEMLIBRA, süstelahus,<br>1ml 1TK   | Roche<br>Registration<br>GmbH | 100              | D66-D66  | Pediaater,<br>Hematoloog,<br>Pediaater –<br>hematoloog-<br>onkoloog |        |              |   | verejooksu episoodide ennetamiseks raske ja mõõduka A-hemofiiliaga patsientide (VIII faktori tase <5% normiväärtusest) järgnevatele rühmadele, kui neil eelneva parima võimaliku profülaktilise raviga ei ole saavutatud piisavalt head kontrolli veritsuste osas (ABR>=3): lapsed ja alla 19-aastased noorukid kellel on raskendatud veenisestest süstete teostamine ja probleemse veeniteega täiskasvanud (kellel veenisisene ravi on võimalik vaid meditsiinipersonali poolt teostatult) |
|                 |                                     |             |                                    |                               | 100              | D66-D66  | Hematoloog,<br>Pediaater,<br>Pediaater –<br>hematoloog-<br>onkoloog |        |              | hüübimisfaktori inhibiitorite esinemise korral  |   |
| 1765773         | emitsizumab,<br>30mg 1ml            | B02BX0<br>6 | HEMLIBRA, süstelahus,<br>1ml 1TK   | Roche<br>Registration<br>GmbH | 100              | D66-D66  | Pediaater –<br>hematoloog-<br>onkoloog,<br>Hematoloog,<br>Pediaater |        |              |   | verejooksu episoodide ennetamiseks raske ja mõõduka A-hemofiiliaga patsientide (VIII faktori tase <5% normiväärtusest) järgnevatele rühmadele, kui neil eelneva parima võimaliku profülaktilise raviga ei ole saavutatud piisavalt head kontrolli veritsuste osas (ABR>=3): lapsed ja alla 19-aastased noorukid kellel on raskendatud veenisestest süstete teostamine ja probleemse veeniteega täiskasvanud (kellel veenisisene ravi on võimalik vaid meditsiinipersonali poolt teostatult) |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                   | Müügiloa hoidja                                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                     | Eriala  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla   | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|--|------------------|------------------------------|---|--------|--------------|---|---|
| 1765784         | emitsizumab,<br>60mg 0.4ml          | B02BX0<br>6 | HEMLIBRA, süstelahus,<br>0.4ml 1TK                      | Roche<br>Registration<br>GmbH                    | 100              | D66-D66                      | Pediaater,<br>Hematoloog,<br>Pediaater –<br>hematoloog-<br>onkoloog |        |              |   | verejooksu episoodide ennetamiseks raske ja mõõduka A-hemofiiliaga patsientide (VIII faktori tase <5% normiväärtusest) järgnevatele rühmadele, kui neil eelneva parima võimaliku profülaktilise raviga ei ole saavutatud piisavalt head kontrolli veritsuste osas (ABR>=3): lapsed ja alla 19-aastased noorukid kellel on raskendatud veenisestest süstete teostamine ja probleemse veeniteega täiskasvanud (kellel veenisisene ravi on võimalik vaid meditsiinipersonali poolt teostatult) |
|                 |                                     |             |   |  | 100              | D66-D66                      | Pediaater,<br>Pediaater –<br>hematoloog-<br>onkoloog,<br>Hematoloog |        |              |   | hüübimisfaktori inhibiitorite esinemise korral  |
| 1649000         | empaglifloosiin,<br>10mg            | A10BK0<br>3 | JARDIANCE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Boehringer<br>Ingelheim<br>International<br>GmbH | 75               | E14-E14, E11-<br>E11         |   |        |              |   | II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea on meditsiiniliselt vastunäidustatud   |
|                 |                                     |             |   |  | 75               | I50-I50                      |   |        |              | patsiendile, kes kuulub NYHA II-IV funktsionaalklassi, kellel ravikoostöö on hea ning kellel AKE-inhibiitor või ARB ja beetablokaatori kaksikravitel südamepuudulikkuse sümptomid endiselt püsivad või süvenevad        |   |
|                 |                                     |             |   |  | 50               |                              |   |        |              |   |   |
| 1649134         | empaglifloosiin,<br>25mg            | A10BK0<br>3 | JARDIANCE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Boehringer<br>Ingelheim<br>International<br>GmbH | 75               | I50-I50                      |   |        |              |   | kroonilise südamepuudulikkuse korral patsiendile, kellel esineb kaasuvana II tüüpi diabeet (E11;E14), kes kuulub NYHA II-IV funktsionaalklassi, kellel ravikoostöö on hea ning kellel AKE-inhibiitor või ARB ja beetablokaatori kaksikravitel südamepuudulikkuse sümptomid endiselt püsivad või süvenevad   |
|                 |                                     |             |   |  | 50               |                              |   |        |              |   |   |
|                 |                                     |             |   |  | 75               | E14-E14, E11-<br>E11         |   |        |              | II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea on meditsiiniliselt vastunäidustatud |   |
| 1010620         | enalapriil, 10mg                    | C09AA0<br>2 | ENAHEXAL 10 MG,<br>tablett, 30TK                        | Hexal AG   | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |   |        |              |   |   |
|                 |                                     |             |   |  | 50               |                              |   |        |              |   |   |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                      | Müügiloo hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                     | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|---------------------------|------------------|------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1013599         | enalapriil, 10mg                    | C09AA0<br>2 | BERLIPRIL 10 MG,<br>tablett, 30TK          | Berlin-Chemie AG          | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 50               |                              |        |        |              |               |          |
| 1133929         | enalapriil, 10mg                    | C09AA0<br>2 | ENAP, tablett, 60TK                        | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 50               |                              |        |        |              |               |          |
| 1359974         | enalapriil, 10mg                    | C09AA0<br>2 | ENALAPRIL<br>VITABALANS, tablett,<br>30TK  | Vitabalans Oy             | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 50               |                              |        |        |              |               |          |
| 1360011         | enalapriil, 10mg                    | C09AA0<br>2 | ENALAPRIL<br>VITABALANS, tablett,<br>100TK | Vitabalans Oy             | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 50               |                              |        |        |              |               |          |
| 1010631         | enalapriil, 20mg                    | C09AA0<br>2 | ENAHEXAL 20 MG,<br>tablett, 30TK           | Hexal AG                  | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 50               |                              |        |        |              |               |          |
| 1013601         | enalapriil, 20mg                    | C09AA0<br>2 | BERLIPRIL 20 MG,<br>tablett, 30TK          | Berlin-Chemie AG          | 50               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 75               |                              |        |        |              |               |          |
| 1133952         | enalapriil, 20mg                    | C09AA0<br>2 | ENAP, tablett, 60TK                        | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 50               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 75               |                              |        |        |              |               |          |
| 1360033         | enalapriil, 20mg                    | C09AA0<br>2 | ENALAPRIL<br>VITABALANS, tablett,<br>30TK  | Vitabalans Oy             | 50               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 75               |                              |        |        |              |               |          |
| 1360077         | enalapriil, 20mg                    | C09AA0<br>2 | ENALAPRIL<br>VITABALANS, tablett,<br>100TK | Vitabalans Oy             | 50               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 75               |                              |        |        |              |               |          |
| 3022119         | enalapriil, 20mg                    | C09AA0<br>2 | ENAP, tablett, 60TK                        | Ideal Trade Links<br>UAB  | 50               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 75               |                              |        |        |              |               |          |
| 1074080         | enalapriil, 5mg                     | C09AA0<br>2 | BERLIPRIL 5 MG,<br>tablett, 50TK           | Berlin-Chemie AG          | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 50               |                              |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus              | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                           | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                     | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|--|-------------|---|---------------------------|------------------|------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1133895         | enalapriil, 5mg                                  | C09AA0<br>2 | ENAP, tablett, 60TK                             | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 50               |                              |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |                           | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
| 1359918         | enalapriil, 5mg                                  | C09AA0<br>2 | ENALAPRIL<br>VITABALANS, tablett,<br>30TK       | Vitabalans Oy             | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |                           | 50               |                              |        |        |              |               |          |
| 1359952         | enalapriil, 5mg                                  | C09AA0<br>2 | ENALAPRIL<br>VITABALANS, tablett,<br>100TK      | Vitabalans Oy             | 50               |                              |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |                           | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
| 3022041         | enalapriil, 5mg                                  | C09AA0<br>2 | ENAP, tablett, 60TK                             | Ideal Trade Links<br>UAB  | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |                           | 50               |                              |        |        |              |               |          |
| 1147564         | enalapriil+hüdroklo<br>rotiasiid,<br>10mg+12,5mg | C09BA8<br>1 | ENAP-HL, tablett, 30TK                          | KRKA d.d. Novo<br>mesto   | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |                           | 50               |                              |        |        |              |               |          |
| 1147575         | enalapriil+hüdroklo<br>rotiasiid,<br>10mg+12,5mg | C09BA8<br>1 | ENAP-HL, tablett, 60TK                          | KRKA d.d. Novo<br>mesto   | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |                           | 50               |                              |        |        |              |               |          |
| 1147597         | enalapriil+hüdroklo<br>rotiasiid,<br>10mg+25mg   | C09BA8<br>1 | ENAP-H, tablett, 30TK                           | KRKA d.d. Novo<br>mesto   | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |                           | 50               |                              |        |        |              |               |          |
| 1147609         | enalapriil+hüdroklo<br>rotiasiid,<br>10mg+25mg   | C09BA8<br>1 | ENAP-H, tablett, 60TK                           | KRKA d.d. Novo<br>mesto   | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |                           | 50               |                              |        |        |              |               |          |
| 1074888         | enalapriil+hüdroklo<br>rotiasiid,<br>20mg+12,5mg | C09BA8<br>1 | CO-RENITEC, tablett,<br>28TK                    | Organon N.V.              | 50               |                              |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |                           | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
| 1129159         | enalapriil+hüdroklo<br>rotiasiid,<br>20mg+12,5mg | C09BA8<br>1 | ENAHXAL COMP 20<br>MG/12,5 MG, tablett,<br>30TK | Hexal AG                  | 50               |                              |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |                           | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
| 1151389         | enalapriil+hüdroklo<br>rotiasiid,<br>20mg+12,5mg | C09BA8<br>1 | ENAP-HL, tablett, 30TK                          | KRKA d.d. Novo<br>mesto   | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |                           | 50               |                              |        |        |              |               |          |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus         | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                    | Müügiloa hoidja                  | Soodus-tus % | Diagnoos   | Eriala                          | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-------------|---------------------------------------|----------|--|----------------------------------|--------------|--|---------------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1619175     | ensalutamiid, 40mg                    | L02BB04  | XTANDI, pehmekapsel, 112TK                               | Astellas Pharma Europe B.V.      | 100          | C61-C61  | Uroloog, Onkoloog               |        |           |            | metastaatilise kastratsioonresistentse eesnäärmevähi raviks patsientidele, kes ei ole enne haiguse metastaseerumist saanud ravi teise põlvkonna androgeenireseptori inhibiitoriga, kes on asümptomaatilised või kergelt sümptomaatilised peale ebaõnnestunud androgeenide deprivatsioonravi, ning kellel kemoterapia ei ole veel kliiniliselt näidustatud või heas üldseisundis (ECOG 0-1 või valusündroomist tingitud ECOG 2) patsientidele, kelle haigus on eelneva dotsetakseeli sisaldava kemoterapia vältel või pärast seda progresseerunud. Ravimi kasutamisele ei või eelneva metastaatilise haiguse ravi apalutamiidi, ensalutamiidiga või abiraterooniga varasemas ravireas, kuid lubatud on ravimi vahetus talumatute kõrvaltoimete ilmnemisel. Soodustus kehtib patsientidele, kelle ravi ensalutamiidi sisaldava ravimpreparaadiga on välja kirjutatud enne 01.04.2023 |
| 1247509     | entekaviir, 0,5mg                     | J05AF10  | BARACLUDE, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK        | Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG | 100          | B18.0-B18.1  | Gastroenteroloog, Infektsionist |        |           |            | kroonilise progresseeruva kuluga B-viirushepatiidi raviks  |
| 1753882     | entekaviir, 0,5mg                     | J05AF10  | ENTECAVIR ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Accord Healthcare S.L.U.         | 100          | B18.0-B18.1  | Gastroenteroloog, Infektsionist |        |           |            | kroonilise progresseeruva kuluga B-viirushepatiidi raviks  |
| 1247510     | entekaviir, 1mg                       | J05AF10  | BARACLUDE, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK        | Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG | 100          | B18.0-B18.1  | Gastroenteroloog, Infektsionist |        |           |            | kroonilise progresseeruva kuluga B-viirushepatiidi raviks  |
| 1753905     | entekaviir, 1mg                       | J05AF10  | ENTECAVIR ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Accord Healthcare S.L.U.         | 100          | B18.0-B18.1  | Infektsionist, Gastroenteroloog |        |           |            | kroonilise progresseeruva kuluga B-viirushepatiidi raviks  |
| 1588844     | epinefriin (adrenaliin), 150mcg 0.3ml | C01CA24  | EIPEN, süstelahus pen-süstlis, 2ml 1TK                   | VIATRIS HEALTHCARE Limited       | 100          | T88.6-T88.6, T78.0-T78.0, T88.2-T88.2, T80.5-T80.6, T78.2-T78.3, L50.0-L50.0 |                                 |        |           |            |  |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus         | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                        | Müügiloa hoidja            | Soodus-tus % | Diagnoos  | Eriala                        | Esmane | Vanus üle | Vanus alla   | Märkused  |
|-------------|---------------------------------------|----------|--|----------------------------|--------------|---|-------------------------------|--------|-----------|--|---|
| 1588866     | epinefriin (adrenaliin), 300mcg 0.3ml | C01CA24  | EPIPEN, süstelahus pen-süstlis, 2ml 1TK      | VIATRIS HEALTHCARE Limited | 100          | T88.6-T88.6, T78.0-T78.0, T88.2-T88.2, T80.5-T80.6, T78.2-T78.3, L50.0-L50.0                                    |                               |        |           |  |   |
| 7004955     | eritoitesegu,                         |          | MONOGEN, pulber, 400g                        | Nutricia Ltd               | 100          | E71.3-E71.3   |                               |        |           |  | ravimi väljakirjutamise õigus pika ahelaga rasvhapete beetaoksüdatsiooni defektide korral |
| 7017960     | eritoitesegu,                         |          | Neocate Syneo, pulber, 400g N6               | Nutrimedical OÜ            | 75           | K52.2-K52.2, L27.2-L27.2, L50-L50, T78.1-T78.1, K22.8-K22.8, K90.4-K90.4, T78.2-T78.2, L20.8-L20.8, T78.0-T78.0 |                               |        |           | 1,00   |   |
| 7017667     | eritoitesegu,                         |          | COMIDA PKU C Formula, pulber, 500g N1        | Vitaflo International Ltd. | 100          | E70.0-E70.1   |                               |        |           |  |   |
|             |                                       |          |  |                            | 50           |   |                               |        |           |  |   |
| 7017656     | eritoitesegu,                         |          | COMIDA PKU C Formula Orange, pulber, 500g N1 | Vitaflo International Ltd. | 100          | E70.0-E70.1   |                               |        |           |  |   |
|             |                                       |          |  |                            | 50           |   |                               |        |           |  |   |
| 7004911     | eritoitesegu,                         |          | Lipistart , suukaudse lahuse pulber, 400 g   | Vitaflo                    | 100          | E71.3-E71.3   |                               |        |           |  | ravimi väljakirjutamise õigus pika ahelaga rasvhapete beetaoksüdatsiooni defektide korral |
| 1205435     | erütropoetiin, 10000RÜ 0.6ml          | B03XA01  | NEORECORMON, süstelahus süstlis, 0.6ml 6TK   | Roche Registration GmbH    | 50           |   |                               |        |           |  |   |
|             |                                       |          |  |                            | 100          | D63-D63, T86-T86  | Uroloog, Pediaater, Nefroloog |        |           | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral |   |
|             |                                       |          |  |                            | 100          | D46-D46, D47.1-D47.1  | Hematoloog                    |        |           |  |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus           | Müügiloa hoidja        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla   | Märkused  |  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------------------|------------------|---|--------|--------|--------------|---|---|--|
| 1422335         | esetimiib, 10mg                     | C10AX0<br>9 | EZOLETA, tablett, 28TK          | KRKA, d.d., Novo mesto | 75               | I70.2-I70.2, Z45-Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95 |        |        |              |   |   |  |
|                 |                                     |             |                                 |                        | 50               |   |        |        |              |   |   |  |
|                 |                                     |             |                                 |                        | 100              | N18-N18   |        |        |              |   | alates III staadiumist kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust                                       |  |
|                 |                                     |             |                                 |                        | 75               | E13-E14, E10-E11  |        |        |              | kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust;   |   |  |
|                 |                                     |             |                                 |                        | 75               | I11-I12   |        |        |              | raske südame või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust |   |  |
| 1681174         | esetimiib, 10mg                     | C10AX0<br>9 | EZETIMIBE ACCORD, tablett, 28TK | Accord Healthcare B.V. | 50               |   |        |        |              |   |   |  |
|                 |                                     |             |                                 |                        | 75               | I70.2-I70.2, Z45-Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95 |        |        |              |   |   |  |
|                 |                                     |             |                                 |                        | 75               | I11-I12   |        |        |              |   | raske südame või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust |  |
|                 |                                     |             |                                 |                        | 75               | E13-E14, E10-E11  |        |        |              | kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust;   |   |  |
|                 |                                     |             |                                 |                        | 100              | N18-N18   |        |        |              | alates III staadiumist kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust                                       |   |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus             | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle  | Vanus<br>alla  | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|------------------|---|--------|--------|---|--|----------|
| 1815926         | esetimiib, 10mg                     | C10AX0<br>9 | EZETIMIBE ELVIM,<br>tablett, 28TK | SIA Elvim       | 75               | I70.2-I70.2, Z45-<br>Z45, I25-I25,<br>I21-I22, I63-I63,<br>I65-I66, Z95-Z95 |        |        |   |  |          |
|                 |                                     |             |                                   |                 | 50               |   |        |        |   |  |          |
|                 |                                     |             |                                   |                 | 100              | N18-N18   |        |        |   | alates III staadiumist kombinatsioonis atorvastatiini või<br>rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi<br>optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata<br>kolesteroolitaseme eesmärkväärtust |          |
|                 |                                     |             |                                   |                 | 75               | I11-I12   |        |        | raske südame või neerukahjustusega hüpertensiooni<br>esinemisel kombinatsioonis atorvastatiini või<br>rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi<br>optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata<br>kolesteroolitaseme eesmärkväärtust |  |          |
|                 |                                     |             |                                   |                 | 75               | E13-E14, E10-<br>E11  |        |        | kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui<br>vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse<br>kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust;  |  |          |
| 1818323         | esetimiib, 10mg                     | C10AX0<br>9 | EZOLETA, tablett, 30TK            | First Pharma OÜ | 50               |   |        |        |   |  |          |
|                 |                                     |             |                                   |                 | 75               | E13-E14, E10-<br>E11  |        |        | kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui<br>vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse<br>kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust;  |  |          |
|                 |                                     |             |                                   |                 | 75               | I11-I12   |        |        | raske südame või neerukahjustusega hüpertensiooni<br>esinemisel kombinatsioonis atorvastatiini või<br>rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi<br>optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata<br>kolesteroolitaseme eesmärkväärtust |  |          |
|                 |                                     |             |                                   |                 | 100              | N18-N18   |        |        | alates III staadiumist kombinatsioonis atorvastatiini või<br>rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi<br>optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata<br>kolesteroolitaseme eesmärkväärtust  |  |          |
|                 |                                     |             |                                   |                 | 75               | I70.2-I70.2, Z45-<br>Z45, I25-I25,<br>I21-I22, I63-I63,<br>I65-I66, Z95-Z95 |        |        |   |  |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla   | Märkused  |   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------------|------------------|---|--------|--------|--------------|---|---|---|
| 1818356         | esetimiib, 10mg                     | C10AX0<br>9 | EZOLETA, tablett, 60TK | First Pharma OÜ          | 75               | I25-I25, I70.2-<br>I70.2, I65-I65,<br>Z95-Z95, I63-<br>I63, I21-I22,<br>Z45-Z45 |        |        |              |   |   |   |
|                 |                                     |             |                        |                          | 50               |   |        |        |              |   |   |   |
|                 |                                     |             |                        |                          | 75               | E13-E14, E10-<br>E11  |        |        |              |   | kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust; |   |
|                 |                                     |             |                        |                          | 100              | N18-N18   |        |        |              | alates III staadiumist kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust                                       |   |   |
|                 |                                     |             |                        |                          | 75               | I11-I12   |        |        |              | raske südame või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust |   |   |
| 1861714         | esetimiib, 10mg                     | C10AX0<br>9 | EZOLETA, tablett, 30TK | Ideal Trade Links<br>UAB | 75               | I11-I12   |        |        |              |   |   | raske südame või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust |
|                 |                                     |             |                        |                          | 50               |   |        |        |              |   |   |   |
|                 |                                     |             |                        |                          | 75               | E13-E14, E10-<br>E11  |        |        |              |   | kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust; |   |
|                 |                                     |             |                        |                          | 75               | I70.2-I70.2, Z45-<br>Z45, I25-I25,<br>I21-I22, I63-I63,<br>I65-I66, Z95-Z95     |        |        |              |   |   |   |
|                 |                                     |             |                        |                          | 100              | N18-N18   |        |        |              | alates III staadiumist kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust                                       |   |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla   | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------------|------------------|---|--------|--------|--------------|---|---|
| 1861747         | esetimiib, 10mg                     | C10AX0<br>9 | EZOLETA, tablett, 60TK | Ideal Trade Links<br>UAB | 75               | I11-I12   |        |        |              |   | raske südame või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust |
|                 |                                     |             |                        |                          | 50               |   |        |        |              |   |   |
|                 |                                     |             |                        |                          | 100              | N18-N18   |        |        |              | alates III staadiumist kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust                                       |   |
|                 |                                     |             |                        |                          | 75               | I70.2-I70.2, Z45-<br>Z45, I25-I25,<br>I21-I22, I63-I63,<br>I65-I66, Z95-Z95 |        |        |              |   |   |
|                 |                                     |             |                        |                          | 75               | E13-E14, E10-<br>E11  |        |        |              | kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust;   |   |
| 1862704         | esetimiib, 10mg                     | C10AX0<br>9 | EZOLETA, tablett, 30TK | Lex Ano UAB              | 100              | N18-N18   |        |        |              |   | alates III staadiumist kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust                                       |
|                 |                                     |             |                        |                          | 50               |   |        |        |              |   |   |
|                 |                                     |             |                        |                          | 75               | I11-I12   |        |        |              | raske südame või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust |   |
|                 |                                     |             |                        |                          | 75               | I70.2-I70.2, Z45-<br>Z45, I25-I25,<br>I21-I22, I63-I63,<br>I65-I66, Z95-Z95 |        |        |              |   |   |
|                 |                                     |             |                        |                          | 75               | E13-E14, E10-<br>E11  |        |        |              | kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust;   |   |



| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloo hoidja             | Soodus-tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla   | Märkused   |
|-------------|-------------------------------|----------|---|-----------------------------|--------------|----------|--------|--------|-----------|--|--|
| 1087949     | esomeprasool, 20mg            | A02BC05  | NEXIUM, gastroresistentne tablett, 14TK               | Grunenthal GmbH             | 50           |          |        |        |           |  |  |
|             |                               |          |   |                             | 75           | K25-K27  |        |        |           | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |  |
| 1087950     | esomeprasool, 20mg            | A02BC05  | NEXIUM, gastroresistentne tablett, 28TK               | Grunenthal GmbH             | 50           |          |        |        |           |  |  |
|             |                               |          |   |                             | 75           | K25-K27  |        |        |           | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |  |
| 1337891     | esomeprasool, 20mg            | A02BC05  | NEXMEZOL 20 MG, gastroresistentne tablett, 28TK       | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 75           | K25-K27  |        |        |           |  | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
|             |                               |          |   |                             | 50           |          |        |        |           |  |  |
| 1337914     | esomeprasool, 20mg            | A02BC05  | NEXMEZOL 20 MG, gastroresistentne tablett, 56TK       | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 75           | K25-K27  |        |        |           |  | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
|             |                               |          |   |                             | 50           |          |        |        |           |  |  |
| 1395985     | esomeprasool, 20mg            | A02BC05  | ESCADRA, gastroresistentne kõvakapsel, 14TK           | KRKA, d.d., Novo mesto      | 75           | K25-K27  |        |        |           |  | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
|             |                               |          |   |                             | 50           |          |        |        |           |  |  |
| 1396009     | esomeprasool, 20mg            | A02BC05  | ESCADRA, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK           | KRKA, d.d., Novo mesto      | 75           | K25-K27  |        |        |           |  | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
|             |                               |          |   |                             | 50           |          |        |        |           |  |  |
| 1396032     | esomeprasool, 20mg            | A02BC05  | ESCADRA, gastroresistentne kõvakapsel, 56TK           | KRKA, d.d., Novo mesto      | 50           |          |        |        |           |  |  |
|             |                               |          |   |                             | 75           | K25-K27  |        |        |           | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |  |
| 1542338     | esomeprasool, 20mg            | A02BC05  | ESOMEPRAZOLE ACTAVIS, gastroresistentne tablett, 28TK | Teva B.V.                   | 50           |          |        |        |           |  |  |
|             |                               |          |   |                             | 75           | K25-K27  |        |        |           | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |  |
| 1830574     | esomeprasool, 20mg            | A02BC05  | NEXIUM, gastroresistentne tablett, 28TK               | Lex Ano UAB                 | 75           | K25-K27  |        |        |           |  | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
|             |                               |          |   |                             | 50           |          |        |        |           |  |  |
| 1892268     | esomeprasool, 20mg            | A02BC05  | NEXIUM, gastroresistentne tablett, 28TK               | Ideal Trade Links UAB       | 50           |          |        |        |           |  |  |
|             |                               |          |   |                             | 75           | K25-K27  |        |        |           | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |  |
| 1087972     | esomeprasool, 40mg            | A02BC05  | NEXIUM, gastroresistentne tablett, 14TK               | Grunenthal GmbH             | 50           |          |        |        |           |  |  |
|             |                               |          |   |                             | 75           | K25-K27  |        |        |           | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |  |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja             | Soodus-tus % | Diagnoos                 | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-------------|-------------------------------|----------|--|-----------------------------|--------------|--------------------------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1087983     | esomeprasool, 40mg            | A02BC05  | NEXIUM, gastroresistentne tablett, 28TK                      | Grunenthal GmbH             | 75           | K25-K27                  |             |        |           |            | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
|             |                               |          |  |                             | 50           |                          |             |        |           |            |  |
| 1337981     | esomeprasool, 40mg            | A02BC05  | NEXMEZOL 40 MG, gastroresistentne tablett, 14TK              | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 75           | K25-K27                  |             |        |           |            | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
|             |                               |          |  |                             | 50           |                          |             |        |           |            |  |
| 1338005     | esomeprasool, 40mg            | A02BC05  | NEXMEZOL 40 MG, gastroresistentne tablett, 28TK              | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 75           | K25-K27                  |             |        |           |            | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
|             |                               |          |  |                             | 50           |                          |             |        |           |            |  |
| 1338027     | esomeprasool, 40mg            | A02BC05  | NEXMEZOL 40 MG, gastroresistentne tablett, 56TK              | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 75           | K25-K27                  |             |        |           |            | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
|             |                               |          |  |                             | 50           |                          |             |        |           |            |  |
| 1396111     | esomeprasool, 40mg            | A02BC05  | ESCADRA, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK                  | KRKA, d.d., Novo mesto      | 75           | K25-K27                  |             |        |           |            | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
|             |                               |          |  |                             | 50           |                          |             |        |           |            |  |
| 1542462     | esomeprasool, 40mg            | A02BC05  | ESOMEPRAZOLE ACTAVIS, gastroresistentne tablett, 28TK        | Teva B.V.                   | 75           | K25-K27                  |             |        |           |            | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
|             |                               |          |  |                             | 50           |                          |             |        |           |            |  |
| 1885215     | esomeprasool, 40mg            | A02BC05  | NEXIUM, gastroresistentne tablett, 28TK                      | Lex Ano UAB                 | 75           | K25-K27                  |             |        |           |            | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
|             |                               |          |  |                             | 50           |                          |             |        |           |            |  |
| 1888049     | esomeprasool, 40mg            | A02BC05  | ESCADRA, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK                  | Lex Ano UAB                 | 50           |                          |             |        |           |            |  |
|             |                               |          |  |                             | 75           | K25-K27                  |             |        |           |            | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| 1892303     | esomeprasool, 40mg            | A02BC05  | NEXIUM, gastroresistentne tablett, 28TK                      | Ideal Trade Links UAB       | 75           | K25-K27                  |             |        |           |            | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
|             |                               |          |  |                             | 50           |                          |             |        |           |            |  |
| 1325023     | estsitalopraam, 10mg          | N06AB10  | ESCITALOPRAM ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Teva B.V.                   | 50           |                          |             |        |           |            |  |
|             |                               |          |  |                             | 100          | F33.2-F33.3, F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                    | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|-----------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1331648         | estsitalopraam,<br>10mg             | N06AB1<br>0 | ESCITALOPRAM TEVA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK            | Teva Pharma B.V.                  | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                                   | 50               |                             |             |        |              |               |          |
| 1400218         | estsitalopraam,<br>10mg             | N06AB1<br>0 | ELICEA 10 MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                 | KRKA, d.d., Novo<br>mesto         | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                                   | 50               |                             |             |        |              |               |          |
| 1484018         | estsitalopraam,<br>10mg             | N06AB1<br>0 | CIRASET 10 MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                                   | 50               |                             |             |        |              |               |          |
| 1488540         | estsitalopraam,<br>10mg             | N06AB1<br>0 | ESCITALOPRAM<br>ACCORD 10 MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Accord Healthcare<br>B.V.         | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                                   | 50               |                             |             |        |              |               |          |
| 1543137         | estsitalopraam,<br>10mg             | N06AB1<br>0 | ESTAN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK                           | Medochemie<br>Limited             | 50               |                             | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                                   | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 |             |        |              |               |          |
| 1559987         | estsitalopraam,<br>10mg             | N06AB1<br>0 | ELICEA Q-TAB 10MG,<br>suus disperseeruv<br>tablett, 28TK                      | KRKA d.d. Novo<br>mesto           | 50               |                             | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                                   | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 |             |        |              |               |          |
| 1869644         | estsitalopraam,<br>10mg             | N06AB1<br>0 | ESCITALOPRAM<br>GRINDEKS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK        | Grindeks AS                       | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                                   | 50               |                             |             |        |              |               |          |
| 1325225         | estsitalopraam,<br>20mg             | N06AB1<br>0 | ESCITALOPRAM<br>ACTAVIS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK         | Teva B.V.                         | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                                   | 50               |                             |             |        |              |               |          |
| 1331907         | estsitalopraam,<br>20mg             | N06AB1<br>0 | ESCITALOPRAM TEVA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK            | Teva Pharma B.V.                  | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                                   | 50               |                             |             |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                    | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|---------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1400320         | estsitalopraam,<br>20mg             | N06AB1<br>0 | ELICEA 20 MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                 | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 50               |                             |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                           | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
| 1488595         | estsitalopraam,<br>20mg             | N06AB1<br>0 | ESCITALOPRAM<br>ACCORD 20 MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Accord Healthcare<br>B.V. | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                           | 50               |                             |             |        |              |               |          |
| 1560046         | estsitalopraam,<br>20mg             | N06AB1<br>0 | ELICEA Q-TAB 20MG,<br>suus disperseeruv<br>tablett, 28TK                      | KRKA d.d. Novo<br>mesto   | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                           | 50               |                             |             |        |              |               |          |
| 1869699         | estsitalopraam,<br>20mg             | N06AB1<br>0 | ESCITALOPRAM<br>GRINDEKS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK        | Grindeks AS               | 50               |                             |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                           | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                         | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala                           | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla   | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|--------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------|--------------|---|---|
| 1011665         | etanertsept, 25mg                   | L04AB0<br>1 | ENBREL, süstelahuse<br>pulber ja lahusti, 4TK | Pfizer Europe MA<br>EEIG | 100              | M07.0-M07.3                   | Reumatoloog,<br>Pediaater        |        |              |   | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks. |
|                 |                                     |             |   |                          | 100              | M45-M45, M46-<br>M46          | Pediaater,<br>Reumatoloog        |        |              | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.   |   |
|                 |                                     |             |   |                          | 100              | M05-M05, M08-<br>M08, M06-M06 | Pediaater,<br>Reumatoloog        |        |              | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks  |   |
|                 |                                     |             |   |                          | 100              | L40-L40                       | Dermatovenerol<br>oog, Pediaater |        |              | patsient vastab järgmistele tingimustele: haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor $\geq 10$ ja/või DLQI $\geq 10$ ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoterapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas) |   |
|                 |                                     |             |   |                          | 100              | M08-M08                       | Reumatoloog,<br>Pediaater        |        |              | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav   |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus              | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala                              | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla   | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------|--------------|---|---|
| 1265600         | etanertsept, 25mg                   | L04AB0<br>1 | ENBREL, süstelahus<br>süstlis, 4TK | Pfizer Europe MA<br>EEIG | 100              | M07.0-M07.3                   | Pediaater,<br>Reumatoloog           |        |              |   | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks. |
|                 |                                     |             |                                    |                          | 100              | L40-L40                       | Pediaater,<br>Dermatovenerol<br>oog |        |              | patsient vastab järgmistele tingimustele: haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor $\geq 10$ ja/või DLQI $\geq 10$ ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoterapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas) |   |
|                 |                                     |             |                                    |                          | 100              | M45-M45, M46-<br>M46          | Pediaater,<br>Reumatoloog           |        |              | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.   |   |
|                 |                                     |             |                                    |                          | 100              | M08-M08                       | Pediaater,<br>Reumatoloog           |        |              | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav   |   |
|                 |                                     |             |                                    |                          | 100              | M05-M05, M08-<br>M08, M06-M06 | Pediaater,<br>Reumatoloog           |        |              | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks  |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus              | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                             | Eriala                           | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla   | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------|--------------|---|--|
| 1748482         | etanertsept, 25mg                   | L04AB0<br>1 | ERELZI, süstelahus<br>süstlis, 4TK | Sandoz GmbH     | 100              | L40-L40                              | Dermatovenerol<br>oog, Pediaater |        |              |   | patsient vastab järgmistele tingimustele: haigus on<br>väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor<br>>=10 ja/või DLQI>=10 ning esineb vähemalt üks<br>järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi<br>(atsitreiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja<br>Psoralen+UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud,<br>esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või<br>puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi<br>kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid<br>hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi<br>vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas) |
|                 |                                     |             |                                    |                 | 100              | M05-M05, M08-<br>M08, M06-M06        | Pediaater,<br>Reumatoloog        |        |              | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud<br>ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on<br>osutunud ebatõhusaks või talumatuks  |  |
|                 |                                     |             |                                    |                 | 100              | M08-M08                              | Reumatoloog,<br>Pediaater        |        |              | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud<br>ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või<br>ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja<br>intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus<br>või talutav |  |
|                 |                                     |             |                                    |                 | 100              | M07.0-M07.3,<br>M45-M45, M46-<br>M46 | Reumatoloog,<br>Pediaater        |        |              | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud<br>ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga,<br>perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu<br>modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või<br>talumatuks.   |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus              | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                            | Eriala                           | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla   | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------|--------------|---|---|
| 1265644         | etanertsept, 50mg                   | L04AB0<br>1 | ENBREL, süstelahus<br>süstlis, 4TK | Pfizer Europe MA<br>EEIG | 100              | M08-M08                             | Reumatoloog,<br>Pediaater        |        |              |   | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav |
|                 |                                     |             |                                    |                          | 100              | M05-M05, M08-<br>M08, M06-M06       | Reumatoloog,<br>Pediaater        |        |              | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks  |   |
|                 |                                     |             |                                    |                          | 100              | L40-L40                             | Dermatovenerol<br>oog, Pediaater |        |              | patsient vastab järgmistele tingimustele: haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor $\geq 10$ ja/või DLQI $\geq 10$ ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitreiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas) |   |
|                 |                                     |             |                                    |                          | 100              | M45-M45,<br>M07.0-M07.3,<br>M46-M46 | Reumatoloog,<br>Pediaater        |        |              | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.   |   |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                  | Müügiloo hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                            | Eriala                              | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla  | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|--------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------------|--|---|
| 1460191         | etanertsept, 50mg                   | L04AB0<br>1 | ENBREL, süstelahus<br>pen-süstlis, 4TK | Pfizer Europe MA<br>EEIG | 100              | M45-M45,<br>M07.0-M07.3,<br>M46-M46 | Pediaater,<br>Reumatoloog           |        |              |  | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks. |
|                 |                                     |             |  |                          | 100              | M08-M08                             | Pediaater,<br>Reumatoloog           |        |              | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav  |   |
|                 |                                     |             |  |                          | 100              | L40-L40                             | Pediaater,<br>Dermatovenerol<br>oog |        |              | patsient vastab järgmistele tingimustele: haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor $\geq 10$ ja/või DLQI $\geq 10$ ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitreiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoterapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas) |   |
|                 |                                     |             |  |                          | 100              | M05-M05, M08-<br>M08, M06-M06       | Pediaater,<br>Reumatoloog           |        |              | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks   |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                    | Müügiloa hoidja            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                            | Eriala                           | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla   | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|----------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------|--------------|---|--|
| 1708680         | etanertsept, 50mg                   | L04AB0<br>1 | BENEPALI, süstelahus<br>pen-süstlis, 4TK | Samsung Bioepis<br>NL B.V. | 100              | L40-L40                             | Dermatovenerol<br>oog, Pediaater |        |              |   | patsient vastab järgmistele tingimustele: haigus on<br>väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor<br>>=10 ja/või DLQI>=10 ning esineb vähemalt üks<br>järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi<br>(atsitreiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja<br>Psoralen+UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud,<br>esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või<br>puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi<br>kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid<br>hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi<br>vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas) |
|                 |                                     |             |  |                            | 100              | M08-M08                             | Pediaater,<br>Reumatoloog        |        |              | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud<br>ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või<br>ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja<br>intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus<br>või talutav |  |
|                 |                                     |             |  |                            | 100              | M45-M45,<br>M07.0-M07.3,<br>M46-M46 | Reumatoloog,<br>Pediaater        |        |              | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud<br>ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga,<br>perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu<br>modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või<br>talumatuks.   |  |
|                 |                                     |             |  |                            | 100              | M05-M05, M08-<br>M08, M06-M06       | Reumatoloog,<br>Pediaater        |        |              | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud<br>ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on<br>osutunud ebatõhusaks või talumatuks  |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus              | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                             | Eriala                              | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla  | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------------|--|---|
| 1748527         | etanertsept, 50mg                   | L04AB0<br>1 | ERELZI, süstelahus<br>süstlis, 4TK | Sandoz GmbH     | 100              | M07.0-M07.3,<br>M45-M45, M46-<br>M46 | Reumatoloog,<br>Pediaater           |        |              |  | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks. |
|                 |                                     |             |                                    |                 | 100              | M05-M05, M08-<br>M08, M06-M06        | Reumatoloog,<br>Pediaater           |        |              | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks   |   |
|                 |                                     |             |                                    |                 | 100              | M08-M08                              | Reumatoloog,<br>Pediaater           |        |              | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav  |   |
|                 |                                     |             |                                    |                 | 100              | L40-L40                              | Pediaater,<br>Dermatovenerol<br>oog |        |              | patsient vastab järgmistele tingimustele: haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor $\geq 10$ ja/või DLQI $\geq 10$ ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitreiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoterapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas) |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                         | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                  | Müügi-<br>loa hoidja     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                            | Eriala                              | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla  | Märkused  |
|-----------------|---|-------------|--|--------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------------|--|---|
| 1748561         | etanertsept, 50mg   | L04AB0<br>1 | ERELZI, süstelahus<br>pen-süstlis, 4TK | Sandoz GmbH              | 100              | M45-M45,<br>M07.0-M07.3,<br>M46-M46 | Pediaater,<br>Reumatoloog           |        |              |  | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks. |
|                 |   |             |  |                          | 100              | M08-M08                             | Reumatoloog,<br>Pediaater           |        |              | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav  |   |
|                 |   |             |  |                          | 100              | L40-L40                             | Pediaater,<br>Dermatovenerol<br>oog |        |              | patsient vastab järgmistele tingimustele: haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor $\geq 10$ ja/või DLQI $\geq 10$ ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitreiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoterapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas) |   |
|                 |   |             |  |                          | 100              | M05-M05, M08-<br>M08, M06-M06       | Pediaater,<br>Reumatoloog           |        |              | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks   |   |
| 1589171         | etonogestreel,<br>68mg                                      | G03AC0<br>8 | NEXPLANON,<br>implantaat, 1TK          | Organon N.V.             | 50               |                                     |                                     |        |              |  |   |
| 1138621         | etonogestreel+etü<br>nüülöstradiool,<br>120mcg+15mcg<br>24h | G02BB0<br>1 | NUVARING,<br>vaginaalravivahend, 1TK   | Organon N.V.             | 50               |                                     |                                     |        |              |  |   |
| 1712584         | etonogestreel+etü<br>nüülöstradiool,<br>120mcg+15mcg<br>24h | G02BB0<br>1 | SETLONA,<br>vaginaalravivahend, 1TK    | Viatrix Limited          | 50               |                                     |                                     |        |              |  |   |
| 3033212         | etoposiid, 100mg  | L01CB0<br>1 | VEPESID,<br>pehmekapsel, 10TK          | Ideal Trade Links<br>UAB | 100              | C00-C48                             | Onkoloog,<br>Hematoloog             |        |              |  |   |
|                 |   |             |  |                          | 50               |                                     |                                     |        |              |  |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja         | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|-------------------------|------------------|----------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1085352         | etorikoksiib,<br>120mg              | M01AH0<br>5 | ARCOXIA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK                      | Organon N.V.            | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1653241         | etorikoksiib,<br>120mg              | M01AH0<br>5 | ETORICOXIB ZENTIVA<br>120 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>7TK  | Zentiva k.s.            | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1653252         | etorikoksiib,<br>120mg              | M01AH0<br>5 | ETORICOXIB ZENTIVA<br>120 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK | Zentiva k.s.            | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1658369         | etorikoksiib,<br>120mg              | M01AH0<br>5 | ETORICOXIB TEVA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK           | Teva B.V.               | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1699577         | etorikoksiib,<br>120mg              | M01AH0<br>5 | ETOXIB, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>7TK                        | KRKA d.d. Novo<br>mesto | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1699588         | etorikoksiib,<br>120mg              | M01AH0<br>5 | ETOXIB, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK                       | KRKA d.d. Novo<br>mesto | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1751385         | etorikoksiib,<br>120mg              | M01AH0<br>5 | ETIDYLAN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK                     | G.L. Pharma<br>GmbH     | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1085318         | etorikoksiib, 60mg                  | M01AH0<br>5 | ARCOXIA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK                      | Organon N.V.            | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1652824         | etorikoksiib, 60mg                  | M01AH0<br>5 | ETORICOXIB ZENTIVA<br>60 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK  | Zentiva k.s.            | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1699342         | etorikoksiib, 60mg                  | M01AH0<br>5 | ETOXIB, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK                       | KRKA d.d. Novo<br>mesto | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1085330         | etorikoksiib, 90mg                  | M01AH0<br>5 | ARCOXIA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK                      | Organon N.V.            | 50               |          |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                  | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|----------------------------------|------------------|---|----------|--------|--------------|---------------|--|
| 1653173         | etorikoksiib, 90mg                  | M01AH0<br>5 | ETORICOXIB ZENTIVA<br>90 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>7TK  | Zentiva k.s.                     | 50               |   |          |        |              |               |  |
| 1653184         | etorikoksiib, 90mg                  | M01AH0<br>5 | ETORICOXIB ZENTIVA<br>90 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK | Zentiva k.s.                     | 50               |   |          |        |              |               |  |
| 1658279         | etorikoksiib, 90mg                  | M01AH0<br>5 | ETORICOXIB TEVA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK          | Teva B.V.                        | 50               |   |          |        |              |               |  |
| 1699454         | etorikoksiib, 90mg                  | M01AH0<br>5 | ETOXIB, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>7TK                       | KRKA d.d. Novo<br>mesto          | 50               |   |          |        |              |               |  |
| 1699465         | etorikoksiib, 90mg                  | M01AH0<br>5 | ETOXIB, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK                      | KRKA d.d. Novo<br>mesto          | 50               |   |          |        |              |               |  |
| 1751251         | etorikoksiib, 90mg                  | M01AH0<br>5 | ETIDYLAN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK                    | G.L. Pharma<br>GmbH              | 50               |   |          |        |              |               |  |
| 1433315         | everoliimus, 10mg                   | L01EG0<br>2 | AFINITOR, tablett, 30TK   | Novartis<br>Europharm<br>Limited | 100              | C78-C78, C25-<br>C25, C34-C34,<br>C16-C20 | Onkoloog |        |              |               | patsientidele, kellel ravi alustamise näidustatus<br>everoliimusega on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 2<br>onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele:<br>diagnoositud kaugelearenenud kõrgelt diferentseerunud<br>(täielikult) mitteresetseeritav progresseeruva kuluga<br>seedetraktist, kopsust või pankreasest lähtunud<br>neuroendokriinne kasvaja ning süsteemne keemiaravi<br>ja/või ravi somatostatiini analoogiga on vastunäidustatud<br>või osutunud ebaefektiivseks |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                    | Müügiloa hoidja                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                  | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|----------------------------------|------------------|---|----------|--------|--------------|---------------|--|
| 1787632         | everoliimus, 10mg                   | L01EG0<br>2 | EVEROLIMUS<br>NORAMEDA, tablett,<br>30TK | Norameda UAB                     | 100              | C78-C78, C25-<br>C25, C34-C34,<br>C16-C20 | Onkoloog |        |              |               | patsientidele, kellel ravi alustamise näidustatus everoliimusega on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud kaugelearenenud kõrgelt diferentseerunud (täielikult) mitteresetseeritav progresseeruva kuluga seedetraktist, kopsust või pankreasest lähtunud neuroendokriinne kasvaja ning süsteemne keemiaravi ja/või ravi somatostatiini analoogiga on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks |
| 1433281         | everoliimus, 5mg                    | L01EG0<br>2 | AFINITOR, tablett, 30TK                  | Novartis<br>Europharm<br>Limited | 100              | C78-C78, C25-<br>C25, C34-C34,<br>C16-C20 | Onkoloog |        |              |               | patsientidele, kellel ravi alustamise näidustatus everoliimusega on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud kaugelearenenud kõrgelt diferentseerunud (täielikult) mitteresetseeritav progresseeruva kuluga seedetraktist, kopsust või pankreasest lähtunud neuroendokriinne kasvaja ning süsteemne keemiaravi ja/või ravi somatostatiini analoogiga on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks |
| 1787609         | everoliimus, 5mg                    | L01EG0<br>2 | EVEROLIMUS<br>NORAMEDA, tablett,<br>30TK | Norameda UAB                     | 100              | C78-C78, C25-<br>C25, C34-C34,<br>C16-C20 | Onkoloog |        |              |               | patsientidele, kellel ravi alustamise näidustatus everoliimusega on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud kaugelearenenud kõrgelt diferentseerunud (täielikult) mitteresetseeritav progresseeruva kuluga seedetraktist, kopsust või pankreasest lähtunud neuroendokriinne kasvaja ning süsteemne keemiaravi ja/või ravi somatostatiini analoogiga on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus  | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|--|-------------|---|--|------------------|---|---|--------|--------------|---------------|---|
| 1693256         | evolokumab,<br>140mg 1ml   | C10AX1<br>3 | REPATHA, süstelahus<br>pen-süstlis, 1ml 1TK                       | Amgen Europe<br>B.V.                                       | 100              | I22-I22, Z95-<br>Z95, I66-I66,<br>I69-I69, I25-I25,<br>I63-I63, I21-I21,<br>I70.2-I70.2, I65-<br>I65, I20.0-I20.0 | Kardioloog,<br>Neuroloog,<br>vaskulaarkirurg                        | esmane |              |               | ägea koronaarsündroomi (ÄKS, STEMI, NSTEMI,<br>ebastabiilne stenokardia), isheemilise insuldi ja<br>revaskulariseerimise (koronaararter, karotiidararter,<br>perifeerse arteriaalse) järgselt (möödunud <=36 kuud)<br>kombinatsioonis statiini ja esetimiibiga patsientidele, kelle<br>LDL-C väärtus on >=2,6 mmol/l ja kellel vaatamata 1-3<br>kuud kestnud ravile maksimaalses talutavas annuses<br>statiini ja esetimiibiga ei ole saavutatud LDL-kolesterooli<br>eesmärkväärtust või kellele statiin/esetimiib on<br>vastunäidustatud |
|                 |  |             |   |  | 100              | E78.0-E78.0   | Kardioloog  | esmane |              |               | kroonilise perekondliku hüperkolesteroleemia raviks<br>dokumenteeritud ateroskleroosiga patsientidele, kui<br>varasem ravi maksimaalselt talutavas annuses statiini ja<br>esetimiibiga on osutunud ebapiisavaks või on need<br>ravimid olnud vastunäidustatud ning patsiendi LDL-C<br>väärtus on >=2,6 mmol/L   |
| 1680421         | faktor VIII<br>inhibiitorist<br>möödamineva<br>aktiivsusega<br>hüübimisfaktorid,<br>50ühik 1ml | B02BD0<br>3 | FEIBA 50 Ü/ML,<br>infusioonilahuse pulber<br>ja lahusti, 20ml 1TK | Baxalta<br>Innovations GmbH                                | 100              | D66-D66,<br>D68.4-D68.4   | Pediaater,<br>Pediaater –<br>hematoloog-<br>onkoloog,<br>Hematoloog |        |              |               |   |
| 1349300         | febuksostaat,<br>120mg   | M04AA0<br>3 | ADENURIC, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK            | Menarini<br>International<br>Operations<br>Luxembourg S.A. | 75               | M10-M10   |   |        |              |               | juhul, kui allopurinool on vastunäidustatud või talumatu<br>(põhjustab ravi katkestama sundivaid või annuse tõstmist<br>takistavaid kõrvaltoimeid)  |
|                 |  |             |   |  | 50               |   |   |        |              |               |   |
| 1716207         | febuksostaat,<br>120mg   | M04AA0<br>3 | FEBUXOSTAT TEVA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK  | Teva B.V.  | 75               | M10-M10   |   |        |              |               | juhul, kui allopurinool on vastunäidustatud või talumatu<br>(põhjustab ravi katkestama sundivaid või annuse tõstmist<br>takistavaid kõrvaltoimeid)  |
|                 |  |             |   |  | 50               |   |   |        |              |               |   |
| 1721753         | febuksostaat,<br>120mg   | M04AA0<br>3 | DRUNILER, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK            | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.                          | 75               | M10-M10   |   |        |              |               | juhul, kui allopurinool on vastunäidustatud või talumatu<br>(põhjustab ravi katkestama sundivaid või annuse tõstmist<br>takistavaid kõrvaltoimeid)  |
|                 |  |             |   |  | 50               |   |   |        |              |               |   |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla  | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|--|------------------|----------|--------|--------|--------------|--|--|
| 1748325         | febeksostaat,<br>120mg              | M04AA0<br>3 | FEBUXOSTAT<br>VIATRIS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Viatris Limited  | 50               |          |        |        |              |  |  |
|                 |                                     |             |   |  | 75               | M10-M10  |        |        |              | juhul, kui allopurinool on vastunäidustatud või talumatu<br>(põhjustab ravi katkestama sündivaid või annuse tõstmist<br>takistavaid kõrvaltoimeid) |  |
| 1750755         | febeksostaat,<br>120mg              | M04AA0<br>3 | FEBUXOSTAT<br>ZENTIVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Zentiva k.s.   | 50               |          |        |        |              |  |  |
|                 |                                     |             |   |  | 75               | M10-M10  |        |        |              | juhul, kui allopurinool on vastunäidustatud või talumatu<br>(põhjustab ravi katkestama sündivaid või annuse tõstmist<br>takistavaid kõrvaltoimeid) |  |
| 1791581         | febeksostaat,<br>120mg              | M04AA0<br>3 | FEBUXOSTAT KRKA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK    | KRKA, d.d., Novo<br>mesto                                  | 50               |          |        |        |              |  |  |
|                 |                                     |             |   |  | 75               | M10-M10  |        |        |              | juhul, kui allopurinool on vastunäidustatud või talumatu<br>(põhjustab ravi katkestama sündivaid või annuse tõstmist<br>takistavaid kõrvaltoimeid) |  |
| 1349287         | febeksostaat,<br>80mg               | M04AA0<br>3 | ADENURIC, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK              | Menarini<br>International<br>Operations<br>Luxembourg S.A. | 75               | M10-M10  |        |        |              |  | juhul, kui allopurinool on vastunäidustatud või talumatu<br>(põhjustab ravi katkestama sündivaid või annuse tõstmist<br>takistavaid kõrvaltoimeid) |
|                 |                                     |             |   |  | 50               |          |        |        |              |  |  |
| 1716140         | febeksostaat,<br>80mg               | M04AA0<br>3 | FEBUXOSTAT TEVA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK    | Teva B.V.  | 75               | M10-M10  |        |        |              |  | juhul, kui allopurinool on vastunäidustatud või talumatu<br>(põhjustab ravi katkestama sündivaid või annuse tõstmist<br>takistavaid kõrvaltoimeid) |
|                 |                                     |             |   |  | 50               |          |        |        |              |  |  |
| 1721696         | febeksostaat,<br>80mg               | M04AA0<br>3 | DRUNILER, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK              | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.                          | 75               | M10-M10  |        |        |              |  | juhul, kui allopurinool on vastunäidustatud või talumatu<br>(põhjustab ravi katkestama sündivaid või annuse tõstmist<br>takistavaid kõrvaltoimeid) |
|                 |                                     |             |   |  | 50               |          |        |        |              |  |  |
| 1748291         | febeksostaat,<br>80mg               | M04AA0<br>3 | FEBUXOSTAT<br>VIATRIS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Viatris Limited  | 50               |          |        |        |              |  |  |
|                 |                                     |             |   |  | 75               | M10-M10  |        |        |              | juhul, kui allopurinool on vastunäidustatud või talumatu<br>(põhjustab ravi katkestama sündivaid või annuse tõstmist<br>takistavaid kõrvaltoimeid) |  |
| 1750698         | febeksostaat,<br>80mg               | M04AA0<br>3 | FEBUXOSTAT<br>ZENTIVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Zentiva k.s.   | 75               | M10-M10  |        |        |              |  | juhul, kui allopurinool on vastunäidustatud või talumatu<br>(põhjustab ravi katkestama sündivaid või annuse tõstmist<br>takistavaid kõrvaltoimeid) |
|                 |                                     |             |   |  | 50               |          |        |        |              |  |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus            | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja                        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala     | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|--|-------------|---|--|------------------|-------------------------------|------------|--------|--------------|---------------|---|
| 1791547         | febuksostaat,<br>80mg                          | M04AA0<br>3 | FEBUXOSTAT KRKA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK            | KRKA, d.d., Novo<br>mesto              | 75               | M10-M10                       |            |        |              |               | juhul, kui allopurinool on vastunäidustatud või talumatu<br>(põhjustab ravi katkestama sundivaid või annuse tõstmist<br>takistavaid kõrvaltoimeid)  |
|                 |  |             |   |  | 50               |                               |            |        |              |               |   |
| 1840799         | fedratiniib, 100mg                             | L01EJ02     | INREBIC, kõvakapsel,<br>120TK   | Bristol-Myers<br>Squibb Pharma<br>EEIG | 100              | D47.1-D47.1                   | Hematoloog |        |              |               | konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi) otsuse alusel<br>müelofibroosi raviks keskmise-2 või kõrge riskiga<br>(IPSS $\geq$ 2) patsientidele, kellel eelnev ravi ruksolitiniibiga<br>on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks |
| 1012330         | felodipiin, 10mg                               | C08CA0<br>2 | PRESID, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK             | Teva B.V.                              | 75               | I10-I13, I15-I15              |            |        |              |               |   |
|                 |  |             |   |  | 50               |                               |            |        |              |               |   |
| 1174474         | felodipiin, 10mg                               | C08CA0<br>2 | FELODIPIN HEXAL,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | Hexal AG                               | 75               | I10-I13, I15-I15              |            |        |              |               |   |
|                 |  |             |   |  | 50               |                               |            |        |              |               |   |
| 1012318         | felodipiin, 2,5mg                              | C08CA0<br>2 | PRESID, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK             | Teva B.V.                              | 75               | I10-I13, I15-I15              |            |        |              |               |   |
|                 |  |             |   |  | 50               |                               |            |        |              |               |   |
| 1012329         | felodipiin, 5mg                                | C08CA0<br>2 | PRESID, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK             | Teva B.V.                              | 50               |                               |            |        |              |               |   |
|                 |  |             |   |  | 75               | I10-I13, I15-I15              |            |        |              |               |   |
| 1174373         | felodipiin, 5mg                                | C08CA0<br>2 | FELODIPIN HEXAL,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | Hexal AG                               | 50               |                               |            |        |              |               |   |
|                 |  |             |   |  | 75               | I10-I13, I15-I15              |            |        |              |               |   |
| 1029495         | fenobarbitaal,<br>100mg                        | N03AA0<br>2 | PHENAEMAL, tablett,<br>50TK   | Desitin<br>Arzneimittel GmbH           | 100              | G40-G40                       | Neuroloog  | esmane |              |               |   |
|                 |  |             |   |  | 50               |                               |            |        |              |               |   |
| 1026593         | fenofibraat, 200mg                             | C10AB0<br>5 | LIPANTHYL,<br>kõvakapsel, 30TK  | Viatris SIA                            | 50               |                               |            |        |              |               |   |
| 1020340         | fenoksümetüülpeni<br>tsilliin, 1000000RÜ       | J01CE0<br>2 | OSPEN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>12TK                         | Sandoz GmbH                            | 75               | J13-J18, J03-<br>J03, H65-H67 |            |        |              | 16,00         |   |
|                 |  |             |   |  | 50               |                               |            |        |              |               |   |
| 1105951         | fenoksümetüülpeni<br>tsilliin, 400000RÜ<br>5ml | J01CE0<br>2 | OSPEN, suukaudne<br>suspensioon, 60ml 1TK                                   | Sandoz GmbH                            | 50               |                               |            |        |              |               |   |
|                 |  |             |   |  | 75               | J13-J18, J03-<br>J03, H65-H67 |            |        |              | 16,00         |   |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus                      | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloa hoidja                         | Soodus-tus % | Diagnoos         | Eriala  | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-------------|--|----------|--|---|--------------|------------------|---|--------|-----------|------------|--|
| 1044223     | fenoterool, 100mcg 1annus                          | R03AC04  | BEROTEC N, inhalatsiooniaerosool, lahus, 200annus 1TK  | Boehringer Ingelheim International GmbH | 75           | J44-J44, J43-J43 | Pulmonoloog   | esmane |           |            |  |
|             |  |          |  |   | 50           |                  |   |        |           |            |  |
|             |  |          |  |   | 75           | J45-J45          |   |        |           |            |  |
| 1009651     | fenoterool+ipratroopiumbromiid, 50mcg+20mcg 1annus | R03AL01  | BERODUAL N, inhalatsiooniaerosool, lahus, 200annus 1TK | Boehringer Ingelheim International GmbH | 75           | J43-J44          | Pulmonoloog   | esmane |           |            |  |
|             |  |          |  |   | 50           |                  |   |        |           |            |  |
|             |  |          |  |   | 75           | J45-J45          |   |        |           |            |  |
| 1346958     | fentanüül, 100mcg                                  | N02AB03  | EFFENTORA, bukaaltablett, 28TK                         | Teva B.V.                               | 50           |                  | Neuroloog, Onkoloog, Reumatoloog, Anestesioloog, Hematoloog | esmane |           |            | ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil(vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvianalgeetilist annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu |
|             |  |          |  |   | 100          | C00-D48          |   |        |           |            |  |
| 1400948     | fentanüül, 100mcg                                  | N02AB03  | LUNALDIN, keelealune tablett, 10TK                     | Gedeon Richter Plc.                     | 100          | C00-D48          | Hematoloog, Onkoloog, Reumatoloog, Neuroloog, Anestesioloog | esmane |           |            | ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil(vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvianalgeetilist annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu |
|             |  |          |  |   | 50           |                  |   |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                        | Müügiloa hoidja         | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla   | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|-------------------------|------------------|-------------|---|--------|--------------|---|--|
| 1223165         | fentanüül, 100mcg<br>1h             | N02AB0<br>3 | MATRIFEN,<br>transdermaalne<br>plaaster, 5TK | Istituto Gentili S.r.l. | 100              | R52.1-R52.1 | Neuroloog,<br>Reumatoloog,<br>Anestesioloog                             | esmane |              |   | esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist   |
|                 |                                     |             |  |                         | 50               |             |   |        |              |   |  |
|                 |                                     |             |  |                         | 100              | C00-D48     |   |        |              | patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist |  |
| 1223121         | fentanüül, 12mcg<br>1h              | N02AB0<br>3 | MATRIFEN,<br>transdermaalne<br>plaaster, 5TK | Istituto Gentili S.r.l. | 50               |             |   |        |              |   |  |
|                 |                                     |             |  |                         | 100              | C00-D48     |   |        |              | patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist |  |
|                 |                                     |             |  |                         | 100              | R52.1-R52.1 | Neuroloog,<br>Reumatoloog,<br>Anestesioloog                             | esmane |              |   | esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist   |
| 1346970         | fentanüül, 200mcg                   | N02AB0<br>3 | EFFENTORA,<br>bukaaltablett, 28TK            | Teva B.V.               | 100              | C00-D48     | Reumatoloog,<br>Onkoloog,<br>Anestesioloog,<br>Neuroloog,<br>Hematoloog | esmane |              |   | ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil(vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalsel fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvianalgeetilist annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu |
|                 |                                     |             |  |                         | 50               |             |   |        |              |   |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                  | Müügiloa hoidja         | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla   | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|-------------------------|------------------|-------------|---|--------|--------------|---|--|
| 1400959         | fentanüül, 200mcg                   | N02AB03     | LUNALDIN, keelealune tablett, 10TK     | Gedeon Richter Plc.     | 50               |             |   |        |              |   |  |
|                 |                                     |             |  |                         | 100              | C00-D48     | Anestesioloog, Hematoloog, Neuroloog, Reumatoloog, Onkoloog | esmane |              |   | ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil(vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvianalgeetilist annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu |
| 1223132         | fentanüül, 25mcg<br>1h              | N02AB03     | MATRIFEN, transdermaalne plaaster, 5TK | Istituto Gentili S.r.l. | 50               |             |   |        |              |   |  |
|                 |                                     |             |  |                         | 100              | R52.1-R52.1 | Anestesioloog, Reumatoloog, Neuroloog                       | esmane |              |   | esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist   |
|                 |                                     |             |  |                         | 100              | C00-D48     |   |        |              | patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist |  |
| 1400960         | fentanüül, 300mcg                   | N02AB03     | LUNALDIN, keelealune tablett, 10TK     | Gedeon Richter Plc.     | 50               |             |   |        |              |   |  |
|                 |                                     |             |  |                         | 100              | C00-D48     | Anestesioloog, Hematoloog, Onkoloog, Reumatoloog, Neuroloog | esmane |              |   | ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil(vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvianalgeetilist annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                        | Müügiloa hoidja         | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla  | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|-------------------------|------------------|-------------|---|--------|--------------|--|--|
| 1346992         | fentanüül, 400mcg                   | N02AB03     | EFFENTORA,<br>bukaaltablett, 28TK            | Teva B.V.               | 100              | C00-D48     | Reumatoloog,<br>Anestesioloog,<br>Neuroloog,<br>Onkoloog,<br>Hematoloog | esmane |              |  | ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvaja tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil(vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalsel fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvivalentsust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu |
|                 |                                     |             |  |                         | 50               |             |   |        |              |  |  |
| 1400971         | fentanüül, 400mcg                   | N02AB03     | LUNALDIN, keelealune tablett, 10TK           | Gedeon Richter Plc.     | 100              | C00-D48     | Neuroloog,<br>Hematoloog,<br>Reumatoloog,<br>Anestesioloog,<br>Onkoloog | esmane |              |  | ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvaja tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil(vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalsel fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvivalentsust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu |
|                 |                                     |             |  |                         | 50               |             |   |        |              |  |  |
| 1223143         | fentanüül, 50mcg<br>1h              | N02AB03     | MATRIFEN,<br>transdermaalne<br>plaaster, 5TK | Istituto Gentili S.r.l. | 100              | C00-D48     |   |        |              |  | patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist  |
|                 |                                     |             |  |                         | 50               |             |   |        |              |  |  |
|                 |                                     |             |  |                         | 100              | R52.1-R52.1 | Reumatoloog,<br>Anestesioloog,<br>Neuroloog                             | esmane |              | esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                        | Müügiloa hoidja         | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|-------------------------|------------------|-------------|---|--------|--------------|---------------|--|
| 1347038         | fentanüül, 600mcg                   | N02AB03     | EFFENTORA,<br>bukaaltablett, 28TK            | Teva B.V.               | 100              | C00-D48     | Reumatoloog,<br>Onkoloog,<br>Anestesioloog,<br>Hematoloog,<br>Neuroloog | esmane |              |               | ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil(vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalsel fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvivalentsust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu |
|                 |                                     |             |  |                         | 50               |             |   |        |              |               |  |
| 1400982         | fentanüül, 600mcg                   | N02AB03     | LUNALDIN, keelealune tablett, 10TK           | Gedeon Richter Plc.     | 100              | C00-D48     | Reumatoloog,<br>Neuroloog,<br>Onkoloog,<br>Hematoloog,<br>Anestesioloog | esmane |              |               | ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil(vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalsel fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvivalentsust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu |
|                 |                                     |             |  |                         | 50               |             |   |        |              |               |  |
| 1223154         | fentanüül, 75mcg<br>1h              | N02AB03     | MATRIFEN,<br>transdermaalne<br>plaaster, 5TK | Istituto Gentili S.r.l. | 100              | C00-D48     |   |        |              |               | patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist  |
|                 |                                     |             |  |                         | 100              | R52.1-R52.1 | Neuroloog,<br>Anestesioloog,<br>Reumatoloog                             | esmane |              |               | esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist   |
|                 |                                     |             |  |                         | 50               |             |   |        |              |               |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                 | Müügiloa hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------|----------|---|--------|--------------|---------------|--|
| 1347016         | fentanüül, 800mcg                   | N02AB0<br>3 | EFFENTORA,<br>bukaaltablett, 28TK     | Teva B.V.                    | 50               |          |   |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |                                       |                              | 100              | C00-D48  | Anestesioloog,<br>Reumatoloog,<br>Onkoloog,<br>Hematoloog,<br>Neuroloog | esmane |              |               | ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil(vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvianalgeetilist annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu |
| 1400993         | fentanüül, 800mcg                   | N02AB0<br>3 | LUNALDIN, keelealune<br>tablett, 10TK | Gedeon Richter<br>Plc.       | 100              | C00-D48  | Onkoloog,<br>Neuroloog,<br>Reumatoloog,<br>Anestesioloog,<br>Hematoloog | esmane |              |               | ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil(vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvianalgeetilist annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu |
|                 |                                     |             |                                       |                              | 50               |          |   |        |              |               |  |
| 1077050         | fenütoiin, 100mg                    | N03AB0<br>2 | PHENHYDAN, tablett,<br>100TK          | Desitin<br>Arzneimittel GmbH | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |              |               |  |
|                 |                                     |             |                                       |                              | 50               |          |   |        |              |               |  |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                      | Müügiloa hoidja        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla   | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|------------------------|------------------|----------|---|--------|--------------|---|---|
| 1828649         | filgotiniib, 100mg                  | L04AF04     | JYSELECA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK           | Galapagos              | 100              | K51-K51  | Gastroenteroloog, Pediaater – gastroenteroloog, Pediaater |        |              |   | ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt kahe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud |
|                 |                                     |             |  |                        | 100              | M05-M06  | Reumatoloog, Pediaater                                    |        |              | ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt kahe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud |   |
| 1828661         | filgotiniib, 200mg                  | L04AF04     | JYSELECA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK           | Galapagos              | 100              | M05-M06  | Reumatoloog, Pediaater                                    |        |              |   | ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt kahe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud |
|                 |                                     |             |  |                        | 100              | K51-K51  | Pediaater – gastroenteroloog, Gastroenteroloog, Pediaater |        |              | ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt kahe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud |   |
| 1300587         | finasteriid, 5mg                    | G04CB01     | FINASTERIDE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Accord Healthcare B.V. | 50               |          |   |        |              |   |   |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                    | Müügiloa hoidja             | Soodus-tus % | Diagnoos  | Eriala    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla   | Märkused   |
|-------------|-------------------------------|----------|--|-----------------------------|--------------|---|-----------|--------|-----------|--|--|
| 1338724     | finasteriid, 5mg              | G04CB01  | FINASTERIDE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Teva Pharma B.V.            | 50           |   |           |        |           |  |  |
| 1876181     | finerenoon, 10mg              | C03DA05  | KERENDIA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK         | Bayer AG                    | 75           | N18-N18   |           |        |           |  | 2. tüüpi diabeediga patsientidele, kellel säilib albuminuuria, hoolimata maksimaalsest talutavast AKEi või ARB-i annusest ja SGLT-2 inhibiitori kasutamisest, juhul kui need ravimid ei ole vastunäidustatud             |
| 1876248     | finerenoon, 20mg              | C03DA05  | KERENDIA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK         | Bayer AG                    | 75           | N18-N18   |           |        |           |  | 2. tüüpi diabeediga patsientidele, kellel säilib albuminuuria, hoolimata maksimaalsest talutavast AKEi või ARB-i annusest ja SGLT-2 inhibiitori kasutamisest, juhul kui need ravimid ei ole vastunäidustatud             |
| 1523731     | fangolimood, 0,5mg            | L04AE01  | GILENYA, kõvakapsel, 28TK                                | Novartis Europharm Limited  | 100          | G35-G35   | Neuroloog | esmane |           |  | konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel väga aktiivse, ägenemiste ja remissioonidega kulgeva hulgiskleroosi raviks  |
| 1800199     | fangolimood, 0,5mg            | L04AE01  | FINGOLIMOD ZENTIVA, kõvakapsel, 28TK                     | Zentiva k.s.                | 100          | G35-G35   | Neuroloog | esmane |           |  | konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel väga aktiivse, ägenemiste ja remissioonidega kulgeva hulgiskleroosi raviks  |
| 1144842     | flukonasool, 150mg            | J02AC01  | FLUNOC, kõvakapsel, 2TK                                  | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 50           |   |           |        |           |  |  |
|             |                               |          |  |                             | 100          | B45-B45, B48.2-B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44-B44 |           |        |           | kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks |  |
| 1395165     | flukonasool, 150mg            | J02AC01  | FLUCONAZOLE ELVIM, kõvakapsel, 1TK                       | SIA Elvim                   | 100          | B45-B45, B48.2-B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44-B44 |           |        |           |  | kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks |
|             |                               |          |  |                             | 50           |   |           |        |           |  |  |
| 1395176     | flukonasool, 150mg            | J02AC01  | FLUCONAZOLE ELVIM, kõvakapsel, 2TK                       | SIA Elvim                   | 100          | B45-B45, B48.2-B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44-B44 |           |        |           |  | kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks |
|             |                               |          |  |                             | 50           |   |           |        |           |  |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                         | Müügiloa hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla  | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|-----------------------|------------------|---|--------|--------|--------------|--|--|
| 1395187         | flukonasool,<br>150mg               | J02AC0<br>1 | FLUCONAZOLE ELVIM,<br>kõvakapsel, 4TK         | SIA Elvim             | 50               |   |        |        |              |  |  |
|                 |                                     |             |   |                       | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8,<br>B44-B44 |        |        |              | kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega<br>(pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse<br>seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse<br>sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja<br>profülaktikaks |  |
| 1490688         | flukonasool,<br>150mg               | J02AC0<br>1 | FLUCONAZOLE<br>ACTAVIS, kõvakapsel,<br>1TK    | Teva B.V.             | 50               |   |        |        |              |  |  |
|                 |                                     |             |   |                       | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8,<br>B44-B44 |        |        |              | kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega<br>(pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse<br>seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse<br>sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja<br>profülaktikaks |  |
| 1490699         | flukonasool,<br>150mg               | J02AC0<br>1 | FLUCONAZOLE<br>ACTAVIS, kõvakapsel,<br>2TK    | Teva B.V.             | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8,<br>B44-B44 |        |        |              |  | kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega<br>(pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse<br>seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse<br>sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja<br>profülaktikaks |
|                 |                                     |             |   |                       | 50               |   |        |        |              |  |  |
| 1531279         | flukonasool,<br>150mg               | J02AC0<br>1 | FLUCONAZOLE<br>MEDOCHEMIE,<br>kõvakapsel, 2TK | Medochemie<br>Limited | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8,<br>B44-B44 |        |        |              |  | kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega<br>(pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse<br>seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse<br>sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja<br>profülaktikaks |
|                 |                                     |             |   |                       | 50               |   |        |        |              |  |  |
| 1821237         | flukonasool,<br>150mg               | J02AC0<br>1 | FLUCONAZOLE<br>VITABALANS, tablett,<br>2TK    | Vitabalans Oy         | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8,<br>B44-B44 |        |        |              |  | kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega<br>(pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse<br>seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse<br>sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja<br>profülaktikaks |
|                 |                                     |             |   |                       | 50               |   |        |        |              |  |  |
| 1821248         | flukonasool,<br>150mg               | J02AC0<br>1 | FLUCONAZOLE<br>VITABALANS, tablett,<br>4TK    | Vitabalans Oy         | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8,<br>B44-B44 |        |        |              |  | kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega<br>(pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse<br>seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse<br>sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja<br>profülaktikaks |
|                 |                                     |             |   |                       | 50               |   |        |        |              |  |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus     | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |
|-----------------|---|-------------|--|-----------------------------------|------------------|--|-------------|--------|--------------|---------------|--|
| 1140691         | flukonasool, 50mg                       | J02AC0<br>1 | FLUCONAZOLE<br>MEDOCHEMIE,<br>kõvakapsel, 7TK                        | Medochemie<br>Limited             | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8,<br>B44-B44  |             |        |              |               | kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega<br>(pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse<br>seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse<br>sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja<br>profülaktikaks |
|                 |   |             |  |                                   | 50               |  |             |        |              |               |  |
| 1395660         | flukonasool, 50mg                       | J02AC0<br>1 | FLUCONAZOLE ELVIM,<br>kõvakapsel, 7TK                                | SIA Elvim                         | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8,<br>B44-B44  |             |        |              |               | kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega<br>(pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse<br>seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse<br>sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja<br>profülaktikaks |
|                 |   |             |  |                                   | 50               |  |             |        |              |               |  |
| 1167971         | fluokortoloon+lidokaiin, 1mg+20mg<br>1g | C05AA8<br>4 | DOLOPROCT<br>1MG/20MG/G<br>REKTAALKREEM,<br>rektaalkreem, 15g 1TK    | Karo Pharma AB                    | 50               |  |             |        |              |               |  |
| 1167948         | fluokortoloon+lidokaiin, 1mg+40mg       | C05AA8<br>4 | DOLOPROCT<br>1MG/40MG<br>REKTAALSUPOSIIDID,<br>rektaalsuposiit, 10TK | Karo Pharma AB                    | 50               |  |             |        |              |               |  |
| 1107122         | fluoksetiin, 20mg                       | N06AB0<br>3 | FLUX, kõvakapsel,<br>28TK  | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 100              | F32.2-F32.3,<br>F70-F79, F11.4-<br>F11.7, F18.4-<br>F18.7, F20-F29,<br>F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7,<br>F19.4-F19.7,<br>F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7,<br>F00-F09, F60.3-<br>F60.3, F13.4-<br>F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-<br>F17.7, F15.4-<br>F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane |              |               |  |
|                 |   |             |  |                                   | 50               |  |             |        |              |               |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|-----------------|------------------|--|-------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1456691         | fluoksetiin, 20mg                   | N06AB0<br>3 | FLUOXETINE<br>VITABALANS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Vitabalans Oy   | 50               |  |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                 | 100              | F32.2-F32.3,<br>F70-F79, F11.4-<br>F11.7, F18.4-<br>F18.7, F20-F29,<br>F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7,<br>F19.4-F19.7,<br>F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7,<br>F00-F09, F60.3-<br>F60.3, F13.4-<br>F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-<br>F17.7, F15.4-<br>F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
| 1456703         | fluoksetiin, 20mg                   | N06AB0<br>3 | FLUOXETINE<br>VITABALANS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Vitabalans Oy   | 50               |  |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                 | 100              | F32.2-F32.3,<br>F70-F79, F11.4-<br>F11.7, F18.4-<br>F18.7, F20-F29,<br>F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7,<br>F19.4-F19.7,<br>F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7,<br>F00-F09, F60.3-<br>F60.3, F13.4-<br>F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-<br>F17.7, F15.4-<br>F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                      | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|--------------------------------------|------------------|--|-------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1489765         | flupentiksool, 1mg                  | N05AF0<br>1 | FLUANXOL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>50TK              | H. Lundbeck A/S                      | 100              | F32.2-F32.3,<br>F70-F79, F11.4-<br>F11.7, F18.4-<br>F18.7, F20-F29,<br>F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7,<br>F19.4-F19.7,<br>F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7,<br>F00-F09, F60.3-<br>F60.3, F13.4-<br>F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-<br>F17.7, F15.4-<br>F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                                      | 50               |  |             |        |              |               |          |
| 1006175         | flupentiksool,<br>20mg 1ml          | N05AF0<br>1 | FLUANXOL DEPOT,<br>süstelahus, 1ml 1TK                              | H. Lundbeck A/S                      | 50               |  |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                                      | 100              | F32.2-F32.3,<br>F70-F79, F11.4-<br>F11.7, F18.4-<br>F18.7, F20-F29,<br>F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7,<br>F19.4-F19.7,<br>F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7,<br>F00-F09, F60.3-<br>F60.3, F13.4-<br>F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-<br>F17.7, F15.4-<br>F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
| 1007840         | flutikasoon,<br>100mcg 1annus       | R03BA0<br>5 | FLIXOTIDE DISKUS<br>100 MCG,<br>inhalatsioonipulber,<br>60annus 1TK | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited | 75               | J45-J45  |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                                      | 50               |  |             |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus          | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                      | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |  |
|-----------------|--|-------------|--|--------------------------------------|------------------|--|--------|--------|--------------|---------------|----------|--|
| 1007884         | flutikasoon,<br>250mcg 1annus                | R03BA0<br>5 | FLIXOTIDE DISKUS<br>250 MCG,<br>inhalatsioonipulber,<br>60annus 1TK                    | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited | 75               | J45-J45  |        |        |              |               |          |  |
|                 |  |             |  |                                      | 50               |  |        |        |              |               |          |  |
| 1006344         | flutikasoon,<br>500mcg 1g                    | D07AC1<br>7 | CUTIVATE CREAM,<br>kreem, 15g 1TK  | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited | 75               | L20-L20, L40-<br>L40, L23-L23  |        |        |              |               |          |  |
|                 |  |             |  |                                      | 50               |  |        |        |              |               |          |  |
| 1007233         | flutikasoon, 50mcg<br>1annus                 | R01AD0<br>8 | FLIXONASE AQUEOUS<br>NASAL SPRAY 50<br>MCG, ninasprei,<br>suspensioon, 120annus<br>1TK | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited | 50               |  |        |        |              |               |          |  |
| 1130690         | flutikasoon, 50mcg<br>1annus                 | R03BA0<br>5 | FLIXOTIDE INHALER,<br>inhalatsiooniaerosool,<br>suspensioon, 120annus<br>1TK           | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited | 75               | J45-J45  |        |        |              |               |          |  |
|                 |  |             |  |                                      | 50               |  |        |        |              |               |          |  |
| 1343034         | flutikasoonfuroaat,<br>27,5mcg 1annus        | R01AD1<br>2 | AVAMYS, ninasprei,<br>suspensioon, 120annus<br>1TK                                     | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited | 50               |  |        |        |              |               |          |  |
| 3013096         | flutikasoonfuroaat,<br>27,5mcg<br>1mõõtannus | R01AD1<br>2 | FLUTICASONE TEVA,<br>ninasprei, suspensioon,<br>120mõõtannus 1TK                       | Teva B.V.                            | 50               |  |        |        |              |               |          |  |
| 1287187         | fluvastatiin, 80mg                           | C10AA0<br>4 | FLUVASTATIN<br>ACTAVIS, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 28TK        | Teva B.V.                            | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |              |               |          |  |
|                 |  |             |  |                                      | 50               |  |        |        |              |               |          |  |
|                 |  |             |  |                                      | 100              | N18-N18  |        |        |              |               |          |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|-----------------------------------|------------------|--|-------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1678057         | fluvastatiin, 80mg                  | C10AA04     | LESCOL XL, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 28TK | First Pharma OÜ                   | 75               | I65-I66, E78-<br>E78, I21-I22,<br>E10-E11, I70.2-<br>I70.2, I63-I63,<br>I25-I25, Z95-<br>Z95, E13-E14,<br>Z45-Z45, E11-<br>I12 |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                   | 100              | N18-N18  |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                   | 50               |  |             |        |              |               |          |
| 1723216         | fluvastatiin, 80mg                  | C10AA04     | LESCOL XL, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 28TK | First Pharma OÜ                   | 50               |  |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                   | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12     |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                   | 100              | N18-N18  |             |        |              |               |          |
| 1881042         | fluvastatiin, 80mg                  | C10AA04     | LESCOL XL, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 28TK | Ideal Trade Links<br>UAB          | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12     |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                   | 100              | N18-N18  |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                   | 50               |  |             |        |              |               |          |
| 1039564         | fluvoksamiin,<br>100mg              | N06AB08     | FEVARIN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK              | Viartis SIA                       | 50               |  |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                   | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3  | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
| 1087152         | formoterool,<br>12mcg               | R03AC13     | FORADIL AEROLIZER,<br>inhalatsioonipulber<br>kõvakapslis, 60TK     | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 50               |  |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                   | 75               | J45-J45  |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                   | 75               | J43-J44  | Pulmonoloog | esmane |              |               |          |



| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus                  | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                | Müügiloa hoidja             | Soodus-tus % | Diagnoos | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-------------|--|----------|--|-----------------------------|--------------|----------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1178939     | formoterool, 12mcg 1annus                      | R03AC13  | FOMEDA EASYHALER, inhalatsioonipulber, 120annus 1TK  | Orion Corporation           | 75           | J43-J44  | Pulmonoloog | esmane |           |            |   |
|             |  |          |  |                             | 75           | J45-J45  |             |        |           |            |   |
|             |  |          |  |                             | 50           |          |             |        |           |            |   |
| 1669697     | formoterool+aklidium, 11,8mcg+340mcg 1mõõtanus | R03AL05  | BRIMICA GENUAIR, inhalatsioonipulber, 60mõõtanus 1TK | Covis Pharma Europe B.V.    | 50           |          |             |        |           |            |   |
|             |  |          |  |                             | 75           | J43-J44  | Pulmonoloog | esmane |           |            |   |
| 1314256     | formoterool+beklo metasoon, 6mcg+100mcg 1annus | R03AK08  | FOSTER, inhalatsiooniaerosool, lahus, 180annus 1TK   | CHIESI Pharmaceuticals GmbH | 50           |          |             |        |           |            |   |
|             |  |          |  |                             | 75           | J43-J44  | Pulmonoloog | esmane |           |            | C-D staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel eosinofiilide arv perifeerses veres on $\geq 100$ rakku/mikroliitris ning kellel on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasis ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga |
|             |  |          |  |                             | 75           | J45-J45  |             |        |           |            |   |
| 1796991     | formoterool+beklo metasoon, 6mcg+100mcg 1annus | R03AK08  | FOSTER NEXTHALER, inhalatsioonipulber, 180annus 1TK  | CHIESI Pharmaceuticals GmbH | 75           | J45-J45  |             |        |           |            |   |
|             |  |          |  |                             | 75           | J43-J44  | Pulmonoloog | esmane |           |            | C-D staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel eosinofiilide arv perifeerses veres on $\geq 100$ rakku/mikroliitris ning kellel on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasis ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga |
|             |  |          |  |                             | 50           |          |             |        |           |            |   |
| 1830350     | formoterool+beklo metasoon, 6mcg+100mcg 1annus | R03AK08  | AFORBE, inhalatsiooniaerosool, lahus, 120annus 1TK   | Viatrix Limited             | 50           |          |             |        |           |            |   |
|             |  |          |  |                             | 75           | J45-J45  |             |        |           |            |   |
|             |  |          |  |                             | 75           | J43-J44  | Pulmonoloog | esmane |           |            | C-D staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel eosinofiilide arv perifeerses veres on $\geq 100$ rakku/mikroliitris ning kellel on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasis ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                         | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|---|-------------|---|-----------------------------------|------------------|----------|-------------|--------|--------------|---------------|---|
| 1653410         | formoterool+beklo<br>metasoon,<br>6mcg+200mcg<br>1annus     | R03AK0<br>8 | FOSTER,<br>inhalatsiooniaerosool,<br>lahus, 180annus 1TK                    | CHIESI<br>Pharmaceuticals<br>GmbH | 75               | J43-J44  | Pulmonoloog | esmane |              |               | C-D staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel eosinofiilide arv perifeerses veres on $\geq 100$ rakku/mikroliitris ning kellel on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasis ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga |
|                 |   |             |   |                                   | 50               |          |             |        |              |               |   |
|                 |   |             |   |                                   | 75               | J45-J45  |             |        |              |               |   |
| 1068443         | formoterool+budes<br>oniid,<br>4,5mcg+160mcg<br>1annus      | R03AK0<br>7 | SYMBICORT<br>TURBUHALER,<br>inhalatsioonipulber,<br>120annus 1TK            | Astrazeneca AB                    | 75               | J43-J44  | Pulmonoloog | esmane |              |               | C-D staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel eosinofiilide arv perifeerses veres on $\geq 100$ rakku/mikroliitris ning kellel on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasis ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga |
|                 |   |             |   |                                   | 75               | J45-J45  |             |        |              |               |   |
|                 |   |             |   |                                   | 50               |          |             |        |              |               |   |
| 1611470         | formoterool+budes<br>oniid,<br>4,5mcg+160mcg<br>1annus      | R03AK0<br>7 | BUFOMIX<br>EASYHALER,<br>inhalatsioonipulber,<br>120annus 1TK               | Orion Corporation                 | 75               | J43-J44  | Pulmonoloog | esmane |              |               | C-D staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel eosinofiilide arv perifeerses veres on $\geq 100$ rakku/mikroliitris ning kellel on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasis ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga |
|                 |   |             |   |                                   | 75               | J45-J45  |             |        |              |               |   |
|                 |   |             |   |                                   | 50               |          |             |        |              |               |   |
| 1742789         | formoterool+budes<br>oniid,<br>4,5mcg+160mcg<br>1mõõttannus | R03AK0<br>7 | AIRBUFO FORSPIRO,<br>annustatud<br>inhalatsioonipulber,<br>60mõõttannus 2TK | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 75               | J45-J45  |             |        |              |               |   |
|                 |   |             |   |                                   | 75               | J43-J44  | Pulmonoloog | esmane |              |               | C-D staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel eosinofiilide arv perifeerses veres on $\geq 100$ rakku/mikroliitris ning kellel on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasis ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga |
|                 |   |             |   |                                   | 50               |          |             |        |              |               |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                            | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|--|-------------|---|-----------------------------------|------------------|----------|-------------|--------|--------------|---------------|---|
| 1156250         | formoterool+budes<br>oniid,<br>9mcg+320mcg<br>1annus           | R03AK0<br>7 | SYMBICORT<br>TURBUHALER,<br>inhalatsioonipulber,<br>60annus 1TK                       | Astrazeneca AB                    | 50               |          |             |        |              |               |   |
|                 |  |             |   |                                   | 75               | J43-J44  | Pulmonoloog | esmane |              |               | C-D staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel eosinofiilide arv perifeerses veres on $\geq 100$ rakku/mikroliitris ning kellel on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasis ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga |
|                 |  |             |   |                                   | 75               | J45-J45  |             |        |              |               |   |
| 1611481         | formoterool+budes<br>oniid,<br>9mcg+320mcg<br>1annus           | R03AK0<br>7 | BUFOMIX<br>EASYHALER,<br>inhalatsioonipulber,<br>60annus 1TK                          | Orion Corporation                 | 75               | J45-J45  |             |        |              |               |   |
|                 |  |             |   |                                   | 75               | J43-J44  | Pulmonoloog | esmane |              |               | C-D staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel eosinofiilide arv perifeerses veres on $\geq 100$ rakku/mikroliitris ning kellel on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasis ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga |
|                 |  |             |   |                                   | 50               |          |             |        |              |               |   |
| 1808603         | formoterool+budes<br>oniid,<br>9mcg+320mcg<br>1mõõttannus      | R03AK0<br>7 | AIRBUFO FORSPIRO,<br>annustatud<br>inhalatsioonipulber,<br>60mõõttannus 1TK           | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 75               | J43-J44  | Pulmonoloog | esmane |              |               | C-D staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel eosinofiilide arv perifeerses veres on $\geq 100$ rakku/mikroliitris ning kellel on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasis ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga |
|                 |  |             |   |                                   | 75               | J45-J45  |             |        |              |               |   |
|                 |  |             |   |                                   | 50               |          |             |        |              |               |   |
| 1786596         | formoterool+glüko<br>pürroonium,<br>5mcg+7,2mcg<br>1mõõttannus | R03AL0<br>7 | BEVESPI<br>AEROSPHERE,<br>inhalatsiooniaerosool,<br>suspensioon,<br>120mõõttannus 1TK | Astrazeneca AB                    | 50               |          |             |        |              |               |   |
|                 |  |             |   |                                   | 75               | J43-J44  | Pulmonoloog | esmane |              |               |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus  | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|--|-------------|---|----------------------------------|------------------|----------|-------------|--------|--------------|---------------|---|
| 1750227         | formoterool+glüko<br>pürroonium+beklo<br>metasoon,<br>5mcg+9mcg+87m<br>cg 1mõõtannus | R03AL0<br>9 | TRIMBOW,<br>inhalatsiooniaerosool,<br>lahus, 120mõõtannus<br>1TK                    | Chiesi<br>Farmaceutici<br>S.p.A. | 50               |          |             |        |              |               |   |
|                 |  |             |   |                                  | 75               | J43-J44  | Pulmonoloog | esmane |              |               | patsiendile, kelle eosinofiilide arv perifeerses veres on >=100 rakku ning IKS/LABA või LAMA/LABA kaksikravigil on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasis ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga; või kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsiendile, kes saab IKS+LAMA+LABA toimeaineid avatud kombinatsioonis (e. kolmikravigil erinevatest inhalaatoritest); või kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsiendile, kelle eosinofiilide arv perifeerses veres on >=300 rakku ning LABA või LAMA monoterapias on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasis ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga |
| 1834905         | formoterool+glüko<br>pürroonium+budes<br>oniid,<br>5mcg+7,2mcg+16<br>0mcg 1mõõtannus | R03AL1<br>1 | TRIXEO<br>AEROSPHERE,<br>inhalatsiooniaerosool,<br>suspensioon,<br>120mõõtannus 1TK | Astrazeneca AB                   | 75               | J43-J44  | Pulmonoloog | esmane |              |               | patsiendile, kelle eosinofiilide arv perifeerses veres on >=100 rakku ning IKS/LABA või LAMA/LABA kaksikravigil on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasis ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga; või kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsiendile, kes saab IKS+LAMA+LABA toimeaineid avatud kombinatsioonis (e. kolmikravigil erinevatest inhalaatoritest); või kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsiendile, kelle eosinofiilide arv perifeerses veres on >=300 rakku ning LABA või LAMA monoterapias on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasis ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga |
|                 |  |             |   |                                  | 50               |          |             |        |              |               |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus               | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                               | Müügiloa hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                     | Eriala    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|---|-------------|---|--|------------------|------------------------------|-----------|--------|--------------|---------------|---|
| 1027145         | fosinopriil, 10mg                                 | C09AA0<br>9 | MONOPRIL, tablett,<br>28TK                          | PharmaSwiss<br>Ceska republika<br>s.r.o.                   | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |           |        |              |               |   |
|                 |   |             |   |  | 50               |                              |           |        |              |               |   |
| 1193767         | fosinopriil, 10mg                                 | C09AA0<br>9 | FOSINOPRIL ACTAVIS,<br>tablett, 28TK                | Teva B.V.  | 50               |                              |           |        |              |               |   |
|                 |   |             |   |  | 75               |                              |           |        |              |               |   |
| 1027336         | fosinopriil, 20mg                                 | C09AA0<br>9 | MONOPRIL, tablett,<br>28TK                          | PharmaSwiss<br>Ceska republika<br>s.r.o.                   | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |           |        |              |               |   |
|                 |   |             |   |  | 50               |                              |           |        |              |               |   |
| 1193891         | fosinopriil, 20mg                                 | C09AA0<br>9 | FOSINOPRIL ACTAVIS,<br>tablett, 28TK                | Teva B.V.  | 50               |                              |           |        |              |               |   |
|                 |   |             |   |  | 75               |                              |           |        |              |               |   |
| 1107021         | fosinopriil+hüdrokl<br>orotiasiid,<br>20mg+12,5mg | C09BA8<br>7 | MONOZIDE, tablett,<br>28TK                          | PharmaSwiss<br>Ceska republika<br>s.r.o.                   | 50               |                              |           |        |              |               |   |
|                 |   |             |   |  | 75               |                              |           |        |              |               |   |
| 1250581         | fosinopriil+hüdrokl<br>orotiasiid,<br>20mg+12,5mg | C09BA8<br>7 | FOSINOPRIL HCT<br>ACTAVIS, tablett, 30TK            | Teva B.V.  | 50               |                              |           |        |              |               |   |
|                 |   |             |   |  | 75               |                              |           |        |              |               |   |
| 1791615         | fremanezumab,<br>225mg                            | N02CD0<br>3 | AJOVY, süstelahus pen-<br>süstlis, 1TK              | Teva GmbH  | 75               | G43-G43                      | Neuroloog | esmane |              |               | kroonilise migreeni profülaktiliseks raviks täiskasvanutel, kellel esinevad peavalud >=15 päeval kuus, millest vähemalt 8 päeval on tegemist migreeni kriteeriume täitvate hoogudega ja kellel on vähemalt 3 eelnevat Eesti või rahvusvahelistes ravijuhistes mainitud profülaktilist ravi dokumenteeritult ebaõnnestunud. Ravivastust hinnatakse 6 ravikuu möödumisel ning soodustusega väljakirjutamise õigus jätkub patsientidele, kellel raviarsti hinnangul on dokumenteeritult >=50% vähenemine peavalupäevade arvus kuus. Edaspidi tuleb ravi jätkamise vajadust hinnata regulaarselt 6-12 kuu järel, ravi jätkamise eelduseks on püsiv ravivastus. Ravi lõpetatakse, kui peavalupäevade arv on alla 4 päeva kuus vähemalt 6 järjestikuse kuu vältel |
| 1161548         | frovatriptaan,<br>2,5mg                           | N02CC0<br>7 | MIGARD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>2TK | Menarini<br>International<br>Operations<br>Luxembourg S.A. | 50               |                              |           |        |              |               |   |
|                 |   |             |   |  | 75               |                              |           |        |              |               |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                 | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla  | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|---------------------------------|------------------|-------------|-----------|--------|--------------|--|--|
| 1039362         | furosemiid, 60mg                    | C03CA0<br>1 | LASIX RETARD,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 30TK | Sanofi Winthrop<br>Industrie    | 75               | I50-I50     |           |        |              |  |  |
|                 |                                     |             |   |                                 | 100              | I27.0-I27.0 |           |        |              |  |  |
|                 |                                     |             |   |                                 | 50               |             |           |        |              |  |  |
| 1018606         | fusidiinhape, 10mg<br>1g            | S01AA1<br>3 | FUCITHALMIC,<br>silmatilgad,<br>suspensioon, 5g 1TK                         | Amdipharm<br>Limited            | 50               |             |           |        |              |  |  |
| 1007727         | fusidiinhape, 20mg<br>1g            | D06AX0<br>1 | FUCIDIN 20 mg/g salv,<br>salv, 15g 1TK                                      | LEO Pharma A/S                  | 50               |             |           |        |              |  |  |
| 1007750         | fusidiinhape, 20mg<br>1g            | D06AX0<br>1 | FUCIDIN 20 mg/g<br>kreem, kreem, 15g 1TK                                    | LEO Pharma A/S                  | 50               |             |           |        |              |  |  |
| 1032815         | gabapentiin,<br>300mg               | N02BF0<br>1 | NEURONTIN,<br>kõvakapsel, 50TK  | Upjohn EESV                     | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |              |  |  |
|                 |                                     |             |   |                                 | 50               |             |           |        |              |  |  |
|                 |                                     |             |   |                                 | 75               | G63.2-G63.2 |           |        |              | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on<br>vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid<br>kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise<br>järel andnud piisavat raviefekti |  |
| 1126055         | gabapentiin,<br>300mg               | N02BF0<br>1 | GABAGAMMA 300MG,<br>kõvakapsel, 50TK  | Woerwag Pharma<br>GmbH & Co. KG | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |              |  |  |
|                 |                                     |             |   |                                 | 50               |             |           |        |              |  |  |
|                 |                                     |             |   |                                 | 75               | G63.2-G63.2 |           |        |              | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on<br>vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid<br>kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise<br>järel andnud piisavat raviefekti |  |
| 1696417         | gabapentiin,<br>300mg               | N02BF0<br>1 | GABAPENTIN<br>ACCORD, kõvakapsel,<br>50TK                                   | Accord Healthcare<br>B.V.       | 75               | G63.2-G63.2 |           |        |              |  | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on<br>vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid<br>kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise<br>järel andnud piisavat raviefekti |
|                 |                                     |             |   |                                 | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |              |  |  |
|                 |                                     |             |   |                                 | 50               |             |           |        |              |  |  |
| 1826355         | gabapentiin,<br>300mg               | N02BF0<br>1 | NEURONTIN,<br>kõvakapsel, 90TK  | Lex Ano UAB                     | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |              |  |  |
|                 |                                     |             |   |                                 | 75               | G63.2-G63.2 |           |        |              | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on<br>vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid<br>kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise<br>järel andnud piisavat raviefekti |  |
|                 |                                     |             |   |                                 | 50               |             |           |        |              |  |  |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                   | Müügiloa hoidja              | Soodus-tus % | Diagnoos                 | Eriala    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused  |
|-------------|-------------------------------|----------|---|------------------------------|--------------|--------------------------|-----------|--------|-----------|---|---|
| 1845547     | gabapentiin, 300mg            | N02BF01  | NEURONTIN, kõvakapsel, 100TK                            | Ideal Trade Links UAB        | 100          | G40-G40                  | Neuroloog | esmane |           |   |   |
|             |                               |          |   |                              | 75           | G63.2-G63.2              |           |        |           | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |   |
|             |                               |          |   |                              | 50           |                          |           |        |           |   |   |
| 1893012     | gabapentiin, 300mg            | N02BF01  | NEURONTIN, kõvakapsel, 100TK                            | Ideal Trade Links UAB        | 75           | G63.2-G63.2              |           |        |           |   | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |
|             |                               |          |   |                              | 50           |                          |           |        |           |   |   |
|             |                               |          |   |                              | 100          | G40-G40                  | Neuroloog | esmane |           |   |   |
| 1897331     | gabapentiin, 300mg            | N02BF01  | NEURONTIN, kõvakapsel, 50TK                             | Lex Ano UAB                  | 50           |                          |           |        |           |   |   |
|             |                               |          |   |                              | 75           | G63.2-G63.2              |           |        |           | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |   |
|             |                               |          |   |                              | 100          | G40-G40                  | Neuroloog | esmane |           |   |   |
| 1125953     | gabapentiin, 400mg            | N02BF01  | GABAGAMMA 400MG, kõvakapsel, 50TK                       | Woerwag Pharma GmbH & Co. KG | 75           | G63.2-G63.2              |           |        |           |   | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |
|             |                               |          |   |                              | 50           |                          |           |        |           |   |   |
|             |                               |          |   |                              | 100          | G40-G40                  | Neuroloog | esmane |           |   |   |
| 1696529     | gabapentiin, 400mg            | N02BF01  | GABAPENTIN ACCORD, kõvakapsel, 50TK                     | Accord Healthcare B.V.       | 100          | G40-G40                  | Neuroloog | esmane |           |   |   |
|             |                               |          |   |                              | 50           |                          |           |        |           |   |   |
|             |                               |          |   |                              | 75           | G63.2-G63.2              |           |        |           | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |   |
| 1888173     | ganireliks, 0,25mg 0.5ml      | H01CC01  | GANIRELIX GEDEON RICHTER, süstelahus süstlis, 0.5ml 1TK | Gedeon Richter Plc.          | 100          | N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9 |           |        |           | 41,00   | kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks  |
|             |                               |          |   |                              | 50           |                          |           |        |           |   |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloa hoidja                       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|--|-------------|--|---------------------------------------|------------------|---|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1115716         | gestodeen+etünüü<br>löstradiool,<br>0,075mg+0,02mg | G03AA1<br>0 | LINDYNETTE 20,<br>kaetud tablett, 63TK                 | Gedeon Richter<br>Plc.                | 50               | Z30-Z30   |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |  |                                       | 75               |   |        |        |              |               |          |
| 1828548         | gestodeen+etünüü<br>löstradiool,<br>0,075mg+0,02mg | G03AA1<br>0 | LINDYNETTE 20,<br>kaetud tablett, 63TK                 | Ideal Trade Links<br>UAB              | 50               | Z30-Z30   |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |  |                                       | 75               |   |        |        |              |               |          |
| 1115693         | gestodeen+etünüü<br>löstradiool,<br>0,075mg+0,03mg | G03AA1<br>0 | LINDYNETTE 30,<br>kaetud tablett, 63TK                 | Gedeon Richter<br>Plc.                | 75               | Z30-Z30   |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |  |                                       | 50               |   |        |        |              |               |          |
| 1828559         | gestodeen+etünüü<br>löstradiool,<br>0,075mg+0,03mg | G03AA1<br>0 | LINDYNETTE 30,<br>kaetud tablett, 63TK                 | Ideal Trade Links<br>UAB              | 75               | Z30-Z30   |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |  |                                       | 50               |   |        |        |              |               |          |
| 1062953         | gestodeen+etünüü<br>löstradiool,<br>75mcg+20mcg    | G03AA1<br>0 | HARMONET, kaetud<br>tablett, 63TK                      | Pfizer Europe MA<br>EEIG              | 50               | Z30-Z30   |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |  |                                       | 75               |   |        |        |              |               |          |
| 1364105         | gestodeen+etünüü<br>löstradiool,<br>75mcg+20mcg    | G03AA1<br>0 | GESYTIL 75/20<br>MIKROGRAMMI, kaetud<br>tablett, 63TK  | Ratiopharm GmbH                       | 75               | Z30-Z30   |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |  |                                       | 50               |   |        |        |              |               |          |
| 3068782         | gestodeen+etünüü<br>löstradiool,<br>75mcg+20mcg    | G03AA1<br>0 | HARMONET, kaetud<br>tablett, 63TK                      | Ideal Trade Links<br>UAB              | 75               | Z30-Z30   |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |  |                                       | 50               |   |        |        |              |               |          |
| 1364138         | gestodeen+etünüü<br>löstradiool,<br>75mcg+30mcg    | G03AA1<br>0 | GESYTIL 75/30<br>MIKROGRAMMI, kaetud<br>tablett, 63TK  | Ratiopharm GmbH                       | 75               | Z30-Z30   |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |  |                                       | 50               |   |        |        |              |               |          |
| 1061334         | glargiin-insuliin,<br>100ühik 1ml                  | A10AE0<br>4 | LANTUS, süstelahus<br>kolbampullis, 3ml 5TK            | Sanofi-Aventis<br>Deutschland<br>GmbH | 100              | O24-O24, E13-<br>E14, E10-E11,<br>P70.2-P70.2,<br>E89.1-E89.1 |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |  |                                       | 50               |   |        |        |              |               |          |
| 1265790         | glargiin-insuliin,<br>100ühik 1ml                  | A10AE0<br>4 | LANTUS SOLOSTAR,<br>süstelahus pen-süstlis,<br>3ml 5TK | Sanofi-Aventis<br>Deutschland<br>GmbH | 100              | O24-O24, E13-<br>E14, E10-E11,<br>P70.2-P70.2,<br>E89.1-E89.1 |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |  |                                       | 50               |   |        |        |              |               |          |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                           | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                    | Müügiloa hoidja                        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala                             | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla  | Märkused  |
|-----------------|---|-------------|--|--|------------------|---|------------------------------------|--------|--------------|--|---|
| 1665053         | glargiin-insuliin,<br>100ühik 1ml                             | A10AE0<br>4 | ABASAGLAR<br>KWIKPEN, süstelahus<br>pen-süstlis, 3ml 5TK | Eli Lilly Nederland<br>B.V.            | 50               |   |                                    |        |              |  |   |
|                 |   |             |  |  | 100              | O24-O24, E13-<br>E14, E10-E11,<br>P70.2-P70.2,<br>E89.1-E89.1 |                                    |        |              |  |   |
| 1684043         | glargiin-insuliin,<br>300ühik 1ml                             | A10AE0<br>4 | TOUJEO, süstelahus<br>pen-süstlis, 1.5ml 5TK             | Sanofi-Aventis<br>Deutschland<br>GmbH  | 50               |   |                                    |        |              |  |   |
|                 |   |             |  |  | 100              | O24-O24, E13-<br>E14, E10-E11,<br>P70.2-P70.2,<br>E89.1-E89.1 |                                    |        |              |  |   |
| 1737042         | glargiin-<br>insuliin+liksisenatii<br>d, 100ühik+33mcg<br>1ml | A10AE5<br>4 | SULIQUA, süstelahus<br>pen-süstlis, 3ml 5TK              | Sanofi Winthrop<br>Industrie           | 50               | E14-E14, E11-<br>E11  |                                    |        |              |  | II tüüpi diabeedi raviks kombinatsioonis metformiiniga<br>juhul, kui ravi suukaudsete diabeediravimitega ei ole<br>efektiivne või on vastunäidustatud |
|                 |   |             |  |  | 75               | E14-E14, E11-<br>E11  |                                    |        |              | II tüüpi diabeedi raviks kombinatsioonis metformiiniga<br>rasvumusega patsientidele (KMI>=35kg/m2), kellel<br>suukaudsed diabeediravimid (metformiin, sulfonüüluurea<br>preparaat, PPAR agonist, DPP-4 inhibiitor)<br>maksimaalsetes talutavates annustes ei ole andnud<br>rahuldavat efekti või on vastunäidustatud |   |
| 1737020         | glargiin-<br>insuliin+liksisenatii<br>d, 100ühik+50mcg<br>1ml | A10AE5<br>4 | SULIQUA, süstelahus<br>pen-süstlis, 3ml 5TK              | Sanofi Winthrop<br>Industrie           | 50               | E14-E14, E11-<br>E11  |                                    |        |              |  | II tüüpi diabeedi raviks kombinatsioonis metformiiniga<br>juhul, kui ravi suukaudsete diabeediravimitega ei ole<br>efektiivne või on vastunäidustatud |
|                 |   |             |  |  | 75               | E14-E14, E11-<br>E11  |                                    |        |              | II tüüpi diabeedi raviks kombinatsioonis metformiiniga<br>rasvumusega patsientidele (KMI>=35kg/m2), kellel<br>suukaudsed diabeediravimid (metformiin, sulfonüüluurea<br>preparaat, PPAR agonist, DPP-4 inhibiitor)<br>maksimaalsetes talutavates annustes ei ole andnud<br>rahuldavat efekti või on vastunäidustatud |   |
| 1241244         | glatirameeratasetaa<br>t, 20mg 1ml                            | L03AX1<br>3 | COPAXONE, süstelahus<br>süstlis, 1ml 28TK                | Teva GmbH                              | 100              | G35-G35   | Neuroloog                          | esmane |              |  | konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel (ägenemiste<br>ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks                                       |
| 1618196         | glatirameeratasetaa<br>t, 40mg 1ml                            | L03AX1<br>3 | COPAXONE, süstelahus<br>süstlis, 1ml 12TK                | Teva GmbH                              | 100              | G35-G35   | Neuroloog                          | esmane |              |  | konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel (ägenemiste<br>ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks                                       |
| 1751037         | glekapreviir+pibre<br>ntasviir,<br>100mg+40mg                 | J05AP57     | MAVIRET, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>84TK    | AbbVie<br>Deutschland<br>GmbH & Co. KG | 100              | B18.2-B18.2   | Infektsionist,<br>Gastroenteroloog |        |              |  | kroonilise progresseeruva C-viirushepatiidi raviks  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus          | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja                        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala                             | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |
|-----------------|--|-------------|---|--|------------------|----------------------|------------------------------------|--------|--------------|---------------|--|
| 1860016         | glekapreviir+pibre<br>ntasviir,<br>50mg+20mg | J05AP57     | MAVIRET, kaetud<br>graanulid kotikeses,<br>28TK                                   | AbbVie<br>Deutschland<br>GmbH & Co. KG | 100              | B18.2-B18.2          | Gastroenteroloog,<br>Infektsionist |        |              |               | kroonilise progresseeruva C-viirushepatiidi raviks |
| 1261066         | gliklasiid, 30mg                             | A10BB0<br>9 | GLICLADA 30 MG,<br>toimeainet<br>modifitseeritud vabastav<br>tablett, 60TK        | KRKA d.d. Novo<br>mesto                | 50               |                      |                                    |        |              |               |  |
|                 |  |             |   |  | 75               | E14-E14, E11-<br>E11 |                                    |        |              |               |  |
| 1261101         | gliklasiid, 30mg                             | A10BB0<br>9 | GLICLADA 30 MG,<br>toimeainet<br>modifitseeritud vabastav<br>tablett, 120TK       | KRKA d.d. Novo<br>mesto                | 75               | E14-E14, E11-<br>E11 |                                    |        |              |               |  |
|                 |  |             |   |  | 50               |                      |                                    |        |              |               |  |
| 1603145         | gliklasiid, 30mg                             | A10BB0<br>9 | GLICLAZIDE KRKA,<br>toimeainet<br>modifitseeritud vabastav<br>tablett, 60TK       | KRKA d.d. Novo<br>mesto                | 75               | E14-E14, E11-<br>E11 |                                    |        |              |               |  |
|                 |  |             |   |  | 50               |                      |                                    |        |              |               |  |
| 1350054         | gliklasiid, 60mg                             | A10BB0<br>9 | DIAPREL MR 60MG,<br>toimeainet<br>modifitseeritud vabastav<br>tablett, 60TK       | Les Laboratoires<br>Servier            | 75               | E14-E14, E11-<br>E11 |                                    |        |              |               |  |
|                 |  |             |   |  | 50               |                      |                                    |        |              |               |  |
| 1551822         | gliklasiid, 60mg                             | A10BB0<br>9 | GLICLADA 60 MG,<br>toimeainet<br>modifitseeritud vabastav<br>tablett, 60TK        | KRKA d.d. Novo<br>mesto                | 50               |                      |                                    |        |              |               |  |
|                 |  |             |   |  | 75               | E14-E14, E11-<br>E11 |                                    |        |              |               |  |
| 1551855         | gliklasiid, 60mg                             | A10BB0<br>9 | GLICLADA 60 MG,<br>toimeainet<br>modifitseeritud vabastav<br>tablett, 120TK       | KRKA d.d. Novo<br>mesto                | 75               | E14-E14, E11-<br>E11 |                                    |        |              |               |  |
|                 |  |             |   |  | 50               |                      |                                    |        |              |               |  |
| 1551945         | gliklasiid, 60mg                             | A10BB0<br>9 | GLICLAZIDE KRKA 60<br>MG, toimeainet<br>modifitseeritud vabastav<br>tablett, 60TK | KRKA, d.d., Novo<br>mesto              | 75               | E14-E14, E11-<br>E11 |                                    |        |              |               |  |
|                 |  |             |   |  | 50               |                      |                                    |        |              |               |  |
| 1644601         | gliklasiid, 60mg                             | A10BB0<br>9 | GLICLAZIDE ACTAVIS,<br>toimeainet<br>modifitseeritud vabastav<br>tablett, 60TK    | Teva B.V.                              | 50               |                      |                                    |        |              |               |  |
|                 |  |             |   |  | 75               | E14-E14, E11-<br>E11 |                                    |        |              |               |  |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja           | Soodus-tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-------------|-------------------------------|----------|---|---------------------------|--------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1847246     | gliklasiid, 60mg              | A10BB09  | DIAPREL MR 60MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 60TK | Ideal Trade Links UAB     | 75           | E11-E11, E14-E14 |        |        |           |            |          |
|             |                               |          |   |                           | 50           |                  |        |        |           |            |          |
| 3059377     | gliklasiid, 60mg              | A10BB09  | DIAPREL MR 60MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 60TK | Ideal Trade Links UAB     | 50           |                  |        |        |           |            |          |
|             |                               |          |   |                           | 75           | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            |          |
| 1046405     | gliklasiid, 80mg              | A10BB09  | DIAPREL, tablett, 60TK  | Les Laboratoires Servier  | 75           | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            |          |
|             |                               |          |   |                           | 50           |                  |        |        |           |            |          |
| 1176948     | glimepiriid, 1mg              | A10BB12  | OLTAR 1MG, tablett, 30TK  | Berlin-Chemie AG          | 50           |                  |        |        |           |            |          |
|             |                               |          |   |                           | 75           | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            |          |
| 1334821     | glimepiriid, 1mg              | A10BB12  | GLIMEPIRIDE ACCORD, tablett, 30TK                                   | Accord Healthcare B.V.    | 50           |                  |        |        |           |            |          |
|             |                               |          |   |                           | 75           | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            |          |
| 1110328     | glimepiriid, 2mg              | A10BB12  | AMARYL, tablett, 30TK   | Sanofi Winthrop Industrie | 50           |                  |        |        |           |            |          |
|             |                               |          |   |                           | 75           | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            |          |
| 1177039     | glimepiriid, 2mg              | A10BB12  | OLTAR 2 MG, tablett, 30TK   | Berlin-Chemie AG          | 50           |                  |        |        |           |            |          |
|             |                               |          |   |                           | 75           | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            |          |
| 1334865     | glimepiriid, 2mg              | A10BB12  | GLIMEPIRIDE ACCORD, tablett, 30TK                                   | Accord Healthcare B.V.    | 75           | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            |          |
|             |                               |          |   |                           | 50           |                  |        |        |           |            |          |
| 1671195     | glimepiriid, 2mg              | A10BB12  | AMARYL, tablett, 30TK   | First Pharma OÜ           | 75           | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            |          |
|             |                               |          |   |                           | 50           |                  |        |        |           |            |          |
| 1846942     | glimepiriid, 2mg              | A10BB12  | AMARYL, tablett, 30TK   | Ideal Trade Links UAB     | 75           | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            |          |
|             |                               |          |   |                           | 50           |                  |        |        |           |            |          |
| 1110339     | glimepiriid, 3mg              | A10BB12  | AMARYL, tablett, 30TK   | Sanofi Winthrop Industrie | 75           | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            |          |
|             |                               |          |   |                           | 50           |                  |        |        |           |            |          |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus   | ATC kood    | Ravim, pakendi suurus                            | Müügiloa hoidja                 | Soodus-tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-------------|---------------------------------|-------------|--|---------------------------------|--------------|---|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1177129     | glimepiriid, 3mg                | A10BB1<br>2 | OLTAR 3 MG, tablett, 30TK                        | Berlin-Chemie AG                | 75           | E14-E14, E11-E11                                    |        |        |           |            |          |
|             |                                 |             |  |                                 | 50           |   |        |        |           |            |          |
| 1334900     | glimepiriid, 3mg                | A10BB1<br>2 | GLIMEPIRIDE ACCORD, tablett, 30TK                | Accord Healthcare B.V.          | 75           | E14-E14, E11-E11                                    |        |        |           |            |          |
|             |                                 |             |  |                                 | 50           |   |        |        |           |            |          |
| 1670992     | glimepiriid, 3mg                | A10BB1<br>2 | AMARYL, tablett, 30TK                            | First Pharma OÜ                 | 50           |   |        |        |           |            |          |
|             |                                 |             |  |                                 | 75           | E14-E14, E11-E11                                    |        |        |           |            |          |
| 1847055     | glimepiriid, 3mg                | A10BB1<br>2 | AMARYL, tablett, 30TK                            | Ideal Trade Links UAB           | 50           |   |        |        |           |            |          |
|             |                                 |             |  |                                 | 75           | E14-E14, E11-E11                                    |        |        |           |            |          |
| 3055407     | glimepiriid, 3mg                | A10BB1<br>2 | AMARYL, tablett, 30TK                            | Ideal Trade Links UAB           | 75           | E14-E14, E11-E11                                    |        |        |           |            |          |
|             |                                 |             |  |                                 | 50           |   |        |        |           |            |          |
| 1125391     | glimepiriid, 4mg                | A10BB1<br>2 | AMARYL, tablett, 30TK                            | Sanofi Winthrop Industrie       | 50           |   |        |        |           |            |          |
|             |                                 |             |  |                                 | 75           | E14-E14, E11-E11                                    |        |        |           |            |          |
| 1334944     | glimepiriid, 4mg                | A10BB1<br>2 | GLIMEPIRIDE ACCORD, tablett, 30TK                | Accord Healthcare B.V.          | 50           |   |        |        |           |            |          |
|             |                                 |             |  |                                 | 75           | E14-E14, E11-E11                                    |        |        |           |            |          |
| 3055542     | glimepiriid, 4mg                | A10BB1<br>2 | AMARYL, tablett, 30TK                            | Ideal Trade Links UAB           | 75           | E14-E14, E11-E11                                    |        |        |           |            |          |
|             |                                 |             |  |                                 | 50           |   |        |        |           |            |          |
| 1201396     | glulisiin-insuliin, 100ühik 1ml | A10AB0<br>6 | APIDRA, süstelahus kolbampullis, 3ml 5TK         | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 50           |   |        |        |           |            |          |
|             |                                 |             |  |                                 | 100          | O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1 |        |        |           |            |          |
| 1294398     | glulisiin-insuliin, 100ühik 1ml | A10AB0<br>6 | APIDRA SOLOSTAR, süstelahus pen-süstlis, 3ml 5TK | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 50           |   |        |        |           |            |          |
|             |                                 |             |  |                                 | 100          | O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1 |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                    | Eriala               | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla   | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|----------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------|--------|--------------|---|--|
| 1165878         | glükagoon, 1mg                      | H04AA01     | GLUCAGEN 1MG<br>HYPOKIT, süstelahuse<br>pulber ja lahusti, 1TK         | Novo Nordisk A/S                 | 50               |                             |                      |        |              |   |  |
| 1326653         | glükoosamiin,<br>1178mg             | M01AX05     | GLUCOSAMIN-<br>RATIOPHARM 1178<br>MG, suukaudse lahuse<br>pulber, 20TK | Ratiopharm GmbH                  | 50               |                             |                      |        |              |   |  |
| 1183687         | glükoosamiin,<br>400mg              | M01AX05     | GLUCOSAMINE<br>PHARMA NORD,<br>kõvakapsel, 90TK                        | Pharma Nord ApS                  | 50               |                             |                      |        |              |   |  |
| 1183698         | glükoosamiin,<br>400mg              | M01AX05     | GLUCOSAMINE<br>PHARMA NORD,<br>kõvakapsel, 270TK                       | Pharma Nord ApS                  | 50               |                             |                      |        |              |   |  |
| 1595954         | glükopürroonium,<br>44mcg           | R03BB06     | SEEBRI BREEZHALER,<br>inhalatsioonipulber<br>kõvakapslis, 30TK         | Novartis<br>Europharm<br>Limited | 50               |                             |                      |        |              |   |  |
|                 |                                     |             |  |                                  | 75               | J43-J44                     | Pulmonoloog          | esmane |              |   |  |
| 1648403         | gosereliin, 10,8mg                  | L02AE03     | RESELIGO, implantaat<br>süstlis, 1TK                                   | Zentiva k.s.                     | 100              | C61-C61                     | Onkoloog,<br>Uroloog |        |              |   | lokaalse või lokaalselt levinud kõrge riskiga (kliiniline<br>staadium >=T2c või Gleasoni skoor 8-10 või PSA >=20<br>ng/ml või regionaalsete lümfisõlmede haaratus või<br>positiivne reseksioonipiir) multimodaalse ravi osana kuni<br>2 aasta vältel ning metastaseerunud eesnäärmevähiga<br>patsientidele |
|                 |                                     |             |  |                                  | 75               | N80-N80                     |                      |        |              | III-IV astme endometriooosi põdevatele patsientidele  |  |
|                 |                                     |             |  |                                  | 100              | N97.0-N97.9,<br>Z31.0-Z31.9 |                      |        | 41,00        | kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise<br>tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks |  |
|                 |                                     |             |  |                                  | 50               |                             |                      |        |              |   |  |
|                 |                                     |             |  |                                  | 75               | D25-D25                     | Günekoloog           | esmane |              |   | mõõdukate kuni raskete sümptomitega patsientidele,<br>kellel esmavaliku ravimid (traneksaamhape,<br>hormonaalsed kontratseptiivid, emakasisesed<br>rasestumisvastased vahendid) on ebaefektiivsed või<br>talumatud.  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                | Müügiloa hoidja                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                    | Eriala               | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla  | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|-----------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------|--------|--------------|--|---|
| 1002621         | gosereliin, 3,6mg                   | L02AE0<br>3 | ZOLADEX, implantaat,<br>1TK                          | Astrazeneca AB                    | 100              | N97.0-N97.9,<br>Z31.0-Z31.9 |                      |        |              | 41,00  | kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise<br>tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks |
|                 |                                     |             |  |                                   | 75               | D25-D25                     | Günekoloog           | esmane |              | mõõdukate kuni raskete sümptomitega patsientidele,<br>kellel esmavaliku ravimid (traneksaamhape,<br>hormonaalsed kontratseptiivid, emakasisesed<br>rasestumisvastased vahendid) on ebaefektiivsed või<br>talumatud.  |   |
|                 |                                     |             |  |                                   | 100              | C61-C61                     | Onkoloog,<br>Uroloog |        |              | lokaalse või lokaalselt levinud kõrge riskiga (kliiniline<br>staadium $\geq$ T2c või Gleasoni skoor 8-10 või PSA $\geq$ 20<br>ng/ml või regionaalsete lümfisõlmede haaratus või<br>positiivne reseksioonipiir) multimodaalse ravi osana kuni<br>2 aasta vältel ning metastaseerunud eesnäärmevähiga<br>patsientidele |   |
|                 |                                     |             |  |                                   | 75               | N80-N80                     |                      |        |              | III-IV astme endometriooosi põdevatele patsientidele   |   |
| 1648425         | gosereliin, 3,6mg                   | L02AE0<br>3 | RESELIGO, implantaat<br>süstlis, 1TK                 | Zentiva k.s.                      | 50               |                             |                      |        |              |  |   |
|                 |                                     |             |  |                                   | 100              | C61-C61                     | Onkoloog,<br>Uroloog |        |              | lokaalse või lokaalselt levinud kõrge riskiga (kliiniline<br>staadium $\geq$ T2c või Gleasoni skoor 8-10 või PSA $\geq$ 20<br>ng/ml või regionaalsete lümfisõlmede haaratus või<br>positiivne reseksioonipiir) multimodaalse ravi osana kuni<br>2 aasta vältel ning metastaseerunud eesnäärmevähiga<br>patsientidele |   |
|                 |                                     |             |  |                                   | 75               | N80-N80                     |                      |        |              | III-IV astme endometriooosi põdevatele patsientidele   |   |
|                 |                                     |             |  |                                   | 100              | N97.0-N97.9,<br>Z31.0-Z31.9 |                      |        | 41,00        | kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise<br>tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks  |   |
|                 |                                     |             |  |                                   | 75               | D25-D25                     | Günekoloog           | esmane |              | mõõdukate kuni raskete sümptomitega patsientidele,<br>kellel esmavaliku ravimid (traneksaamhape,<br>hormonaalsed kontratseptiivid, emakasisesed<br>rasestumisvastased vahendid) on ebaefektiivsed või<br>talumatud.  |   |
| 1023950         | granisetroon, 1mg                   | A04AA0<br>2 | KYTRIL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK | Atnahs Pharma<br>Netherlands B.V. | 50               |                             |                      |        |              |  |   |
|                 |                                     |             |  |                                   | 100              | C00-D48                     |                      |        |              | suukaudsest keemiaravist põhjustatud iivelduse ja<br>oksendamise profülaktikaks ja raviks juhul, kui<br>metoklopramiid ei ole esmase valikuna soovitatud või on<br>osutunud ebaefektiivseks  |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                        | Müügiloa hoidja                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala                              | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla  | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|----------------------------------|------------------|---|-------------------------------------|--------|--------------|--|---|
| 1800470         | guselkumab,<br>100mg 1ml            | L04AC1<br>6 | TREMIFYA, süstelahus<br>pen-süstlis, 1ml 1TK | Janssen - Cilag<br>International | 100              | L40-L40   | Pediaater,<br>Dermatovenerol<br>oog |        |              |  | patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus L40 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud. |
|                 |                                     |             |  |                                  | 100              | M07.0-M07.3   | Reumatoloog,<br>Pediaater           |        |              | ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus M07.0–3 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud. |   |
| 1014680         | haloperidool,<br>1,5mg              | N05AD0<br>1 | HALOPERIDOL-<br>RICHTER, tablett, 50TK       | Gedeon Richter<br>Plc.           | 100              | F33.2-F33.3,<br>F18.4-F18.7,<br>F60.3-F60.3,<br>F11.4-F11.7,<br>F13.4-F13.7,<br>F14.4-F14.7,<br>F17.4-F17.7,<br>F16.4-F16.7,<br>F19.4-F19.7,<br>F70-F79, F00-<br>F09, F20-F29,<br>F32.2-F33.2,<br>F15.4-F15.7,<br>F30-F31, F12.4-<br>F12.7, F10.4-<br>F10.7 | Psühhiaater                         | esmane |              |  |   |
|                 |                                     |             |  |                                  | 50               |   |                                     |        |              |  |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|------------------------|------------------|---|-------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1014691         | haloperidool, 2mg<br>1ml            | N05AD0<br>1 | HALOPERIDOL-<br>RICHTER, suukaudsed<br>tilgad, lahus, 10ml 1TK | Gedeon Richter<br>Plc. | 50               |   |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                        | 100              | F33.2-F33.3,<br>F18.4-F18.7,<br>F60.3-F60.3,<br>F11.4-F11.7,<br>F13.4-F13.7,<br>F14.4-F14.7,<br>F17.4-F17.7,<br>F16.4-F16.7,<br>F19.4-F19.7,<br>F70-F79, F00-<br>F09, F20-F29,<br>F32.2-F33.2,<br>F15.4-F15.7,<br>F30-F31, F12.4-<br>F12.7, F10.4-<br>F10.7 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
| 1064674         | haloperidool,<br>50mg 1ml           | N05AD0<br>1 | HALOPERIDOL<br>DECANOATE-<br>RICHTER, süstelahus,<br>1ml 5TK   | Gedeon Richter<br>Plc. | 50               |   |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                        | 100              | F33.2-F33.3,<br>F18.4-F18.7,<br>F60.3-F60.3,<br>F11.4-F11.7,<br>F13.4-F13.7,<br>F14.4-F14.7,<br>F17.4-F17.7,<br>F16.4-F16.7,<br>F19.4-F19.7,<br>F70-F79, F00-<br>F09, F20-F29,<br>F32.2-F33.2,<br>F15.4-F15.7,<br>F30-F31, F12.4-<br>F12.7, F10.4-<br>F10.7 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                   | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloo hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |  |
|-----------------|---|-------------|---|------------------------------|------------------|---|-------------|--------|--------------|---------------|----------|--|
| 1014679         | haloperidool, 5mg                                     | N05AD0<br>1 | HALOPERIDOL-<br>RICHTER, tablett, 50TK                | Gedeon Richter<br>Plc.       | 100              | F33.2-F33.3,<br>F18.4-F18.7,<br>F60.3-F60.3,<br>F11.4-F11.7,<br>F13.4-F13.7,<br>F14.4-F14.7,<br>F17.4-F17.7,<br>F16.4-F16.7,<br>F19.4-F19.7,<br>F70-F79, F00-<br>F09, F20-F29,<br>F32.2-F33.2,<br>F15.4-F15.7,<br>F30-F31, F12.4-<br>F12.7, F10.4-<br>F10.7 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |  |
|                 |   |             |   |                              | 50               |   |             |        |              |               |          |  |
| 1054055         | hõbesulfadasiin,<br>10mg 1g                           | D06BA0<br>1 | SULFARGIN, salv, 50g<br>1TK                           | Grindeks AS                  | 50               |   |             |        |              |               |          |  |
| 1015478         | hüdroklorotiasiid,<br>25mg                            | C03AA0<br>3 | HYPOTHIAZID, tablett,<br>20TK                         | Sanofi Winthrop<br>Industrie | 75               | I15-I15, I10-I13,<br>O10-O16, I50-<br>I50   |             |        |              |               |          |  |
|                 |   |             |   |                              | 50               |   |             |        |              |               |          |  |
|                 |   |             |   |                              | 100              | I27.0-I27.0   |             |        |              |               |          |  |
| 1137013         | hüdrokortisoon,<br>10mg 1g                            | D07AA0<br>2 | HYDROCORTISONE<br>DAK, salv, 30g 1TK                  | Orifarm<br>Healthcare A/S    | 50               |   |             |        |              |               |          |  |
| 1018594         | hüdrokortisoon+fu<br>sidiinhape,<br>10mg+20mg 1g      | D07CA8<br>3 | FUCIDIN H, kreem, 15g<br>1TK                          | LEO Pharma A/S               | 50               |   |             |        |              |               |          |  |
| 1035403         | hüdrokortisoon+kl<br>oorheksidiin,<br>10mg+10mg 1g    | D07BA8<br>0 | SIBICORT, kreem, 20g<br>1TK                           | Orion Corporation            | 50               |   |             |        |              |               |          |  |
| 1045145         | hüdrokortisoon+tsi<br>profloksatsiin,<br>10mg+2mg 1ml | S02CA8<br>2 | CIPROBAY HC,<br>kõrvatilgad,<br>suspensioon, 10ml 1TK | Novartis Baltics<br>SIA      | 50               |   |             |        |              |               |          |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                       | Müügiloa hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                           | Eriala                 | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|-------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------------|--------|--------------|---------------|---|
| 1036022         | hüdroksükarbamiid, 500mg            | L01XX05     | HYDREA, kõvakapsel, 100TK                                   | Cheplapharm Arzneimittel GmbH | 100              | C00-D48                            | Hematoloog, Onkoloog   |        |              |               |   |
|                 |                                     |             |   |                               | 50               |                                    |                        |        |              |               |   |
| 1615698         | hüdroksükarbamiid, 500mg            | L01XX05     | HYDREA, kõvakapsel, 100TK                                   | First Pharma OÜ               | 100              | C00-D48                            | Onkoloog, Hematoloog   |        |              |               |   |
|                 |                                     |             |   |                               | 50               |                                    |                        |        |              |               |   |
| 1878251         | hüdroksükarbamiid, 500mg            | L01XX05     | HYDREA, kõvakapsel, 100TK                                   | Lex Ano UAB                   | 50               |                                    |                        |        |              |               |   |
|                 |                                     |             |   |                               | 100              | C00-D48                            | Hematoloog, Onkoloog   |        |              |               |   |
| 1027291         | hüdroksükloroviin, 200mg            | P01BA02     | PLAQUENIL, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK           | Sanofi Winthrop Industrie     | 75               | M45-M46, M08-M08, M30-M35, M05-M06 | Pediaater, Reumatoloog | esmane |              |               |   |
|                 |                                     |             |   |                               | 50               |                                    |                        |        |              |               |   |
| 1566086         | hüdroksükloroviin, 200mg            | P01BA02     | PLAQUENIL, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK           | First Pharma OÜ               | 50               |                                    |                        |        |              |               |   |
|                 |                                     |             |   |                               | 75               | M45-M46, M08-M08, M30-M35, M05-M06 | Pediaater, Reumatoloog | esmane |              |               |   |
| 1830529         | hüdroksükloroviin, 200mg            | P01BA02     | PLAQUENIL, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK           | Lex Ano UAB                   | 75               | M45-M46, M08-M08, M30-M35, M05-M06 | Reumatoloog, Pediaater | esmane |              |               |   |
|                 |                                     |             |   |                               | 50               |                                    |                        |        |              |               |   |
| 1891290         | hüdroksükloroviin, 200mg            | P01BA02     | PLAQUENIL, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK           | Ideal Trade Links UAB         | 50               |                                    |                        |        |              |               |   |
|                 |                                     |             |   |                               | 75               | M45-M46, M08-M08, M30-M35, M05-M06 | Reumatoloog, Pediaater | esmane |              |               |   |
| 1893551         | hüdroksükloroviin, 200mg            | P01BA02     | PLAQUENIL, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK           | Lex Ano UAB                   | 75               | M45-M46, M08-M08, M30-M35, M05-M06 | Reumatoloog, Pediaater | esmane |              |               |   |
|                 |                                     |             |   |                               | 50               |                                    |                        |        |              |               |   |
| 1498978         | ibandronhape, 150mg                 | M05BA06     | IBANDRONIC ACID TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 1TK | Teva B.V.                     | 50               |                                    |                        |        |              |               |   |
|                 |                                     |             |   |                               | 75               | M80-M80                            |                        |        |              |               | patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala     | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla   | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|----------------------------------|------------------|-------------|------------|--------|--------------|---|---|
| 1498989         | ibandronhape,<br>150mg              | M05BA0<br>6 | IBANDRONIC ACID<br>TEVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>3TK | Teva B.V.                        | 75               | M80-M80     |            |        |              |   | patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna   |
|                 |                                     |             |  |                                  | 50               |             |            |        |              |   |   |
| 1798825         | ibrutiniib, 140mg                   | L01EL01     | IMBRUVICA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK              | Janssen - Cilag<br>International | 100              | C91.1-C91.1 | Hematoloog |        |              |   | monoteraapiana patsientidele, kellel esineb 17p deletsioon või TP53 mutatsioon, kes ei ole eelnevalt ravi saanud või kes on eelnevalt saanud vähemalt ühe ravikuuri ja haigus ei ole ravile allunud või on taastekkinud lühema aja kui 36 kuu jooksul eelneva ravi alustamisest alates ning patsientidele, kellel esineb 11q deletsioon, kes ei ole eelnevalt ravi saanud või kes on eelnevalt saanud vähemalt ühe ravikuuri ja haigus ei ole ravile allunud või on taastekkinud ning kombinatsioonis venetoklaksiga patsientidele, kes ei ole eelnevalt ravi saanud.<br>Kombinatsioonravi pikkus maksimaalselt 15 tsüklit. |
|                 |                                     |             |  |                                  | 100              | C83.1-C83.1 | Hematoloog |        |              | monoteraapiana heas üldseisundis (ECOG 0-1) ravirefraktaarsele mantelrakulise lümfoomiga patsiendile (dokumenteeritud suutmatus saavutada vähemalt osalist ravivastust) või teise rea ravina patsiendile, kellel on tekkinud haiguse varajane ägenemine (<24 kuud). Ravi ibrutiniibiga teostatakse kuni haiguse progressioonini |   |
| 1775156         | ibrutiniib, 420mg                   | L01EL01     | IMBRUVICA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK              | Janssen - Cilag<br>International | 100              | C91.1-C91.1 | Hematoloog |        |              |   | monoteraapiana patsientidele, kellel esineb 17p deletsioon või TP53 mutatsioon, kes ei ole eelnevalt ravi saanud või kes on eelnevalt saanud vähemalt ühe ravikuuri ja haigus ei ole ravile allunud või on taastekkinud lühema aja kui 36 kuu jooksul eelneva ravi alustamisest alates ning patsientidele, kellel esineb 11q deletsioon, kes ei ole eelnevalt ravi saanud või kes on eelnevalt saanud vähemalt ühe ravikuuri ja haigus ei ole ravile allunud või on taastekkinud ning kombinatsioonis venetoklaksiga patsientidele, kes ei ole eelnevalt ravi saanud.<br>Kombinatsioonravi pikkus maksimaalselt 15 tsüklit. |
| 1775167         | ibrutiniib, 560mg                   | L01EL01     | IMBRUVICA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK              | Janssen - Cilag<br>International | 100              | C83.1-C83.1 | Hematoloog |        |              |   | monoteraapiana heas üldseisundis (ECOG 0-1) ravirefraktaarsele mantelrakulise lümfoomiga patsiendile (dokumenteeritud suutmatus saavutada vähemalt osalist ravivastust) või teise rea ravina patsiendile, kellel on tekkinud haiguse varajane ägenemine (<24 kuud). Ravi ibrutiniibiga teostatakse kuni haiguse progressioonini   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|---------------------------|------------------|-------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1073012         | ibuprofeen, 400mg                   | M01AE0<br>1 | IBUMAX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK                 | Vitabalans Oy             | 75               | M15-M19                       |        |        | 63,00        |               |          |
|                 |                                     |             |   |                           | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                           | 50               |                               |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                           | 100              | C00-D48                       |        |        |              |               |          |
| 1073089         | ibuprofeen, 400mg                   | M01AE0<br>1 | IBUMETIN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK               | Orifarm<br>Healthcare A/S | 100              | C00-D48                       |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                           | 75               | M15-M19                       |        |        | 63,00        |               |          |
|                 |                                     |             |   |                           | 50               |                               |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                           | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46 |        |        |              |               |          |
| 1473588         | ibuprofeen, 400mg                   | M01AE0<br>1 | IBUPROFEN<br>LANNACHER, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK | G.L. Pharma<br>GmbH       | 75               | M15-M19                       |        |        | 63,00        |               |          |
|                 |                                     |             |   |                           | 50               |                               |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                           | 100              | C00-D48                       |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                           | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46 |        |        |              |               |          |
| 1032714         | ibuprofeen, 600mg                   | M01AE0<br>1 | IBUPROFEN<br>LANNACHER, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK  | G.L. Pharma<br>GmbH       | 100              | C00-D48                       |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                           | 75               | M15-M19                       |        |        | 63,00        |               |          |
|                 |                                     |             |   |                           | 50               |                               |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                           | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46 |        |        |              |               |          |
| 1073113         | ibuprofeen, 600mg                   | M01AE0<br>1 | IBUMETIN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK               | Orifarm<br>Healthcare A/S | 75               | M15-M19                       |        |        | 63,00        |               |          |
|                 |                                     |             |   |                           | 50               |                               |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                           | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                           | 100              | C00-D48                       |        |        |              |               |          |
| 1085194         | ibuprofeen, 600mg                   | M01AE0<br>1 | IBUMAX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                  | Vitabalans Oy             | 75               | M15-M19                       |        |        | 63,00        |               |          |
|                 |                                     |             |   |                           | 100              | C00-D48                       |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                           | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                           | 50               |                               |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|---------------------------|------------------|-------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1085206         | ibuprofeen, 600mg                   | M01AE0<br>1 | IBUMAX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK                 | Vitabalans Oy             | 100              | C00-D48                       |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                           | 50               |                               |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                           | 75               | M15-M19                       |        | 63,00  |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                           | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46 |        |        |              |               |          |
| 1473599         | ibuprofeen, 600mg                   | M01AE0<br>1 | IBUPROFEN<br>LANNACHER, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK | G.L. Pharma<br>GmbH       | 50               |                               |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                           | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                           | 100              | C00-D48                       |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                           | 75               | M15-M19                       |        | 63,00  |              |               |          |
| 1673692         | ibuprofeen, 600mg                   | M01AE0<br>1 | IBUPROFEN ACCORD,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK    | Accord Healthcare<br>B.V. | 50               |                               |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                           | 100              | C00-D48                       |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                           | 75               | M05-M08, M30-<br>M35, M45-M46 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                           | 75               | M15-M19                       |        | 63,00  |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|----------------------------------|------------------|-------------|-------------|--------|--------------|---------------|--|
| 1697126         | idebenoon, 150mg                    | N06BX1<br>3 | RAXONE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>180TK | Chiesi<br>Farmaceutici<br>S.p.A. | 100              | H47.2-H47.2 | Oftalmoloog |        |              |               | ravi jätkamiseks kliiniliselt olulise paranemise (clinically relevant recovery, CRR) saavutamisel võrreldes idebenoon-ravi alustamisega geneetilise testiga kinnitatud Leberi päriliku optilise neuropaatia näidustusel. Ravi jätkamisel toimub ravivastuse hindamine iga 6 kuu tagant. Ravi lõpetatakse, kui pärast CRR saavutamist ei ole kahel järjestikusel mõõtmisel enam toimunud täiendavat nägemisteravuse paranemist. Off-chart patsiendil, kes enne ravi alustamist ei näe ühtegi tähte logMAR lugemistabelil, tähendab CRR võimet lugeda lugemistabelilt vähemalt 5 tähte (võrdne ühe rea lugemisega) ning on-chart patsiendil, kes suutis lugeda tähti lugemistabelilt enne ravi alustamist, tähendab CRR võimet lugeda täiendavalt vähemalt 10 tähte (võrdne 2 rea lugemisega lugemistabelil) |
|                 |                                     |             |   |                                  | 100              | H47.2-H47.2 | Oftalmoloog |        |              |               | ravi alustamiseks geneetilise testiga kinnitatud Leberi päriliku optilise neuropaatia näidustusel ning jätkamiseks patsientidel, kellel ei ole iga 3 kuu järgsel ravivastuse hindamisel saavutatud olulist kliinilist paranemist (clinically relevant recovery, CRR) pärast 3. 6. ja 9. ravikuud. Ravi lõpetatakse kui 12. kuu järel ei ole CRR saavutatud. Off-chart patsiendil, kes enne ravi alustamist ei näe ühtegi tähte logMAR lugemistabelil, tähendab CRR võimet lugeda lugemistabelilt vähemalt 5 tähte (võrdne ühe rea lugemisega) ning on-chart patsiendil, kes suutis lugeda tähti lugemistabelilt enne ravi alustamist, tähendab CRR võimet lugeda täiendavalt vähemalt 10 tähte (võrdne 2 rea lugemisega lugemistabelil)  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                          | Müügiloa hoidja                       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla   | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|---------------------------------------|------------------|----------------------|--|--------|--------------|---|---|
| 1717107         | iksekizumab,<br>80mg 1ml            | L04AC1<br>3 | TALTZ, süstelahus pen-<br>süstlis, 1ml 1TK     | Eli Lilly And Co<br>(Ireland) Limited | 100              | L40-L40              | Pediaater,<br>Dermatovenerol<br>oog                      |        |              |   | patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus L40 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud. |
|                 |                                     |             |  |                                       | 100              | M45-M45, M46-<br>M46 | Reumatoloog,<br>Pediaater                                |        |              | ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus M45 ja M46 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud. |   |
|                 |                                     |             |  |                                       | 100              | M07.0-M07.3          | Pediaater,<br>Reumatoloog                                |        |              | ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus M07.0–3 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud.    |   |
| 1291890         | iloprost, 10mcg<br>1ml              | B01AC1<br>1 | VENTAVIS,<br>nebuliseeritav lahus, 1ml<br>30TK | Bayer AG                              | 50               |                      |  |        |              |   |   |
|                 |                                     |             |  |                                       | 100              | I27.0-I27.0          | Kardioloog,<br>Reumatoloog,<br>Pulmonoloog,<br>Pediaater |        |              | NYHA III-IV kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafiil on vastunäidustatud, ostunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid  |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                    | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla   | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|---------------------------|------------------|-----------------------------|--|--------|--------------|---|---|
| 1291902         | iloprost, 10mcg<br>1ml              | B01AC1<br>1 | VENTAVIS,<br>nebuliseeritav lahus, 1ml<br>168TK       | Bayer AG                  | 50               |                             |  |        |              |   |   |
|                 |                                     |             |   |                           | 100              | I27.0-I27.0                 | Pulmonoloog,<br>Pediaater,<br>Reumatoloog,<br>Kardioloog |        |              |   | NYHA III-IV kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse<br>või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse<br>arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi<br>(vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui<br>sildenafiil on vastunäidustatud, ostunud ebaefektiivseks<br>või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid |
| 1566413         | imatiniib, 100mg                    | L01EA0<br>1 | MEAXIN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>120TK | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 100              | C92.1-C92.1                 | Hematoloog   |        |              |   | konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi ühise) otsuse<br>alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist<br>vastust indutseeriv ravi ning imatiniibravi foonil püsib<br>hematoloogiline ravivastus (haigus ei progresseeru)   |
|                 |                                     |             |   |                           | 100              | C83.5-C83.5,<br>C91.0-C91.0 | Hematoloog   |        |              | patsiendile, kelle ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga<br>on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt<br>vastavaks järgmistele kriteeriumidele: Ph-positiivse B-<br>rakulise lümfoblastleukeemia või -lümfoomi raviks kuni 3<br>aasta vältel või haiguse progresseerumiseni  |   |
|                 |                                     |             |   |                           | 100              | C49.9-C49.9,<br>C16-C20     | Onkoloog   |        |              | patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine<br>imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3<br>onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele:<br>KITpositiivse kõrge retsidiivriskiga pahaloomulise<br>gastrointestinaalse stromaaltuumori adjuvantraviks kuni 3<br>aasta vältel ja KITpositiivse mitteopereeritava või<br>metastaseerunud pahaloomulise gastrointestinaalse<br>stromaaltuumori raviks, kui mitte enam kui 3 ravikuu<br>möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus<br>või haigus püsib stabiilsena |   |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                    | Eriala     | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla   | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|-----------------|------------------|-----------------------------|------------|--------|--------------|---|---|
| 1588417         | imatiniib, 100mg                    | L01EA0<br>1 | IMATINIB GRINDEKS,<br>kõvakapsel, 120TK                         | Grindeks AS     | 100              | C49.9-C49.9,<br>C16-C20     | Onkoloog   |        |              |   | patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: KITpositiivse kõrge retsidiiviriskiga pahaloomulise gastrointestinaalse stromaaltuumori adjuvantraviks kuni 3 aasta vältel ja KITpositiivse mitteopereeritava või metastaseerunud pahaloomulise gastrointestinaalse stromaaltuumori raviks, kui mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena |
|                 |                                     |             |   |                 | 100              | C83.5-C83.5,<br>C91.0-C91.0 | Hematoloog |        |              | patsiendile, kelle ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: Ph-positiivse B-rakulise lümfoblastleukeemia või -lümfoomi raviks kuni 3 aasta vältel või haiguse progresseerumiseni |   |
|                 |                                     |             |   |                 | 100              | C92.1-C92.1                 | Hematoloog |        |              | konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi ning imatiniibravi foonil püsib hematoloogiline ravivastus (haigus ei progresseeru)  |   |
| 1604900         | imatiniib, 100mg                    | L01EA0<br>1 | IMATINIB TEVA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>120TK | Teva B.V.       | 100              | C49.9-C49.9,<br>C16-C20     | Onkoloog   |        |              |   | patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: KITpositiivse kõrge retsidiiviriskiga pahaloomulise gastrointestinaalse stromaaltuumori adjuvantraviks kuni 3 aasta vältel ja KITpositiivse mitteopereeritava või metastaseerunud pahaloomulise gastrointestinaalse stromaaltuumori raviks, kui mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena |
|                 |                                     |             |   |                 | 100              | C83.5-C83.5,<br>C91.0-C91.0 | Hematoloog |        |              | patsiendile, kelle ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: Ph-positiivse B-rakulise lümfoblastleukeemia või -lümfoomi raviks kuni 3 aasta vältel või haiguse progresseerumiseni |   |
|                 |                                     |             |   |                 | 100              | C92.1-C92.1                 | Hematoloog |        |              | konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi ning imatiniibravi foonil püsib hematoloogiline ravivastus (haigus ei progresseeru)  |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                    | Eriala     | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla   | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|-----------------------------|------------------|-----------------------------|------------|--------|--------------|---|---|
| 1619726         | imatiniib, 100mg                    | L01EA0<br>1 | IMATINIB ACCORD,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>120TK | Accord Healthcare<br>S.L.U. | 100              | C49.9-C49.9,<br>C16-C20     | Onkoloog   |        |              |   | patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: KITpositiivse kõrge retsidiiviriskiga pahaloomulise gastrointestinaalse stromaaltuumori adjuvantraviks kuni 3 aasta vältel ja KITpositiivse mitteopereeritava või metastaseerunud pahaloomulise gastrointestinaalse stromaaltuumori raviks, kui mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena |
|                 |                                     |             |   |                             | 100              | C92.1-C92.1                 | Hematoloog |        |              | konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi ning imatiniibravi foonil püsib hematoloogiline ravivastus (haigus ei progresseeru)  |   |
|                 |                                     |             |   |                             | 100              | C83.5-C83.5,<br>C91.0-C91.0 | Hematoloog |        |              | patsiendile, kelle ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: Ph-positiivse B-rakulise lümfoblastleukeemia või -lümfoomi raviks kuni 3 aasta vältel või haiguse progresseerumiseni   |   |
| 1658448         | imatiniib, 100mg                    | L01EA0<br>1 | GLIPOX, kõvakapsel,<br>120TK                                      | Noramedia UAB               | 100              | C92.1-C92.1                 | Hematoloog |        |              |   | konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi ning imatiniibravi foonil püsib hematoloogiline ravivastus (haigus ei progresseeru)  |
|                 |                                     |             |   |                             | 100              | C83.5-C83.5,<br>C91.0-C91.0 | Hematoloog |        |              | patsiendile, kelle ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: Ph-positiivse B-rakulise lümfoblastleukeemia või -lümfoomi raviks kuni 3 aasta vältel või haiguse progresseerumiseni   |   |
|                 |                                     |             |   |                             | 100              | C49.9-C49.9,<br>C16-C20     | Onkoloog   |        |              | patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: KITpositiivse kõrge retsidiiviriskiga pahaloomulise gastrointestinaalse stromaaltuumori adjuvantraviks kuni 3 aasta vältel ja KITpositiivse mitteopereeritava või metastaseerunud pahaloomulise gastrointestinaalse stromaaltuumori raviks, kui mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                    | Eriala     | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla   | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|-----------------------------|------------------|-----------------------------|------------|--------|--------------|---|---|
| 1619759         | imatiniib, 400mg                    | L01EA0<br>1 | IMATINIB ACCORD,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Accord Healthcare<br>S.L.U. | 100              | C83.5-C83.5,<br>C91.0-C91.0 | Hematoloog |        |              |   | patsiendile, kelle ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: Ph-positiivse B-rakulise lümfoblastleukeemia või -lümfoomi raviks kuni 3 aasta vältel või haiguse progresseerumiseni   |
|                 |                                     |             |  |                             | 100              | C92.1-C92.1                 | Hematoloog |        |              | konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi ning imatiniibravi foonil püsib hematoloogiline ravivastus (haigus ei progresseeru)  |   |
|                 |                                     |             |  |                             | 100              | C49.9-C49.9,<br>C16-C20     | Onkoloog   |        |              | patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: KITpositiivse kõrge retsidiiviriskiga pahaloolumulise gastrointestinaalse stromaaltuumori adjuvantraviks kuni 3 aasta vältel ja KITpositiivse mitteopereeritava või metastaseerunud pahaloolumulise gastrointestinaalse stromaaltuumori raviks, kui mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena |   |
| 1658471         | imatiniib, 400mg                    | L01EA0<br>1 | GLIPOX, kõvakapsel,<br>30TK                                      | Noramedia UAB               | 100              | C49.9-C49.9,<br>C16-C20     | Onkoloog   |        |              |   | patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: KITpositiivse kõrge retsidiiviriskiga pahaloolumulise gastrointestinaalse stromaaltuumori adjuvantraviks kuni 3 aasta vältel ja KITpositiivse mitteopereeritava või metastaseerunud pahaloolumulise gastrointestinaalse stromaaltuumori raviks, kui mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena |
|                 |                                     |             |  |                             | 100              | C83.5-C83.5,<br>C91.0-C91.0 | Hematoloog |        |              | patsiendile, kelle ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: Ph-positiivse B-rakulise lümfoblastleukeemia või -lümfoomi raviks kuni 3 aasta vältel või haiguse progresseerumiseni   |   |
|                 |                                     |             |  |                             | 100              | C92.1-C92.1                 | Hematoloog |        |              | konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi ning imatiniibravi foonil püsib hematoloogiline ravivastus (haigus ei progresseeru)  |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja    | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|--------------------|------------------|---|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 7000085         | imikute toitesegu,                  |             | APTAMIL Pepti MCT (APTAMIL DIGESTIVE CARE), pulber, 450 g N12 | N.V. Nutricia      | 75               | K52.2-K52.2, L27.2-L27.2, L50-L50, T78.1-T78.1, K22.8-K22.8, K90.4-K90.4, T78.2-T78.2, L20.8-L20.8, T78.0-T78.0 |        |        |              | 1,00          |          |
| 7002863         | imikute toitesegu,                  |             | FRISOLAC GOLD PEP AC, pulber, 400g                            | Friesland Foods BV | 75               | K52.2-K52.2, L27.2-L27.2, L50-L50, T78.1-T78.1, K22.8-K22.8, K90.4-K90.4, T78.2-T78.2, L20.8-L20.8, T78.0-T78.0 |        |        |              | 1,00          |          |
| 7002874         | imikute toitesegu,                  |             | FRISOLAC GOLD PREMATURE, pulber, 400g                         | Friesland Foods BV | 75               | P05-P05, E42-E42, P07-P07, P27.1-P27.1  |        |        |              | 0,58          |          |
| 7002885         | imikute toitesegu,                  |             | FRISOLAC GOLD PEP, pulber, 400g                               | Friesland Foods BV | 75               | K52.2-K52.2, L27.2-L27.2, L50-L50, T78.1-T78.1, K22.8-K22.8, K90.4-K90.4, T78.2-T78.2, L20.8-L20.8, T78.0-T78.0 |        |        |              | 1,00          |          |
| 7017971         | imikute toitesegu,                  |             | Neocate (aminohapete segu), pulber, 400g N6                   | Nutrimedical OÜ    | 75               | K52.2-K52.2, L27.2-L27.2, L50-L50, T78.1-T78.1, K22.8-K22.8, K90.4-K90.4, T78.2-T78.2, L20.8-L20.8, T78.0-T78.0 |        |        |              | 1,00          |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus        | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|--|-------------|---|----------------------------|------------------|---|-------------|--------|--------------|---------------|---|
| 7018095         | imikute toitesegu,                         |             | APTAMIL HMF, pulber, 200g                                       | Nutricia Cuijk bv          | 75               | P05-P05, E42-E42, P07-P07, P27.1-P27.1  |             |        |              | 0,58          |   |
| 7018017         | imikute toitesegu,                         |             | Aptamil Pepti Syneo, pulber, 400g N12                           | Nutricia Cuijk bv          | 75               | K52.2-K52.2, L27.2-L27.2, L50-L50, T78.1-T78.1, K22.8-K22.8, K90.4-K90.4, T78.2-T78.2, L20.8-L20.8, T78.0-T78.0 |             |        |              | 1,00          |   |
| 7017432         | imikute toitesegu,                         |             | INFATRINI, suspensioon, 125ml N24                               | Nutricia                   | 75               | E42-E42   |             |        |              | 1,00          | lastele, kellele on paigaldatud gastrostoom või jejunostoom |
| 7004933         | imikute toitesegu,                         |             | APTAMIL PREMATIL, pulber, 400 g                                 | Nutricia Cuijk BV.         | 75               | P05-P05, E42-E42, P07-P07, P27.1-P27.1  |             |        |              | 0,58          |   |
| 1060322         | imikvimood, 5%                             | D06BB10     | ALDARA, kreem, 250mg 12TK                                       | VIATRIS HEALTHCARE Limited | 50               |   |             |        |              |               |   |
| 1452169         | indakaterool, 150mcg                       | R03AC18     | ONBREZ BREEZHALER, inhalatsioonipulber kõvakapslis, 30TK        | Novartis Europharm Limited | 50               |   |             |        |              |               |   |
|                 |  |             |   |                            | 75               | J44-J44, J43-J43  | Pulmonoloog | esmane |              |               |   |
| 1452215         | indakaterool, 300mcg                       | R03AC18     | ONBREZ BREEZHALER, inhalatsioonipulber kõvakapslis, 30TK        | Novartis Europharm Limited | 50               |   |             |        |              |               |   |
|                 |  |             |   |                            | 75               | J44-J44, J43-J43  | Pulmonoloog | esmane |              |               |   |
| 1626555         | indakaterool+glüko pürroonium, 85mcg+43mcg | R03AL04     | ULTIBRO BREEZHALER, inhalatsioonipulber kõvakapslis, 30TK       | Novartis Europharm Limited | 75               | J43-J44   | Pulmonoloog | esmane |              |               |   |
|                 |  |             |   |                            | 50               |   |             |        |              |               |   |
| 1167780         | indapamiid, 1,5mg                          | C03BA11     | TERTENSIF SR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | Les Laboratoires Servier   | 75               | I15-I15, I10-I13, O10-O16, I50-I50  |             |        |              |               |   |
|                 |  |             |   |                            | 50               |   |             |        |              |               |   |
|                 |  |             |   |                            | 100              | I27.0-I27.0   |             |        |              |               |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                  | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|-----------------------------|------------------|---|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1185230         | indapamiid, 1,5mg                   | C03BA1<br>1 | RAWEL SR, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK        | KRKA, d.d., Novo<br>mesto   | 75               | I15-I15, I10-I13,<br>O10-O16, I50-<br>I50 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                             | 50               |   |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                             | 100              | I27.0-I27.0                               |        |        |              |               |          |
| 1379741         | indapamiid, 1,5mg                   | C03BA1<br>1 | INDAMAX, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK         | Teva Pharma B.V.            | 75               | I15-I15, I10-I13,<br>O10-O16, I50-<br>I50 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                             | 50               |   |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                             | 100              | I27.0-I27.0                               |        |        |              |               |          |
| 1860746         | indapamiid, 1,5mg                   | C03BA1<br>1 | TERTENSIF SR,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | Ideal Trade Links<br>UAB    | 50               |   |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                             | 100              | I27.0-I27.0                               |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                             | 75               | I15-I15, I10-I13,<br>O10-O16, I50-<br>I50 |        |        |              |               |          |
| 1019416         | indapamiid, 2,5mg                   | C03BA1<br>1 | TERTENSIF, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                  | Les Laboratoires<br>Servier | 100              | I27.0-I27.0                               |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                             | 50               |   |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                             | 75               | I15-I15, I10-I13,<br>O10-O16, I50-<br>I50 |        |        |              |               |          |
| 1038383         | indapamiid, 2,5mg                   | C03BA1<br>1 | PROINDAP,<br>kõvakapsel, 30TK  | Pro.Med.Cs Praha<br>a.s.    | 50               |   |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                             | 75               | I15-I15, I10-I13,<br>O10-O16, I50-<br>I50 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                             | 100              | I27.0-I27.0                               |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus            | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala                                       | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla  | Märkused   |
|-----------------|--|-------------|--|--|------------------|---|--|--------|--------------|--|--|
| 1886261         | inklisiraan, 284mg<br>1.5ml                    | C10AX1<br>6 | LEQVIO, süstelahus<br>süstlis, 1.5ml 1TK                     | Novartis<br>Europharm<br>Limited                 | 100              | E78.0-E78.0   | Kardioloog                                   | esmane |              |  | kroonilise perekondliku hüperkolesteroleemia raviks<br>dokumenteeritud ateroskleroosiga patsientidele, kui<br>varasem ravi maksimaalselt talutavas annuses statiini ja<br>esetimiibiga on osutunud ebapiisavaks või on need<br>ravimid olnud vastunäidustatud ning patsiendi LDL-C<br>väärtus on $\geq 2,6$ mmol/L |
|                 |  |             |  |  | 100              | I22-I22, Z95-<br>Z95, I66-I66,<br>I69-I69, I25-I25,<br>I63-I63, I21-I21,<br>I70.2-I70.2, I65-<br>I65, I20.0-I20.0 | Kardioloog,<br>Neuroloog,<br>vaskulaarkirurg | esmane |              | ägeda koronaarsündroomi (ÄKS, STEMI, NSTEMI,<br>ebastabiilne stenokardia), isheemilise insuldi ja<br>revaskulariseerimise (koronaararter, karotiidarter,<br>perifeerse arteriaalse) järgselt (möödunud $\leq 36$ kuud)<br>kombinatsioonis statiini ja esetimiibiga patsientidele, kelle<br>LDL-C väärtus on $\geq 2,6$ mmol/l ja kellel vaatamata 1-3<br>kuud kestnud ravile maksimaalses talutavas annuses<br>statiini ja esetimiibiga ei ole saavutatud LDL-kolesterooli<br>eesmärgväärtust või kellele statiin või esetimiib on<br>vastunäidustatud |  |
| 1105940         | ipratroopiumbromii<br>d, 20mcg 1annus          | R03BB0<br>1 | ATROVENT N,<br>inhalatsiooniaerosool,<br>lahus, 200annus 1TK | Boehringer<br>Ingelheim<br>International<br>GmbH | 75               | J45-J45   |  |        |              |  |  |
|                 |  |             |  |  | 50               |   |  |        |              |  |  |
|                 |  |             |  |  | 75               | J43-J44   | Pulmonoloog                                  | esmane |              |  |  |
| 1699724         | isavukonasool,<br>100mg                        | J02AC0<br>5 | CRESEMBA,<br>kõvakapsel, 14TK                                | Basilea<br>Pharmaceutica<br>Deutschland<br>GmbH  | 100              | B44-B44   |  |        |              |  | kui ravi vorikonasooliga on olnud ebaefektiivne või<br>vastunäidustatud ning ravi on alustatud haiglas   |
|                 |  |             |  |  | 100              | B46-B46   |  |        |              |  | kui ravi on alustatud haiglas  |
| 1000348         | isokonasool, 10mg<br>1g                        | D01AC0<br>5 | TRAVOGEN, kreem,<br>20g 1TK                                  | LEO Pharma A/S                                   | 50               |   |  |        |              |  |  |
| 1820191         | isokonasool, 10mg<br>1g                        | D01AC0<br>5 | TRAVOGEN, kreem,<br>30g 1TK                                  | First Pharma OÜ                                  | 50               |   |  |        |              |  |  |
| 1865156         | isokonasool, 10mg<br>1g                        | D01AC0<br>5 | TRAVOGEN, kreem,<br>30g 1TK                                  | Ideal Trade Links<br>UAB                         | 50               |   |  |        |              |  |  |
| 1000416         | isokonasool+difluk<br>ortoloon,<br>10mg+1mg 1g | D01AC8<br>0 | TRAVOCORT, kreem,<br>15g 1TK                                 | LEO Pharma A/S                                   | 50               |   |  |        |              |  |  |
| 1783830         | isokonasool+difluk<br>ortoloon,<br>10mg+1mg 1g | D01AC8<br>0 | TRAVOCORT, kreem,<br>30g 1TK                                 | First Pharma OÜ                                  | 50               |   |  |        |              |  |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus            | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                      | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                    | Eriala                              | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|--|-------------|--|--------------------------------------|------------------|---|-------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1827659         | isokonasool+difluk<br>ortoloon,<br>10mg+1mg 1g | D01AC8<br>0 | TRAVOCORT, kreem,<br>30g 1TK   | Ideal Trade Links<br>UAB             | 50               |   |                                     |        |              |               |          |
| 1891380         | isokonasool+difluk<br>ortoloon,<br>10mg+1mg 1g | D01AC8<br>0 | TRAVOCORT, kreem,<br>30g 1TK   | Lex Ano UAB                          | 50               |   |                                     |        |              |               |          |
| 1043547         | isosorbiitmononitra<br>at, 20mg                | C01DA1<br>4 | MONOSAN 20 MG,<br>tablett, 30TK  | Pro.Med.Cs Praha<br>a.s.             | 75               | I20-I20                                     |                                     |        |              |               |          |
|                 |  |             |  |                                      | 50               |   |                                     |        |              |               |          |
| 1017010         | isosorbiitmononitra<br>at, 40mg                | C01DA1<br>4 | MONOSAN 40 MG,<br>tablett, 30TK  | Pro.Med.Cs Praha<br>a.s.             | 50               |   |                                     |        |              |               |          |
|                 |  |             |  |                                      | 75               | I20-I20                                     |                                     |        |              |               |          |
| 1046786         | isosorbiitmononitra<br>at, 60mg                | C01DA1<br>4 | IMDUR, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK             | TopRidge Pharma<br>(Ireland) Limited | 50               |   |                                     |        |              |               |          |
|                 |  |             |  |                                      | 75               | I20-I20                                     |                                     |        |              |               |          |
| 1127584         | isosorbiitmononitra<br>at, 60mg                | C01DA1<br>4 | ISOMONIT 60 MG,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | Hexal AG                             | 75               | I20-I20                                     |                                     |        |              |               |          |
|                 |  |             |  |                                      | 50               |   |                                     |        |              |               |          |
| 1252741         | isosorbiitmononitra<br>at, 60mg                | C01DA1<br>4 | ISOMONIT 60 MG,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 60TK | Hexal AG                             | 50               |   |                                     |        |              |               |          |
|                 |  |             |  |                                      | 75               | I20-I20                                     |                                     |        |              |               |          |
| 1004364         | isotretinoiin, 10mg                            | D10BA0<br>1 | ROACCUTANE 10 MG,<br>pehmekapsel, 30TK                                     | Roche Eesti<br>Osahing               | 75               | L43-L43                                     | Pediaater,<br>Dermatovenerol<br>oog |        |              |               |          |
|                 |  |             |  |                                      | 75               | L70.0-L70.0,<br>L71.8-L71.8,<br>L70.1-L70.2 | Dermatovenerol<br>oog               |        |              |               |          |
|                 |  |             |  |                                      | 50               |   |                                     |        |              |               |          |
| 1790007         | isotretinoiin, 10mg                            | D10BA0<br>1 | ISOTRETINOIN<br>SANDOZ, pehmekapsel,<br>30TK                               | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.    | 75               | L43-L43                                     | Pediaater,<br>Dermatovenerol<br>oog |        |              |               |          |
|                 |  |             |  |                                      | 75               | L70.0-L70.0,<br>L71.8-L71.8,<br>L70.1-L70.2 | Dermatovenerol<br>oog               |        |              |               |          |
|                 |  |             |  |                                      | 50               |   |                                     |        |              |               |          |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                        | Müügiloa hoidja                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala                              | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|-----------------------------------|------------------|---|-------------------------------------|--------|--------------|---------------|--|
| 1112230         | isotretinoiin, 20mg                 | D10BA0<br>1 | ROACCUTANE 20 MG,<br>pehmekapsel, 30TK       | Roche Eesti<br>Osahing            | 75               | L43-L43   | Pediaater,<br>Dermatovenerol<br>oog |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |  |                                   | 50               |   |                                     |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |  |                                   | 75               | L70.0-L70.0,<br>L71.8-L71.8,<br>L70.1-L70.2                   | Dermatovenerol<br>oog               |        |              |               |  |
| 1790041         | isotretinoiin, 20mg                 | D10BA0<br>1 | ISOTRETINOIN<br>SANDOZ, pehmekapsel,<br>30TK | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 75               | L70.0-L70.0,<br>L71.8-L71.8,<br>L70.1-L70.2                   | Dermatovenerol<br>oog               |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |  |                                   | 75               | L43-L43   | Dermatovenerol<br>oog, Pediaater    |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |  |                                   | 50               |   |                                     |        |              |               |  |
| 1833599         | isotretinoiin, 20mg                 | D10BA0<br>1 | ISOTIORGA,<br>pehmekapsel, 30TK              | Laboratoires<br>Bailleul S.A.     | 50               |   |                                     |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |  |                                   | 75               | L43-L43   | Dermatovenerol<br>oog, Pediaater    |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |  |                                   | 75               | L70.0-L70.0,<br>L71.8-L71.8,<br>L70.1-L70.2                   | Dermatovenerol<br>oog               |        |              |               |  |
| 1164057         | itrakonasool,<br>100mg              | J02AC0<br>2 | PROKANAZOL,<br>kõvakapsel, 28TK              | Pro.Med.Cs Praha<br>a.s.          | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8,<br>B44-B44 |                                     |        |              |               | kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega<br>(pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse<br>seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse<br>sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja<br>profülaktikaks |
|                 |                                     |             |  |                                   | 50               |   |                                     |        |              |               |  |
| 1183553         | itrakonasool,<br>100mg              | J02AC0<br>2 | CLADOSOL 100MG,<br>kõvakapsel, 14TK          | Stada Arzneimittel<br>AG          | 50               |   |                                     |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |  |                                   | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8,<br>B44-B44 |                                     |        |              |               | kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega<br>(pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse<br>seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse<br>sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja<br>profülaktikaks |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|-----------------------------|------------------|---|--------|--------|--------------|---------------|--|
| 1230488         | itrakonasool,<br>100mg              | J02AC0<br>2 | ITRACONAZOL<br>ACTAVIS, kõvakapsel,<br>28TK                          | Teva B.V.                   | 50               |   |        |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |  |                             | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8,<br>B44-B44 |        |        |              |               | kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega<br>(pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse<br>seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse<br>sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja<br>profülaktikaks |
| 1219553         | ivabradiin, 5mg                     | C01EB1<br>7 | PROCORALAN,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK          | Les Laboratoires<br>Servier | 50               |   |        |        |              |               |  |
| 1700772         | ivabradiin, 5mg                     | C01EB1<br>7 | IVABRADINE<br>GRINDEKS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK | Grindeks AS                 | 50               |   |        |        |              |               |  |
| 1715712         | ivabradiin, 5mg                     | C01EB1<br>7 | IVABRADINE VIATRIS,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK  | Viatris Limited             | 50               |   |        |        |              |               |  |
| 1746378         | ivabradiin, 5mg                     | C01EB1<br>7 | IVABRADINE ACCORD,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK   | Accord Healthcare<br>S.L.U. | 50               |   |        |        |              |               |  |
| 1219485         | ivabradiin, 7,5mg                   | C01EB1<br>7 | PROCORALAN,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK          | Les Laboratoires<br>Servier | 50               |   |        |        |              |               |  |
| 1700783         | ivabradiin, 7,5mg                   | C01EB1<br>7 | IVABRADINE<br>GRINDEKS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK | Grindeks AS                 | 50               |   |        |        |              |               |  |
| 1746446         | ivabradiin, 7,5mg                   | C01EB1<br>7 | IVABRADINE ACCORD,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK   | Accord Healthcare<br>S.L.U. | 50               |   |        |        |              |               |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                    | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                            | Müügiloa hoidja                          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |
|-----------------|--|-------------|--|--|------------------|----------|--|--------|--------------|---------------|--|
| 1821057         | ivakaftoor, 150mg                                      | R07AX0<br>2 | KALYDECO, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited | 100              | E84-E84  | Pulmonoloog, Pediaater                                 |        |              |               | koos ivakaftoori/tesakaftoori/eleksakaftoori tablettidega tsüstilise fibroosi kombinatsioonraviks patsientidele, kellel on tsüstilise fibroosi transmembraanse juhtivuse regulaatorgeenis vähemalt üks F508del-mutatsioon    |
| 3058253         | ivakaftoor, 59,5mg                                     | R07AX0<br>2 | KALYDECO, graanulid kotikeses, 28TK              | Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited | 100              | E84-E84  | Pediaater, Pulmonoloog                                 |        |              |               | koos ivakaftoori/tesakaftoori/eleksakaftoori tablettidega tsüstilise fibroosi kombinatsioonraviks patsientidele, kellel on tsüstilise fibroosi transmembraanse juhtivuse regulaatorgeenis vähemalt üks F508del-mutatsioon    |
| 1834534         | ivakaftoor, 75mg                                       | R07AX0<br>2 | KALYDECO, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited | 100              | E84-E84  | Pulmonoloog, Pediaater                                 |        |              |               | koos ivakaftoori/tesakaftoori/eleksakaftoori tablettidega tsüstilise fibroosi kombinatsioonraviks patsientidele, kellel on tsüstilise fibroosi transmembraanse juhtivuse regulaatorgeenis vähemalt üks F508del-mutatsioon    |
| 3061516         | ivakaftoor, 75mg                                       | R07AX0<br>2 | KALYDECO, graanulid kotikeses, 28TK              | Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited | 100              | E84-E84  | Pulmonoloog, Pediaater                                 |        |              |               | koos ivakaftoori/tesakaftoori/eleksakaftoori tablettidega tsüstilise fibroosi kombinatsioonraviks patsientidele, kellel on tsüstilise fibroosi transmembraanse juhtivuse regulaatorgeenis vähemalt üks F508del-mutatsioon    |
| 1872211         | ivakaftoor+tesakaftoor+eleksakaftoor, 37,5mg+25mg+50mg | R07AX3<br>2 | KAFTRIO, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK  | Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited | 100              | E84-E84  | Pediaater, Pulmonoloog                                 |        |              |               | koos ivakaftooriga tsüstilise fibroosi kombinatsioonraviks patsientidele, kellel on tsüstilise fibroosi transmembraanse juhtivuse regulaatorgeenis vähemalt üks F508del-mutatsioon   |
| 3059771         | ivakaftoor+tesakaftoor+eleksakaftoor, 60mg+40mg+80mg   | R07AX3<br>2 | KAFTRIO, graanulid kotikeses, 28TK               | Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited | 100              | E84-E84  | Pediaater, Pulmonoloog                                 |        |              |               | koos ivakaftooriga tsüstilise fibroosi kombinatsioonraviks patsientidele, kellel on tsüstilise fibroosi transmembraanse juhtivuse regulaatorgeenis vähemalt üks F508del-mutatsioon   |
| 1826232         | ivakaftoor+tesakaftoor+eleksakaftoor, 75mg+50mg+100mg  | R07AX3<br>2 | KAFTRIO, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK  | Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited | 100              | E84-E84  | Pediaater, Pulmonoloog                                 |        |              |               | koos ivakaftooriga tsüstilise fibroosi kombinatsioonraviks patsientidele, kellel on tsüstilise fibroosi transmembraanse juhtivuse regulaatorgeenis vähemalt üks F508del-mutatsioon   |
| 3059782         | ivakaftoor+tesakaftoor+eleksakaftoor, 75mg+50mg+100mg  | R07AX3<br>2 | KAFTRIO, graanulid kotikeses, 28TK               | Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited | 100              | E84-E84  | Pediaater, Pulmonoloog                                 |        |              |               | koos ivakaftooriga tsüstilise fibroosi kombinatsioonraviks patsientidele, kellel on tsüstilise fibroosi transmembraanse juhtivuse regulaatorgeenis vähemalt üks F508del-mutatsioon   |
| 1718535         | IX hüübimisfaktor, 1000RÜ                              | B02BD0<br>4 | ALPROLIX, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK     | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)       | 100              | D67-D67  | Pediaater – hematoloog-onkoloog, Hematoloog, Pediaater |        |              |               | verejooksu episoodide ennetamiseks B- hemofiiliaga patsientidele, kellel on raskendatud veenisüsteemide teostamine ning seetõttu pole võimalik kasutada profülaktilises annuses vereplasmast valmistatud IX hüübimisfaktorit |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|--|------------------|----------|---|--------|--------------|---------------|--|
| 1038068         | IX hüübimisfaktor,<br>1200RÜ        | B02BD0<br>4 | IMMUNINE, süste-<br>/infusioonilahuse pulber<br>ja lahusti, 1TK | Baxalta<br>Innovations GmbH              | 100              | D67-D67  | Pediaater,<br>Pediaater –<br>hematoloog-<br>onkoloog,<br>Hematoloog |        |              |               |  |
| 1718546         | IX hüübimisfaktor,<br>2000RÜ        | B02BD0<br>4 | ALPROLIX, süstelahuse<br>pulber ja lahusti, 1TK                 | Swedish Orphan<br>Biovitrum AB<br>(publ) | 100              | D67-D67  | Pediaater,<br>Hematoloog,<br>Pediaater –<br>hematoloog-<br>onkoloog |        |              |               | verejooksu episoodide ennetamiseks B- hemofiiliaga<br>patsientidele, kellel on raskendatud veenisiseste süstete<br>teostamine ning seetõttu pole võimalik kasutada<br>profülaktilises annuses vereplasmast valmistatud IX<br>hüübimisfaktorit                          |
| 1718513         | IX hüübimisfaktor,<br>250RÜ         | B02BD0<br>4 | ALPROLIX, süstelahuse<br>pulber ja lahusti, 1TK                 | Swedish Orphan<br>Biovitrum AB<br>(publ) | 100              | D67-D67  | Hematoloog,<br>Pediaater –<br>hematoloog-<br>onkoloog,<br>Pediaater |        |              |               | verejooksu episoodide ennetamiseks B- hemofiiliaga<br>patsientidele, kellel on raskendatud veenisiseste süstete<br>teostamine ning seetõttu pole võimalik kasutada<br>profülaktilises annuses vereplasmast valmistatud IX<br>hüübimisfaktorit                          |
| 1718557         | IX hüübimisfaktor,<br>3000RÜ        | B02BD0<br>4 | ALPROLIX, süstelahuse<br>pulber ja lahusti, 1TK                 | Swedish Orphan<br>Biovitrum AB<br>(publ) | 100              | D67-D67  | Hematoloog,<br>Pediaater,<br>Pediaater –<br>hematoloog-<br>onkoloog |        |              |               | verejooksu episoodide ennetamiseks B- hemofiiliaga<br>patsientidele, kellel on raskendatud veenisiseste süstete<br>teostamine ning seetõttu pole võimalik kasutada<br>profülaktilises annuses vereplasmast valmistatud IX<br>hüübimisfaktorit                          |
| 1718524         | IX hüübimisfaktor,<br>500RÜ         | B02BD0<br>4 | ALPROLIX, süstelahuse<br>pulber ja lahusti, 1TK                 | Swedish Orphan<br>Biovitrum AB<br>(publ) | 100              | D67-D67  | Pediaater,<br>Hematoloog,<br>Pediaater –<br>hematoloog-<br>onkoloog |        |              |               | verejooksu episoodide ennetamiseks B- hemofiiliaga<br>patsientidele, kellel on raskendatud veenisiseste süstete<br>teostamine ning seetõttu pole võimalik kasutada<br>profülaktilises annuses vereplasmast valmistatud IX<br>hüübimisfaktorit                          |
| 1038057         | IX hüübimisfaktor,<br>600RÜ         | B02BD0<br>4 | IMMUNINE, süste-<br>/infusioonilahuse pulber<br>ja lahusti, 1TK | Baxalta<br>Innovations GmbH              | 100              | D67-D67  | Pediaater –<br>hematoloog-<br>onkoloog,<br>Pediaater,<br>Hematoloog |        |              |               |  |
| 1728840         | kabosantiniib,<br>20mg              | L01EX0<br>7 | CABOMETYX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK         | Ipsen Pharma                             | 100              | C64-C64  | Onkoloog  |        |              |               | IV staadiumis heledarakulise neeru kartsinoomi raviks<br>heas üldseisundis (ECOG 0–1) patsientidele teise rea<br>raviks ning heas üldseisundis (ECOG 0–1) patsientidele<br>kolmanda rea raviks, kui sunitiniib ja pasopaniib on<br>vastunäidustatud või ebaefektiivsed |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus                 | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                             | Müügiloa hoidja                | Soodus-tus % | Diagnoos             | Eriala                   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-------------|---|----------|---|--------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1728862     | kabosantiniib, 40mg                           | L01EX07  | CABOMETYX, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Ipsen Pharma                   | 100          | C64-C64              | Onkoloog                 |        |           |            | IV staadiumis heledarakulise neeru kartsinoomi raviks heas üldseisundis (ECOG 0–1) patsientidele teise rea raviks ning heas üldseisundis (ECOG 0–1) patsientidele kolmanda rea raviks, kui sunitiniib ja pasopaniib on vastunäidustatud või ebaefektiivsed |
| 1728884     | kabosantiniib, 60mg                           | L01EX07  | CABOMETYX, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Ipsen Pharma                   | 100          | C64-C64              | Onkoloog                 |        |           |            | IV staadiumis heledarakulise neeru kartsinoomi raviks heas üldseisundis (ECOG 0–1) patsientidele teise rea raviks ning heas üldseisundis (ECOG 0–1) patsientidele kolmanda rea raviks, kui sunitiniib ja pasopaniib on vastunäidustatud või ebaefektiivsed |
| 1093340     | kaltsipotriool+beet ametasoon, 50mcg+0,5mg 1g | D05AX80  | DAIVOBET, salv, 30g 1TK                           | LEO Pharma A/S                 | 50           |                      |                          |        |           |            |  |
|             |   |          |   |                                | 75           | L40-L40              |                          |        |           |            |  |
| 1534621     | kaltsipotriool+beet ametasoon, 50mcg+0,5mg 1g | D05AX80  | DAIVOBET, geel, 30g 1TK                           | LEO Pharma A/S                 | 50           |                      |                          |        |           |            |  |
|             |   |          |   |                                | 75           | L40-L40              |                          |        |           |            |  |
| 1676369     | kaltsipotriool+beet ametasoon, 50mcg+0,5mg 1g | D05AX80  | CABEMET, salv, 30g 1TK                            | Sandoz Pharmaceuticals d.d.    | 75           | L40-L40              |                          |        |           |            |  |
|             |   |          |   |                                | 50           |                      |                          |        |           |            |  |
| 1676370     | kaltsipotriool+beet ametasoon, 50mcg+0,5mg 1g | D05AX80  | CABEMET, salv, 60g 1TK                            | Sandoz Pharmaceuticals d.d.    | 75           | L40-L40              |                          |        |           |            |  |
|             |   |          |   |                                | 50           |                      |                          |        |           |            |  |
| 1680050     | kaltsipotriool+beet ametasoon, 50mcg+0,5mg 1g | D05AX80  | ENSTILAR, nahavaht, 60g 1TK                       | LEO Pharma A/S                 | 75           | L40-L40              |                          |        |           |            |  |
|             |   |          |   |                                | 50           |                      |                          |        |           |            |  |
| 3030871     | kaltsipotriool+beet ametasoon, 50mcg+0,5mg 1g | D05AX80  | DAIVOBET, salv, 15g 2TK                           | Ideal Trade Links UAB          | 50           |                      |                          |        |           |            |  |
|             |   |          |   |                                | 75           | L40-L40              |                          |        |           |            |  |
| 1004599     | kaltsitriool, 0,25mcg                         | A11CC04  | ROCALTROL, pehmekapsel, 30TK                      | Atnahs Pharma Netherlands B.V. | 100          | E89.2-E89.2, E20-E20 | Endokrinoloog, Pediaater |        |           |            |  |
|             |   |          |   |                                | 50           |                      |                          |        |           |            |  |
|             |   |          |   |                                | 100          | N25-N25, N18-N18     | Nefroloog, Pediaater     |        |           |            |  |
| 1392016     | kaltsium+kolekaltsiferool, 500mg+400RÜ        | A12AX80  | CALCIGRAN FORTE, närimistablett, 120TK            | Orifarm Healthcare A/S         | 75           | M80-M80              |                          |        |           |            | kombinatsioonravi osana patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna  |
|             |   |          |   |                                | 100          | N18-N18              |                          |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                    | Müügiloo hoidja                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                     | Eriala                      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|-----------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1046337         | kaltsiumkarbonaat,<br>1250mg        | A12AA0<br>4 | CALCIGRAN SINE,<br>närimistablett, 100TK | Orifarm<br>Healthcare A/S         | 100              | E89.2-E89.2,<br>E20-E20      | Endokrinoloog,<br>Pediaater |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                   | 100              | N18-N18                      |                             |        |              |               |          |
| 1776483         | kaltsiumkarbonaat,<br>1250mg        | A12AA0<br>4 | CALCIGRAN SINE,<br>närimistablett, 120TK | Orifarm<br>Healthcare A/S         | 100              | E89.2-E89.2,<br>E20-E20      | Pediaater,<br>Endokrinoloog |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                   | 100              | N18-N18                      |                             |        |              |               |          |
| 1291070         | kandesartaan,<br>16mg               | C09CA0<br>6 | PRESCANDEN 16MG,<br>tablett, 56TK        | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 50               |                              |                             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                   | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |                             |        |              |               |          |
| 1455061         | kandesartaan,<br>16mg               | C09CA0<br>6 | CANDESARTAN<br>ACTAVIS, tablett, 28TK    | Actavis Group Ptc<br>ehf.         | 50               |                              |                             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                   | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |                             |        |              |               |          |
| 1487572         | kandesartaan,<br>16mg               | C09CA0<br>6 | CARZAN 16MG, tablett,<br>28TK            | Zentiva k.s.                      | 50               |                              |                             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                   | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |                             |        |              |               |          |
| 1497630         | kandesartaan,<br>16mg               | C09CA0<br>6 | CANOCORD 16 MG,<br>tablett, 30TK         | KRKA, d.d., Novo<br>mesto         | 50               |                              |                             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                   | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |                             |        |              |               |          |
| 1183867         | kandesartaan,<br>32mg               | C09CA0<br>6 | ATACAND, tablett, 28TK                   | Cheplapharm<br>Arzneimittel GmbH  | 50               |                              |                             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                   | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |                             |        |              |               |          |
| 1396470         | kandesartaan,<br>32mg               | C09CA0<br>6 | PRESCANDEN 32MG,<br>tablett, 56TK        | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 50               |                              |                             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                   | 75               | I10-I13, I15-I15,<br>I50-I50 |                             |        |              |               |          |
| 1487651         | kandesartaan,<br>32mg               | C09CA0<br>6 | CARZAN 32MG, tablett,<br>28TK            | Zentiva k.s.                      | 50               |                              |                             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                   | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |                             |        |              |               |          |
| 1497719         | kandesartaan,<br>32mg               | C09CA0<br>6 | CANOCORD 32 MG,<br>tablett, 30TK         | KRKA, d.d., Novo<br>mesto         | 50               |                              |                             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                   | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |                             |        |              |               |          |
| 1497551         | kandesartaan,<br>8mg                | C09CA0<br>6 | CANOCORD 8 MG,<br>tablett, 30TK          | KRKA d.d. Novo<br>mesto           | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |                             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                   | 50               |                              |                             |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                                   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla   | Märkused  |
|-----------------|--|-------------|--|--|------------------|------------------|--|--------|--------------|---|---|
| 1589665         | kandesartaan+aml<br>odipiin,<br>16mg+10mg          | C09DB0<br>7 | ZENICAMO, tablett,<br>28TK   | Zentiva k.s.                               | 50               |                  |  |        |              |   |   |
|                 |  |             |  |  | 75               | I10-I13, I15-I15 |  |        |              |   |   |
| 1355879         | kandesartaan+hüd<br>roklorotiasiid,<br>16mg+12,5mg | C09DA8<br>4 | PRESCANDEN HCT 16<br>MG/12,5 MG, tablett,<br>28TK                    | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.          | 75               | I10-I13, I15-I15 |  |        |              |   |   |
|                 |  |             |  |  | 50               |                  |  |        |              |   |   |
| 1455375         | kandesartaan+hüd<br>roklorotiasiid,<br>16mg+12,5mg | C09DA8<br>4 | CANDESARTAN HCT<br>ACTAVIS, tablett, 28TK                            | Actavis Group Ptc<br>ehf.                  | 75               | I10-I13, I15-I15 |  |        |              |   |   |
|                 |  |             |  |  | 50               |                  |  |        |              |   |   |
| 1487819         | kandesartaan+hüd<br>roklorotiasiid,<br>16mg+12,5mg | C09DA8<br>4 | CARZAN HCT<br>16MG/12,5MG, tablett,<br>28TK                          | Zentiva k.s.                               | 50               |                  |  |        |              |   |   |
|                 |  |             |  |  | 75               | I10-I13, I15-I15 |  |        |              |   |   |
| 1634419         | kandesartaan+hüd<br>roklorotiasiid,<br>16mg+12,5mg | C09DA8<br>4 | CANOCOMBI, tablett,<br>30TK  | KRKA d.d. Novo<br>mesto                    | 50               |                  |  |        |              |   |   |
|                 |  |             |  |  | 75               | I10-I13, I15-I15 |  |        |              |   |   |
| 1634600         | kandesartaan+hüd<br>roklorotiasiid,<br>32mg+12,5mg | C09DA8<br>4 | CANOCOMBI, tablett,<br>30TK  | KRKA d.d. Novo<br>mesto                    | 75               | I10-I13, I15-I15 |  |        |              |   |   |
|                 |  |             |  |  | 50               |                  |  |        |              |   |   |
| 1634329         | kandesartaan+hüd<br>roklorotiasiid,<br>32mg+25mg   | C09DA8<br>4 | CANOCOMBI, tablett,<br>30TK  | KRKA d.d. Novo<br>mesto                    | 75               | I10-I13, I15-I15 |  |        |              |   |   |
|                 |  |             |  |  | 50               |                  |  |        |              |   |   |
| 1634510         | kandesartaan+hüd<br>roklorotiasiid,<br>8mg+12,5mg  | C09DA8<br>4 | CANOCOMBI, tablett,<br>30TK  | KRKA d.d. Novo<br>mesto                    | 50               |                  |  |        |              |   |   |
|                 |  |             |  |  | 75               | I10-I13, I15-I15 |  |        |              |   |   |
| 1801460         | kannabidiool,<br>100mg 1ml                         | N03AX2<br>4 | EPIDYOLEX,<br>suukaudne lahus, 100ml<br>1TK                          | Jazz<br>Pharmaceuticals<br>Ireland Limited | 100              | G40.4-G40.4      | , Pediaater –<br>neuroloog,<br>Neuroloog |        |              |   | koos klobasaamiga Lennox-Gastaut' sündroomi, Dravet' sündroomi või tuberoosse skleroosi kompleksiga seotud epileptiliste hoogude lisaraviks alates 2-aastastel patsientidel, tingimusel, et raviefekti hinnatakse iga 6 kuu järel. Juhul kui ravieelse perioodiga võrreldes ei ole epilepsiahood vähenenud vähemalt 30%, ravi lõpetatakse |
| 1567986         | kapetsitabiin,<br>150mg                            | L01BC0<br>6 | CAPECITABINE<br>ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Accord Healthcare<br>S.L.U.                | 100              | C18-C20          | Onkoloog                                 |        |              |   | kolorektaalvähi adjuvantseks ja palliatiivseks monokemoteraapiaks   |
|                 |  |             |  |  | 50               |                  |  |        |              |   |   |
|                 |  |             |  |  | 100              | C22-C25          | Onkoloog                                 |        |              | biliopankreaatilise süsteemi kasvajate adjuvantraviks |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla  | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|------------------------------|------------------|--|-------------|--------|--------------|--|--|
| 1540099         | kapetsitabiin,<br>500mg             | L01BC0<br>6 | CAPECITABINE<br>ZENTIVA 500 MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>120TK | Zentiva k.s.                 | 100              | C18-C20  | Onkoloog    |        |              |  | kolorektaalvähi adjuvantseks ja palliatiivseks<br>monokemoteraapiaks |
|                 |                                     |             |  |                              | 100              | C22-C25  | Onkoloog    |        |              | biliopankreaatilise süsteemi kasvajate adjuvantraviks                |  |
|                 |                                     |             |  |                              | 50               |  |             |        |              |  |  |
| 1568055         | kapetsitabiin,<br>500mg             | L01BC0<br>6 | CAPECITABINE<br>ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>120TK            | Accord Healthcare<br>S.L.U.  | 50               |  |             |        |              |  |  |
|                 |                                     |             |  |                              | 100              | C22-C25  | Onkoloog    |        |              | biliopankreaatilise süsteemi kasvajate adjuvantraviks                |  |
|                 |                                     |             |  |                              | 100              | C18-C20  | Onkoloog    |        |              | kolorektaalvähi adjuvantseks ja palliatiivseks<br>monokemoteraapiaks |  |
| 1077117         | karbamasepiin,<br>150mg             | N03AF0<br>1 | TIMONIL 150 RETARD,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 100TK  | Desitin<br>Arzneimittel GmbH | 100              | F32.2-F32.3,<br>F70-F79, F11.4-<br>F11.7, F18.4-<br>F18.7, F20-F29,<br>F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7,<br>F19.4-F19.7,<br>F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7,<br>F00-F09, F60.3-<br>F60.3, F13.4-<br>F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-<br>F17.7, F15.4-<br>F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane |              |  |  |
|                 |                                     |             |  |                              | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |              |  |  |
|                 |                                     |             |  |                              | 75               | G50.0-G50.0  |             |        |              |  |  |
|                 |                                     |             |  |                              | 50               |  |             |        |              |  |  |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|------------------------------|------------------|--|-------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1042311         | karbamasepiin,<br>200mg             | N03AF0<br>1 | CARBALEX 200 MG,<br>tablett, 50TK   | G.L. Pharma<br>GmbH          | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                              | 75               | G50.0-G50.0  |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                              | 50               |  |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                              | 100              | F32.2-F32.3,<br>F70-F79, F11.4-<br>F11.7, F18.4-<br>F18.7, F20-F29,<br>F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7,<br>F19.4-F19.7,<br>F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7,<br>F00-F09, F60.3-<br>F60.3, F13.4-<br>F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-<br>F17.7, F15.4-<br>F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
| 1077207         | karbamasepiin,<br>300mg             | N03AF0<br>1 | TIMONIL 300 RETARD,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 100TK | Desitin<br>Arzneimittel GmbH | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                              | 50               |  |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                              | 100              | F32.2-F32.3,<br>F70-F79, F11.4-<br>F11.7, F18.4-<br>F18.7, F20-F29,<br>F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7,<br>F19.4-F19.7,<br>F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7,<br>F00-F09, F60.3-<br>F60.3, F13.4-<br>F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-<br>F17.7, F15.4-<br>F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                              | 75               | G50.0-G50.0  |             |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|---------------------|------------------|--|-------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1115592         | karbamasepiin,<br>300mg             | N03AF0<br>1 | CARBALEX RETARD<br>300 MG, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 50TK | G.L. Pharma<br>GmbH | 50               |  |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                     | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                     | 75               | G50.0-G50.0  |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                     | 100              | F18.4-F18.7,<br>F33.2-F33.3,<br>F70-F79, F00-<br>F09, F15.4-<br>F15.7, F14.4-<br>F14.7, F12.4-<br>F12.7, F30-F31,<br>F11.4-F11.7,<br>F60.3-F60.3,<br>F10.4-F10.7,<br>F16.4-F16.7,<br>F32.2-F32.3,<br>F13.4-F13.7,<br>F20-F29, F19.4-<br>F19.7                | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
| 1042322         | karbamasepiin,<br>400mg             | N03AF0<br>1 | CARBALEX 400 MG,<br>tablett, 50TK  | G.L. Pharma<br>GmbH | 50               |  |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                     | 100              | F32.2-F32.3,<br>F70-F79, F11.4-<br>F11.7, F18.4-<br>F18.7, F20-F29,<br>F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7,<br>F19.4-F19.7,<br>F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7,<br>F00-F09, F60.3-<br>F60.3, F13.4-<br>F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-<br>F17.7, F15.4-<br>F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                     | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                     | 75               | G50.0-G50.0  |             |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|------------------------------|------------------|--|-------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1007716         | karbamasepiin,<br>600mg             | N03AF0<br>1 | TIMONIL 600 RETARD,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 50TK     | Desitin<br>Arzneimittel GmbH | 50               |  |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                              | 100              | F32.2-F32.3,<br>F70-F79, F11.4-<br>F11.7, F18.4-<br>F18.7, F20-F29,<br>F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7,<br>F19.4-F19.7,<br>F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7,<br>F00-F09, F60.3-<br>F60.3, F13.4-<br>F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-<br>F17.7, F15.4-<br>F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                              | 75               | G50.0-G50.0  |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                              | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |              |               |          |
| 1042333         | karbamasepiin,<br>600mg             | N03AF0<br>1 | CARBALEX RETARD<br>600 MG, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 50TK | G.L. Pharma<br>GmbH          | 75               | G50.0-G50.0  |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                              | 100              | F32.2-F32.3,<br>F70-F79, F11.4-<br>F11.7, F18.4-<br>F18.7, F20-F29,<br>F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7,<br>F19.4-F19.7,<br>F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7,<br>F00-F09, F60.3-<br>F60.3, F13.4-<br>F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-<br>F17.7, F15.4-<br>F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                              | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                              | 50               |  |             |        |              |               |          |
| 1749821         | kariprasiin, 1,5mg                  | N05AX1<br>5 | REAGILA, kõvakapsel,<br>28TK   | Gedeon Richter<br>Plc.       | 100              | F20-F29, F30-<br>F31   | Psühhiaater |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                    | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |
|-----------------|--|-------------|---|-----------------------------|------------------|---|-------------|--------|--------------|---------------|--|
| 1749922         | kariprasiin, 3mg                                       | N05AX1<br>5 | REAGILA, kõvakapsel,<br>28TK                                    | Gedeon Richter<br>Plc.      | 100              | F20-F29, F30-<br>F31  | Psühhiaater |        |              |               |  |
| 1750025         | kariprasiin, 4,5mg                                     | N05AX1<br>5 | REAGILA, kõvakapsel,<br>28TK                                    | Gedeon Richter<br>Plc.      | 100              | F20-F29, F30-<br>F31  | Psühhiaater |        |              |               |  |
| 1750104         | kariprasiin, 6mg                                       | N05AX1<br>5 | REAGILA, kõvakapsel,<br>28TK                                    | Gedeon Richter<br>Plc.      | 100              | F20-F29, F30-<br>F31  | Psühhiaater |        |              |               |  |
| 1110564         | karvedilool,<br>12,5mg                                 | C07AG0<br>2 | CARVEDILOLHEXAL<br>12,5 MG, tablett, 30TK                       | Hexal AG                    | 50               |   |             |        |              |               |  |
|                 |  |             |   |                             | 75               | I50-I50, I47-I49  |             |        |              |               |  |
| 1110520         | karvedilool, 25mg                                      | C07AG0<br>2 | CARVEDILOLHEXAL 25<br>MG, tablett, 30TK                         | Hexal AG                    | 75               | I50-I50, I47-I49  |             |        |              |               |  |
|                 |  |             |   |                             | 50               |   |             |        |              |               |  |
| 1110609         | karvedilool,<br>6,25mg                                 | C07AG0<br>2 | CARVEDILOLHEXAL<br>6,25 MG, tablett, 30TK                       | Hexal AG                    | 75               | I50-I50, I47-I49  |             |        |              |               |  |
|                 |  |             |   |                             | 50               |   |             |        |              |               |  |
| 1115637         | keskmise<br>toimeajaga<br>humaaninsuliin,<br>100RÜ 1ml | A10AC0<br>1 | HUMULIN N KWIKPEN,<br>süstesuspensioon pen-<br>süstlis, 3ml 5TK | Eli Lilly Nederland<br>B.V. | 100              | O24-O24, E13-<br>E14, E10-E11,<br>P70.2-P70.2,<br>E89.1-E89.1 |             |        |              |               |  |
|                 |  |             |   |                             | 50               |   |             |        |              |               |  |
| 1018189         | ketokonasool,<br>20mg 1g                               | D01AC0<br>8 | NIZORAL, kreem, 15g<br>1TK                                      | Stada Arzneimittel<br>AG    | 50               |   |             |        |              |               |  |
| 1073461         | ketoprofeen,<br>100mg                                  | M01AE0<br>3 | KETO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK              | Vitabalans Oy               | 75               | M15-M19   |             |        | 63,00        |               |  |
|                 |  |             |   |                             | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46                                 |             |        |              |               |  |
|                 |  |             |   |                             | 50               |   |             |        |              |               |  |
|                 |  |             |   |                             | 100              | C00-D48   |             |        |              |               |  |
| 1073483         | ketoprofeen,<br>100mg                                  | M01AE0<br>3 | KETO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK             | Vitabalans Oy               | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46                                 |             |        |              |               |  |
|                 |  |             |   |                             | 100              | C00-D48   |             |        |              |               |  |
|                 |  |             |   |                             | 50               |   |             |        |              |               |  |
|                 |  |             |   |                             | 75               | M15-M19   |             |        | 63,00        |               |  |
| 1752443         | kladribiin, 10mg                                       | L04AA4<br>0 | MAVENCLAD, tablett,<br>1TK                                      | Merck Europe B.V.           | 100              | G35-G35   | Neuroloog   | esmane |              |               | konsiiliumi (3 neuroloogi ühise otsuse alusel (ägenemiste<br>ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks |
| 1028887         | klaritromütsiin,<br>250mg                              | J01FA09     | FROMILID, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK          | KRKA, d.d., Novo<br>mesto   | 75               | H65-H67, J13-<br>J18  |             |        |              | 16,00         | kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või<br>fenoksümetüülpenitsilliiniga                                  |
|                 |  |             |   |                             | 50               |   |             |        |              |               |  |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja        | Soodus-tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla   | Märkused   |
|-------------|-------------------------------|----------|---|------------------------|--------------|------------------|--------|--------|-----------|--|--|
| 1032747     | klaritromütsiin, 250mg        | J01FA09  | KLACID 250 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK               | Viartis SIA            | 50           |                  |        |        |           |  |  |
|             |                               |          |   |                        | 75           | H65-H67, J13-J18 |        |        | 16,00     | kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliiniga |  |
| 1110261     | klaritromütsiin, 250mg        | J01FA09  | KLERIMED 250MG, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK              | Medochemie Limited     | 75           | H65-H67, J13-J18 |        |        |           | 16,00  | kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliiniga |
|             |                               |          |   |                        | 50           |                  |        |        |           |  |  |
| 1549582     | klaritromütsiin, 250mg        | J01FA09  | CLARITHROMYCIN GRINDEKS, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK     | Grindeks AS            | 75           | H65-H67, J13-J18 |        |        |           | 16,00  | kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliiniga |
|             |                               |          |   |                        | 50           |                  |        |        |           |  |  |
| 1068881     | klaritromütsiin, 25mg 1ml     | J01FA09  | KLACID 125 MG/5 ML, suukaudse suspensiooni graanulid, 100ml 1TK     | Viartis SIA            | 75           | H65-H67, J13-J18 |        |        |           | 16,00  | kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliiniga |
|             |                               |          |   |                        | 50           |                  |        |        |           |  |  |
| 1028876     | klaritromütsiin, 500mg        | J01FA09  | FROMILID, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK                    | KRKA, d.d., Novo mesto | 75           | H65-H67, J13-J18 |        |        |           | 16,00  | kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliiniga |
|             |                               |          |   |                        | 50           |                  |        |        |           |  |  |
| 1032758     | klaritromütsiin, 500mg        | J01FA09  | KLACID SR 500 MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 5TK | Viartis SIA            | 50           |                  |        |        |           |  |  |
|             |                               |          |   |                        | 75           | H65-H67, J13-J18 |        |        | 16,00     | kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliiniga |  |
| 1068904     | klaritromütsiin, 500mg        | J01FA09  | KLACID SR 500 MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 7TK | Viartis SIA            | 75           | H65-H67, J13-J18 |        |        |           | 16,00  | kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliiniga |
|             |                               |          |   |                        | 50           |                  |        |        |           |  |  |
| 1110238     | klaritromütsiin, 500mg        | J01FA09  | KLERIMED 500MG, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK              | Medochemie Limited     | 50           |                  |        |        |           |  |  |
|             |                               |          |   |                        | 75           | H65-H67, J13-J18 |        |        | 16,00     | kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliiniga |  |
| 1141276     | klaritromütsiin, 500mg        | J01FA09  | FROMILID UNO, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 5TK     | KRKA, d.d., Novo mesto | 50           |                  |        |        |           |  |  |
|             |                               |          |   |                        | 75           | H65-H67, J13-J18 |        |        | 16,00     | kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliiniga |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                                    | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|--|------------------|----------------------|--------|--------|--------------|---------------|---|
| 1141287         | klaritromütsiin,<br>500mg           | J01FA09     | FROMILID UNO,<br>toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 7TK | KRKA, d.d., Novo<br>mesto                          | 75               | H65-H67, J13-<br>J18 |        |        |              | 16,00         | kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või<br>fenoksümetüülpenitsilliiniga |
|                 |                                     |             |  |  | 50               |                      |        |        |              |               |   |
| 1166677         | klaritromütsiin,<br>500mg           | J01FA09     | KLABAX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK                     | Sun<br>Pharmaceutical<br>Industries Europe<br>B.V. | 75               | H65-H67, J13-<br>J18 |        |        |              | 16,00         | kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või<br>fenoksümetüülpenitsilliiniga |
|                 |                                     |             |  |  | 50               |                      |        |        |              |               |   |
| 1405460         | klaritromütsiin,<br>500mg           | J01FA09     | KLACID, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK                     | Viatris SIA  | 75               | H65-H67, J13-<br>J18 |        |        |              | 16,00         | kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või<br>fenoksümetüülpenitsilliiniga |
|                 |                                     |             |  |  | 50               |                      |        |        |              |               |   |
| 1549627         | klaritromütsiin,<br>500mg           | J01FA09     | CLARITHROMYCIN<br>GRINDEKS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK | Grindeks AS  | 50               |                      |        |        |              |               |   |
|                 |                                     |             |  |  | 75               | H65-H67, J13-<br>J18 |        |        |              | 16,00         | kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või<br>fenoksümetüülpenitsilliiniga |
| 1011160         | klindamütsiin,<br>100mg             | G01AA1<br>0 | DALACIN,<br>vaginaalsuposiit, 3TK  | Pfizer Europe MA<br>EEIG                           | 50               |                      |        |        |              |               |   |
| 1007503         | klindamütsiin,<br>150mg             | J01FF01     | DALACIN C,<br>kõvakapsel, 16TK   | Pfizer Europe MA<br>EEIG                           | 50               |                      |        |        |              |               |   |
| 1007536         | klindamütsiin,<br>300mg             | J01FF01     | DALACIN C,<br>kõvakapsel, 16TK   | Pfizer Europe MA<br>EEIG                           | 50               |                      |        |        |              |               |   |
| 1108561         | klindamütsiin,<br>300mg             | J01FF01     | CLINDAMYCIN - MIP<br>300, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>16TK   | MIP Pharma<br>GmbH                                 | 50               |                      |        |        |              |               |   |
| 1865101         | klindamütsiin,<br>300mg             | J01FF01     | DALACIN C,<br>kõvakapsel, 16TK   | Lex Ano UAB  | 50               |                      |        |        |              |               |   |
| 1108606         | klindamütsiin,<br>600mg             | J01FF01     | CLINDAMYCIN - MIP<br>600, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>16TK   | MIP Pharma<br>GmbH                                 | 50               |                      |        |        |              |               |   |
| 1432268         | klindamütsiin,<br>600mg             | J01FF01     | CLINDAMYCIN - MIP<br>600, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>32TK   | MIP Pharma<br>GmbH                                 | 50               |                      |        |        |              |               |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus            | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja                      | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala                  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|--|-------------|--|--------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1527814         | klindamütsiin+treti<br>noin,<br>10mg+0,25mg 1g | D10AF8<br>2 | TRECLINAC, geel, 30g<br>1TK  | VIATRIS<br>HEALTHCARE<br>Limited     | 50               |                      |                         |        |              |               |          |
| 1005208         | klobetasool,<br>500mcg 1g                      | D07AD0<br>1 | DERMOVATE<br>OINTMENT, salv, 25g<br>1TK                                  | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited | 50               |                      |                         |        |              |               |          |
| 1005242         | klobetasool,<br>500mcg 1g                      | D07AD0<br>1 | DERMOVATE CREAM,<br>kreem, 25g 1TK                                       | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited | 50               |                      |                         |        |              |               |          |
| 1005286         | klobetasool,<br>500mcg 1ml                     | D07AD0<br>1 | DERMOVATE,<br>nahalahus, 25ml 1TK  | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited | 50               |                      |                         |        |              |               |          |
| 1829325         | klobetasool,<br>500mcg 1ml                     | D07AD0<br>1 | DERMOVATE,<br>nahalahus, 25ml 1TK  | Lex Ano UAB                          | 50               |                      |                         |        |              |               |          |
| 1842386         | klobetasool,<br>500mcg 1ml                     | D07AD0<br>1 | DERMOVATE,<br>nahalahus, 25ml 1TK  | Ideal Trade Links<br>UAB             | 50               |                      |                         |        |              |               |          |
| 3041659         | klobetasool,<br>500mcg 1ml                     | D07AD0<br>1 | DERMOVATE,<br>nahalahus, 50ml 1TK  | Lex Ano UAB                          | 50               |                      |                         |        |              |               |          |
| 1011407         | klomipramiin,<br>10mg                          | N06AA0<br>4 | ANAFRANIL, kaetud<br>tablett, 30TK                                       | pharmaand GmbH                       | 50               |                      |                         |        |              |               |          |
| 1001462         | klomipramiin,<br>25mg                          | N06AA0<br>4 | ANAFRANIL, kaetud<br>tablett, 30TK                                       | Pharmaand GmbH                       | 50               |                      |                         |        |              |               |          |
| 1011418         | klomipramiin,<br>75mg                          | N06AA0<br>4 | ANAFRANIL SR,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 20TK | pharmaand GmbH                       | 50               |                      |                         |        |              |               |          |
| 1004544         | klonasepaam,<br>2mg                            | N03AE0<br>1 | RIVOTRIL, tablett, 30TK  | Cheplapharm<br>Arzneimittel GmbH     | 50               | G20-G26, G63-<br>G63 |                         |        |              |               |          |
|                 |  |             |  |                                      | 100              | G40-G40              | Neuroloog               | esmane |              |               |          |
| 1007345         | kloorambutsiil,<br>2mg                         | L01AA0<br>2 | LEUKERAN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>25TK                   | Aspen Pharma<br>Trading Limited      | 50               |                      |                         |        |              |               |          |
|                 |  |             |  |                                      | 100              | C00-D48              | Onkoloog,<br>Hematoloog |        |              |               |          |
| 1044357         | klooramfenikool,<br>5mg 1ml                    | S01AA0<br>1 | OFTAN AKVAKOL,<br>silmatilgad, lahus, 10ml<br>1TK                        | Santen Oy                            | 50               |                      |                         |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus               | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|---|-------------|---|------------------------|------------------|--|-------------|--------|--------------|---------------|---|
| 1356937         | kloormadinoon+et<br>ünüülöstradiol,<br>2mg+0,03mg | G03AA1<br>5 | CLORMETIN 2 MG/0,03<br>MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>21TK | Exeltis Baltics<br>UAB | 75               | Z30-Z30  |             |        |              |               | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
|                 |   |             |   |                        | 50               |  |             |        |              |               |   |
| 1356948         | kloormadinoon+et<br>ünüülöstradiol,<br>2mg+0,03mg | G03AA1<br>5 | CLORMETIN 2 MG/0,03<br>MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>63TK | Exeltis Baltics<br>UAB | 75               | Z30-Z30  |             |        |              |               | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
|                 |   |             |   |                        | 50               |  |             |        |              |               |   |
| 1006063         | kloorprotikseen,<br>25mg                          | N05AF0<br>3 | TRUXAL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK                   | H. Lundbeck A/S        | 100              | F32.2-F32.3,<br>F70-F79, F11.4-<br>F11.7, F18.4-<br>F18.7, F20-F29,<br>F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7,<br>F19.4-F19.7,<br>F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7,<br>F00-F09, F60.3-<br>F60.3, F13.4-<br>F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-<br>F17.7, F15.4-<br>F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane |              |               |   |
|                 |   |             |   |                        | 50               |  |             |        |              |               |   |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala                  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|---------------------------|------------------|--|-------------------------|--------|--------------|---------------|--|
| 1006096         | kloorprotikseen,<br>50mg            | N05AF0<br>3 | TRUXAL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>50TK                           | H. Lundbeck A/S           | 50               |  |                         |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |  |                           | 100              | F32.2-F32.3,<br>F70-F79, F11.4-<br>F11.7, F18.4-<br>F18.7, F20-F29,<br>F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7,<br>F19.4-F19.7,<br>F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7,<br>F00-F09, F60.3-<br>F60.3, F13.4-<br>F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-<br>F17.7, F15.4-<br>F15.7, F30-F31 | Psühhiaater             | esmane |              |               |  |
| 1040588         | klopidogreel,<br>75mg               | B01AC0<br>4 | PLAVIX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                           | Sanofi-Aventis<br>Groupe  | 75               | Z95-Z95, I21-<br>I22, I25.2-I25.2  | Sisearst,<br>Kardioloog | esmane |              |               | müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika<br>järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12<br>kuu vältel |
|                 |                                     |             |  |                           | 50               |  |                         |        |              |               |  |
| 1065743         | klopidogreel,<br>75mg               | B01AC0<br>4 | PLAVIX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>84TK                           | Sanofi-Aventis<br>Groupe  | 75               | Z95-Z95, I21-<br>I22, I25.2-I25.2  | Kardioloog,<br>Sisearst | esmane |              |               | müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika<br>järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12<br>kuu vältel |
|                 |                                     |             |  |                           | 50               |  |                         |        |              |               |  |
| 1357141         | klopidogreel,<br>75mg               | B01AC0<br>4 | TROMBEX 75 MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                 | Zentiva k.s.              | 75               | Z95-Z95, I21-<br>I22, I25.2-I25.2  | Sisearst,<br>Kardioloog | esmane |              |               | müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika<br>järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12<br>kuu vältel |
|                 |                                     |             |  |                           | 50               |  |                         |        |              |               |  |
| 1367197         | klopidogreel,<br>75mg               | B01AC0<br>4 | CLOPIDOGREL<br>SANOSWISS 75MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Sanoswiss UAB             | 50               |  |                         |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |  |                           | 75               | Z95-Z95, I21-<br>I22, I25.2-I25.2  | Kardioloog,<br>Sisearst | esmane |              |               | müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika<br>järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12<br>kuu vältel |
| 1431256         | klopidogreel,<br>75mg               | B01AC0<br>4 | CLOPIDOGREL<br>ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK            | Accord Healthcare<br>B.V. | 50               |  |                         |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |  |                           | 75               | Z95-Z95, I21-<br>I22, I25.2-I25.2  | Kardioloog,<br>Sisearst | esmane |              |               | müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika<br>järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12<br>kuu vältel |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala                  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|---------------------------|------------------|--|-------------------------|--------|--------------|---------------|--|
| 1437465         | klopidogreel,<br>75mg               | B01AC0<br>4 | ZYLLT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK               | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 50               |  |                         |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |   |                           | 75               | Z95-Z95, I21-<br>I22, I25.2-I25.2  | Kardioloog,<br>Sisearst | esmane |              |               | müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12 kuu vältel |
| 1437500         | klopidogreel,<br>75mg               | B01AC0<br>4 | ZYLLT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>84TK               | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 50               |  |                         |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |   |                           | 75               | Z95-Z95, I21-<br>I22, I25.2-I25.2  | Kardioloog,<br>Sisearst | esmane |              |               | müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12 kuu vältel |
| 1448489         | klopidogreel,<br>75mg               | B01AC0<br>4 | CLOPIDOGREL KRKA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>84TK | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 50               |  |                         |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |   |                           | 75               | Z95-Z95, I21-<br>I22, I25.2-I25.2  | Kardioloog,<br>Sisearst | esmane |              |               | müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12 kuu vältel |
| 1004724         | klosapiin, 100mg                    | N05AH0<br>2 | LEPONEX, tablett, 50TK  | Viatris SIA               | 50               |  |                         |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |   |                           | 100              | F32.2-F32.3,<br>F70-F79, F11.4-<br>F11.7, F18.4-<br>F18.7, F20-F29,<br>F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7,<br>F19.4-F19.7,<br>F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7,<br>F00-F09, F60.3-<br>F60.3, F13.4-<br>F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-<br>F17.7, F15.4-<br>F15.7, F30-F31 |                         |        |              |               |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus              | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|--|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1663859         | klosapiin, 100mg                    | N05AH0<br>2 | CLOZAPINE ACCORD,<br>tablett, 50TK | Accord Healthcare<br>B.V. | 50               |  |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                    |                           | 100              | F32.2-F32.3,<br>F70-F79, F11.4-<br>F11.7, F18.4-<br>F18.7, F20-F29,<br>F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7,<br>F19.4-F19.7,<br>F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7,<br>F00-F09, F60.3-<br>F60.3, F13.4-<br>F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-<br>F17.7, F15.4-<br>F15.7, F30-F31 |        |        |              |               |          |
| 1004768         | klosapiin, 25mg                     | N05AH0<br>2 | LEPONEX, tablett, 50TK             | Viatris SIA               | 100              | F32.2-F32.3,<br>F70-F79, F11.4-<br>F11.7, F18.4-<br>F18.7, F20-F29,<br>F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7,<br>F19.4-F19.7,<br>F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7,<br>F00-F09, F60.3-<br>F60.3, F13.4-<br>F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-<br>F17.7, F15.4-<br>F15.7, F30-F31 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                    |                           | 50               |  |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus      | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|--|-------------|--|---|------------------|--|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1663657         | klosapiin, 25mg                          | N05AH0<br>2 | CLOZAPINE ACCORD,<br>tablett, 30TK                                 | Accord Healthcare<br>B.V.                         | 100              | F32.2-F32.3,<br>F70-F79, F11.4-<br>F11.7, F18.4-<br>F18.7, F20-F29,<br>F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7,<br>F19.4-F19.7,<br>F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7,<br>F00-F09, F60.3-<br>F60.3, F13.4-<br>F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-<br>F17.7, F15.4-<br>F15.7, F30-F31 |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |  |   | 50               |  |        |        |              |               |          |
| 1033692         | klotrimasool,<br>1%/100mg                | G01AF0<br>2 | CANIFUG CREMOLUM,<br>kreem +<br>vaginaalsuposiit, 20g<br>1TK / 6TK | Dr. August Wolff<br>GmbH & Co. KG<br>Arzneimittel | 50               |  |        |        |              |               |          |
| 1033726         | klotrimasool,<br>100mg                   | G01AF0<br>2 | CANIFUG CREMOLUM,<br>vaginaalsuposiit, 6TK                         | Dr. August Wolff<br>GmbH & Co. KG<br>Arzneimittel | 50               |  |        |        |              |               |          |
| 1045123         | klotrimasool,<br>100mg                   | G01AF0<br>2 | KLOTTRIMASOOL GSK,<br>vaginaaltablett, 6TK                         | GlaxoSmithKline<br>Trading Services<br>Limited    | 50               |  |        |        |              |               |          |
| 1831014         | klotrimasool,<br>100mg                   | G01AF0<br>2 | KLOTTRIMASOOL GSK,<br>vaginaaltablett, 6TK                         | Ideal Trade Links<br>UAB                          | 50               |  |        |        |              |               |          |
| 1893562         | klotrimasool,<br>100mg                   | G01AF0<br>2 | KLOTTRIMASOOL GSK,<br>vaginaaltablett, 6TK                         | Ideal Trade Links<br>UAB                          | 50               |  |        |        |              |               |          |
| 1140815         | kodeiin+paratseta<br>mool,<br>30mg+500mg | N02AJ0<br>6 | PARACETAMOL/CODEI<br>NE VITABALANS,<br>tablett, 30TK               | Vitalbans Oy                                      | 50               |  |        |        |              |               |          |
| 1140826         | kodeiin+paratseta<br>mool,<br>30mg+500mg | N02AJ0<br>6 | PARACETAMOL/CODEI<br>NE VITABALANS,<br>tablett, 100TK              | Vitalbans Oy                                      | 50               |  |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus      | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|--|-------------|---|----------------------------------|------------------|----------------------|-------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1485187         | kodeiin+paratseta<br>mool,<br>30mg+500mg | N02AJ0<br>6 | ALGOCALM, tablett,<br>30TK  | Zentiva k.s.                     | 50               |                      |             |        |              |               |          |
| 1485200         | kodeiin+paratseta<br>mool,<br>30mg+500mg | N02AJ0<br>6 | ALGOCALM, tablett,<br>100TK   | Zentiva k.s.                     | 50               |                      |             |        |              |               |          |
| 1241356         | kvetiapiin, 100mg                        | N05AH0<br>4 | KETIPINOR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK                      | Orion Corporation                | 100              | F20-F29, F30-<br>F31 | Psühhiaater |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |                                  | 50               |                      |             |        |              |               |          |
| 1258297         | kvetiapiin, 100mg                        | N05AH0<br>4 | KVENTIAX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK                        | KRKA, d.d., Novo<br>mesto        | 50               |                      |             |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |                                  | 100              | F20-F29, F30-<br>F31 | Psühhiaater |        |              |               |          |
| 3048544         | kvetiapiin, 100mg                        | N05AH0<br>4 | KVENTIAX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK                        | Ideal Trade Links<br>UAB         | 50               |                      |             |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |                                  | 100              | F20-F29, F30-<br>F31 | Psühhiaater |        |              |               |          |
| 1636792         | kvetiapiin, 150mg                        | N05AH0<br>4 | KVENTIAX SR,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 60TK       | KRKA, d.d., Novo<br>mesto        | 100              | F20-F29, F30-<br>F31 | Psühhiaater |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |                                  | 50               |                      |             |        |              |               |          |
| 1683750         | kvetiapiin, 150mg                        | N05AH0<br>4 | QUETIAPINE ACCORD,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 60TK | Accord Healthcare<br>B.V.        | 100              | F20-F29, F30-<br>F31 | Psühhiaater |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |                                  | 50               |                      |             |        |              |               |          |
| 1115086         | kvetiapiin, 200mg                        | N05AH0<br>4 | SEROQUEL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK                        | Cheplapharm<br>Arzneimittel GmbH | 50               |                      |             |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |                                  | 100              | F20-F29, F30-<br>F31 | Psühhiaater |        |              |               |          |
| 1241378         | kvetiapiin, 200mg                        | N05AH0<br>4 | KETIPINOR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK                      | Orion Corporation                | 100              | F20-F29, F30-<br>F31 | Psühhiaater |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |                                  | 50               |                      |             |        |              |               |          |
| 1258477         | kvetiapiin, 200mg                        | N05AH0<br>4 | KVENTIAX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK                        | KRKA, d.d., Novo<br>mesto        | 100              | F20-F29, F30-<br>F31 | Psühhiaater |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |                                  | 50               |                      |             |        |              |               |          |
| 1301847         | kvetiapiin, 200mg                        | N05AH0<br>4 | QUETIAPINE TEVA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK              | Teva Pharma B.V.                 | 100              | F20-F29, F30-<br>F31 | Psühhiaater |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |                                  | 50               |                      |             |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|---------------------------|------------------|----------------------|-------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1454059         | kvetiapiin, 200mg                   | N05AH0<br>4 | QUETIAPINE ACCORD,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 60TK | Accord Healthcare<br>B.V. | 50               |                      |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                           | 100              | F20-F29, F30-<br>F31 | Psühhiaater |        |              |               |          |
| 1636859         | kvetiapiin, 200mg                   | N05AH0<br>4 | KVENTIAX SR,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 60TK       | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 50               |                      |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                           | 100              | F20-F29, F30-<br>F31 | Psühhiaater |        |              |               |          |
| 1241334         | kvetiapiin, 25mg                    | N05AH0<br>4 | KETIPINOR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK                      | Orion Corporation         | 50               |                      |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                           | 100              | F20-F29, F30-<br>F31 | Psühhiaater |        |              |               |          |
| 1258208         | kvetiapiin, 25mg                    | N05AH0<br>4 | KVENTIAX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                        | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 100              | F20-F29, F30-<br>F31 | Psühhiaater |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                           | 50               |                      |             |        |              |               |          |
| 1258242         | kvetiapiin, 25mg                    | N05AH0<br>4 | KVENTIAX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK                       | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 100              | F20-F29, F30-<br>F31 | Psühhiaater |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                           | 50               |                      |             |        |              |               |          |
| 1377503         | kvetiapiin, 25mg                    | N05AH0<br>4 | QUETIAPINE TEVA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK              | Teva Pharma B.V.          | 100              | F20-F29, F30-<br>F31 | Psühhiaater |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                           | 50               |                      |             |        |              |               |          |
| 1879690         | kvetiapiin, 25mg                    | N05AH0<br>4 | KETIPINOR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK                      | Ideal Trade Links<br>UAB  | 50               |                      |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                           | 100              | F20-F29, F30-<br>F31 | Psühhiaater |        |              |               |          |
| 1301937         | kvetiapiin, 300mg                   | N05AH0<br>4 | QUETIAPINE TEVA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK              | Teva Pharma B.V.          | 100              | F20-F29, F30-<br>F31 | Psühhiaater |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                           | 50               |                      |             |        |              |               |          |
| 1454149         | kvetiapiin, 300mg                   | N05AH0<br>4 | QUETIAPINE ACCORD,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 60TK | Accord Healthcare<br>B.V. | 50               |                      |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                           | 100              | F20-F29, F30-<br>F31 | Psühhiaater |        |              |               |          |
| 1496998         | kvetiapiin, 300mg                   | N05AH0<br>4 | QUETIAPINE TEVA,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 60TK   | Teva Pharma B.V.          | 100              | F20-F29, F30-<br>F31 | Psühhiaater |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                           | 50               |                      |             |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                      | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala        | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|--------------------------------------|------------------|----------------------|---------------|--------|--------------|---------------|---|
| 1895610         | kvetiapiin, 300mg                   | N05AH0<br>4 | QUETIAPINE TEVA,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 60TK   | Ideal Trade Links<br>UAB             | 100              | F20-F29, F30-<br>F31 | Psühhiaater   |        |              |               |   |
|                 |                                     |             |   |                                      | 50               |                      |               |        |              |               |   |
| 1454206         | kvetiapiin, 400mg                   | N05AH0<br>4 | QUETIAPINE ACCORD,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 60TK | Accord Healthcare<br>B.V.            | 50               |                      |               |        |              |               |   |
|                 |                                     |             |   |                                      | 100              | F20-F29, F30-<br>F31 | Psühhiaater   |        |              |               |   |
| 1497067         | kvetiapiin, 400mg                   | N05AH0<br>4 | QUETIAPINE TEVA,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 60TK   | Teva Pharma B.V.                     | 50               |                      |               |        |              |               |   |
|                 |                                     |             |   |                                      | 100              | F20-F29, F30-<br>F31 | Psühhiaater   |        |              |               |   |
| 1724510         | kvetiapiin, 400mg                   | N05AH0<br>4 | KVENTIAX SR,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 60TK       | KRKA, d.d., Novo<br>mesto            | 50               |                      |               |        |              |               |   |
|                 |                                     |             |   |                                      | 100              | F20-F29, F30-<br>F31 | Psühhiaater   |        |              |               |   |
| 1895777         | kvetiapiin, 400mg                   | N05AH0<br>4 | QUETIAPINE TEVA,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 60TK   | Ideal Trade Links<br>UAB             | 100              | F20-F29, F30-<br>F31 | Psühhiaater   |        |              |               |   |
|                 |                                     |             |   |                                      | 50               |                      |               |        |              |               |   |
| 1555253         | kvetiapiin, 50mg                    | N05AH0<br>4 | QUETIAPINE ACCORD,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | Accord Healthcare<br>B.V.            | 50               |                      |               |        |              |               |   |
|                 |                                     |             |   |                                      | 100              | F20-F29, F30-<br>F31 | Psühhiaater   |        |              |               |   |
| 1007828         | labetalool, 100mg                   | C07AG0<br>1 | TRANDATE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>50TK                        | Aspen Pharma<br>Trading Limited      | 50               |                      |               |        |              |               |   |
|                 |                                     |             |   |                                      | 75               | O10-O16              |               |        |              |               |   |
| 1043042         | lamivudiin, 100mg                   | J05AF05     | ZEFFIX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                          | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited | 50               |                      |               |        |              |               |   |
| 1025873         | lamivudiin, 150mg                   | J05AF05     | EPIVIR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK                          | Viiv Healthcare<br>B.V.              | 50               |                      | Infektsionist |        |              |               | HIV-nakkuse profülaktikaks, v a tööülesannete täitmisega<br>seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega |
| 1379123         | lamotrigiin, 100mg                  | N03AX0<br>9 | LAMICTAL 100MG,<br>närimis-/dispergeeruv<br>tablett, 28TK                     | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited | 100              | G40-G40              | Neuroloog     | esmane |              |               |   |
|                 |                                     |             |   |                                      | 100              | F30-F31              | Psühhiaater   |        |              |               |   |
|                 |                                     |             |   |                                      | 50               |                      |               |        |              |               |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                    | Müügiloa hoidja   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                 | Eriala  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|---|------------------|--------------------------|---|--------|--------------|---------------|---|
| 1394210         | lamotrigiin, 25mg                   | N03AX0<br>9 | LAMICTAL 25MG,<br>närimis-/dispergeeruv<br>tablett, 28TK | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited                            | 50               |                          |   |        |              |               |   |
|                 |                                     |             |  |   | 100              | G40-G40                  | Neuroloog   | esmane |              |               |   |
|                 |                                     |             |  |   | 100              | F30-F31                  | Psühhiaater   |        |              |               |   |
| 1379088         | lamotrigiin, 50mg                   | N03AX0<br>9 | LAMICTAL 50MG,<br>närimis-/dispergeeruv<br>tablett, 28TK | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited                            | 100              | G40-G40                  | Neuroloog   | esmane |              |               |   |
|                 |                                     |             |  |   | 100              | F30-F31                  | Psühhiaater   |        |              |               |   |
|                 |                                     |             |  |   | 50               |                          |   |        |              |               |   |
| 1141434         | lamotrigiin, 5mg                    | N03AX0<br>9 | LAMICTAL 5MG,<br>närimis-/dispergeeruv<br>tablett, 30TK  | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited                            | 100              | G40-G40                  | Neuroloog   | esmane |              |               |   |
|                 |                                     |             |  |   | 100              | F30-F31                  | Psühhiaater   |        |              |               |   |
|                 |                                     |             |  |   | 50               |                          |   |        |              |               |   |
| 1134560         | lanreotiid, 120mg                   | H01CB0<br>3 | SOMATULINE<br>AUTOGEL 120MG,<br>süstelahus süstlis, 1TK  | Ipsen Pharma  | 100              | C00-D48, E22.0-<br>E22.0 | Onkoloog,<br>Pediaater –<br>endokrinoloog,<br>Endokrinoloog |        |              |               | neuroendokriinkasvaja või akromegaalia raviks   |
| 1134582         | lanreotiid, 60mg                    | H01CB0<br>3 | SOMATULINE<br>AUTOGEL 60MG,<br>süstelahus süstlis, 1TK   | Ipsen Pharma  | 100              | C00-D48, E22.0-<br>E22.0 | Onkoloog,<br>Pediaater –<br>endokrinoloog,<br>Endokrinoloog |        |              |               | neuroendokriinkasvaja või akromegaalia raviks   |
| 1134571         | lanreotiid, 90mg                    | H01CB0<br>3 | SOMATULINE<br>AUTOGEL 90MG,<br>süstelahus süstlis, 1TK   | Ipsen Pharma  | 100              | C00-D48, E22.0-<br>E22.0 | Pediaater –<br>endokrinoloog,<br>Onkoloog,<br>Endokrinoloog |        |              |               | neuroendokriinkasvaja või akromegaalia raviks   |
| 1235056         | lantaan, 750mg                      | V03AE0<br>3 | FOSRENOL,<br>närimistablett, 90TK                        | Takeda<br>Pharmaceuticals<br>International AG<br>Ireland Branch | 100              | N18-N18                  | Pediaater,<br>Nefroloog                                     |        |              |               | juhul, kui kaltsiumipõhine fosforisiduja on<br>vastunäidustatud (seerumi kaltsiumisisaldus >2,54<br>mmol/l) |
|                 |                                     |             |  |   | 50               |                          |   |        |              |               |   |
| 1781232         | lantaan, 750mg                      | V03AE0<br>3 | CALAFOS,<br>närimistablett, 90TK                         | Viatrix Limited   | 100              | N18-N18                  | Nefroloog,<br>Pediaater                                     |        |              |               | juhul, kui kaltsiumipõhine fosforisiduja on<br>vastunäidustatud (seerumi kaltsiumisisaldus >2,54<br>mmol/l) |
|                 |                                     |             |  |   | 50               |                          |   |        |              |               |   |
| 1041196         | latanoprost,<br>50mcg 1ml           | S01EE0<br>1 | XALATAN, silmatilgad,<br>lahus, 2.5ml 1TK                | Upjohn EESV   | 50               |                          |   |        |              |               |   |
|                 |                                     |             |  |   | 100              | H40-H42                  | Oftalmoloog   | esmane |              |               |   |
| 1165733         | latanoprost,<br>50mcg 1ml           | S01EE0<br>1 | GLAUMAX, silmatilgad,<br>lahus, 2.5ml 1TK                | Aktiaselts<br>KEVELT  | 50               |                          |   |        |              |               |   |
|                 |                                     |             |  |   | 100              | H40-H42                  | Oftalmoloog   | esmane |              |               |   |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                 | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla  | Märkused   |
|-----------------|---|-------------|--|---------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|--------|--------------|--|--|
| 1346790         | latanoprost,<br>50mcg 1ml                           | S01EE0<br>1 | LATANOPROST<br>ACTAVIS, silmatilgad,<br>lahus, 2.5ml 1TK           | Teva B.V.                             | 100              | H40-H42          | Oftalmoloog               | esmane |              |  |  |
|                 |   |             |  |                                       | 50               |                  |                           |        |              |  |  |
| 1346802         | latanoprost,<br>50mcg 1ml                           | S01EE0<br>1 | LATANOPROST<br>ACTAVIS, silmatilgad,<br>lahus, 2.5ml 3TK           | Teva B.V.                             | 100              | H40-H42          | Oftalmoloog               | esmane |              |  |  |
|                 |   |             |  |                                       | 50               |                  |                           |        |              |  |  |
| 1377873         | latanoprost,<br>50mcg 1ml                           | S01EE0<br>1 | UNILAT, silmatilgad,<br>lahus, 2.5ml 1TK                           | Unimed Pharma<br>spol. s r.o.         | 50               |                  |                           |        |              |  |  |
|                 |   |             |  |                                       | 100              | H40-H42          | Oftalmoloog               | esmane |              |  |  |
| 1860229         | latanoprost,<br>50mcg 1ml                           | S01EE0<br>1 | LATANOPROST ELVIM,<br>silmatilgad, lahus, 2.5ml<br>1TK             | SIA Elvim                             | 100              | H40-H42          | Oftalmoloog               | esmane |              |  |  |
|                 |   |             |  |                                       | 50               |                  |                           |        |              |  |  |
| 3068951         | latanoprost,<br>50mcg 1ml                           | S01EE0<br>1 | XALATAN, silmatilgad,<br>lahus, 2.5ml 1TK                          | Ideal Trade Links<br>UAB              | 50               |                  |                           |        |              |  |  |
|                 |   |             |  |                                       | 100              | H40-H42          | Oftalmoloog               | esmane |              |  |  |
| 1836468         | latanoprost+netars<br>udiil,<br>50mcg+200mcg<br>1ml | S01EE5<br>1 | ROCLANDA,<br>silmatilgad, lahus, 2.5ml<br>1TK                      | Santen Oy                             | 100              | H40-H42          | Oftalmoloog               | esmane |              |  | kui monoterapia prostaglandiini analoogiga ei ole<br>langetanud piisavalt silma siserõhku  |
| 1073023         | latsidipiin, 4mg                                    | C08CA0<br>9 | LACIPIL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK              | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited  | 75               | I10-I13, I15-I15 |                           |        |              |  |  |
|                 |   |             |  |                                       | 50               |                  |                           |        |              |  |  |
| 1009921         | leflunomiid, 10mg                                   | L04AK0<br>1 | ARAVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                | Sanofi-Aventis<br>Deutschland<br>GmbH | 75               | M05-M06          | Pediaater,<br>Reumatoloog |        |              |  | kui mono- ja kombinatsioonravi metotreksaadi ja<br>sulfasalasiiniga pole küllaldaselt efektiivne, on<br>vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
|                 |   |             |  |                                       | 75               | M07-M07          | Pediaater,<br>Reumatoloog |        |              | kui metotreksaat pole küllaldaselt efektiivne, on<br>vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid  |  |
|                 |   |             |  |                                       | 50               |                  |                           |        |              |  |  |
| 1873009         | leflunomiid, 10mg                                   | L04AK0<br>1 | LEFLUNOMIDE ELVIM,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | SIA Elvim                             | 75               | M07-M07          | Pediaater,<br>Reumatoloog |        |              |  | kui metotreksaat pole küllaldaselt efektiivne, on<br>vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid  |
|                 |   |             |  |                                       | 50               |                  |                           |        |              |  |  |
|                 |   |             |  |                                       | 75               | M05-M06          | Reumatoloog,<br>Pediaater |        |              | kui mono- ja kombinatsioonravi metotreksaadi ja<br>sulfasalasiiniga pole küllaldaselt efektiivne, on<br>vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla  | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|---------------------------------------|------------------|----------|---------------------------|--------|--------------|--|--|
| 1009932         | leflunomiid, 20mg                   | L04AK0<br>1 | ARAVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                | Sanofi-Aventis<br>Deutschland<br>GmbH | 50               |          |                           |        |              |  |  |
|                 |                                     |             |  |                                       | 75               | M05-M06  | Reumatoloog,<br>Pediaater |        |              | kui mono- ja kombinatsioonravi metotreksaadi ja<br>sulfasalasiiniga pole küllaldaselt efektiivne, on<br>vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid   |  |
|                 |                                     |             |  |                                       | 75               | M07-M07  | Reumatoloog,<br>Pediaater |        |              | kui metotreksaat pole küllaldaselt efektiivne, on<br>vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid  |  |
| 1873043         | leflunomiid, 20mg                   | L04AK0<br>1 | LEFLUNOMIDE ELVIM,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | SIA Elvim                             | 75               | M05-M06  | Reumatoloog,<br>Pediaater |        |              |  | kui mono- ja kombinatsioonravi metotreksaadi ja<br>sulfasalasiiniga pole küllaldaselt efektiivne, on<br>vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
|                 |                                     |             |  |                                       | 50               |          |                           |        |              |  |  |
|                 |                                     |             |  |                                       | 75               | M07-M07  | Pediaater,<br>Reumatoloog |        |              | kui metotreksaat pole küllaldaselt efektiivne, on<br>vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid  |  |
| 1748156         | lenalidomiid, 10mg                  | L04AX0<br>4 | LENALIDOMIDE<br>AUXILIA, kõvakapsel,<br>21TK                       | Auxilia Pharma<br>OÜ                  | 100              | C90-C90  | Hematoloog                |        |              |  |  |
|                 |                                     |             |  |                                       | 100              | D46-D46  | Hematoloog                |        |              | konsiiliumi (vähemasti 3 hematoloogi) otsuse alusel<br>isoleeritud 5q deletsioonist tingitud tsütogeneetilise<br>häirega seotud müelodüsplastilise sündroomi raviks<br>erütrotsüütide suspensiooni ülekannetest sõltuva<br>(koormusega vähemalt 4 doosi 8 nädala kohta) ja madala<br>või madala-mõõduka riskiskooriga (IPSS 0-1) patsiendile<br>piisava ravivastuse saavutamisel (ülekannete koormus<br>väheneb vähemalt 50% võrra 16. ravinädalaks) ja selle<br>püsimisel |  |
| 1766000         | lenalidomiid, 10mg                  | L04AX0<br>4 | LENALIDOMIDE<br>GRINDEKS,<br>kõvakapsel, 21TK                      | Grindeks AS                           | 100              | C90-C90  | Hematoloog                |        |              |  |  |
|                 |                                     |             |  |                                       | 100              | D46-D46  | Hematoloog                |        |              | konsiiliumi (vähemasti 3 hematoloogi) otsuse alusel<br>isoleeritud 5q deletsioonist tingitud tsütogeneetilise<br>häirega seotud müelodüsplastilise sündroomi raviks<br>erütrotsüütide suspensiooni ülekannetest sõltuva<br>(koormusega vähemalt 4 doosi 8 nädala kohta) ja madala<br>või madala-mõõduka riskiskooriga (IPSS 0-1) patsiendile<br>piisava ravivastuse saavutamisel (ülekannete koormus<br>väheneb vähemalt 50% võrra 16. ravinädalaks) ja selle<br>püsimisel |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                         | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala     | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|---------------------------|------------------|----------|------------|--------|--------------|---------------|--|
| 1780411         | lenalidomiid, 10mg                  | L04AX0<br>4 | LENALIDOMIDE<br>ACCORD, kõvakapsel,<br>21TK   | Accord Healthcare<br>S.L. | 100              | D46-D46  | Hematoloog |        |              |               | konsiiliumi (vähemasti 3 hematoloogi) otsuse alusel isoleeritud 5q deletsioonist tingitud tsütogeneetilise häirega seotud müelodüsplastilise sündroomi raviks erütrotsüütide suspensiooni ülekannetest sõltuva (koormusega vähemalt 4 doosi 8 nädala kohta) ja madala või madala-mõõduka riskiskooriga (IPSS 0-1) patsiendile piisava ravivastuse saavutamisel (ülekannete koormus väheneb vähemalt 50% võrra 16. ravinädalaks) ja selle püsimisel |
|                 |                                     |             |   |                           | 100              | C90-C90  | Hematoloog |        |              |               |  |
| 1748202         | lenalidomiid, 15mg                  | L04AX0<br>4 | LENALIDOMIDE<br>AUXILIA, kõvakapsel,<br>21TK  | Auxilia Pharma<br>OÜ      | 100              | D46-D46  | Hematoloog |        |              |               | konsiiliumi (vähemasti 3 hematoloogi) otsuse alusel isoleeritud 5q deletsioonist tingitud tsütogeneetilise häirega seotud müelodüsplastilise sündroomi raviks erütrotsüütide suspensiooni ülekannetest sõltuva (koormusega vähemalt 4 doosi 8 nädala kohta) ja madala või madala-mõõduka riskiskooriga (IPSS 0-1) patsiendile piisava ravivastuse saavutamisel (ülekannete koormus väheneb vähemalt 50% võrra 16. ravinädalaks) ja selle püsimisel |
|                 |                                     |             |   |                           | 100              | C90-C90  | Hematoloog |        |              |               |  |
| 1766022         | lenalidomiid, 15mg                  | L04AX0<br>4 | LENALIDOMIDE<br>GRINDEKS,<br>kõvakapsel, 21TK | Grindeks AS               | 100              | C90-C90  | Hematoloog |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |   |                           | 100              | D46-D46  | Hematoloog |        |              |               | konsiiliumi (vähemasti 3 hematoloogi) otsuse alusel isoleeritud 5q deletsioonist tingitud tsütogeneetilise häirega seotud müelodüsplastilise sündroomi raviks erütrotsüütide suspensiooni ülekannetest sõltuva (koormusega vähemalt 4 doosi 8 nädala kohta) ja madala või madala-mõõduka riskiskooriga (IPSS 0-1) patsiendile piisava ravivastuse saavutamisel (ülekannete koormus väheneb vähemalt 50% võrra 16. ravinädalaks) ja selle püsimisel |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                         | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala     | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|---------------------------|------------------|----------|------------|--------|--------------|---------------|--|
| 1780433         | lenalidomiid, 15mg                  | L04AX0<br>4 | LENALIDOMIDE<br>ACCORD, kõvakapsel,<br>21TK   | Accord Healthcare<br>S.L. | 100              | D46-D46  | Hematoloog |        |              |               | konsiiliumi (vähemasti 3 hematoloogi) otsuse alusel isoleeritud 5q deletsioonist tingitud tsütogeneetilise häirega seotud müelodüsplastilise sündroomi raviks erütrotsüütide suspensiooni ülekannetest sõltuva (koormusega vähemalt 4 doosi 8 nädala kohta) ja madala või madala-mõõduka riskiskooriga (IPSS 0-1) patsiendile piisava ravivastuse saavutamisel (ülekannete koormus väheneb vähemalt 50% võrra 16. ravinädalaks) ja selle püsimisel |
|                 |                                     |             |   |                           | 100              | C90-C90  | Hematoloog |        |              |               |  |
| 1748257         | lenalidomiid, 25mg                  | L04AX0<br>4 | LENALIDOMIDE<br>AUXILIA, kõvakapsel,<br>21TK  | Auxilia Pharma<br>OÜ      | 100              | D46-D46  | Hematoloog |        |              |               | konsiiliumi (vähemasti 3 hematoloogi) otsuse alusel isoleeritud 5q deletsioonist tingitud tsütogeneetilise häirega seotud müelodüsplastilise sündroomi raviks erütrotsüütide suspensiooni ülekannetest sõltuva (koormusega vähemalt 4 doosi 8 nädala kohta) ja madala või madala-mõõduka riskiskooriga (IPSS 0-1) patsiendile piisava ravivastuse saavutamisel (ülekannete koormus väheneb vähemalt 50% võrra 16. ravinädalaks) ja selle püsimisel |
|                 |                                     |             |   |                           | 100              | C90-C90  | Hematoloog |        |              |               |  |
| 1766066         | lenalidomiid, 25mg                  | L04AX0<br>4 | LENALIDOMIDE<br>GRINDEKS,<br>kõvakapsel, 21TK | Grindeks AS               | 100              | C90-C90  | Hematoloog |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |   |                           | 100              | D46-D46  | Hematoloog |        |              |               | konsiiliumi (vähemasti 3 hematoloogi) otsuse alusel isoleeritud 5q deletsioonist tingitud tsütogeneetilise häirega seotud müelodüsplastilise sündroomi raviks erütrotsüütide suspensiooni ülekannetest sõltuva (koormusega vähemalt 4 doosi 8 nädala kohta) ja madala või madala-mõõduka riskiskooriga (IPSS 0-1) patsiendile piisava ravivastuse saavutamisel (ülekannete koormus väheneb vähemalt 50% võrra 16. ravinädalaks) ja selle püsimisel |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                         | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala     | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|---------------------------|------------------|----------|------------|--------|--------------|---------------|--|
| 1780455         | lenalidomiid, 25mg                  | L04AX0<br>4 | LENALIDOMIDE<br>ACCORD, kõvakapsel,<br>21TK   | Accord Healthcare<br>S.L. | 100              | D46-D46  | Hematoloog |        |              |               | konsiiliumi (vähemasti 3 hematoloogi) otsuse alusel isoleeritud 5q deletsioonist tingitud tsütogeneetilise häirega seotud müelodüsplastilise sündroomi raviks erütrotsüütide suspensiooni ülekannetest sõltuva (koormusega vähemalt 4 doosi 8 nädala kohta) ja madala või madala-mõõduka riskiskooriga (IPSS 0-1) patsiendile piisava ravivastuse saavutamisel (ülekannete koormus väheneb vähemalt 50% võrra 16. ravinädalaks) ja selle püsimisel |
|                 |                                     |             |   |                           | 100              | C90-C90  | Hematoloog |        |              |               |  |
| 1748101         | lenalidomiid, 5mg                   | L04AX0<br>4 | LENALIDOMIDE<br>AUXILIA, kõvakapsel,<br>21TK  | Auxilia Pharma<br>OÜ      | 100              | C90-C90  | Hematoloog |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |   |                           | 100              | D46-D46  | Hematoloog |        |              |               | konsiiliumi (vähemasti 3 hematoloogi) otsuse alusel isoleeritud 5q deletsioonist tingitud tsütogeneetilise häirega seotud müelodüsplastilise sündroomi raviks erütrotsüütide suspensiooni ülekannetest sõltuva (koormusega vähemalt 4 doosi 8 nädala kohta) ja madala või madala-mõõduka riskiskooriga (IPSS 0-1) patsiendile piisava ravivastuse saavutamisel (ülekannete koormus väheneb vähemalt 50% võrra 16. ravinädalaks) ja selle püsimisel |
| 1765964         | lenalidomiid, 5mg                   | L04AX0<br>4 | LENALIDOMIDE<br>GRINDEKS,<br>kõvakapsel, 21TK | Grindeks AS               | 100              | D46-D46  | Hematoloog |        |              |               | konsiiliumi (vähemasti 3 hematoloogi) otsuse alusel isoleeritud 5q deletsioonist tingitud tsütogeneetilise häirega seotud müelodüsplastilise sündroomi raviks erütrotsüütide suspensiooni ülekannetest sõltuva (koormusega vähemalt 4 doosi 8 nädala kohta) ja madala või madala-mõõduka riskiskooriga (IPSS 0-1) patsiendile piisava ravivastuse saavutamisel (ülekannete koormus väheneb vähemalt 50% võrra 16. ravinädalaks) ja selle püsimisel |
|                 |                                     |             |   |                           | 100              | C90-C90  | Hematoloog |        |              |               |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                       | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala     | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|---------------------------|------------------|----------|------------|--------|--------------|---------------|--|
| 1780376         | lenalidomiid, 5mg                   | L04AX0<br>4 | LENALIDOMIDE<br>ACCORD, kõvakapsel,<br>21TK | Accord Healthcare<br>S.L. | 100              | C90-C90  | Hematoloog |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |   |                           | 100              | D46-D46  | Hematoloog |        |              |               | konsiiliumi (vähemasti 3 hematoloogi) otsuse alusel isoleeritud 5q deletsioonist tingitud tsütogeneetilise häirega seotud müelodüsplastilise sündroomi raviks erütrotsüütide suspensiooni ülekannetest sõltuva (koormusega vähemalt 4 doosi 8 nädala kohta) ja madala või madala-mõõduka riskiskooriga (IPSS 0-1) patsiendile piisava ravivastuse saavutamisel (ülekannete koormus väheneb vähemalt 50% võrra 16. ravinädalaks) ja selle püsimisel   |
| 1780398         | lenalidomiid,<br>7,5mg              | L04AX0<br>4 | LENALIDOMIDE<br>ACCORD, kõvakapsel,<br>21TK | Accord Healthcare<br>S.L. | 100              | D46-D46  | Hematoloog |        |              |               | konsiiliumi (vähemasti 3 hematoloogi) otsuse alusel isoleeritud 5q deletsioonist tingitud tsütogeneetilise häirega seotud müelodüsplastilise sündroomi raviks erütrotsüütide suspensiooni ülekannetest sõltuva (koormusega vähemalt 4 doosi 8 nädala kohta) ja madala või madala-mõõduka riskiskooriga (IPSS 0-1) patsiendile piisava ravivastuse saavutamisel (ülekannete koormus väheneb vähemalt 50% võrra 16. ravinädalaks) ja selle püsimisel   |
|                 |                                     |             |   |                           | 100              | C90-C90  | Hematoloog |        |              |               |  |
| 1687192         | lenvatiniib, 10mg                   | L01EX0<br>8 | LENVIMA, kõvakapsel,<br>30TK                | Eisai GmbH                | 100              | C73-C73  | Onkoloog   |        |              |               | kuni haiguse progresseerumiseni, kui ravi alustamise lenvatiniibiga on hinnatud konsiilium (vähemalt 2 onkoloogi) vastavaks järgmistele kriteeriumitele: diagnoositud progresseeruv, lokaalselt kaugelearenenud või metastaatiline, diferentseeritud (papillaarne/follikulaarne/Hürthle-rakuline), radioaktiivsele joodile allumatu kilpnäärme kartsinoom ja patsiendi üldseisund on hea (funktsionaalne klass 0-1 ECOG järgi). RAI allumatu kilpnäärme kartsinoom on diagnoositud, kui esineb vähemalt üks haiguskolle, mis ei näita RAI-skaneeringul joodi neeldumist, või haigus progresseerub RAI-ravi foonil, või kumulatiivne RAI annus on $\geq 22,2$ GBq. Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi lenvatiniibiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. oktoobrit 2020. a |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|---|------------------|------------------|----------|--------|--------------|---------------|---|
| 1687181         | lenvatiiniib, 4mg                   | L01EX0<br>8 | LENVIMA, kõvakapsel,<br>30TK                                       | Eisai GmbH  | 100              | C73-C73          | Onkoloog |        |              |               | kuni haiguse progresseerumiseni, kui ravi alustamise lenvatiiniibiga on hinnatud konsiilium (vähemalt 2 onkoloogi) vastavaks järgmistele kriteeriumitele: diagnoositud progresseeruv, lokaalselt kaugelearenenud või metastaatiline, diferentseeritud (papillaarne/follikulaarne/Hürthle-rakuline), radioaktiivsele joodile allumatu kilpnäärme kartsinoom ja patsiendi üldseisund on hea (funktsionaalne klass 0-1 ECOG järgi). RAI allumatu kilpnäärme kartsinoom on diagnoositud, kui esineb vähemalt üks haiguskolle, mis ei näita RAI-skaneeringul joodi neeldumist, või haigus progresseerub RAI-ravi foonil, või kumulatiivne RAI annus on >=22,2 GBq. Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi lenvatiiniibiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. oktoobrit 2020. a |
|                 |                                     |             |  |   | 100              | C22-C22          | Onkoloog |        |              |               |   |
| 1474950         | lerkanidipiin, 10mg                 | C08CA1<br>3 | LERCAPIN, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK                   | Menarini International Operations Luxembourg S.A. | 50               |                  |          |        |              |               |   |
|                 |                                     |             |  |   | 75               | I10-I13, I15-I15 |          |        |              |               |   |
| 1611234         | lerkanidipiin, 10mg                 | C08CA1<br>3 | LERCANIDIPINE ACTAVIS 10MG, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK | Teva B.V.   | 75               | I10-I13, I15-I15 |          |        |              |               |   |
|                 |                                     |             |  |   | 50               |                  |          |        |              |               |   |
| 1826018         | lerkanidipiin, 10mg                 | C08CA1<br>3 | LERCANIDIPINE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK       | Accord Healthcare B.V.                            | 50               |                  |          |        |              |               |   |
|                 |                                     |             |  |   | 75               | I10-I13, I15-I15 |          |        |              |               |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                                | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|--|------------------|------------------|---------------------------------------|--------|--------------|---------------|--|
| 1860386         | lerkanidipiin, 10mg                 | C08CA1<br>3 | KAPIDIN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>90TK                          | Zentiva k.s.   | 75               | I10-I13, I15-I15 |                                       |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |  |  | 50               |                  |                                       |        |              |               |  |
| 1880186         | lerkanidipiin, 10mg                 | C08CA1<br>3 | LERCAPIN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>90TK                         | Ideal Trade Links<br>UAB                                   | 75               | I10-I13, I15-I15 |                                       |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |  |  | 50               |                  |                                       |        |              |               |  |
| 1474994         | lerkanidipiin, 20mg                 | C08CA1<br>3 | LERCAPIN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>90TK                         | Menarini<br>International<br>Operations<br>Luxembourg S.A. | 50               |                  |                                       |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |  |  | 75               | I10-I13, I15-I15 |                                       |        |              |               |  |
| 1611245         | lerkanidipiin, 20mg                 | C08CA1<br>3 | LERCANIDIPINE<br>ACTAVIS 20MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>90TK | Teva B.V.  | 75               | I10-I13, I15-I15 |                                       |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |  |  | 50               |                  |                                       |        |              |               |  |
| 1826085         | lerkanidipiin, 20mg                 | C08CA1<br>3 | LERCANIDIPINE<br>ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>90TK          | Accord Healthcare<br>B.V.                                  | 75               | I10-I13, I15-I15 |                                       |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |  |  | 50               |                  |                                       |        |              |               |  |
| 1860498         | lerkanidipiin, 20mg                 | C08CA1<br>3 | KAPIDIN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>90TK                          | Zentiva k.s.   | 50               |                  |                                       |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |  |  | 75               | I10-I13, I15-I15 |                                       |        |              |               |  |
| 1034334         | letrosool, 2,5mg                    | L02BG0<br>4 | FEMARA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                           | Novartis Baltics<br>SIA                                    | 100              | C50-C50          | Onkoloog,<br>Günekoloog,<br>Üldkirurg |        |              |               | günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks |
|                 |                                     |             |  |  | 50               |                  |                                       |        |              |               |  |
| 1302398         | letrosool, 2,5mg                    | L02BG0<br>4 | LETROZOLE<br>SANOSWISS 2,5 MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Sanoswiss UAB  | 50               |                  |                                       |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |  |  | 100              | C50-C50          | Üldkirurg,<br>Onkoloog,<br>Günekoloog |        |              |               | günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks |
| 1349771         | letrosool, 2,5mg                    | L02BG0<br>4 | LETROZOLE TEVA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                | Teva Pharma B.V.   | 100              | C50-C50          | Günekoloog,<br>Üldkirurg,<br>Onkoloog |        |              |               | günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks |
|                 |                                     |             |  |  | 50               |                  |                                       |        |              |               |  |



| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                                   | Soodus-tus % | Diagnoos | Eriala                          | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-------------|-------------------------------|----------|--|---|--------------|----------|---------------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1409352     | letrosool, 2,5mg              | L02BG04  | LETROZOLE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK     | Accord Healthcare B.V.                            | 100          | C50-C50  | Üldkirurg, Onkoloog, Gynecoloog |        |           |            | günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks  |
|             |                               |          |  |   | 50           |          |                                 |        |           |            |   |
| 1554702     | letrosool, 2,5mg              | L02BG04  | LORTANDA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK             | KRKA d.d. Novo mesto                              | 100          | C50-C50  | Onkoloog, Üldkirurg, Gynecoloog |        |           |            | günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks  |
|             |                               |          |  |   | 50           |          |                                 |        |           |            |   |
| 1156755     | leuproreliin, 22,5mg          | L02AE02  | ELIGARD, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK                  | Recordati Industria Chimica E Farmaceutica S.p.A. | 100          | C61-C61  | Onkoloog, Uroloog               |        |           |            | lokaalse või lokaalselt levinud kõrge riskiga (kliiniline staadium $\geq$ T2c või Gleasoni skoor 8-10 või PSA $\geq$ 20 ng/ml või regionaalsete lümfisõlmede haaratus või positiivne reseksioonipiir) multimodaalse ravi osana kuni 2 aasta vältel ning metastaseerunud eesnäärmevähiga patsientidele |
| 1287570     | leuproreliin, 45mg            | L02AE02  | ELIGARD, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK                  | Recordati Industria Chimica E Farmaceutica S.p.A. | 100          | C61-C61  | Onkoloog, Uroloog               |        |           |            | lokaalse või lokaalselt levinud kõrge riskiga (kliiniline staadium $\geq$ T2c või Gleasoni skoor 8-10 või PSA $\geq$ 20 ng/ml või regionaalsete lümfisõlmede haaratus või positiivne reseksioonipiir) multimodaalse ravi osana kuni 2 aasta vältel ning metastaseerunud eesnäärmevähiga patsientidele |
| 1198975     | levetiratsetaam, 1000mg       | N03AX14  | KEPPRA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK               | UCB Pharma  | 100          | G40-G40  | Neuroloog                       | esmane |           |            |   |
|             |                               |          |  |   | 50           |          |                                 |        |           |            |   |
| 1544981     | levetiratsetaam, 1000mg       | N03AX14  | LEVETIRACETAM TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK   | Teva B.V.   | 100          | G40-G40  | Neuroloog                       | esmane |           |            |   |
|             |                               |          |  |   | 50           |          |                                 |        |           |            |   |
| 1545566     | levetiratsetaam, 1000mg       | N03AX14  | LEVETIRACETAM ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Accord Healthcare S.L.U.                          | 50           |          |                                 |        |           |            |   |
|             |                               |          |  |   | 100          | G40-G40  | Neuroloog                       | esmane |           |            |   |
| 1546130     | levetiratsetaam, 1000mg       | N03AX14  | MATEVER, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK              | Pharmathen S.A.                                   | 50           |          |                                 |        |           |            |   |
|             |                               |          |  |   | 100          | G40-G40  | Neuroloog                       | esmane |           |            |   |
| 1198762     | levetiratsetaam, 250mg        | N03AX14  | KEPPRA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK               | UCB Pharma  | 100          | G40-G40  | Neuroloog                       | esmane |           |            |   |
|             |                               |          |  |   | 50           |          |                                 |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus  | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|--------------------------------------|-------------|---|-----------------------------|------------------|--|-----------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1544802         | levetiratsetaam,<br>250mg            | N03AX1<br>4 | LEVETIRACETAM<br>TEVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK   | Teva B.V.                   | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |              |               |          |
|                 |                                      |             |   |                             | 50               |  |           |        |              |               |          |
| 1545353         | levetiratsetaam,<br>250mg            | N03AX1<br>4 | LEVETIRACETAM<br>ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Accord Healthcare<br>S.L.U. | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |              |               |          |
|                 |                                      |             |   |                             | 50               |  |           |        |              |               |          |
| 1545904         | levetiratsetaam,<br>250mg            | N03AX1<br>4 | MATEVER, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                 | Pharmathen S.A.             | 50               |  |           |        |              |               |          |
|                 |                                      |             |   |                             | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |              |               |          |
| 1198829         | levetiratsetaam,<br>500mg            | N03AX1<br>4 | KEPPRA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                  | UCB Pharma                  | 50               |  |           |        |              |               |          |
|                 |                                      |             |   |                             | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |              |               |          |
| 1495054         | levetiratsetaam,<br>500mg            | N03AX1<br>4 | NORMEG 500 MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK        | Zentiva k.s.                | 50               |  |           |        |              |               |          |
|                 |                                      |             |   |                             | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |              |               |          |
| 1544868         | levetiratsetaam,<br>500mg            | N03AX1<br>4 | LEVETIRACETAM<br>TEVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK   | Teva B.V.                   | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |              |               |          |
|                 |                                      |             |   |                             | 50               |  |           |        |              |               |          |
| 1545421         | levetiratsetaam,<br>500mg            | N03AX1<br>4 | LEVETIRACETAM<br>ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Accord Healthcare<br>S.L.U. | 50               |  |           |        |              |               |          |
|                 |                                      |             |   |                             | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |              |               |          |
| 1545960         | levetiratsetaam,<br>500mg            | N03AX1<br>4 | MATEVER, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                 | Pharmathen S.A.             | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |              |               |          |
|                 |                                      |             |   |                             | 50               |  |           |        |              |               |          |
| 1077049         | levodopa+bensera<br>siid, 100mg+25mg | N04BA8<br>0 | MADOPAR,<br>dispergeeruv tablett,<br>100TK                            | Roche Eesti<br>Osaühing     | 100              | G23-G23, G20-<br>G20, G90.3-<br>G90.3, G24.1-<br>G24.1, G21-<br>G21, G31.8-<br>G31.8 | Neuroloog | esmane |              |               |          |
|                 |                                      |             |   |                             | 50               |  |           |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus  | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja         | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|--------------------------------------|-------------|---|-------------------------|------------------|--|-----------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1082922         | levodopa+bensera<br>siid, 100mg+25mg | N04BA8<br>0 | MADOPAR, kõvakapsel,<br>100TK   | Roche Eesti<br>Osaühing | 100              | G23-G23, G20-<br>G20, G90.3-<br>G90.3, G24.1-<br>G24.1, G21-<br>G21, G31.8-<br>G31.8 | Neuroloog | esmane |              |               |          |
|                 |                                      |             |   |                         | 50               |  |           |        |              |               |          |
| 1085161         | levodopa+bensera<br>siid, 100mg+25mg | N04BA8<br>0 | MADOPAR HBS,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 100TK | Roche Eesti<br>Osaühing | 50               |  | Neuroloog | esmane |              |               |          |
|                 |                                      |             |   |                         | 100              | G23-G23, G20-<br>G20, G90.3-<br>G90.3, G24.1-<br>G24.1, G21-<br>G21, G31.8-<br>G31.8 |           |        |              |               |          |
| 1002014         | levodopa+bensera<br>siid, 200mg+50mg | N04BA8<br>0 | MADOPAR, tablett,<br>100TK  | Roche Eesti<br>Osaühing | 100              | G23-G23, G20-<br>G20, G90.3-<br>G90.3, G24.1-<br>G24.1, G21-<br>G21, G31.8-<br>G31.8 | Neuroloog | esmane |              |               |          |
|                 |                                      |             |   |                         | 50               |  |           |        |              |               |          |
| 1599611         | levodopa+bensera<br>siid, 200mg+50mg | N04BA8<br>0 | MADOPAR, tablett,<br>100TK  | First Pharma OÜ         | 100              | G23-G23, G20-<br>G20, G90.3-<br>G90.3, G24.1-<br>G24.1, G21-<br>G21, G31.8-<br>G31.8 | Neuroloog | esmane |              |               |          |
|                 |                                      |             |   |                         | 50               |  |           |        |              |               |          |
| 1798072         | levodopa+karbido<br>pa, 100mg+25mg   | N04BA8<br>1 | SINEMET 25/100,<br>tablett, 60TK  | Organon N.V.            | 50               |  | Neuroloog | esmane |              |               |          |
|                 |                                      |             |   |                         | 100              | G23-G23, G20-<br>G20, G90.3-<br>G90.3, G24.1-<br>G24.1, G21-<br>G21, G31.8-<br>G31.8 |           |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                          | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|--|-------------|--|-------------------|------------------|--|-----------|--------|--------------|---------------|----------|
| 3047981         | levodopa+karbido<br>pa, 100mg+25mg                           | N04BA8<br>1 | SINEMET 25/100,<br>tablett, 60TK   | Lex Ano UAB       | 50               |  |           |        |              |               |          |
|                 |  |             |  |                   | 100              | G23-G23, G20-<br>G20, G90.3-<br>G90.3, G24.1-<br>G24.1, G21-<br>G21, G31.8-<br>G31.8 | Neuroloog | esmane |              |               |          |
| 1006861         | levodopa+karbido<br>pa, 250mg+25mg                           | N04BA8<br>1 | SINEMET 25/250,<br>tablett, 100TK  | Organon N.V.      | 100              | G23-G23, G20-<br>G20, G90.3-<br>G90.3, G24.1-<br>G24.1, G21-<br>G21, G31.8-<br>G31.8 | Neuroloog | esmane |              |               |          |
|                 |  |             |  |                   | 50               |  |           |        |              |               |          |
| 1172854         | levodopa+karbido<br>pa+entakapoon,<br>100mg+25mg+200<br>mg   | N04BA0<br>3 | STALEVO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK                                   | Orion Corporation | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |              |               |          |
|                 |  |             |  |                   | 50               |  |           |        |              |               |          |
| 1629716         | levodopa+karbido<br>pa+entakapoon,<br>100mg+25mg+200<br>mg   | N04BA0<br>3 | LEVODOPA/CARBIDOP<br>A/ENTACAPONE TEVA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK | Teva Pharma B.V.  | 50               |  |           |        |              |               |          |
|                 |  |             |  |                   | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |              |               |          |
| 1172898         | levodopa+karbido<br>pa+entakapoon,<br>150mg+37,5mg+2<br>00mg | N04BA0<br>3 | STALEVO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK                                   | Orion Corporation | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |              |               |          |
|                 |  |             |  |                   | 50               |  |           |        |              |               |          |
| 1630257         | levodopa+karbido<br>pa+entakapoon,<br>150mg+37,5mg+2<br>00mg | N04BA0<br>3 | LEVODOPA/CARBIDOP<br>A/ENTACAPONE TEVA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK | Teva Pharma B.V.  | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |              |               |          |
|                 |  |             |  |                   | 50               |  |           |        |              |               |          |
| 1368020         | levodopa+karbido<br>pa+entakapoon,<br>200mg+50mg+200<br>mg   | N04BA0<br>3 | STALEVO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK                                   | Orion Corporation | 50               |  |           |        |              |               |          |
|                 |  |             |  |                   | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |              |               |          |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus                     | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja        | Soodus-tus % | Diagnoos | Eriala    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-------------|---|----------|---|------------------------|--------------|----------|-----------|--------|-----------|------------|---|
| 1630527     | levodopa+karbidopa+entakapoon, 200mg+50mg+200mg   | N04BA03  | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK | Teva Pharma B.V.       | 100          | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |   |
|             |   |          |   |                        | 50           |          |           |        |           |            |   |
| 1629974     | levodopa+karbidopa+entakapoon, 75mg+18,75mg+200mg | N04BA03  | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK | Teva Pharma B.V.       | 100          | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |   |
|             |   |          |   |                        | 50           |          |           |        |           |            |   |
| 1549650     | levonorgestreel, 13,5mg                           | G02BA03  | FLEREE, intrauteriinne ravivahend, 1TK                                      | Bayer AG               | 75           | Z30-Z30  |           |        |           |            | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
|             |   |          |   |                        | 50           |          |           |        |           |            |   |
| 1703955     | levonorgestreel, 19,5mg                           | G02BA03  | KYLEENA, intrauteriinne ravivahend, 1TK                                     | Bayer AG               | 75           | Z30-Z30  |           |        |           |            | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
|             |   |          |   |                        | 50           |          |           |        |           |            |   |
| 1009493     | levonorgestreel, 52mg                             | G02BA03  | MIRENA, intrauteriinne ravivahend, 1TK                                      | Bayer AG               | 50           |          |           |        |           |            |   |
|             |   |          |   |                        | 75           | Z30-Z30  |           |        |           |            | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
| 1816118     | levonorgestreel, 52mg                             | G02BA03  | DONASERT, intrauteriinne ravivahend, 1TK                                    | Gedeon Richter Plc.    | 50           |          |           |        |           |            |   |
|             |   |          |   |                        | 75           | Z30-Z30  |           |        |           |            | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
| 1621752     | levonorgestreel+etüüülöstradiol, 0,15mg+0,03mg    | G03AA07  | LEVERETTE, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK                           | Exeltis Baltics UAB    | 75           | Z30-Z30  |           |        |           |            | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
|             |   |          |   |                        | 50           |          |           |        |           |            |   |
| 1138137     | levotsetirisiin, 5mg                              | R06AE09  | XYZAL, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK                               | UCB Pharma Oy Finland  | 50           |          |           |        |           |            |   |
| 1512065     | levotsetirisiin, 5mg                              | R06AE09  | CEZERA 5 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK                         | KRKA, d.d., Novo mesto | 50           |          |           |        |           |            |   |
| 3026652     | levotsetirisiin, 5mg                              | R06AE09  | XYZAL, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK                               | Ideal Trade Links UAB  | 50           |          |           |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus        | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloa hoidja                                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla  | Märkused   |
|-----------------|--|-------------|--|--|------------------|----------------------|--------|--------|--------------|--|--|
| 1607240         | liksisenatiid,<br>10mcg/20mcg<br>0.2ml     | A10BJ03     | LYXUMIA, süstelahus,<br>3ml 1TK / 3ml 1TK              | Sanofi Winthrop<br>Industrie                     | 50               | E14-E14, E11-<br>E11 |        |        |              |  | II tüüpi diabeedi raviks juhul, kui ravi suukaudsete<br>diabeediravimitega ei ole efektiivne või on<br>vastunäidustatud  |
|                 |  |             |  |  | 75               | E14-E14, E11-<br>E11 |        |        |              | II tüüpi diabeedi raviks rasvumusega<br>patsientidel(KMI>=35kg/m2), kellel suukaudsed<br>diabeediravimid (metformiin, sulfonüüluurea preparaat,<br>PPAR agonist, DPP-4 inhibiitor) maksimaalsetes<br>talutavates annustes ei ole andnud rahuldavat efekti või<br>on vastunäidustatud                                     |  |
| 1607228         | liksisenatiid,<br>20mcg 0.2ml              | A10BJ03     | LYXUMIA, süstelahus,<br>3ml 2TK                        | Sanofi Winthrop<br>Industrie                     | 75               | E14-E14, E11-<br>E11 |        |        |              |  | II tüüpi diabeedi raviks rasvumusega<br>patsientidel(KMI>=35kg/m2), kellel suukaudsed<br>diabeediravimid (metformiin, sulfonüüluurea preparaat,<br>PPAR agonist, DPP-4 inhibiitor) maksimaalsetes<br>talutavates annustes ei ole andnud rahuldavat efekti või<br>on vastunäidustatud |
|                 |  |             |  |  | 50               | E14-E14, E11-<br>E11 |        |        |              | II tüüpi diabeedi raviks juhul, kui ravi suukaudsete<br>diabeediravimitega ei ole efektiivne või on<br>vastunäidustatud  |  |
| 1539288         | linagliptiin, 5mg                          | A10BH0<br>5 | TRAJENTA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Boehringer<br>Ingelheim<br>International<br>GmbH | 75               | E14-E14, E11-<br>E11 |        |        |              |  | II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi<br>peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati<br>või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või<br>sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud  |
|                 |  |             |  |  | 50               |                      |        |        |              |  |  |
| 1733071         | linagliptiin+empagl<br>ifloosiin, 5mg+10mg | A10BD1<br>9 | GLYXAMBI, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Boehringer<br>Ingelheim<br>International<br>GmbH | 75               | E11-E11, E14-<br>E14 |        |        |              |  | II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi<br>peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati<br>või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või<br>sulfonüüluurea on meditsiiniliselt vastunäidustatud   |
|                 |  |             |  |  | 50               |                      |        |        |              |  |  |
|                 |  |             |  |  | 75               | I50-I50              |        |        |              | kroonilise südamepuudulikkuse korral patsiendile, kellel<br>esineb kaasuvana II tüüpi diabeet (E11;E14), kes kuulub<br>NYHA II-IV funktsionaalklassi, kellel ravikoostöö on hea<br>ning kellel AKE-inhibiitor või ARB ja beetablokaatori<br>kaksikravigil südamepuudulikkuse sümptomid endiselt<br>püsivad või süvenevad |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                              | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|--|-------------|---|--|------------------|----------------------|---------------------------|--------|--------------|---------------|---|
| 1733161         | linagliptiin+empagl<br>ifloosin, 5mg+25mg                        | A10BD1<br>9 | GLYXAMBI, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK            | Boehringer<br>Ingelheim<br>International<br>GmbH | 75               | E14-E14, E11-<br>E11 |                           |        |              |               | II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi<br>peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati<br>või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või<br>sulfonüüluurea on meditsiiniliselt vastunäidustatud  |
|                 |  |             |   |  | 75               | I50-I50              |                           |        |              |               | kroonilise südamepuudulikkuse korral patsiendile, kellel<br>esineb kaasuvana II tüüpi diabeet (E11;E14), kes kuulub<br>NYHA II-IV funktsionaalklassi, kellel ravikoostöö on hea<br>ning kellel AKE-inhibiitor või ARB ja beetablokaatori<br>kaksikravigi südamepuudulikkuse sümptomid endiselt<br>püsivad või süvenevad |
|                 |  |             |   |  | 50               |                      |                           |        |              |               |   |
| 1643251         | linesoliid, 600mg  | J01XX08     | LINEZOLID ACCORD,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK | Accord Healthcare<br>B.V.                        | 50               |                      |                           |        |              |               |   |
| 1751206         | linesoliid, 600mg  | J01XX08     | APEL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK                | Medochemie<br>Limited                            | 50               |                      |                           |        |              |               |   |
| 1063763         | lipaas+amülaas+p<br>roteaas,<br>10000ühik+8000ü<br>hik+600ühik   | A09AA0<br>2 | KREON 10 000 U,<br>gastroresistentne<br>kõvakapsel, 50TK          | VIATRIS<br>HEALTHCARE<br>Limited                 | 100              | E84-E84              | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane |              |               |   |
|                 |  |             |   |  | 50               |                      |                           |        |              |               |   |
| 1020205         | lipaas+amülaas+p<br>roteaas,<br>10000ühik+9000ü<br>hik+500ühik   | A09AA0<br>2 | PANGROL 10000,<br>gastroresistentne<br>kõvakapsel, 20TK           | Berlin-Chemie AG                                 | 100              | E84-E84              | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane |              |               |   |
|                 |  |             |   |  | 50               |                      |                           |        |              |               |   |
| 1060434         | lipaas+amülaas+p<br>roteaas,<br>20000ühik+12000<br>ühik+900ühik  | A09AA0<br>2 | MEZYM 20 000,<br>gastroresistentne tablett,<br>100TK              | Berlin-Chemie AG                                 | 100              | E84-E84              | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane |              |               |   |
|                 |  |             |   |  | 50               |                      |                           |        |              |               |   |
| 1044470         | lipaas+amülaas+p<br>roteaas,<br>25000ühik+18000<br>ühik+1000ühik | A09AA0<br>2 | KREON 25 000 U,<br>gastroresistentne<br>kõvakapsel, 20TK          | VIATRIS<br>HEALTHCARE<br>Limited                 | 100              | E84-E84              | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane |              |               |   |
|                 |  |             |   |  | 50               |                      |                           |        |              |               |   |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus                           | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                              | Müügiloa hoidja  | Soodus-tus % | Diagnoos    | Eriala                 | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-------------|---|----------|--|--|--------------|-------------|------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1063707     | lipaas+amülaas+p roteaas, 25000ühik+18000 ühik+1000ühik | A09AA02  | KREON 25 000 U, gastroresistentne kõvakapsel, 50TK | VIATRIS HEALTHCARE Limited                             | 50           |             |                        |        |           |            |   |
|             |   |          |  |  | 100          | E84-E84     | Pediaater, Pulmonoloog | esmane |           |            |   |
| 1020182     | lipaas+amülaas+p roteaas, 25000ühik+22500 ühik+1250ühik | A09AA02  | PANGROL 25000, gastroresistentne kõvakapsel, 20TK  | Berlin-Chemie AG                                       | 50           |             |                        |        |           |            |   |
|             |   |          |  |  | 100          | E84-E84     | Pulmonoloog, Pediaater | esmane |           |            |   |
| 1857393     | lisdeksamfetamiin dimesülaad, 20mg                      | N06BA12  | ADIXEMIN, kõvakapsel, 30TK                         | Stada Arzneimittel AG                                  | 75           | F90.0-F90.1 | Psühhiaater            | esmane |           |            | patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus kehtivatele metüülfenidaadi ja atomoksetiini hüvitamistingimustele, kuid kellel on adekvaatne ravi metüülfenidaadi ja atomoksetiiniga osutunud ebaefektiivseks, põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele ravimid on dokumenteeritult meditsiiniliselt vastunäidustatud. Lisaks laieneb soodustus patsientidele, kelle ravi lisdeksamfetamiindimesülaadiga on Tervisekassa rahastusel alustatud enne 01.10.2024. |
| 3058152     | lisdeksamfetamiin dimesülaad, 20mg                      | N06BA12  | ELVANSE, kõvakapsel, 30TK                          | Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch | 75           | F90.0-F90.1 | Psühhiaater            | esmane |           |            | patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus kehtivatele metüülfenidaadi ja atomoksetiini hüvitamistingimustele, kuid kellel on adekvaatne ravi metüülfenidaadi ja atomoksetiiniga osutunud ebaefektiivseks, põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele ravimid on dokumenteeritult meditsiiniliselt vastunäidustatud. Lisaks laieneb soodustus patsientidele, kelle ravi lisdeksamfetamiindimesülaadiga on Tervisekassa rahastusel alustatud enne 01.10.2024. |
| 1857416     | lisdeksamfetamiin dimesülaad, 30mg                      | N06BA12  | ADIXEMIN, kõvakapsel, 30TK                         | Stada Arzneimittel AG                                  | 75           | F90.0-F90.1 | Psühhiaater            | esmane |           |            | patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus kehtivatele metüülfenidaadi ja atomoksetiini hüvitamistingimustele, kuid kellel on adekvaatne ravi metüülfenidaadi ja atomoksetiiniga osutunud ebaefektiivseks, põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele ravimid on dokumenteeritult meditsiiniliselt vastunäidustatud. Lisaks laieneb soodustus patsientidele, kelle ravi lisdeksamfetamiindimesülaadiga on Tervisekassa rahastusel alustatud enne 01.10.2024. |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus   | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus         | Müügiloa hoidja   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|---|------------------|------------------|-------------|--------|--------------|---------------|---|
| 3058028         | lisdeksamfetamiin<br>dimesülaad, 30mg | N06BA1<br>2 | ELVANSE, kõvakapsel,<br>30TK  | Takeda<br>Pharmaceuticals<br>International AG<br>Ireland Branch | 75               |                  | Psühhiaater | esmane |              |               | patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus<br>kehtivatele metüülfenidaadi ja atomoksetiini<br>hüvitamistingimustele, kuid kellel on adekvaatne ravi<br>metüülfenidaadi ja atomoksetiiniga osutunud<br>ebaefektiivseks, põhjustanud ravi katkestama sundivaid<br>kõrvaltoimeid või kellele ravimid on dokumenteeritult<br>meditsiiniliselt vastunäidustatud. Lisaks laieneb soodustus<br>patsientidele, kelle ravi lisdeksamfetamiindimesülaadiga<br>on Tervisekassa rahastusel alustatud enne 01.10.2024. |
| 1857438         | lisdeksamfetamiin<br>dimesülaad, 40mg | N06BA1<br>2 | ADIXEMIN, kõvakapsel,<br>30TK | Stada Arzneimittel<br>AG  | 75               | F90.0-F90.1      | Psühhiaater | esmane |              |               | patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus<br>kehtivatele metüülfenidaadi ja atomoksetiini<br>hüvitamistingimustele, kuid kellel on adekvaatne ravi<br>metüülfenidaadi ja atomoksetiiniga osutunud<br>ebaefektiivseks, põhjustanud ravi katkestama sundivaid<br>kõrvaltoimeid või kellele ravimid on dokumenteeritult<br>meditsiiniliselt vastunäidustatud. Lisaks laieneb soodustus<br>patsientidele, kelle ravi lisdeksamfetamiindimesülaadiga<br>on Tervisekassa rahastusel alustatud enne 01.10.2024. |
| 1857461         | lisdeksamfetamiin<br>dimesülaad, 50mg | N06BA1<br>2 | ADIXEMIN, kõvakapsel,<br>30TK | Stada Arzneimittel<br>AG  | 75               | F90.0-F90.1      | Psühhiaater | esmane |              |               | patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus<br>kehtivatele metüülfenidaadi ja atomoksetiini<br>hüvitamistingimustele, kuid kellel on adekvaatne ravi<br>metüülfenidaadi ja atomoksetiiniga osutunud<br>ebaefektiivseks, põhjustanud ravi katkestama sundivaid<br>kõrvaltoimeid või kellele ravimid on dokumenteeritult<br>meditsiiniliselt vastunäidustatud. Lisaks laieneb soodustus<br>patsientidele, kelle ravi lisdeksamfetamiindimesülaadiga<br>on Tervisekassa rahastusel alustatud enne 01.10.2024. |
| 1857517         | lisdeksamfetamiin<br>dimesülaad, 70mg | N06BA1<br>2 | ADIXEMIN, kõvakapsel,<br>30TK | Stada Arzneimittel<br>AG  | 75               | F90.0-F90.1      | Psühhiaater | esmane |              |               | patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus<br>kehtivatele metüülfenidaadi ja atomoksetiini<br>hüvitamistingimustele, kuid kellel on adekvaatne ravi<br>metüülfenidaadi ja atomoksetiiniga osutunud<br>ebaefektiivseks, põhjustanud ravi katkestama sundivaid<br>kõrvaltoimeid või kellele ravimid on dokumenteeritult<br>meditsiiniliselt vastunäidustatud. Lisaks laieneb soodustus<br>patsientidele, kelle ravi lisdeksamfetamiindimesülaadiga<br>on Tervisekassa rahastusel alustatud enne 01.10.2024. |
| 1300598         | lisinopriil+amlodipiin,<br>10mg+5mg   | C09BB0<br>3 | DIRONORM, tablett,<br>30TK    | Gedeon Richter<br>Plc.  | 50               |                  |             |        |              |               |   |
|                 |                                       |             |                               |   | 75               | I10-I13, I15-I15 |             |        |              |               |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                   | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|--------------------------|------------------|---|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1501456         | lisinopriil+amlodipiin, 20mg+5mg    | C09BB03     | DIRONORM, tablett, 30TK                                 | Gedeon Richter Plc.      | 75               | I10-I13, I15-I15                                    |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                          | 50               |   |        |        |              |               |          |
| 1111284         | lispro-insuliin, 100ühik 1ml        | A10AB04     | HUMALOG, süstelahus kolbampullis, 3ml 5TK               | Eli Lilly Nederland B.V. | 100              | O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                          | 50               |   |        |        |              |               |          |
| 1364510         | lispro-insuliin, 100ühik 1ml        | A10AB04     | HUMALOG KWIKPEN, süstelahus, 3ml 5TK                    | Eli Lilly Nederland B.V. | 100              | O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                          | 50               |   |        |        |              |               |          |
| 1364532         | lispro-insuliin, 100ühik 1ml        | A10AD04     | HUMALOG MIX25 KWIKPEN, süstesuspensioon, 3ml 5TK        | Eli Lilly Nederland B.V. | 50               | O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                          | 100              |   |        |        |              |               |          |
| 1364554         | lispro-insuliin, 100ühik 1ml        | A10AD04     | HUMALOG MIX50 KWIKPEN, süstesuspensioon, 3ml 5TK        | Eli Lilly Nederland B.V. | 50               | O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                          | 100              |   |        |        |              |               |          |
| 1754692         | lispro-insuliin, 100ühik 1ml        | A10AB04     | HUMALOG JUNIOR KWIKPEN, süstelahus pen-süstlis, 3ml 5TK | Eli Lilly Nederland B.V. | 100              | O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                          | 50               |   |        |        |              |               |          |
| 1814408         | lispro-insuliin, 100ühik 1ml        | A10AB04     | LYUMJEV KWIKPEN, süstelahus pen-süstlis, 3ml 5TK        | Eli Lilly Nederland B.V. | 100              | O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                          | 50               |   |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus      | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                    | Müügiloa hoidja                        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala        | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |
|-----------------|--|-------------|--|--|------------------|---|---------------|--------|--------------|---------------|--|
| 1713248         | lispro-insuliin,<br>200ühik 1ml          | A10AB0<br>4 | HUMALOG KWIKPEN,<br>süstelahus pen-süstlis,<br>3ml 5TK   | Eli Lilly Nederland<br>B.V.            | 50<br>100        | O24-O24, E13-<br>E14, E10-E11,<br>P70.2-P70.2,<br>E89.1-E89.1 |               |        |              |               |  |
| 1063482         | loperamiid, 2mg                          | A07DA0<br>3 | IMODIUM, kõvakapsel,<br>20TK                             | McNeil Healthcare<br>(Ireland) Limited | 50               |   |               |        |              |               |  |
| 1503571         | loperamiid, 2mg                          | A07DA0<br>3 | LOPACUT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK    | Vitabalans Oy                          | 50               |   |               |        |              |               |  |
| 1284320         | lopinaviir+ritonaviir<br>, 200mg+50mg    | J05AR1<br>0 | KALETRA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>120TK   | AbbVie<br>Deutschland<br>GmbH & Co. KG | 50               |   | Infektsionist |        |              |               | HIV-nakkuse profülaktikaks, v a tööülesannete täitmisega<br>seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega  |
| 1082472         | lopinaviir+ritonaviir<br>, 80mg+20mg 1ml | J05AR1<br>0 | KALETRA, suukaudne<br>lahus, 60ml 5TK                    | AbbVie<br>Deutschland<br>GmbH & Co. KG | 50               |   | Infektsionist |        |              |               | HIV-nakkuse profülaktikaks, v a tööülesannete täitmisega<br>seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega  |
| 1796104         | lorlatiniib, 100mg                       | L01ED0<br>5 | LORVIQUA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK   | Pfizer Europe MA<br>EEIG               | 100              | C34-C34   | Onkoloog      |        |              |               | I või II rea raviks anaplastilise lümfoomkinaas-positiivse<br>kaugelearenenud mitteväikerakk-kopsuvähiga heas<br>üldseisundis (ECOG 0-2) täiskasvanud patsientidele, kes<br>on varem ravimata või kelle haigus on progresseerunud<br>pärast esmavaliku ravi ALK türosiinikinaasi inhibiitoriga |
| 1816422         | lorlatiniib, 25mg                        | L01ED0<br>5 | LORVIQUA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>90TK   | Pfizer Europe MA<br>EEIG               | 100              | C34-C34   | Onkoloog      |        |              |               | I või II rea raviks anaplastilise lümfoomkinaas-positiivse<br>kaugelearenenud mitteväikerakk-kopsuvähiga heas<br>üldseisundis (ECOG 0-2) täiskasvanud patsientidele, kes<br>on varem ravimata või kelle haigus on progresseerunud<br>pärast esmavaliku ravi ALK türosiinikinaasi inhibiitoriga |
| 1805756         | lornoksikaam, 8mg                        | M01AC0<br>5 | XEFO RAPID, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>20TK | First Pharma OÜ                        | 50               |   |               |        |              |               |  |
| 1805767         | lornoksikaam, 8mg                        | M01AC0<br>5 | XEFO RAPID, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | First Pharma OÜ                        | 50               |   |               |        |              |               |  |
| 1830608         | lornoksikaam, 8mg                        | M01AC0<br>5 | XEFO RAPID, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>20TK | Ideal Trade Links<br>UAB               | 50               |   |               |        |              |               |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus      | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                             | Müügiloa hoidja                           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                  | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|--|-------------|---|---|------------------|---------------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1834332         | lornoksikaam, 8mg                        | M01AC05     | XEFO, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK      | Lex Ano UAB                               | 50               |                           |        |        |              |               |          |
| 1207167         | losartaan, 100mg                         | C09CA01     | LOZAP 100, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Zentiva k.s.                              | 50               |                           |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |   | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |              |               |          |
| 1210688         | losartaan, 100mg                         | C09CA01     | LOZAP 100, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Zentiva k.s.                              | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |   | 50               |                           |        |        |              |               |          |
| 1268962         | losartaan, 100mg                         | C09CA01     | LORISTA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK   | KRKA, d.d., Novo mesto                    | 50               |                           |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |   | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |              |               |          |
| 1013735         | losartaan, 50mg                          | C09CA01     | LORISTA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK   | KRKA, d.d., Novo mesto                    | 50               |                           |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |   | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |              |               |          |
| 1207134         | losartaan, 50mg                          | C09CA01     | LOZAP 50, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK  | Zentiva k.s.                              | 50               |                           |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |   | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |              |               |          |
| 1210701         | losartaan, 50mg                          | C09CA01     | LOZAP 50, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK  | Zentiva k.s.                              | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |   | 50               |                           |        |        |              |               |          |
| 1166059         | losartaan+hüdroklorotiasiid, 50mg+12,5mg | C09DA80     | LORISTA H, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | KRKA d.d. Novo mesto                      | 50               |                           |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |   | 75               | I10-I13, I15-I15          |        |        |              |               |          |
| 1217809         | losartaan+hüdroklorotiasiid, 50mg+12,5mg | C09DA80     | LOZAP H, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK   | Zentiva k.s.                              | 50               |                           |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |   | 75               | I10-I13, I15-I15          |        |        |              |               |          |
| 1217810         | losartaan+hüdroklorotiasiid, 50mg+12,5mg | C09DA80     | LOZAP H, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK   | Zentiva k.s.                              | 75               | I10-I13, I15-I15          |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |   | 50               |                           |        |        |              |               |          |
| 1185195         | loteprednool, 0,5%                       | S01BA14     | LOTEMAX, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK        | Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm. Fabrik GmbH | 50               |                           |        |        |              |               |          |
| 7000175         | L-tsitrulliin,                           |             | L-CITRULLINE , pulber, 100 g N1                   | SHS                                       | 50               |                           |        |        |              |               |          |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus  | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja               | Soodus-tus % | Diagnoos  | Eriala  | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-------------|--|----------|--|-------------------------------|--------------|---|---|--------|-----------|------------|---|
| 7017476     | L-tsitrulliin,   |          | L-CITRULLINE, pulber, 100g N10                                   | SHS International Ltd         | 50           |   |   |        |           |            |   |
| 1029417     | lühikese toimeajaga humaaninsuliin, 100RÜ 1ml  | A10AB01  | HUMULIN R, süstelahus kolbampullis, 3ml 5TK                      | Eli Lilly Nederland B.V.      | 100          | O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1 |   |        |           |            |   |
|             |  |          |  |                               | 50           |   |   |        |           |            |   |
| 1479416     | makrogool+naatrium sulfaat, veevaba+naatrium kloriid+kaaliumkloriid+askorbiinhape+naatriumaskorbaat, 100g+7,5g+2,691g +1,015g+0+0/0+0 +0+0+4,7g+5,9g | A06AD83  | MOVIPREP, suukaudse lahuse pulber, 2TK / 2TK                     | Norgine B.V.                  | 50           |   |   |        |           |            |   |
| 1636602     | matsitentaan, 10mg   | C02KX04  | OPSUMIT, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK                  | Janssen - Cilag International | 100          | I27.0-I27.0   | Pulmonoloog, Kardioloog, Pediaater, Reumatoloog |        |           |            | NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafili ja bosentaan on vastunäidustatud, osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid |
|             |  |          |  |                               | 50           |   |   |        |           |            |   |
| 1007222     | mebendasool, 100mg   | P02CA01  | VERMOX 100 MG, tablett, 6TK                                      | Gedeon Richter Plc.           | 50           |   |   |        |           |            |   |
| 1008245     | mebendasool, 100mg   | P02CA01  | MEBENDAZOLE-GRINDEKS, tablett, 6TK                               | Grindeks AS                   | 50           |   |   |        |           |            |   |
| 1832486     | mebendasool, 100mg   | P02CA01  | VERMOX 100 MG, tablett, 6TK                                      | Lex Ano UAB                   | 50           |   |   |        |           |            |   |
| 1837076     | mebendasool, 100mg   | P02CA01  | VERMOX 100 MG, tablett, 6TK                                      | Ideal Trade Links UAB         | 50           |   |   |        |           |            |   |
| 1136696     | mebeveriin, 200mg  | A03AA04  | DUSPATALIN, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 30TK | Viatrix SIA                   | 50           |   |   |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala                  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|--|------------------|-------------------------------|-------------------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1891672         | mebeveriin,<br>200mg                | A03AA0<br>4 | DUSPATALIN,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 30TK | Lex Ano UAB                                      | 50               |                               |                         |        |              |               |          |
| 1013195         | medroksüprogeste<br>roon, 500mg     | L02AB0<br>2 | FARLUTAL, tablett,<br>30TK  | Pfizer Europe MA<br>EEIG                         | 100<br>50        | C00-D48                       | Onkoloog                |        |              |               |          |
| 1004410         | melfalaan, 2mg                      | L01AA0<br>3 | ALKERAN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>25TK                     | Aspen Pharma<br>Trading Limited                  | 50<br>100        | C00-D48                       | Onkoloog,<br>Hematoloog |        |              |               |          |
| 1035021         | meloksikaam,<br>15mg                | M01AC0<br>6 | MOVALIS, tablett, 20TK  | Boehringer<br>Ingelheim<br>International<br>GmbH | 50               |                               |                         |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |  | 75               | M15-M19                       |                         |        | 63,00        |               |          |
|                 |                                     |             |   |  | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46 |                         |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |  | 100              | C00-D48                       |                         |        |              |               |          |
| 1140680         | meloksikaam,<br>15mg                | M01AC0<br>6 | MELOX 15MG, tablett,<br>20TK  | Medochemie<br>Limited                            | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46 |                         |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |  | 75               | M15-M19                       |                         |        | 63,00        |               |          |
|                 |                                     |             |   |  | 50               |                               |                         |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |  | 100              | C00-D48                       |                         |        |              |               |          |
| 1149779         | meloksikaam,<br>15mg                | M01AC0<br>6 | MEXOLAN 15 MG,<br>tablett, 30TK   | G.L. Pharma<br>GmbH                              | 50               |                               |                         |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |  | 75               | M15-M19                       |                         |        | 63,00        |               |          |
|                 |                                     |             |   |  | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46 |                         |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |  | 100              | C00-D48                       |                         |        |              |               |          |
| 1175936         | meloksikaam,<br>15mg                | M01AC0<br>6 | RECOXA, tablett, 20TK   | Zentiva k.s.                                     | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46 |                         |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |  | 100              | C00-D48                       |                         |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |  | 75               | M15-M19                       |                         |        | 63,00        |               |          |
|                 |                                     |             |   |  | 50               |                               |                         |        |              |               |          |
| 1189199         | meloksikaam,<br>15mg                | M01AC0<br>6 | LORMED 15 MG,<br>tablett, 20TK  | Pro.Med.Cs Praha<br>a.s.                         | 50               |                               |                         |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |  | 100              | C00-D48                       |                         |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |  | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46 |                         |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |  | 75               | M15-M19                       |                         |        | 63,00        |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                            | Müügiloo hoidja                                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|--|------------------|-------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1240254         | meloksikaam,<br>15mg                | M01AC0<br>6 | RECOXA, tablett, 60TK                            | Zentiva k.s.                                     | 50               |                               |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |  | 75               | M15-M19                       |        | 63,00  |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |  | 100              | C00-D48                       |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |  | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46 |        |        |              |               |          |
| 1360189         | meloksikaam,<br>15mg                | M01AC0<br>6 | MELOXICAM-<br>RATIOPHARM 15 MG,<br>tablett, 20TK | Ratiopharm GmbH                                  | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |  | 75               | M15-M19                       |        | 63,00  |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |  | 50               |                               |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |  | 100              | C00-D48                       |        |        |              |               |          |
| 1560260         | meloksikaam,<br>15mg                | M01AC0<br>6 | MELOX 15MG, tablett,<br>60TK                     | Medochemie<br>Limited                            | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |  | 50               |                               |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |  | 100              | C00-D48                       |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |  | 75               | M15-M19                       |        | 63,00  |              |               |          |
| 3038532         | meloksikaam,<br>15mg                | M01AC0<br>6 | MOVALIS, tablett, 20TK                           | Ideal Trade Links<br>UAB                         | 100              | C00-D48                       |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |  | 50               |                               |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |  | 75               | M15-M19                       |        | 63,00  |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |  | 75               | M45-M46, M05-<br>M08, M30-M35 |        |        |              |               |          |
| 1035009         | meloksikaam,<br>7,5mg               | M01AC0<br>6 | MOVALIS, tablett, 20TK                           | Boehringer<br>Ingelheim<br>International<br>GmbH | 75               | M15-M19                       |        |        | 63,00        |               |          |
|                 |                                     |             |  |  | 100              | C00-D48                       |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |  | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |  | 50               |                               |        |        |              |               |          |
| 1140679         | meloksikaam,<br>7,5mg               | M01AC0<br>6 | MELOX 7,5MG, tablett,<br>30TK                    | Medochemie<br>Limited                            | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |  | 75               | M15-M19                       |        | 63,00  |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |  | 100              | C00-D48                       |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |  | 50               |                               |        |        |              |               |          |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                      | Müügiloo hoidja                         | Soodus-tus % | Diagnoos                  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-------------|-------------------------------|----------|--|---|--------------|---------------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1146350     | meloksikaam, 7,5mg            | M01AC06  | MOVALIS, tablett, 50TK                     | Boehringer Ingelheim International GmbH | 100          | C00-D48                   |        |        |           |            |          |
|             |                               |          |  |   | 75           | M30-M35, M05-M08, M45-M46 |        |        |           |            |          |
|             |                               |          |  |   | 50           |                           |        |        |           |            |          |
|             |                               |          |  |   | 75           | M15-M19                   |        | 63,00  |           |            |          |
| 1149746     | meloksikaam, 7,5mg            | M01AC06  | MEXOLAN 7,5 MG, tablett, 30TK              | G.L. Pharma GmbH                        | 100          | C00-D48                   |        |        |           |            |          |
|             |                               |          |  |   | 75           | M30-M35, M05-M08, M45-M46 |        |        |           |            |          |
|             |                               |          |  |   | 50           |                           |        |        |           |            |          |
|             |                               |          |  |   | 75           | M15-M19                   |        | 63,00  |           |            |          |
| 1360134     | meloksikaam, 7,5mg            | M01AC06  | MELOXICAM-RATIOPHARM 7,5 MG, tablett, 20TK | Ratiopharm GmbH                         | 100          | C00-D48                   |        |        |           |            |          |
|             |                               |          |  |   | 75           | M15-M19                   |        | 63,00  |           |            |          |
|             |                               |          |  |   | 75           | M30-M35, M05-M08, M45-M46 |        |        |           |            |          |
|             |                               |          |  |   | 50           |                           |        |        |           |            |          |
| 1360156     | meloksikaam, 7,5mg            | M01AC06  | MELOXICAM-RATIOPHARM 7,5 MG, tablett, 50TK | Ratiopharm GmbH                         | 100          | C00-D48                   |        |        |           |            |          |
|             |                               |          |  |   | 75           | M30-M35, M05-M08, M45-M46 |        |        |           |            |          |
|             |                               |          |  |   | 75           | M15-M19                   |        | 63,00  |           |            |          |
|             |                               |          |  |   | 50           |                           |        |        |           |            |          |
| 1560271     | meloksikaam, 7,5mg            | M01AC06  | MELOX 7,5MG, tablett, 60TK                 | Medochemie Limited                      | 50           |                           |        |        |           |            |          |
|             |                               |          |  |   | 75           | M15-M19                   |        | 63,00  |           |            |          |
|             |                               |          |  |   | 75           | M30-M35, M05-M08, M45-M46 |        |        |           |            |          |
|             |                               |          |  |   | 100          | C00-D48                   |        |        |           |            |          |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                            | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|---------------------------|------------------|---|-------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1006007         | melperoon, 25mg                     | N05AD03     | BURONIL, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK | Medilink A/S              | 100              | F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 50               |   |             |        |              |               |          |
| 1006030         | melperoon, 50mg                     | N05AD03     | BURONIL, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK | Medilink A/S              | 100              | F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 50               |   |             |        |              |               |          |
| 1123524         | memantiin, 10mg                     | N06DX01     | AXURA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK    | Merz Pharmaceuticals GmbH | 50               |   |             |        |              |               |          |
| 1123535         | memantiin, 10mg                     | N06DX01     | AXURA, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK    | Merz Pharmaceuticals GmbH | 50               |   |             |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|-----------------------------|------------------|----------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1614024         | memantiin, 10mg                     | N06DX0<br>1 | NEMDATINE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK               | Actavis Group Ptc<br>ehf.   | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1614057         | memantiin, 10mg                     | N06DX0<br>1 | NEMDATINE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK               | Actavis Group Ptc<br>ehf.   | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1614563         | memantiin, 10mg                     | N06DX0<br>1 | MARIXINO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                | KRKA d.d. Novo<br>mesto     | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1614608         | memantiin, 10mg                     | N06DX0<br>1 | MARIXINO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK                | KRKA d.d. Novo<br>mesto     | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1618747         | memantiin, 10mg                     | N06DX0<br>1 | MEMANTINE<br>RATIOPHARM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Ratiopharm GmbH             | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1618781         | memantiin, 10mg                     | N06DX0<br>1 | MEMANTINE<br>RATIOPHARM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK | Ratiopharm GmbH             | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1621998         | memantiin, 10mg                     | N06DX0<br>1 | MANTOMED, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                | Medochemie<br>Limited       | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1622023         | memantiin, 10mg                     | N06DX0<br>1 | MANTOMED, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK                | Medochemie<br>Limited       | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1635331         | memantiin, 10mg                     | N06DX0<br>1 | MEMANTINE ACCORD,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK     | Accord Healthcare<br>S.L.U. | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1635375         | memantiin, 10mg                     | N06DX0<br>1 | MEMANTINE ACCORD,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK     | Accord Healthcare<br>S.L.U. | 50               |          |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus            | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                    | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|--|-------------|---|--|------------------|-----------------------------|--|--------|--------------|---------------|---|
| 1648694         | memantiin, 10mg                                | N06DX0<br>1 | MEMANTINE<br>GRINDEKS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Grindeks AS                                    | 50               |                             |  |        |              |               |   |
| 1648739         | memantiin, 10mg                                | N06DX0<br>1 | MEMANTINE<br>GRINDEKS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Grindeks AS                                    | 50               |                             |  |        |              |               |   |
| 1621819         | memantiin, 20mg                                | N06DX0<br>1 | MANTOMED, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK              | Medochemie<br>Limited                          | 50               |                             |  |        |              |               |   |
| 1872895         | menopausaalne<br>humaangonadotro<br>piin, 75RÜ | G03GA0<br>2 | MENOPUR, süstelahuse<br>pulber ja lahusti, 5TK                      | Ferring GmbH                                   | 100              | N97.0-N97.9,<br>Z31.0-Z31.9 |  |        |              | 41,00         | kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise<br>tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks   |
| 1802562         | mepolizumab,<br>100mg                          | R03DX0<br>9 | NUCALA, süstelahus<br>pen-süstlis, 1ml 1TK                          | GlaxoSmithKline<br>Trading Services<br>Limited | 100              | J32-J33                     | Otorinolarüngolo<br>og, Allergoloog-<br>immunoloog                 |        |              |               | vähemalt kolmeliikmelise kõrva-nina-kurguarstidest<br>koosneva eksperdikomisjoni otsuse alusel patsiendile,<br>kellel on raske krooniline rinosiniit ning ninapolüpooside<br>raviks on viimase 2 aasta jooksul teostatud vähemalt 2<br>endoskoopilist siinuse operatsiooni või üle kolme<br>endoskoopilise siinuse operatsiooni elu jooksul. Kui 16<br>nädala möödudes ravi alustamisest ei ole patsiendi NPS<br>skoor vähenenud vähemalt ühe ühiku võrra, siis ravi<br>katkestatakse |
| 1004971         | merkaptopuriin,<br>50mg                        | L01BB0<br>2 | PURI-NETHOL, tablett,<br>25TK                                       | Aspen Pharma<br>Trading Limited                | 100              | C00-D48                     | Onkoloog,<br>Pediaater –<br>hematoloog-<br>onkoloog,<br>Hematoloog |        |              |               |   |
|                 |  |             |   |  | 50               |                             |  |        |              |               |   |
| 1737648         | mesalasiin,<br>1600mg                          | A07EC0<br>2 | YALDIGO, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 30TK   | Tillotts Pharma AB                             | 75               | K51-K51, K50-<br>K50        | Pediaater,<br>Gastroenteroloo<br>g                                 |        |              |               |   |
|                 |  |             |   |  | 50               |                             |  |        |              |               |   |
| 1023815         | mesalasiin, 1g                                 | A07EC0<br>2 | PENTASA,<br>rektaalsuposiit, 28TK                                   | Ferring GmbH                                   | 50               |                             |  |        |              |               |   |
|                 |  |             |   |  | 75               | K51-K51, K50-<br>K50        | Gastroenteroloo<br>g, Pediaater                                    |        |              |               |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja    | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala                             | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|--------------------|------------------|----------------------|------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1352810         | mesalasiin, 1g                      | A07EC0<br>2 | PENTASA 1G,<br>toimeainet<br>prolongeeritult<br>vabastavad graanulid,<br>50TK | Ferring GmbH       | 50               |                      |                                    |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                    | 75               | K51-K51, K50-<br>K50 | Gastroenteroloo<br>g, Pediaater    |        |              |               |          |
| 1807578         | mesalasiin, 1g                      | A07EC0<br>2 | YALDIGO,<br>rektaalsuposiit, 30TK   | Tillotts Pharma AB | 75               | K51-K51, K50-<br>K50 | Pediaater,<br>Gastroenteroloo<br>g |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                    | 50               |                      |                                    |        |              |               |          |
| 1352854         | mesalasiin, 2g                      | A07EC0<br>2 | PENTASA 2G,<br>toimeainet<br>prolongeeritult<br>vabastavad graanulid,<br>60TK | Ferring GmbH       | 75               | K51-K51, K50-<br>K50 | Gastroenteroloo<br>g, Pediaater    |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                    | 50               |                      |                                    |        |              |               |          |
| 1146574         | mesalasiin, 400mg                   | A07EC0<br>2 | ASACOL 400MG,<br>toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 100TK    | Tillotts Pharma AB | 75               | K51-K51, K50-<br>K50 | Pediaater,<br>Gastroenteroloo<br>g |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                    | 50               |                      |                                    |        |              |               |          |
| 3006762         | mesalasiin, 4g                      | A07EC0<br>2 | PENTASA 4G,<br>toimeainet<br>prolongeeritult<br>vabastavad graanulid,<br>30TK | Ferring GmbH       | 50               |                      |                                    |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                    | 75               | K51-K51, K50-<br>K50 | Pediaater,<br>Gastroenteroloo<br>g |        |              |               |          |
| 1023826         | mesalasiin, 500mg                   | A07EC0<br>2 | PENTASA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 100TK             | Ferring GmbH       | 75               | K51-K51, K50-<br>K50 | Pediaater,<br>Gastroenteroloo<br>g |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                    | 50               |                      |                                    |        |              |               |          |
| 1146541         | mesalasiin, 500mg                   | A07EC0<br>2 | ASACOL,<br>rektaalsuposiit, 20TK  | Tillotts Pharma AB | 75               | K51-K51, K50-<br>K50 | Pediaater,<br>Gastroenteroloo<br>g |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                    | 50               |                      |                                    |        |              |               |          |
| 1184970         | mesalasiin, 800mg                   | A07EC0<br>2 | ASACOL 800 MG,<br>toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 50TK    | Tillotts Pharma AB | 50               |                      |                                    |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                    | 75               | K51-K51, K50-<br>K50 | Gastroenteroloo<br>g, Pediaater    |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                 | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala                                      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla  | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|---------------------------------|------------------|----------------------|---|--------|--------------|--|----------|
| 1034109         | metadoon, 1mg<br>1ml                | N07BC0<br>2 | METADON DAK 1<br>MG/ML, suukaudne<br>lahus, 1000ml 1TK                            | Orifarm<br>Healthcare A/S       | 100              | C00-D48              |   |        |              |  |          |
|                 |                                     |             |   |                                 | 100              | R52.1-R52.1          | Reumatoloog,<br>Anestesioloog,<br>Neuroloog | esmane |              | esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega<br>anestesioloogil, reumatoloogil ja neurooloogil ühe aasta<br>jooksul |          |
|                 |                                     |             |   |                                 | 50               |                      |   |        |              |  |          |
| 1164798         | metformiin,<br>1000mg               | A10BA0<br>2 | METFORAL 1000 MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>120TK                | Laboratori Guidotti<br>S.p.A.   | 75               | E14-E14, E11-<br>E11 |   |        |              |  |          |
|                 |                                     |             |   |                                 | 50               |                      |   |        |              |  |          |
| 1302949         | metformiin,<br>1000mg               | A10BA0<br>2 | METFOGAMMA 1000,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>120TK                 | Woerwag Pharma<br>GmbH & Co. KG | 75               | E14-E14, E11-<br>E11 |   |        |              |  |          |
|                 |                                     |             |   |                                 | 50               |                      |   |        |              |  |          |
| 1568246         | metformiin,<br>1000mg               | A10BA0<br>2 | METFORMIN TEVA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>120TK                  | Teva Pharma B.V.                | 75               | E14-E14, E11-<br>E11 |   |        |              |  |          |
|                 |                                     |             |   |                                 | 50               |                      |   |        |              |  |          |
| 1818019         | metformiin,<br>1000mg               | A10BA0<br>2 | METFORMIN ZENTIVA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>120TK               | Zentiva k.s.                    | 75               | E11-E11, E14-<br>E14 |   |        |              |  |          |
|                 |                                     |             |   |                                 | 50               |                      |   |        |              |  |          |
| 1820034         | metformiin,<br>1000mg               | A10BA0<br>2 | METFORMIN ACCORD,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>120TK                | Accord Healthcare<br>B.V.       | 75               | E14-E14, E11-<br>E11 |   |        |              |  |          |
|                 |                                     |             |   |                                 | 50               |                      |   |        |              |  |          |
| 1064719         | metformiin, 500mg                   | A10BA0<br>2 | METFORAL 500 MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>120TK                 | Berlin-Chemie AG                | 75               | E14-E14, E11-<br>E11 |   |        |              |  |          |
|                 |                                     |             |   |                                 | 50               |                      |   |        |              |  |          |
| 1083169         | metformiin, 500mg                   | A10BA0<br>2 | METFORMIN-<br>RATIOPHARM 500 MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>120TK | Ratiopharm GmbH                 | 50               |                      |   |        |              |  |          |
|                 |                                     |             |   |                                 | 75               | E14-E14, E11-<br>E11 |   |        |              |  |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                 | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|---------------------------------|------------------|----------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1116380         | metformiin, 500mg                   | A10BA0<br>2 | METFOGAMMA 500,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>120TK                  | Woerwag Pharma<br>GmbH & Co. KG | 50               |                      |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                                 | 75               | E14-E14, E11-<br>E11 |        |        |              |               |          |
| 1817816         | metformiin, 500mg                   | A10BA0<br>2 | METFORMIN ZENTIVA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>120TK               | Zentiva k.s.                    | 50               |                      |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                                 | 75               | E11-E11, E14-<br>E14 |        |        |              |               |          |
| 1819694         | metformiin, 500mg                   | A10BA0<br>2 | METFORMIN ACCORD,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>120TK                | Accord Healthcare<br>B.V.       | 75               | E14-E14, E11-<br>E11 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                                 | 50               |                      |        |        |              |               |          |
| 1064731         | metformiin, 850mg                   | A10BA0<br>2 | METFORAL 850 MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>120TK                 | Berlin-Chemie AG                | 75               | E14-E14, E11-<br>E11 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                                 | 50               |                      |        |        |              |               |          |
| 1083158         | metformiin, 850mg                   | A10BA0<br>2 | METFORMIN-<br>RATIOPHARM 850 MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>120TK | Ratiopharm GmbH                 | 75               | E14-E14, E11-<br>E11 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                                 | 50               |                      |        |        |              |               |          |
| 1111262         | metformiin, 850mg                   | A10BA0<br>2 | METFOGAMMA 850,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>120TK                  | Woerwag Pharma<br>GmbH & Co. KG | 50               |                      |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                                 | 75               | E14-E14, E11-<br>E11 |        |        |              |               |          |
| 1156609         | metformiin, 850mg                   | A10BA0<br>2 | METFORMIN SANDOZ<br>850 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>120TK         | Sandoz GmbH                     | 75               | E14-E14, E11-<br>E11 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                                 | 50               |                      |        |        |              |               |          |
| 1817939         | metformiin, 850mg                   | A10BA0<br>2 | METFORMIN ZENTIVA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>120TK               | Zentiva k.s.                    | 50               |                      |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                                 | 75               | E14-E14, E11-<br>E11 |        |        |              |               |          |
| 1819841         | metformiin, 850mg                   | A10BA0<br>2 | METFORMIN ACCORD,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>120TK                | Accord Healthcare<br>B.V.       | 75               | E14-E14, E11-<br>E11 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                                 | 50               |                      |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus              | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloa hoidja                                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla  | Märkused  |
|-----------------|--|-------------|--|--|------------------|----------------------|--------|--------|--------------|--|---|
| 1637917         | metformiin+dapagl<br>ifloosiin,<br>1000mg+5mg    | A10BD1<br>5 | XIGDUO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK   | Astrazeneca AB                                   | 75               | E11-E11, E14-<br>E14 |        |        |              |  |   |
|                 |  |             |  |  | 50               |                      |        |        |              |  |   |
| 1637861         | metformiin+dapagl<br>ifloosiin,<br>850mg+5mg     | A10BD1<br>5 | XIGDUO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK   | Astrazeneca AB                                   | 75               | E14-E14, E11-<br>E11 |        |        |              |  |   |
|                 |  |             |  |  | 50               |                      |        |        |              |  |   |
| 1687136         | metformiin+empag<br>lifloosiin,<br>1000mg+12,5mg | A10BD2<br>0 | SYNJARDY, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Boehringer<br>Ingelheim<br>International<br>GmbH | 75               | E11-E11, E14-<br>E14 |        |        |              |  | kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama<br>sulfonüüluurea preparaati, välja arvatud juhul kui see on<br>meditsiiniliselt vastunäidustatud |
|                 |  |             |  |  | 75               | I50-I50              |        |        |              | kroonilise südamepuudulikkuse korral patsiendile, kellel<br>esineb kaasuvana II tüüpi diabeet (E11;E14), kes kuulub<br>NYHA II-IV funktsionaalklassi, kellel ravikoostöö on hea<br>ning kellel AKE-inhibiitor või ARB ja beetablokaatori<br>kaksikravigil südamepuudulikkuse sümptomid endiselt<br>püsivad või süvenevad |   |
|                 |  |             |  |  | 50               |                      |        |        |              |  |   |
| 1686955         | metformiin+empag<br>lifloosiin,<br>1000mg+5mg    | A10BD2<br>0 | SYNJARDY, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Boehringer<br>Ingelheim<br>International<br>GmbH | 75               | E14-E14, E11-<br>E11 |        |        |              |  | kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama<br>sulfonüüluurea preparaati, välja arvatud juhul kui see on<br>meditsiiniliselt vastunäidustatud |
|                 |  |             |  |  | 75               | I50-I50              |        |        |              | kroonilise südamepuudulikkuse korral patsiendile, kellel<br>esineb kaasuvana II tüüpi diabeet (E11;E14), kes kuulub<br>NYHA II-IV funktsionaalklassi, kellel ravikoostöö on hea<br>ning kellel AKE-inhibiitor või ARB ja beetablokaatori<br>kaksikravigil südamepuudulikkuse sümptomid endiselt<br>püsivad või süvenevad |   |
|                 |  |             |  |  | 50               |                      |        |        |              |  |   |
| 1687046         | metformiin+empag<br>lifloosiin,<br>850mg+12,5mg  | A10BD2<br>0 | SYNJARDY, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Boehringer<br>Ingelheim<br>International<br>GmbH | 75               | E14-E14, E11-<br>E11 |        |        |              |  | kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama<br>sulfonüüluurea preparaati, välja arvatud juhul kui see on<br>meditsiiniliselt vastunäidustatud |
|                 |  |             |  |  | 75               | I50-I50              |        |        |              | kroonilise südamepuudulikkuse korral patsiendile, kellel<br>esineb kaasuvana II tüüpi diabeet (E11;E14), kes kuulub<br>NYHA II-IV funktsionaalklassi, kellel ravikoostöö on hea<br>ning kellel AKE-inhibiitor või ARB ja beetablokaatori<br>kaksikravigil südamepuudulikkuse sümptomid endiselt<br>püsivad või süvenevad |   |
|                 |  |             |  |  | 50               |                      |        |        |              |  |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus          | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla  | Märkused |
|-----------------|--|-------------|---|--|------------------|----------------------|--------|--------|--------------|--|----------|
| 1686865         | metformiin+empag<br>lifloosiin,<br>850mg+5mg | A10BD2<br>0 | SYNJARDY, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK  | Boehringer<br>Ingelheim<br>International<br>GmbH | 50               |                      |        |        |              |  |          |
|                 |  |             |   |  | 75               | E11-E11, E14-<br>E14 |        |        |              | kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama sulfonüüluurea preparaati, välja arvatud juhul kui see on meditsiiniliselt vastunäidustatud  |          |
|                 |  |             |   |  | 75               | I50-I50              |        |        |              | kroonilise südamepuudulikkuse korral patsiendile, kellel esineb kaasuvana II tüüpi diabeet (E11;E14), kes kuulub NYHA II-IV funktsionaalklassi, kellel ravikoostöö on hea ning kellel AKE-inhibiitor või ARB ja beetablokaatori kaksikraviga südamepuudulikkuse sümptomid endiselt püsivad või süvenevad |          |
| 1590599         | metformiin+linagliptiin,<br>1000mg+2,5mg     | A10BD1<br>1 | JENTADUETO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK                                      | Boehringer<br>Ingelheim<br>International<br>GmbH | 50               |                      |        |        |              |  |          |
|                 |  |             |   |  | 75               | E14-E14, E11-<br>E11 |        |        |              | II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama sulfonüüluurea preparaati, välja arvatud juhul kui see on meditsiiniliselt vastunäidustatud  |          |
| 1590465         | metformiin+linagliptiin, 850mg+2,5mg         | A10BD1<br>1 | JENTADUETO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK                                      | Boehringer<br>Ingelheim<br>International<br>GmbH | 50               |                      |        |        |              |  |          |
|                 |  |             |   |  | 75               | E14-E14, E11-<br>E11 |        |        |              | II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama sulfonüüluurea preparaati, välja arvatud juhul kui see on meditsiiniliselt vastunäidustatud  |          |
| 1361034         | metformiin+sitagliptiin,<br>1000mg+50mg      | A10BD0<br>7 | JANUMET, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK   | Merck Sharp &<br>Dohme B.V.                      | 50               |                      |        |        |              |  |          |
|                 |  |             |   |  | 75               | E11-E11, E14-<br>E14 |        |        |              |  |          |
| 1805307         | metformiin+sitagliptiin,<br>1000mg+50mg      | A10BD0<br>7 | MAYMETSI, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK  | KRKA, d.d., Novo<br>mesto                        | 50               |                      |        |        |              |  |          |
|                 |  |             |   |  | 75               | E11-E11, E14-<br>E14 |        |        |              |  |          |
| 1815049         | metformiin+sitagliptiin,<br>1000mg+50mg      | A10BD0<br>7 | SITAGLIPTIN/METFOR<br>MIN HYDROCHLORIDE<br>TEVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK | Teva GmbH  | 50               |                      |        |        |              |  |          |
|                 |  |             |   |  | 75               | E14-E14, E11-<br>E11 |        |        |              |  |          |
| 1822283         | metformiin+sitagliptiin,<br>1000mg+50mg      | A10BD0<br>7 | JAMESI, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK  | Zentiva k.s.                                     | 75               | E11-E11, E14-<br>E14 |        |        |              |  |          |
|                 |  |             |   |  | 50               |                      |        |        |              |  |          |
| 1828324         | metformiin+sitagliptiin,<br>1000mg+50mg      | A10BD0<br>7 | JUZIMETTE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK                                       | Gedeon Richter<br>Plc.                           | 50               |                      |        |        |              |  |          |
|                 |  |             |   |  | 75               | E14-E14, E11-<br>E11 |        |        |              |  |          |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus     | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|---|-------------|--|-----------------------------|------------------|------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1830169         | metformiin+sitagliptiin,<br>1000mg+50mg | A10BD07     | SITAGLIPTIN/METFORMIN HYDROCHLORIDE SANDOZ, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK   | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |              |               |          |
|                 |   |             |  |                             | 50               |                  |        |        |              |               |          |
| 1833207         | metformiin+sitagliptiin,<br>1000mg+50mg | A10BD07     | METFORMIN HYDROCHLORIDE/SITAGLIPTIN GRINDEKS, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK | Grindeks AS                 | 75               | E11-E11, E14-E14 |        |        |              |               |          |
|                 |   |             |  |                             | 50               |                  |        |        |              |               |          |
| 1360965         | metformiin+sitagliptiin, 850mg+50mg     | A10BD07     | JANUMET, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK                                      | Merck Sharp & Dohme B.V.    | 50               |                  |        |        |              |               |          |
|                 |   |             |  |                             | 75               | E11-E11, E14-E14 |        |        |              |               |          |
| 1805239         | metformiin+sitagliptiin, 850mg+50mg     | A10BD07     | MAYMETSI, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK                                     | KRKA, d.d., Novo mesto      | 75               | E11-E11, E14-E14 |        |        |              |               |          |
|                 |   |             |  |                             | 50               |                  |        |        |              |               |          |
| 1814969         | metformiin+sitagliptiin, 850mg+50mg     | A10BD07     | SITAGLIPTIN/METFORMIN HYDROCHLORIDE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK     | Teva GmbH                   | 50               |                  |        |        |              |               |          |
|                 |   |             |  |                             | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |              |               |          |
| 1822249         | metformiin+sitagliptiin, 850mg+50mg     | A10BD07     | JAMESI, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK                                       | Zentiva k.s.                | 50               |                  |        |        |              |               |          |
|                 |   |             |  |                             | 75               | E11-E11, E14-E14 |        |        |              |               |          |
| 1828256         | metformiin+sitagliptiin, 850mg+50mg     | A10BD07     | JUZIMETTE, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK                                    | Gedeon Richter Plc.         | 50               |                  |        |        |              |               |          |
|                 |   |             |  |                             | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |              |               |          |
| 1830091         | metformiin+sitagliptiin, 850mg+50mg     | A10BD07     | SITAGLIPTIN/METFORMIN HYDROCHLORIDE SANDOZ, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK   | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 50               |                  |        |        |              |               |          |
|                 |   |             |  |                             | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus           | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|---|-------------|--|-----------------------------------|------------------|----------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1833173         | metformiin+sitagli-<br>ptiin, 850mg+50mg      | A10BD0<br>7 | METFORMIN<br>HYDROCHLORIDE/SIT<br>AGLIPTIN GRINDEKS,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK | Grindeks AS                       | 50               |                      |        |        |              |               |          |
|                 |   |             |  |                                   | 75               | E11-E11, E14-<br>E14 |        |        |              |               |          |
| 1349401         | metformiin+vildagli-<br>ptiin,<br>1000mg+50mg | A10BD0<br>8 | EUCREAS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK  | Novartis<br>Europharm<br>Limited  | 75               | E11-E11, E14-<br>E14 |        |        |              |               |          |
|                 |   |             |  |                                   | 50               |                      |        |        |              |               |          |
| 1714968         | metformiin+vildagli-<br>ptiin,<br>1000mg+50mg | A10BD0<br>8 | VILSPOX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK  | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 75               | E11-E11, E14-<br>E14 |        |        |              |               |          |
|                 |   |             |  |                                   | 50               |                      |        |        |              |               |          |
| 1720864         | metformiin+vildagli-<br>ptiin,<br>1000mg+50mg | A10BD0<br>8 | DALTEX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK   | Medochemie<br>Limited             | 50               |                      |        |        |              |               |          |
|                 |   |             |  |                                   | 75               | E11-E11, E14-<br>E14 |        |        |              |               |          |
| 1815397         | metformiin+vildagli-<br>ptiin,<br>1000mg+50mg | A10BD0<br>8 | IPINZAN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK  | Zentiva k.s.                      | 75               | E11-E11, E14-<br>E14 |        |        |              |               |          |
|                 |   |             |  |                                   | 50               |                      |        |        |              |               |          |
| 1848775         | metformiin+vildagli-<br>ptiin,<br>1000mg+50mg | A10BD0<br>8 | VILDAGLIPTIN/<br>METFORMIN ELVIM,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK                    | SIA Elvim                         | 50               |                      |        |        |              |               |          |
|                 |   |             |  |                                   | 75               | E11-E11, E14-<br>E14 |        |        |              |               |          |
| 1878554         | metformiin+vildagli-<br>ptiin,<br>1000mg+50mg | A10BD0<br>8 | VILDAGLIPTIN/METFO<br>RMIN<br>HYDROCHLORIDE<br>ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK  | Accord Healthcare<br>S.L.U.       | 50               |                      |        |        |              |               |          |
|                 |   |             |  |                                   | 75               | E11-E11, E14-<br>E14 |        |        |              |               |          |
| 1897397         | metformiin+vildagli-<br>ptiin,<br>1000mg+50mg | A10BD0<br>8 | VILSPOX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK  | Ideal Trade Links<br>UAB          | 50               |                      |        |        |              |               |          |
|                 |   |             |  |                                   | 75               | E11-E11, E14-<br>E14 |        |        |              |               |          |
| 1714913         | metformiin+vildagli-<br>ptiin,<br>850mg+50mg  | A10BD0<br>8 | VILSPOX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK  | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 75               | E11-E11, E14-<br>E14 |        |        |              |               |          |
|                 |   |             |  |                                   | 50               |                      |        |        |              |               |          |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus                          | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja          | Soodus-tus % | Diagnoos             | Eriala                        | Esmane | Vanus üle | Vanus alla   | Märkused |
|-------------|--|----------|---|--------------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|--------|-----------|--|----------|
| 1720796     | metformiin+vildagliptiin, 850mg+50mg                   | A10BD08  | DALTEX, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK                                      | Medochemie Limited       | 75           | E11-E11, E14-E14     |                               |        |           |  |          |
|             |  |          |   |                          | 50           |                      |                               |        |           |  |          |
| 1815353     | metformiin+vildagliptiin, 850mg+50mg                   | A10BD08  | IPINZAN, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK                                     | Zentiva k.s.             | 75           | E11-E11, E14-E14     |                               |        |           |  |          |
|             |  |          |   |                          | 50           |                      |                               |        |           |  |          |
| 1848764     | metformiin+vildagliptiin, 850mg+50mg                   | A10BD08  | VILDAGLIPTIN/METFORMIN ELVIM, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK                | SIA Elvim                | 75           | E11-E11, E14-E14     |                               |        |           |  |          |
|             |  |          |   |                          | 50           |                      |                               |        |           |  |          |
| 1878532     | metformiin+vildagliptiin, 850mg+50mg                   | A10BD08  | VILDAGLIPTIN/METFORMIN HYDROCHLORIDE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Accord Healthcare S.L.U. | 50           |                      |                               |        |           |  |          |
|             |  |          |   |                          | 75           | E11-E11, E14-E14     |                               |        |           |  |          |
| 1897364     | metformiin+vildagliptiin, 850mg+50mg                   | A10BD08  | VILSPOX, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK                                     | Ideal Trade Links UAB    | 50           |                      |                               |        |           |  |          |
|             |  |          |   |                          | 75           | E11-E11, E14-E14     |                               |        |           |  |          |
| 1000674     | metoklopramiid, 10mg                                   | A03FA01  | CERUCAL, tablett, 50TK  | Teva Pharma B.V.         | 100          | C00-D48              |                               |        |           |  |          |
|             |  |          |   |                          | 50           |                      |                               |        |           |  |          |
| 1699050     | metoklopramiid, 10mg                                   | A03FA01  | METOCLOPRAMIDE ACCORD, tablett, 50TK  | Accord Healthcare B.V.   | 50           |                      |                               |        |           |  |          |
|             |  |          |   |                          | 100          | C00-D48              |                               |        |           |  |          |
| 1327643     | metoksüpolüetüleen-glükool-beetaepoetiin, 100mcg 0.3ml | B03XA03  | MIRCERA, süstelahus süstlis, 0.3ml 1TK  | Roche Registration GmbH  | 50           |                      |                               |        |           |  |          |
|             |  |          |   |                          | 100          | D46-D46, D47.1-D47.1 | Hematoloog                    |        |           |  |          |
|             |  |          |   |                          | 100          | D63-D63, T86-T86     | Uroloog, Pediaater, Nefroloog |        |           | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                              | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala                              | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla  | Märkused |
|-----------------|--|-------------|---|-------------------------------|------------------|---|-------------------------------------|--------|--------------|--|----------|
| 1370540         | metoksüpolüetülee<br>nglükool-<br>beetaepoetiin,<br>120mcg 0.3ml | B03XA0<br>3 | MIRCERA, süstelahus<br>süstlis, 0.3ml 1TK                                   | Roche<br>Registration<br>GmbH | 50               |   |                                     |        |              |  |          |
|                 |  |             |   |                               | 100              | D46-D46,<br>D47.1-D47.1                           | Hematoloog                          |        |              |  |          |
|                 |  |             |   |                               | 100              | D63-D63, T86-<br>T86                              | Nefroloog,<br>Pediaater,<br>Uroloog |        |              | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral |          |
| 1327665         | metoksüpolüetülee<br>nglükool-<br>beetaepoetiin,<br>200mcg 0.3ml | B03XA0<br>3 | MIRCERA, süstelahus<br>süstlis, 0.3ml 1TK                                   | Roche<br>Registration<br>GmbH | 100              | D46-D46,<br>D47.1-D47.1                           | Hematoloog                          |        |              |  |          |
|                 |  |             |   |                               | 50               |   |                                     |        |              |  |          |
|                 |  |             |   |                               | 100              | D63-D63, T86-<br>T86                              | Pediaater,<br>Uroloog,<br>Nefroloog |        |              | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral |          |
| 1327621         | metoksüpolüetülee<br>nglükool-<br>beetaepoetiin,<br>50mcg 0.3ml  | B03XA0<br>3 | MIRCERA, süstelahus<br>süstlis, 0.3ml 1TK                                   | Roche<br>Registration<br>GmbH | 50               |   |                                     |        |              |  |          |
|                 |  |             |   |                               | 100              | D63-D63, T86-<br>T86                              | Nefroloog,<br>Pediaater,<br>Uroloog |        |              | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral |          |
|                 |  |             |   |                               | 100              | D46-D46,<br>D47.1-D47.1                           | Hematoloog                          |        |              |  |          |
| 1327632         | metoksüpolüetülee<br>nglükool-<br>beetaepoetiin,<br>75mcg 0.3ml  | B03XA0<br>3 | MIRCERA, süstelahus<br>süstlis, 0.3ml 1TK                                   | Roche<br>Registration<br>GmbH | 50               |   |                                     |        |              |  |          |
|                 |  |             |   |                               | 100              | D46-D46,<br>D47.1-D47.1                           | Hematoloog                          |        |              |  |          |
|                 |  |             |   |                               | 100              | D63-D63, T86-<br>T86                              | Pediaater,<br>Nefroloog,<br>Uroloog |        |              | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral |          |
| 1010811         | metoprolol,<br>100mg   | C07AB0<br>2 | EMZOK, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK              | Teva B.V.                     | 50               |   |                                     |        |              |  |          |
|                 |  |             |   |                               | 75               | I47-I49, I50-I50,<br>I20-I20, I10-I13,<br>I15-I15 |                                     |        |              |  |          |
| 1019720         | metoprolol,<br>100mg   | C07AB0<br>2 | BETALOC ZOK 100,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | Recordati Ireland<br>Limited  | 50               |   |                                     |        |              |  |          |
|                 |  |             |   |                               | 75               | I47-I49, I50-I50,<br>I20-I20, I10-I13,<br>I15-I15 |                                     |        |              |  |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|-----------------------------------|------------------|---|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1224278         | metoprolol,<br>100mg                | C07AB0<br>2 | METOZOK, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK           | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 50               |   |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                   | 75               | I47-I49, I50-I50,<br>I20-I20, I10-I13,<br>I15-I15 |        |        |              |               |          |
| 1224290         | metoprolol,<br>100mg                | C07AB0<br>2 | METOZOK, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 100TK          | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 75               | I47-I49, I50-I50,<br>I20-I20, I10-I13,<br>I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                   | 50               |   |        |        |              |               |          |
| 1672286         | metoprolol,<br>100mg                | C07AB0<br>2 | BLOXAZOC 100,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK   | KRKA, d.d., Novo<br>mesto         | 50               |   |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                   | 75               | I47-I49, I50-I50,<br>I20-I20, I10-I13,<br>I15-I15 |        |        |              |               |          |
| 1083406         | metoprolol, 25mg                    | C07AB0<br>2 | BETALOC ZOK 25,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 28TK | Recordati Ireland<br>Limited      | 50               |   |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                   | 75               | I47-I49, I50-I50,<br>I20-I20, I10-I13,<br>I15-I15 |        |        |              |               |          |
| 1224201         | metoprolol, 25mg                    | C07AB0<br>2 | METOZOK, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK           | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 50               |   |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                   | 75               | I47-I49, I50-I50,<br>I20-I20, I10-I13,<br>I15-I15 |        |        |              |               |          |
| 1672130         | metoprolol, 25mg                    | C07AB0<br>2 | BLOXAZOC 25,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 100TK   | KRKA, d.d., Novo<br>mesto         | 50               |   |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                   | 75               | I47-I49, I50-I50,<br>I20-I20, I10-I13,<br>I15-I15 |        |        |              |               |          |
| 1009055         | metoprolol, 50mg                    | C07AB0<br>2 | METOPROLOL-<br>RATIOPHARM 50 MG,<br>tablett, 30TK                          | Ratiopharm GmbH                   | 75               | I47-I49, I50-I50,<br>I20-I20, I10-I13,<br>I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                   | 50               |   |        |        |              |               |          |
| 1010800         | metoprolol, 50mg                    | C07AB0<br>2 | EMZOK, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK             | Teva B.V.                         | 50               |   |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                   | 75               | I47-I49, I50-I50,<br>I20-I20, I10-I13,<br>I15-I15 |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|-----------------------------------|------------------|---|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1019719         | metoprolol, 50mg                    | C07AB0<br>2 | BETALOC ZOK 50,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK                            | Recordati Ireland<br>Limited      | 50               |   |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                                   | 75               | I47-I49, I50-I50,<br>I20-I20, I10-I13,<br>I15-I15 |        |        |              |               |          |
| 1072190         | metoprolol, 50mg                    | C07AB0<br>2 | METOPROLOL STADA,<br>tablett, 100TK   | Stada Arzneimittel<br>AG          | 50               |   |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                                   | 75               | I47-I49, I50-I50,<br>I20-I20, I10-I13,<br>I15-I15 |        |        |              |               |          |
| 1224245         | metoprolol, 50mg                    | C07AB0<br>2 | METOZOK, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK                                      | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 50               |   |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                                   | 75               | I47-I49, I50-I50,<br>I20-I20, I10-I13,<br>I15-I15 |        |        |              |               |          |
| 1224267         | metoprolol, 50mg                    | C07AB0<br>2 | METOZOK, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 100TK                                     | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 50               |   |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                                   | 75               | I47-I49, I50-I50,<br>I20-I20, I10-I13,<br>I15-I15 |        |        |              |               |          |
| 1282160         | metoprolol, 50mg                    | C07AB0<br>2 | METOPROLOL-<br>RATIOPHARM<br>RETARD 50 MG,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | Ratiopharm GmbH                   | 50               |   |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                                   | 75               | I47-I49, I50-I50,<br>I20-I20, I10-I13,<br>I15-I15 |        |        |              |               |          |
| 1672174         | metoprolol, 50mg                    | C07AB0<br>2 | BLOXAZOC 50,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK                               | KRKA, d.d., Novo<br>mesto         | 75               | I47-I49, I50-I50,<br>I20-I20, I10-I13,<br>I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                                   | 50               |   |        |        |              |               |          |
| 1672242         | metoprolol, 50mg                    | C07AB0<br>2 | BLOXAZOC 50,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 100TK                              | KRKA, d.d., Novo<br>mesto         | 75               | I47-I49, I50-I50,<br>I20-I20, I10-I13,<br>I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                                   | 50               |   |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------|--|--------|--------------|---------------|----------|
| 1688744         | metotreksaat,<br>2,5mg              | L04AX0<br>3 | TREXAN, tablett, 100TK | Orion Corporation        | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46 | Reumatoloog,<br>Pediaater  |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                        |                          | 75               | L40-L40                       | Dermatovenerol<br>oog, Pediaater                                   |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                        |                          | 100              | C00-D48                       | Onkoloog,<br>Hematoloog,<br>Pediaater –<br>hematoloog-<br>onkoloog |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                        |                          | 50               |                               |  |        |              |               |          |
| 1847651         | metotreksaat,<br>2,5mg              | L04AX0<br>3 | TREXAN, tablett, 100TK | Ideal Trade Links<br>UAB | 100              | C00-D48                       | Onkoloog,<br>Pediaater –<br>hematoloog-<br>onkoloog,<br>Hematoloog |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                        |                          | 75               | L40-L40                       | Pediaater,<br>Dermatovenerol<br>oog                                |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                        |                          | 75               | M45-M46, M30-<br>M35, M05-M08 | Pediaater,<br>Reumatoloog  |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                        |                          | 50               |                               |  |        |              |               |          |
| 3036631         | metotreksaat,<br>2,5mg              | L04AX0<br>3 | TREXAN, tablett, 100TK | Ideal Trade Links<br>UAB | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46 | Pediaater,<br>Reumatoloog  |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                        |                          | 50               |                               |  |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                        |                          | 75               | L40-L40                       | Dermatovenerol<br>oog, Pediaater                                   |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                        |                          | 100              | C00-D48                       | Hematoloog,<br>Pediaater –<br>hematoloog-<br>onkoloog,<br>Onkoloog |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala                              | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|-----------------------------------|------------------|---|-------------------------------------|--------|--------------|---------------|--|
| 1418914         | metotreksaat,<br>20mg 1ml           | L04AX0<br>3 | EBETREX 20MG/ML,<br>süstelahus süstlis, 1ml<br>5TK    | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 75               | M08.0-M08.8,<br>M46.8-M46.8,<br>M05.8-M05.8,<br>M07.0-M07.6,<br>M05.3-M05.3,<br>M45-M45,<br>M06.0-M06.0 | Reumatoloog,<br>Pediaater           |        |              | 5,00          |  |
|                 |                                     |             |   |                                   | 75               | L40-L40   | Pediaater,<br>Dermatovenerol<br>oog |        |              |               | ravile allumatu raske psoriaasiga patsientidele, kellel eelnev suukaudne ravi, sh adekvaatses annuses suukaudse metotreksaadiga on olnud ebaefektiivne või tekitanud ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed   |
|                 |                                     |             |   |                                   | 75               | M08.0-M08.8,<br>M46.8-M46.8,<br>M05.8-M05.8,<br>M07.0-M07.6,<br>M05.3-M05.3,<br>M45-M45,<br>M06.0-M06.0 | Reumatoloog,<br>Pediaater           |        |              |               | patsientidele, kellel eelneva 3 kuu jooksul kombineeritud haiguse kulgu mõjutav ravi, sh adekvaatses annuses suukaudse metotreksaadiga ja glükokortikosteroidiga madalas annuses on olnud ebaefektiivne või on tekkinud ravi katkestama sundivad või annuse tõstmist takistavad seedetrakti poolsed kõrvaltoimed |
| 1418925         | metotreksaat,<br>20mg 1ml           | L04AX0<br>3 | EBETREX 20MG/ML,<br>süstelahus süstlis,<br>1.25ml 5TK | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 75               | M08.0-M08.8,<br>M46.8-M46.8,<br>M05.8-M05.8,<br>M07.0-M07.6,<br>M05.3-M05.3,<br>M45-M45,<br>M06.0-M06.0 | Reumatoloog,<br>Pediaater           |        |              | 5,00          |  |
|                 |                                     |             |   |                                   | 75               | M08.0-M08.8,<br>M46.8-M46.8,<br>M05.8-M05.8,<br>M07.0-M07.6,<br>M05.3-M05.3,<br>M45-M45,<br>M06.0-M06.0 | Pediaater,<br>Reumatoloog           |        |              |               | patsientidele, kellel eelneva 3 kuu jooksul kombineeritud haiguse kulgu mõjutav ravi, sh adekvaatses annuses suukaudse metotreksaadiga ja glükokortikosteroidiga madalas annuses on olnud ebaefektiivne või on tekkinud ravi katkestama sundivad või annuse tõstmist takistavad seedetrakti poolsed kõrvaltoimed |
|                 |                                     |             |   |                                   | 75               | L40-L40   | Dermatovenerol<br>oog, Pediaater    |        |              |               | ravile allumatu raske psoriaasiga patsientidele, kellel eelnev suukaudne ravi, sh adekvaatses annuses suukaudse metotreksaadiga on olnud ebaefektiivne või tekitanud ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed   |



| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                           | Müügiloa hoidja             | Soodus-tus % | Diagnoos  | Eriala                       | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-------------|-------------------------------|----------|---|-----------------------------|--------------|---|------------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1547074     | metotreksaat, 20mg 1ml        | L04AX03  | EBETREX 20MG/ML, süstelahus süstlis, 0.5ml 5TK  | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 75           | L40-L40   | Pediaater, Dermatoveneroloog |        |           |            | ravile allumatu raske psoriaasiga patsientidele, kellel eelnev suukaudne ravi, sh adekvaatses annuses suukaudse metotreksaadiga on olnud ebaefektiivne või tekitanud ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed   |
|             |                               |          |   |                             | 75           | M08.0-M08.8, M46.8-M46.8, M05.8-M05.8, M07.0-M07.6, M05.3-M05.3, M45-M45, M06.0-M06.0 | Pediaater, Reumatoloog       |        |           | 5,00       |  |
|             |                               |          |   |                             | 75           | M08.0-M08.8, M46.8-M46.8, M05.8-M05.8, M07.0-M07.6, M05.3-M05.3, M45-M45, M06.0-M06.0 | Reumatoloog, Pediaater       |        |           |            | patsientidele, kellel eelneva 3 kuu jooksul kombineeritud haiguse kulgu mõjutav ravi, sh adekvaatses annuses suukaudse metotreksaadiga ja glükokortikosteroidiga madalas annuses on olnud ebaefektiivne või on tekkinud ravi katkestama sundivad või annuse tõstmist takistavad seedetrakti poolsed kõrvaltoimed |
| 1547120     | metotreksaat, 20mg 1ml        | L04AX03  | EBETREX 20MG/ML, süstelahus süstlis, 0.75ml 5TK | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 75           | M08.0-M08.8, M46.8-M46.8, M05.8-M05.8, M07.0-M07.6, M05.3-M05.3, M45-M45, M06.0-M06.0 | Pediaater, Reumatoloog       |        |           |            |  |
|             |                               |          |   |                             | 75           | L40-L40   | Dermatoveneroloog, Pediaater |        |           |            | ravile allumatu raske psoriaasiga patsientidele, kellel eelnev suukaudne ravi, sh adekvaatses annuses suukaudse metotreksaadiga on olnud ebaefektiivne või tekitanud ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed   |
|             |                               |          |   |                             | 75           | M08.0-M08.8, M46.8-M46.8, M05.8-M05.8, M07.0-M07.6, M05.3-M05.3, M45-M45, M06.0-M06.0 | Pediaater, Reumatoloog       |        |           |            | patsientidele, kellel eelneva 3 kuu jooksul kombineeritud haiguse kulgu mõjutav ravi, sh adekvaatses annuses suukaudse metotreksaadiga ja glükokortikosteroidiga madalas annuses on olnud ebaefektiivne või on tekkinud ravi katkestama sundivad või annuse tõstmist takistavad seedetrakti poolsed kõrvaltoimed |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                   | Müügiloa hoidja   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala                              | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla  | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|---|------------------|---|-------------------------------------|--------|--------------|--|----------|
| 1304637         | metotreksaat,<br>50mg 1ml           | L04AX0<br>3 | METEX, süstelahus<br>süstlis, 0.2ml 6TK | Medac<br>Gesellschaft fuer<br>klinische<br>Spezialpraeparate<br>mbH | 75               | M08.0-M08.8,<br>M46.8-M46.8,<br>M05.8-M05.8,<br>M07.0-M07.6,<br>M05.3-M05.3,<br>M45-M45,<br>M06.0-M06.0 | Pediaater,<br>Reumatoloog           |        |              | 5,00   |          |
|                 |                                     |             |   |   | 75               | L40-L40   | Pediaater,<br>Dermatovenerol<br>oog |        |              | ravile allumatu raske psoriaasiga patsientidele, kellel eelnev suukaudne ravi, sh adekvaatses annuses suukaudse metotreksaadiga on olnud ebaefektiivne või tekitanud ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed   |          |
|                 |                                     |             |   |   | 75               | M08.0-M08.8,<br>M46.8-M46.8,<br>M05.8-M05.8,<br>M07.0-M07.6,<br>M05.3-M05.3,<br>M45-M45,<br>M06.0-M06.0 | Reumatoloog,<br>Pediaater           |        |              | patsientidele, kellel eelneva 3 kuu jooksul kombineeritud haiguse kulgu mõjutav ravi, sh adekvaatses annuses suukaudse metotreksaadiga ja glükokortikosteroidiga madalas annuses on olnud ebaefektiivne või on tekkinud ravi katkestama sundivad või annuse tõstmist takistavad seedetrakti poolsed kõrvaltoimed |          |
| 1304682         | metotreksaat,<br>50mg 1ml           | L04AX0<br>3 | METEX, süstelahus<br>süstlis, 0.3ml 6TK | Medac<br>Gesellschaft fuer<br>klinische<br>Spezialpraeparate<br>mbH | 75               | M08.0-M08.8,<br>M46.8-M46.8,<br>M05.8-M05.8,<br>M07.0-M07.6,<br>M05.3-M05.3,<br>M45-M45,<br>M06.0-M06.0 | Reumatoloog,<br>Pediaater           |        |              | 5,00   |          |
|                 |                                     |             |   |   | 75               | M08.0-M08.8,<br>M46.8-M46.8,<br>M05.8-M05.8,<br>M07.0-M07.6,<br>M05.3-M05.3,<br>M45-M45,<br>M06.0-M06.0 | Pediaater,<br>Reumatoloog           |        |              | patsientidele, kellel eelneva 3 kuu jooksul kombineeritud haiguse kulgu mõjutav ravi, sh adekvaatses annuses suukaudse metotreksaadiga ja glükokortikosteroidiga madalas annuses on olnud ebaefektiivne või on tekkinud ravi katkestama sundivad või annuse tõstmist takistavad seedetrakti poolsed kõrvaltoimed |          |
|                 |                                     |             |   |   | 75               | L40-L40   | Dermatovenerol<br>oog, Pediaater    |        |              | ravile allumatu raske psoriaasiga patsientidele, kellel eelnev suukaudne ravi, sh adekvaatses annuses suukaudse metotreksaadiga on olnud ebaefektiivne või tekitanud ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed   |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                   | Müügiloa hoidja   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala                              | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|---|------------------|---|-------------------------------------|--------|--------------|---------------|--|
| 1304738         | metotreksaat,<br>50mg 1ml           | L04AX0<br>3 | METEX, süstelahus<br>süstlis, 0.4ml 6TK | Medac<br>Gesellschaft fuer<br>klinische<br>Spezialpraeparate<br>mbH | 75               | M08.0-M08.8,<br>M46.8-M46.8,<br>M05.8-M05.8,<br>M07.0-M07.6,<br>M05.3-M05.3,<br>M45-M45,<br>M06.0-M06.0 | Reumatoloog,<br>Pediaater           |        |              | 5,00          |  |
|                 |                                     |             |   |   | 75               | L40-L40   | Dermatovenerol<br>oog, Pediaater    |        |              |               | ravile allumatu raske psoriaasiga patsientidele, kellel eelnev suukaudne ravi, sh adekvaatses annuses suukaudse metotreksaadiga on olnud ebaefektiivne või tekitanud ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed   |
|                 |                                     |             |   |   | 75               | M08.0-M08.8,<br>M46.8-M46.8,<br>M05.8-M05.8,<br>M07.0-M07.6,<br>M05.3-M05.3,<br>M45-M45,<br>M06.0-M06.0 | Reumatoloog,<br>Pediaater           |        |              |               | patsientidele, kellel eelneva 3 kuu jooksul kombineeritud haiguse kulgu mõjutav ravi, sh adekvaatses annuses suukaudse metotreksaadiga ja glükokortikosteroidiga madalas annuses on olnud ebaefektiivne või on tekkinud ravi katkestama sundivad või annuse tõstmist takistavad seedetrakti poolsed kõrvaltoimed |
| 1304783         | metotreksaat,<br>50mg 1ml           | L04AX0<br>3 | METEX, süstelahus<br>süstlis, 0.5ml 6TK | Medac<br>Gesellschaft fuer<br>klinische<br>Spezialpraeparate<br>mbH | 75               | M08.0-M08.8,<br>M46.8-M46.8,<br>M05.8-M05.8,<br>M07.0-M07.6,<br>M05.3-M05.3,<br>M45-M45,<br>M06.0-M06.0 | Reumatoloog,<br>Pediaater           |        |              |               | patsientidele, kellel eelneva 3 kuu jooksul kombineeritud haiguse kulgu mõjutav ravi, sh adekvaatses annuses suukaudse metotreksaadiga ja glükokortikosteroidiga madalas annuses on olnud ebaefektiivne või on tekkinud ravi katkestama sundivad või annuse tõstmist takistavad seedetrakti poolsed kõrvaltoimed |
|                 |                                     |             |   |   | 75               | L40-L40   | Pediaater,<br>Dermatovenerol<br>oog |        |              |               | ravile allumatu raske psoriaasiga patsientidele, kellel eelnev suukaudne ravi, sh adekvaatses annuses suukaudse metotreksaadiga on olnud ebaefektiivne või tekitanud ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed   |
|                 |                                     |             |   |   | 75               | M08.0-M08.8,<br>M46.8-M46.8,<br>M05.8-M05.8,<br>M07.0-M07.6,<br>M05.3-M05.3,<br>M45-M45,<br>M06.0-M06.0 | Reumatoloog,<br>Pediaater           |        |              | 5,00          |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|---|------------------|----------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1033658         | metronidasool, 1g                   | G01AF0<br>1 | ARILIN,<br>vaginaalsuposiit, 2TK                                      | Dr. August Wolff<br>GmbH & Co. KG<br>Arzneimittel | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1008706         | metronidasool,<br>500mg             | P01AB0<br>1 | METRONIDAZOL<br>ORIFARM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK | Orifarm<br>Healthcare A/S                         | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1223749         | metronidasool,<br>7,5mg 1g          | D06BX0<br>1 | METROSA, geel, 25g<br>1TK   | Dr. August Wolff<br>GmbH & Co. KG<br>Arzneimittel | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1819234         | metronidasool,<br>7,5mg 1g          | D06BX0<br>1 | ROZEX, geel, 30g 1TK  | Lex Ano UAB                                       | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1829943         | metronidasool,<br>7,5mg 1g          | D06BX0<br>1 | ROZEX, geel, 30g 1TK  | Ideal Trade Links<br>UAB                          | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1869969         | metronidasool,<br>7,5mg 1g          | D06BX0<br>1 | METROSA, geel, 25g<br>1TK   | Ideal Trade Links<br>UAB                          | 50               |          |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                                    | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|--|------------------|-------------|--|--------|--------------|---------------|--|
| 1396335         | metüülfenidaat,<br>10mg             | N06BA0<br>4 | MEDIKINET XL 10MG,<br>toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>kõvakapsel, 30TK | Medice<br>Arzneimittel<br>Puetter GmbH &<br>Co. KG | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater,<br>Psühhiaater –<br>laste- ja<br>noorukitepsühhi<br>aater | esmane | 20,00        |               | ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: esineb mõõdukas kuni raske funktsionaalne kahjustus vähemalt kahes olukorras (sotsiaalne, akadeemiline ja/või tööalane tegevus), haigus mõjutab konkreetse inimese elu mitmeid aspekte ning viide haiguse esinemisele on tõendatult tuvastatav lapseeest. Ravimi väljakirjutamise õigus esmavalikuna on kaasuva sõltuvushäire puudumisel ning teise valikuna kaasuva sõltuvushäire esinemisel, kui atomoksetiin on olnud ebaefektiivne või talumatu. Ravi efektiivsus on hinnatav 6-nädalase perioodi jooksul kasutamisel adekvaatses annuses. |
|                 |                                     |             |   |  | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater –<br>laste- ja<br>noorukitepsühhi<br>aater                 | esmane | 6,00         | 20,00         | ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (2 Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti 2 erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, CGAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega; |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|-----------------|------------------|-------------|--|--------|--------------|---------------|--|
| 1838033         | metüülfenidaat,<br>10mg             | N06BA0<br>4 | AFFENID, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>kõvakapsel, 30TK | Zentiva k.s.    | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater –<br>laste- ja<br>noorukitepsühhi<br>aater,<br>Psühhiaater | esmane | 20,00        |               | ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: esineb mõõdukas kuni raske funktsionaalne kahjustus vähemalt kahes olukorras (sotsiaalne, akadeemiline ja/või tööalane tegevus), haigus mõjutab konkreetse inimese elu mitmeid aspekte ning viide haiguse esinemisele on tõendatult tuvastatav lapseeest. Ravimi väljakirjutamise õigus esmavalikuna on kaasuva sõltuvushäire puudumisel ning teise valikuna kaasuva sõltuvushäire esinemisel, kui atomoksetiin on olnud ebaefektiivne või talumatu. Ravi efektiivsus on hinnatav 6-nädalase perioodi jooksul kasutamisel adekvaatses annuses. |
|                 |                                     |             |  |                 | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater –<br>laste- ja<br>noorukitepsühhi<br>aater                 | esmane | 6,00         | 20,00         | ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (2 Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti 2 erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, CGAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega; |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla  | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|--------------------------|------------------|-------------|--|--------|--------------|--|--|
| 1313569         | metüülfenidaat,<br>18mg             | N06BA0<br>4 | CONCERTA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | Johnson &<br>Johnson UAB | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater –<br>laste- ja<br>noorukitepsühhi<br>aater                 | esmane | 6,00         | 20,00  | ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel:<br>farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud<br>lastepsühhiaatriline meeskond (2 Eesti Psühhiaatrite<br>Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega<br>psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-<br>eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti 2<br>erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega<br>kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb<br>mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi<br>kirjelduse alusel, CGAS skoor <=50 punkti); ravi toimub<br>koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete<br>rakendamisega; |
|                 |                                     |             |   |                          | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater –<br>laste- ja<br>noorukitepsühhi<br>aater,<br>Psühhiaater | esmane | 20,00        | ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: esineb<br>mõõdukas kuni raske funktsionaalne kahjustus vähemalt<br>kahes olukorras (sotsiaalne, akadeemiline ja/või tööalane<br>tegevus), haigus mõjutab konkreetse inimese elu mitmeid<br>aspekte ning viide haiguse esinemisele on tõendatult<br>tuvastatav lapseeast. Ravimi väljakirjutamise õigus<br>esmavalikuna on kaasuva sõltuvushäire puudumisel ning<br>teise valikuna kaasuva sõltuvushäire esinemisel, kui<br>atomoksetiin on olnud ebaefektiivne või talumatu. Ravi<br>efektiivsus on hinnatav 6-nädalase perioodi jooksul<br>kasutamisel adekvaatses annuses. |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                                    | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla  | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|--|------------------|-------------|--|--------|--------------|--|--|
| 1396368         | metüülfenidaat,<br>20mg             | N06BA0<br>4 | MEDIKINET XL 20MG,<br>toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>kõvakapsel, 30TK | Medice<br>Arzneimittel<br>Puetter GmbH &<br>Co. KG | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater –<br>laste- ja<br>noorukitepsühhi<br>aater                 | esmane | 6,00         | 20,00  | ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel:<br>farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud<br>lastepsühhiaatriline meeskond (2 Eesti Psühhiaatrite<br>Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega<br>psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-<br>eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti 2<br>erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega<br>kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb<br>mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi<br>kirjelduse alusel, CGAS skoor <=50 punkti); ravi toimub<br>koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete<br>rakendamisega; |
|                 |                                     |             |   |  | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater –<br>laste- ja<br>noorukitepsühhi<br>aater,<br>Psühhiaater | esmane | 20,00        | ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: esineb<br>mõõdukas kuni raske funktsionaalne kahjustus vähemalt<br>kahes olukorras (sotsiaalne, akadeemiline ja/või tööalane<br>tegevus), haigus mõjutab konkreetse inimese elu mitmeid<br>aspekte ning viide haiguse esinemisele on tõendatult<br>tuvastatav lapseeast. Ravimi väljakirjutamise õigus<br>esmavalikuna on kaasuva sõltuvushäire puudumisel ning<br>teise valikuna kaasuva sõltuvushäire esinemisel, kui<br>atomoksetiin on olnud ebaefektiivne või talumatu. Ravi<br>efektiivsus on hinnatav 6-nädalase perioodi jooksul<br>kasutamisel adekvaatses annuses. |  |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla  | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|-----------------|------------------|-------------|--|--------|--------------|--|--|
| 1838101         | metüüfenidaat,<br>20mg              | N06BA0<br>4 | AFFENID, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>kõvakapsel, 30TK | Zentiva k.s.    | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater –<br>laste- ja<br>noorukitepsühhi<br>aater                 | esmane | 6,00         | 20,00  | ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel:<br>farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud<br>lastepsühhiaatriline meeskond (2 Eesti Psühhiaatrite<br>Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega<br>psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-<br>eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti 2<br>erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega<br>kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb<br>mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi<br>kirjelduse alusel, CGAS skoor <=50 punkti); ravi toimub<br>koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete<br>rakendamisega; |
|                 |                                     |             |  |                 | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater,<br>Psühhiaater –<br>laste- ja<br>noorukitepsühhi<br>aater | esmane | 20,00        | ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: esineb<br>mõõdukas kuni raske funktsionaalne kahjustus vähemalt<br>kahes olukorras (sotsiaalne, akadeemiline ja/või tööalane<br>tegevus), haigus mõjutab konkreetse inimese elu mitmeid<br>aspekte ning viide haiguse esinemisele on tõendatult<br>tuvastatav lapseeast. Ravimi väljakirjutamise õigus<br>esmavalikuna on kaasuva sõltuvushäire puudumisel ning<br>teise valikuna kaasuva sõltuvushäire esinemisel, kui<br>atomoksetiin on olnud ebaefektiivne või talumatu. Ravi<br>efektiivsus on hinnatav 6-nädalase perioodi jooksul<br>kasutamisel adekvaatses annuses. |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                                    | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla  | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|--|------------------|-------------|--|--------|--------------|--|--|
| 1396391         | metüüfenidaat,<br>30mg              | N06BA0<br>4 | MEDIKINET XL 30MG,<br>toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>kõvakapsel, 30TK | Medice<br>Arzneimittel<br>Puetter GmbH &<br>Co. KG | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater –<br>laste- ja<br>noorukitepsühhiaater                 | esmane | 6,00         | 20,00  | ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (2 Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti 2 erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, CGAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega; |
|                 |                                     |             |   |  | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater,<br>Psühhiaater –<br>laste- ja<br>noorukitepsühhiaater | esmane | 20,00        | ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: esineb mõõdukas kuni raske funktsionaalne kahjustus vähemalt kahes olukorras (sotsiaalne, akadeemiline ja/või tööalane tegevus), haigus mõjutab konkreetse inimese elu mitmeid aspekte ning viide haiguse esinemisele on tõendatult tuvastatav lapseeast. Ravimi väljakirjutamise õigus esmavalikuna on kaasuva sõltuvushäire puudumisel ning teise valikuna kaasuva sõltuvushäire esinemisel, kui atomoksetiin on olnud ebaefektiivne või talumatu. Ravi efektiivsus on hinnatav 6-nädalase perioodi jooksul kasutamisel adekvaatses annuses. |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla  | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|-----------------|------------------|-------------|--|--------|--------------|--|--|
| 1838178         | metüülfenidaat,<br>30mg             | N06BA0<br>4 | AFFENID, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>kõvakapsel, 30TK | Zentiva k.s.    | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater –<br>laste- ja<br>noorukitepsühhi<br>aater                 | esmane | 6,00         | 20,00  | ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel:<br>farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud<br>lastepsühhiaatriline meeskond (2 Eesti Psühhiaatrite<br>Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega<br>psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-<br>eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti 2<br>erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega<br>kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb<br>mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi<br>kirjelduse alusel, CGAS skoor <=50 punkti); ravi toimub<br>koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete<br>rakendamisega; |
|                 |                                     |             |  |                 | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater –<br>laste- ja<br>noorukitepsühhi<br>aater,<br>Psühhiaater | esmane | 20,00        | ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: esineb<br>mõõdukas kuni raske funktsionaalne kahjustus vähemalt<br>kahes olukorras (sotsiaalne, akadeemiline ja/või tööalane<br>tegevus), haigus mõjutab konkreetse inimese elu mitmeid<br>aspekte ning viide haiguse esinemisele on tõendatult<br>tuvastatav lapseeast. Ravimi väljakirjutamise õigus<br>esmavalikuna on kaasuva sõltuvushäire puudumisel ning<br>teise valikuna kaasuva sõltuvushäire esinemisel, kui<br>atomoksetiin on olnud ebaefektiivne või talumatu. Ravi<br>efektiivsus on hinnatav 6-nädalase perioodi jooksul<br>kasutamisel adekvaatses annuses. |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|--------------------------|------------------|-------------|--|--------|--------------|---------------|--|
| 1313581         | metüüfenidaat,<br>36mg              | N06BA0<br>4 | CONCERTA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | Johnson &<br>Johnson UAB | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater,<br>Psühhiaater –<br>laste- ja<br>noorukitepsühhi<br>aater | esmane | 20,00        |               | ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: esineb mõõdukas kuni raske funktsionaalne kahjustus vähemalt kahes olukorras (sotsiaalne, akadeemiline ja/või tööalane tegevus), haigus mõjutab konkreetse inimese elu mitmeid aspekte ning viide haiguse esinemisele on tõendatult tuvastatav lapseeast. Ravimi väljakirjutamise õigus esmavalikuna on kaasuva sõltuvushäire puudumisel ning teise valikuna kaasuva sõltuvushäire esinemisel, kui atomoksetiin on olnud ebaefektiivne või talumatu. Ravi efektiivsus on hinnatav 6-nädalase perioodi jooksul kasutamisel adekvaatses annuses. |
|                 |                                     |             |   |                          | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater –<br>laste- ja<br>noorukitepsühhi<br>aater                 | esmane | 6,00         | 20,00         | ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (2 Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti 2 erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, CGAS skoor ≤50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega;  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                                    | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla  | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|--|------------------|-------------|--|--------|--------------|--|--|
| 1395266         | metüülfenidaat,<br>40mg             | N06BA0<br>4 | MEDIKINET XL 40MG,<br>toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>kõvakapsel, 30TK | Medice<br>Arzneimittel<br>Puetter GmbH &<br>Co. KG | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater –<br>laste- ja<br>noorukitepsühhi<br>aater                 | esmane | 6,00         | 20,00  | ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel:<br>farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud<br>lastepsühhiaatriline meeskond (2 Eesti Psühhiaatrite<br>Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega<br>psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-<br>eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti 2<br>erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega<br>kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb<br>mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi<br>kirjelduse alusel, CGAS skoor <=50 punkti); ravi toimub<br>koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete<br>rakendamisega; |
|                 |                                     |             |   |  | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater,<br>Psühhiaater –<br>laste- ja<br>noorukitepsühhi<br>aater | esmane | 20,00        | ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: esineb<br>mõõdukas kuni raske funktsionaalne kahjustus vähemalt<br>kahes olukorras (sotsiaalne, akadeemiline ja/või tööalane<br>tegevus), haigus mõjutab konkreetse inimese elu mitmeid<br>aspekte ning viide haiguse esinemisele on tõendatult<br>tuvastatav lapseeast. Ravimi väljakirjutamise õigus<br>esmavalikuna on kaasuva sõltuvushäire puudumisel ning<br>teise valikuna kaasuva sõltuvushäire esinemisel, kui<br>atomoksetiin on olnud ebaefektiivne või talumatu. Ravi<br>efektiivsus on hinnatav 6-nädalase perioodi jooksul<br>kasutamisel adekvaatses annuses. |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla  | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|-----------------|------------------|-------------|--|--------|--------------|--|--|
| 1838235         | metüüfenidaat,<br>40mg              | N06BA0<br>4 | AFFENID, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>kõvakapsel, 30TK | Zentiva k.s.    | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater –<br>laste- ja<br>noorukitepsühhi<br>aater                 | esmane | 6,00         | 20,00  | ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel:<br>farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud<br>lastepsühhiaatriline meeskond (2 Eesti Psühhiaatrite<br>Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega<br>psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-<br>eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti 2<br>erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega<br>kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb<br>mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi<br>kirjelduse alusel, CGAS skoor <=50 punkti); ravi toimub<br>koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete<br>rakendamisega; |
|                 |                                     |             |  |                 | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater,<br>Psühhiaater –<br>laste- ja<br>noorukitepsühhi<br>aater | esmane | 20,00        | ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: esineb<br>mõõdukas kuni raske funktsionaalne kahjustus vähemalt<br>kahes olukorras (sotsiaalne, akadeemiline ja/või tööalane<br>tegevus), haigus mõjutab konkreetse inimese elu mitmeid<br>aspekte ning viide haiguse esinemisele on tõendatult<br>tuvastatav lapseeast. Ravimi väljakirjutamise õigus<br>esmavalikuna on kaasuva sõltuvushäire puudumisel ning<br>teise valikuna kaasuva sõltuvushäire esinemisel, kui<br>atomoksetiin on olnud ebaefektiivne või talumatu. Ravi<br>efektiivsus on hinnatav 6-nädalase perioodi jooksul<br>kasutamisel adekvaatses annuses. |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|--------------------------|------------------|-------------|--|--------|--------------|---------------|--|
| 1313660         | metüülfenidaat,<br>54mg             | N06BA0<br>4 | CONCERTA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | Johnson &<br>Johnson UAB | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater,<br>Psühhiaater –<br>laste- ja<br>noorukitepsühhi<br>aater | esmane | 20,00        |               | ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: esineb mõõdukas kuni raske funktsionaalne kahjustus vähemalt kahes olukorras (sotsiaalne, akadeemiline ja/või tööalane tegevus), haigus mõjutab konkreetse inimese elu mitmeid aspekte ning viide haiguse esinemisele on tõendatult tuvastatav lapseeas. Ravimi väljakirjutamise õigus esmavalikuna on kaasuva sõltuvushäire puudumisel ning teise valikuna kaasuva sõltuvushäire esinemisel, kui atomoksetiin on olnud ebaefektiivne või talumatu. Ravi efektiivsus on hinnatav 6-nädalase perioodi jooksul kasutamisel adekvaatses annuses.  |
|                 |                                     |             |   |                          | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater –<br>laste- ja<br>noorukitepsühhi<br>aater                 | esmane | 6,00         | 20,00         | ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (2 Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti 2 erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, CGAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega; |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla   | Märkused   |  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|--------------------------|------------------|---|--|--------|--------------|---|--|--|
| 1838291         | metüülfenidaat,<br>60mg             | N06BA0<br>4 | AFFENID, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>kõvakapsel, 30TK | Zentiva k.s.             | 75               | F90.0-F90.1                                     | Psühhiaater –<br>laste- ja<br>noorukitepsühhiaater                 | esmane | 6,00         | 20,00   | ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: farmakoterapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (2 Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoogia ja logopeed-eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti 2 erinevas keskkonnas (perekeskne, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, CGAS skoor ≤50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega; |  |
|                 |                                     |             |  |                          | 75               | F90.0-F90.1                                     | Psühhiaater,<br>Psühhiaater –<br>laste- ja<br>noorukitepsühhiaater | esmane | 20,00        | ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: esineb mõõdukas kuni raske funktsionaalne kahjustus vähemalt kahes olukorras (sotsiaalne, akadeemiline ja/või tööalane tegevus), haigus mõjutab konkreetse inimese elu mitmeid aspekte ning viide haiguse esinemisele on tõendatult tuvastatav lapseeas. Ravimi väljakirjutamise õigus esmavalikuna on kaasuva sõltuvushäire puudumisel ning teise valikuna kaasuva sõltuvushäire esinemisel, kui atomoksetiin on olnud ebaefektiivne või talumatu. Ravi efektiivsus on hinnatav 6-nädalase perioodi jooksul kasutamisel adekvaatses annuses. |  |  |
| 1009099         | metüülprednisoloon,<br>16mg         | H02AB0<br>4 | MEDROL, tablett, 50TK  | Pfizer Europe MA<br>EEIG | 75               | N00-N08   | Pediaater,<br>Nefroloog  |        |              |   |  |  |
|                 |                                     |             |  |                          | 100              | G35-G35   | Pediaater,<br>Neuroloog  | esmane |              |   |  |  |
|                 |                                     |             |  |                          | 75               | M30-M35, M05-M08, M45-M46                       | Reumatoloog,<br>Pediaater  | esmane |              |   |  |  |
|                 |                                     |             |  |                          | 100              | Z94-Z94, T86-T86                                |  |        |              |   |  |  |
|                 |                                     |             |  |                          | 50               |   |  |        |              |   |  |  |
|                 |                                     |             |  |                          | 75               | L12-L12, L23-L23, L13.0-L13.0, L10-L10, L20-L20 | Dermatoveneroloog,<br>Pediaater,<br>Allergoloog-immunoloog         |        |              |   |  |  |
|                 |                                     |             |  |                          | 75               | K50-K51, K73-K74                                | Gastroenteroloog,<br>Pediaater                                     |        |              |   |  |  |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                  | Müügiloa hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|-----------------------|------------------|---|--|--------|--------------|---------------|----------|
| 1866922         | metüülprednisoloon, 16mg            | H02AB04     | MEDROL, tablett, 50TK                  | Lex Ano UAB           | 100              | Z94-Z94, T86-T86                                |  |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                       | 50               |   |  |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                       | 100              | G35-G35   | Pediaater, Neuroloog                                 | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                       | 75               | K50-K51, K73-K74                                | Gastroenteroloog, Pediaater                          |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                       | 75               | M45-M46, M30-M35, M05-M08                       | Pediaater, Reumatoloog                               | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                       | 75               | L12-L12, L23-L23, L13.0-L13.0, L10-L10, L20-L20 | Allergoloog-immunoloog, Pediaater, Dermatoveneroloog |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                       | 75               | N00-N08   | Pediaater, Nefroloog                                 |        |              |               |          |
| 1009190         | metüülprednisoloon, 40mg 1ml        | H02AB04     | DEPO-MEDROL, süstesuspensioon, 1ml 1TK | Pfizer Europe MA EEIG | 100              | G35-G35   | Neuroloog, Pediaater                                 | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                       | 100              | Z94-Z94, T86-T86                                |  |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                       | 75               | N00-N08   | Pediaater, Nefroloog                                 |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                       | 75               | M30-M35, M05-M08, M45-M46                       | Pediaater, Reumatoloog                               | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                       | 50               |   |  |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus  | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus    | Müügiloo hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|------------------|---|--|--------|--------------|---------------|----------|
| 1065754         | metüülprednisoloon, 4mg              | H02AB04     | MEDROL, tablett, 100TK   | Pfizer Europe MA EEIG | 100              | G35-G35   | Neuroloog, Pediaater                                 | esmane |              |               |          |
|                 |                                      |             |                          |                       | 75               | N00-N08   | Nefroloog, Pediaater                                 |        |              |               |          |
|                 |                                      |             |                          |                       | 100              | Z94-Z94, T86-T86                                |  |        |              |               |          |
|                 |                                      |             |                          |                       | 75               | M30-M35, M05-M08, M45-M46                       | Reumatoloog, Pediaater                               | esmane |              |               |          |
|                 |                                      |             |                          |                       | 75               | L12-L12, L23-L23, L13.0-L13.0, L10-L10, L20-L20 | Pediaater, Allergoloog-immunoloog, Dermatoveneroloog |        |              |               |          |
|                 |                                      |             |                          |                       | 50               |   |  |        |              |               |          |
| 1868328         | metüülprednisoloon, 4mg              | H02AB04     | MEDROL, tablett, 100TK   | Lex Ano UAB           | 75               | N00-N08   | Pediaater, Nefroloog                                 |        |              |               |          |
|                 |                                      |             |                          |                       | 50               |   |  |        |              |               |          |
|                 |                                      |             |                          |                       | 100              | G35-G35   | Pediaater, Neuroloog                                 | esmane |              |               |          |
|                 |                                      |             |                          |                       | 75               | M05-M08, M30-M35, M45-M46                       | Pediaater, Reumatoloog                               | esmane |              |               |          |
|                 |                                      |             |                          |                       | 100              | Z94-Z94, T86-T86                                |  |        |              |               |          |
|                 |                                      |             |                          |                       | 75               | L12-L12, L23-L23, L13.0-L13.0, L10-L10, L20-L20 | Dermatoveneroloog, Pediaater, Allergoloog-immunoloog |        |              |               |          |
| 1028102         | metüülprednisoloonatseponaat, 1mg 1g | D07AC14     | ADVANTAN, kreem, 15g 1TK | LEO Pharma A/S        | 75               | L20-L20, L40-L40, L23-L23                       |  |        |              |               |          |
|                 |                                      |             |                          |                       | 50               |   |  |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus         | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala                 | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |
|-----------------|---|-------------|--|--|------------------|-------------------------------|------------------------|--------|--------------|---------------|--|
| 1062009         | metüülprednisoloo<br>natseponaat, 1mg<br>1g | D07AC1<br>4 | ADVANTAN, salv, 15g<br>1TK                                       | LEO Pharma A/S                           | 75               | L20-L20, L40-<br>L40, L23-L23 |                        |        |              |               |  |
|                 |   |             |  |  | 50               |                               |                        |        |              |               |  |
| 1133356         | metüülprednisoloo<br>natseponaat, 1mg<br>1g | D07AC1<br>4 | ADVANTAN MILK,<br>nahaemulsioon, 20g<br>1TK                      | LEO Pharma A/S                           | 50               | L20-L20, L40-<br>L40, L23-L23 |                        |        |              |               |  |
|                 |   |             |  |  | 75               |                               |                        |        |              |               |  |
| 3031681         | metüülprednisoloo<br>natseponaat, 1mg<br>1g | D07AC1<br>4 | ADVANTAN MILK,<br>nahaemulsioon, 50g<br>1TK                      | Ideal Trade Links<br>UAB                 | 75               | L20-L20, L40-<br>L40, L23-L23 |                        |        |              |               |  |
|                 |   |             |  |  | 50               |                               |                        |        |              |               |  |
| 1764794         | midostauriin,<br>25mg                       | L01EX1<br>0 | RYDAPT, pehmekapsel,<br>56TK                                     | Novartis<br>Europharm<br>Limited         | 100              | C92-C92                       | Hematoloog             |        |              |               | esmakordselt diagnoositud ägeda müeloidleukeemia ja<br>FLT3 mutatsiooniga täiskasvanud patsientidele koos<br>standardse antratsükliini ja tsütarabiini<br>induksioonkeemiaraviga ning koos suures annuses<br>tsütarabiini konsolideeriva keemiaraviga, millele täieliku<br>ravivastuse korral järgneb säilitusravi ainult<br>midostauriiniga |
| 1722013         | migalastaat,<br>123mg                       | A16AX1<br>4 | GALAFOLD,<br>kõvakapsel, 14TK                                    | Amicus<br>Therapeutics<br>Europe Limited | 100              | E75.2-E75.2                   | Neuroloog,<br>Sisearst |        |              |               |  |
| 1024579         | mikonasool, 20mg<br>1g                      | A01AB0<br>9 | DAKTARIN, suukaudne<br>geel, 40g 1TK                             | McNeil Healthcare<br>(Ireland) Limited   | 50               |                               |                        |        |              |               |  |
| 1828379         | mikonasool, 20mg<br>1g                      | A01AB0<br>9 | DAKTARIN, suukaudne<br>geel, 40g 1TK                             | Lex Ano UAB                              | 50               |                               |                        |        |              |               |  |
| 1891379         | mikonasool, 20mg<br>1g                      | A01AB0<br>9 | DAKTARIN, suukaudne<br>geel, 40g 1TK                             | Ideal Trade Links<br>UAB                 | 50               |                               |                        |        |              |               |  |
| 1604337         | mirabegroon,<br>50mg                        | G04BD1<br>2 | BETMIGA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | Astellas Pharma<br>Europe B.V.           | 50               |                               |                        |        |              |               |  |
| 1181607         | mirtasapiin, 15mg                           | N06AX1<br>1 | MIRTASTAD 15 MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Stada Arzneimittel<br>AG                 | 50               | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3   | Psühhiaater            | esmane |              |               |  |
|                 |   |             |  |  | 100              |                               |                        |        |              |               |  |
| 1243684         | mirtasapiin, 15mg                           | N06AX1<br>1 | MIRTAZAPIN ORION,<br>suus disperseeruv<br>tablett, 30TK          | Orion Corporation                        | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3   | Psühhiaater            | esmane |              |               |  |
|                 |   |             |  |  | 50               |                               |                        |        |              |               |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                  | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|--------------------------|------------------|---|-------------|--------|--------------|---------------|--|
| 1273137         | mirtasapiin, 15mg                   | N06AX1<br>1 | MIRTAZAPIN ACTAVIS,<br>suus disperseeruv<br>tablett, 30TK              | Teva B.V.                | 50               |   |             |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |  |                          | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3               | Psühhiaater | esmane |              |               |  |
| 1314683         | mirtasapiin, 15mg                   | N06AX1<br>1 | MIRZATEN Q-TAB,<br>suus disperseeruv<br>tablett, 30TK                  | KRKA d.d. Novo<br>mesto  | 50               |   |             |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |  |                          | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3               | Psühhiaater | esmane |              |               |  |
| 1170166         | mirtasapiin, 30mg                   | N06AX1<br>1 | ESPRITAL 30, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK              | Zentiva k.s.             | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3               | Psühhiaater | esmane |              |               |  |
|                 |                                     |             |  |                          | 50               |   |             |        |              |               |  |
| 1181797         | mirtasapiin, 30mg                   | N06AX1<br>1 | MIRTASTAD 30 MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK       | Stada Arzneimittel<br>AG | 50               |   |             |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |  |                          | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3               | Psühhiaater | esmane |              |               |  |
| 1243729         | mirtasapiin, 30mg                   | N06AX1<br>1 | MIRTAZAPIN ORION,<br>suus disperseeruv<br>tablett, 30TK                | Orion Corporation        | 50               |   |             |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |  |                          | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3               | Psühhiaater | esmane |              |               |  |
| 1273227         | mirtasapiin, 30mg                   | N06AX1<br>1 | MIRTAZAPIN ACTAVIS,<br>suus disperseeruv<br>tablett, 30TK              | Teva B.V.                | 50               |   |             |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |  |                          | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3               | Psühhiaater | esmane |              |               |  |
| 1301522         | mirtasapiin, 30mg                   | N06AX1<br>1 | MIRZATEN Q-TAB,<br>suus disperseeruv<br>tablett, 30TK                  | KRKA d.d. Novo<br>mesto  | 50               |   |             |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |  |                          | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3               | Psühhiaater | esmane |              |               |  |
| 1243741         | mirtasapiin, 45mg                   | N06AX1<br>1 | MIRTAZAPIN ORION,<br>suus disperseeruv<br>tablett, 30TK                | Orion Corporation        | 50               |   |             |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |  |                          | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3               | Psühhiaater | esmane |              |               |  |
| 1751891         | moksifloksatsiin,<br>400mg          | J01MA1<br>4 | FLOXELAN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>5TK                  | Medochemie<br>Limited    | 50               | J44-J44, J41-<br>J41, J47-J47,<br>J13-J15 |             |        |              |               | kui beetalaktaam-antibiootikum, tetratsükliin ja makroliid<br>on ebaefektiivsed või vastunäidustatud |
|                 |                                     |             |  |                          | 100              | F30-F31                                   | Psühhiaater |        |              |               |  |
| 1145999         | moksonidiin,<br>0,2mg               | C02AC0<br>5 | MOXONIDINHEXAL 0,2<br>MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Hexal AG                 | 50               |   |             |        |              |               |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                 | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|---------------------------------|------------------|----------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1155091         | moksonidiin,<br>0,2mg               | C02AC0<br>5 | STADAPRESS,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK               | Stada Arzneimittel<br>AG        | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1157778         | moksonidiin,<br>0,2mg               | C02AC0<br>5 | MOXOGAMMA 0,2 MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK         | Woerwag Pharma<br>GmbH & Co. KG | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1247598         | moksonidiin,<br>0,2mg               | C02AC0<br>5 | MOXONIDIN ACTAVIS<br>0,2 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Teva B.V.                       | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1146079         | moksonidiin,<br>0,3mg               | C02AC0<br>5 | MOXONIDINHEXAL 0,3<br>MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK    | Hexal AG                        | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1157857         | moksonidiin,<br>0,3mg               | C02AC0<br>5 | MOXOGAMMA 0,3 MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK         | Woerwag Pharma<br>GmbH & Co. KG | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1247677         | moksonidiin,<br>0,3mg               | C02AC0<br>5 | MOXONIDIN ACTAVIS<br>0,3 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Teva B.V.                       | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1013791         | moksonidiin,<br>0,4mg               | C02AC0<br>5 | PHYSIOTENS 0,4 MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK        | Viatrix SIA                     | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1146170         | moksonidiin,<br>0,4mg               | C02AC0<br>5 | MOXONIDINHEXAL 0,4<br>MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK    | Hexal AG                        | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1155259         | moksonidiin,<br>0,4mg               | C02AC0<br>5 | STADAPRESS,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK               | Stada Arzneimittel<br>AG        | 50               |          |        |        |              |               |          |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja              | Soodus-tus % | Diagnoos                  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-------------|-------------------------------|----------|--|------------------------------|--------------|---------------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1157947     | moksonidiin, 0,4mg            | C02AC05  | MOXOGAMMA 0,4 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK         | Woerwag Pharma GmbH & Co. KG | 50           |                           |        |        |           |            |          |
| 1247756     | moksonidiin, 0,4mg            | C02AC05  | MOXONIDIN ACTAVIS 0,4 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Teva B.V.                    | 50           |                           |        |        |           |            |          |
| 1028933     | mometasoon, 1mg 1g            | D07AC13  | ELOCON, nahalahus, 20ml 1TK                                      | Organon N.V.                 | 50           |                           |        |        |           |            |          |
|             |                               |          |  |                              | 75           | L20-L20, L23-L23, L40-L40 |        |        |           |            |          |
| 1028944     | mometasoon, 1mg 1g            | D07AC13  | ELOCON, salv, 20g 1TK  | Organon N.V.                 | 75           | L20-L20, L23-L23, L40-L40 |        |        |           |            |          |
|             |                               |          |  |                              | 50           |                           |        |        |           |            |          |
| 1028955     | mometasoon, 1mg 1g            | D07AC13  | ELOCON, kreem, 20g 1TK   | Organon N.V.                 | 75           | L20-L20, L23-L23, L40-L40 |        |        |           |            |          |
|             |                               |          |  |                              | 50           |                           |        |        |           |            |          |
| 1833904     | mometasoon, 1mg 1g            | D07AC13  | ELOCOM, kreem, 15g 1TK   | Lex Ano UAB                  | 50           |                           |        |        |           |            |          |
|             |                               |          |  |                              | 75           | L23-L23, L40-L40, L20-L20 |        |        |           |            |          |
| 1833915     | mometasoon, 1mg 1g            | D07AC13  | ELOCOM, salv, 15g 1TK  | Lex Ano UAB                  | 50           |                           |        |        |           |            |          |
|             |                               |          |  |                              | 75           | L23-L23, L40-L40, L20-L20 |        |        |           |            |          |
| 1847101     | mometasoon, 1mg 1g            | D07AC13  | ELOCON, salv, 15g 2TK  | Ideal Trade Links UAB        | 50           |                           |        |        |           |            |          |
|             |                               |          |  |                              | 75           | L23-L23, L20-L20, L40-L40 |        |        |           |            |          |
| 3071180     | mometasoon, 1mg 1g            | D07AC13  | ELOCOM, nahalahus, 60ml 1TK                                      | Lex Ano UAB                  | 50           |                           |        |        |           |            |          |
|             |                               |          |  |                              | 75           | L23-L23, L40-L40, L20-L20 |        |        |           |            |          |
| 1028966     | mometasoon, 50mcg 1annus      | R01AD09  | NASONEX, ninasprei, suspensioon, 140annus 1TK                    | Organon N.V.                 | 50           |                           |        |        |           |            |          |
|             |                               |          |  |                              | 75           | J30-J30                   |        |        | 17,00     |            |          |
| 1484298     | mometasoon, 50mcg 1annus      | R01AD09  | NASOMETIN, ninasprei, suspensioon, 140annus 1TK                  | Sandoz Pharmaceuticals d.d.  | 75           | J30-J30                   |        |        |           | 17,00      |          |
|             |                               |          |  |                              | 50           |                           |        |        |           |            |          |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügi- loa hoidja      | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla   | Märkused   |
|-------------|-------------------------------|----------|---|------------------------|---------------|----------|--------|--------|-----------|--|--|
| 1621224     | mometasoon, 50mcg 1annus      | R01AD09  | BRESO, ninasprei, suspensioon, 140annus 1TK                     | Norameda UAB           | 75            | J30-J30  |        |        |           | 17,00  |  |
|             |                               |          |   |                        | 50            |          |        |        |           |  |  |
| 1820135     | mometasoon, 50mcg 1annus      | R01AD09  | NASONEX, ninasprei, suspensioon, 140annus 1TK                   | Lex Ano UAB            | 50            |          |        |        |           |  |  |
|             |                               |          |   |                        | 75            | J30-J30  |        |        |           | 17,00  |  |
| 1823554     | mometasoon, 50mcg 1annus      | R01AD09  | NASONEX, ninasprei, suspensioon, 140annus 1TK                   | Ideal Trade Links UAB  | 50            |          |        |        |           |  |  |
|             |                               |          |   |                        | 75            | J30-J30  |        |        |           | 17,00  |  |
| 1602087     | mometasoon, 50mcg 1mõõttannus | R01AD09  | KALMENTE, ninasprei, suspensioon, 140mõõttannus 1TK             | Zentiva k.s.           | 50            |          |        |        |           |  |  |
|             |                               |          |   |                        | 75            | J30-J30  |        |        |           | 17,00  |  |
| 1641787     | mometasoon, 50mcg 1mõõttannus | R01AD09  | MOMETASONE SANOSWISS, ninasprei, suspensioon, 140mõõttannus 1TK | Sanoswiss UAB          | 75            | J30-J30  |        |        |           | 17,00  |  |
|             |                               |          |   |                        | 50            |          |        |        |           |  |  |
| 1274116     | montelukast, 10mg             | R03DC03  | MONTELUKAST TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK        | Teva Pharma B.V.       | 75            | J45-J45  |        |        |           | 11,00  |  |
|             |                               |          |   |                        | 50            |          |        |        |           |  |  |
|             |                               |          |   |                        | 75            | J45-J45  |        |        | 11,00     | mõõduka ja raske haiguse puhul lisaks püsivale optimaalses annuses inhaleeritava kortikosteroidiga |  |
| 1289987     | montelukast, 10mg             | R03DC03  | MONKASTA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK                | KRKA, d.d., Novo mesto | 75            | J45-J45  |        |        |           | 11,00  |  |
|             |                               |          |   |                        | 75            | J45-J45  |        |        | 11,00     | mõõduka ja raske haiguse puhul lisaks püsivale optimaalses annuses inhaleeritava kortikosteroidiga |  |
|             |                               |          |   |                        | 50            |          |        |        |           |  |  |
| 1289718     | montelukast, 4mg              | R03DC03  | MONKASTA, närimistablett, 28TK                                  | KRKA, d.d., Novo mesto | 75            | J45-J45  |        |        | 11,00     |  | mõõduka ja raske haiguse puhul lisaks püsivale optimaalses annuses inhaleeritava kortikosteroidiga |
|             |                               |          |   |                        | 75            | J45-J45  |        |        | 11,00     |  |  |
|             |                               |          |   |                        | 50            |          |        |        |           |  |  |
| 1289831     | montelukast, 5mg              | R03DC03  | MONKASTA, närimistablett, 28TK                                  | KRKA, d.d., Novo mesto | 75            | J45-J45  |        |        |           | 11,00  |  |
|             |                               |          |   |                        | 50            |          |        |        |           |  |  |
|             |                               |          |   |                        | 75            | J45-J45  |        |        | 11,00     | mõõduka ja raske haiguse puhul lisaks püsivale optimaalses annuses inhaleeritava kortikosteroidiga |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|---------------------------|------------------|-------------|---|--------|--------------|---------------|--|
| 1035740         | morfiin, 100mg                      | N02AA0<br>1 | VENDAL RETARD 100<br>MG, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | G.L. Pharma<br>GmbH       | 50               |             |   |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |  |                           | 100              | R52.1-R52.1 | Neuroloog,<br>Anestesioloog,<br>Reumatoloog | esmane |              |               | esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega<br>anestesioloogil, reumatoloogil ja neurooloogil ühe aasta<br>jooksul |
|                 |                                     |             |  |                           | 100              | C00-D48     |   |        |              |               |  |
| 1035717         | morfiin, 10mg                       | N02AA0<br>1 | VENDAL RETARD 10<br>MG, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK  | G.L. Pharma<br>GmbH       | 100              | C00-D48     |   |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |  |                           | 100              | R52.1-R52.1 | Neuroloog,<br>Anestesioloog,<br>Reumatoloog | esmane |              |               | esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega<br>anestesioloogil, reumatoloogil ja neurooloogil ühe aasta<br>jooksul |
|                 |                                     |             |  |                           | 50               |             |   |        |              |               |  |
| 1382284         | morfiin, 10mg                       | N02AA0<br>1 | SEVREDOL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK                           | Mundipharma<br>Ges.m.b.H. | 100              | C00-D48     |   |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |  |                           | 100              | R52.1-R52.1 | Neuroloog,<br>Anestesioloog,<br>Reumatoloog | esmane |              |               | esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega<br>anestesioloogil, reumatoloogil ja neurooloogil ühe aasta<br>jooksul |
|                 |                                     |             |  |                           | 50               |             |   |        |              |               |  |
| 1382307         | morfiin, 20mg                       | N02AA0<br>1 | SEVREDOL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK                           | Mundipharma<br>Ges.m.b.H. | 50               |             |   |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |  |                           | 100              | C00-D48     |   |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |  |                           | 100              | R52.1-R52.1 | Neuroloog,<br>Reumatoloog,<br>Anestesioloog | esmane |              |               | esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega<br>anestesioloogil, reumatoloogil ja neurooloogil ühe aasta<br>jooksul |
| 1035728         | morfiin, 30mg                       | N02AA0<br>1 | VENDAL RETARD 30<br>MG, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK  | G.L. Pharma<br>GmbH       | 100              | R52.1-R52.1 | Neuroloog,<br>Anestesioloog,<br>Reumatoloog | esmane |              |               | esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega<br>anestesioloogil, reumatoloogil ja neurooloogil ühe aasta<br>jooksul |
|                 |                                     |             |  |                           | 50               |             |   |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |  |                           | 100              | C00-D48     |   |        |              |               |  |
| 1339422         | morfiin, 30mg                       | N02AA0<br>1 | MXL 30 MG, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 30TK            | Mundipharma<br>Ges.m.b.H. | 50               |             |   |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |  |                           | 100              | C00-D48     |   |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |  |                           | 100              | R52.1-R52.1 | Neuroloog,<br>Reumatoloog,<br>Anestesioloog | esmane |              |               | esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega<br>anestesioloogil, reumatoloogil ja neurooloogil ühe aasta<br>jooksul |
| 1035739         | morfiin, 60mg                       | N02AA0<br>1 | VENDAL RETARD 60<br>MG, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK  | G.L. Pharma<br>GmbH       | 50               |             |   |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |  |                           | 100              | C00-D48     |   |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |  |                           | 100              | R52.1-R52.1 | Reumatoloog,<br>Anestesioloog,<br>Neuroloog | esmane |              |               | esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega<br>anestesioloogil, reumatoloogil ja neurooloogil ühe aasta<br>jooksul |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala                        | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|-------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1023556         | mükofenoolhape,<br>250mg            | L04AA0<br>6 | CELLCEPT, kõvakapsel,<br>100TK   | Roche<br>Registration<br>GmbH | 75               | L10-L10, L94-<br>L94, M30-M36 |                               |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                               | 75               | E05.0-E05.0                   | Endokrinoloog,<br>Oftalmoloog |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                               | 100              | Z94-Z94, T86-<br>T86          |                               |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                               | 50               |                               |                               |        |              |               |          |
| 1164697         | mükofenoolhape,<br>360mg            | L04AA0<br>6 | MYFORTIC,<br>gastroresistentne tablett,<br>120TK                                 | Novartis Baltics<br>SIA       | 50               |                               |                               |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                               | 75               | L10-L10, L94-<br>L94, M30-M36 |                               |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                               | 100              | Z94-Z94, T86-<br>T86          |                               |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                               | 75               | E05.0-E05.0                   | Oftalmoloog,<br>Endokrinoloog |        |              |               |          |
| 1088344         | mükofenoolhape,<br>500mg            | L04AA0<br>6 | CELLCEPT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>50TK                           | Roche<br>Registration<br>GmbH | 75               | L10-L10, L94-<br>L94, M30-M36 |                               |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                               | 100              | Z94-Z94, T86-<br>T86          |                               |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                               | 50               |                               |                               |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                               | 75               | E05.0-E05.0                   | Oftalmoloog,<br>Endokrinoloog |        |              |               |          |
| 1276736         | mükofenoolhape,<br>500mg            | L04AA0<br>6 | MYCOPHENOLATE<br>MOFETIL ACCORD,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>50TK | Accord Healthcare<br>B.V.     | 100              | Z94-Z94, T86-<br>T86          |                               |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                               | 50               |                               |                               |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                               | 75               | L10-L10, L94-<br>L94, M30-M36 |                               |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                               | 75               | E05.0-E05.0                   | Oftalmoloog,<br>Endokrinoloog |        |              |               |          |
| 1343270         | mükofenoolhape,<br>500mg            | L04AA0<br>6 | MYFENAX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>50TK                            | Teva B.V.                     | 75               | L10-L10, L94-<br>L94, M30-M36 |                               |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                               | 100              | Z94-Z94, T86-<br>T86          |                               |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                               | 75               | E05.0-E05.0                   | Oftalmoloog,<br>Endokrinoloog |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                               | 50               |                               |                               |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus             | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloa hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala                        | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla   | Märkused        |
|-----------------|---|-------------|--|--|------------------|---|-------------------------------|--------|--------------|---|-----------------|
| 3042964         | mükofenoolhape,<br>500mg                        | L04AA0<br>6 | CELLCEPT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>50TK | Roche<br>Registration<br>GmbH              | 50               |   |                               |        |              |   |                 |
|                 |   |             |  |  | 75               | M30-M36, L94-<br>L94, L10-L10   |                               |        |              |   |                 |
|                 |   |             |  |  | 100              | Z94-Z94, T86-<br>T86  |                               |        |              |   |                 |
|                 |   |             |  |  | 75               | E05.0-E05.0   | Oftalmoloog,<br>Endokrinoloog |        |              |   |                 |
| 1193127         | naatriumbemiparii<br>n, 2500RÜ anti Xa<br>0.2ml | B01AB1<br>2 | ZIBOR, süstelahus<br>süstlis, 0.2ml 10TK               | Rovi Pharma<br>Industrial Services<br>S.A. | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6  |                               |        |              |   | kuni 10 päevaks |
|                 |   |             |  |  | 100              | O99.8-O99.8   |                               |        |              |   |                 |
|                 |   |             |  |  | 50               |   |                               |        |              |   |                 |
| 1193172         | naatriumbemiparii<br>n, 3500RÜ anti Xa<br>0.2ml | B01AB1<br>2 | ZIBOR, süstelahus<br>süstlis, 10TK                     | Rovi Pharma<br>Industrial Services<br>S.A. | 100              | O99.8-O99.8   |                               |        |              |   |                 |
|                 |   |             |  |  | 75               | M17-M17,<br>S72.7-S72.7,<br>S72.1-S72.1,<br>S72.2-S72.2,<br>M16-M16,<br>S72.0-S72.0 |                               |        |              | kuni 30 päevaks   |                 |
|                 |   |             |  |  | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6  |                               |        |              | kuni 10 päevaks   |                 |
|                 |   |             |  |  | 50               |   |                               |        |              |   |                 |
| 1065596         | naatriumenoksapa<br>riin, 10000RÜ 1ml           | B01AB0<br>5 | CLEXANE, süstelahus<br>süstlis, 1ml 2TK                | Sanofi Winthrop<br>Industrie               | 50               |   |                               |        |              |   |                 |
|                 |   |             |  |  | 100              | O99.8-O99.8   |                               |        |              |   |                 |
|                 |   |             |  |  | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6  |                               |        |              | kuni 10 päevaks või kaasuva pahaloomulise kasvaja<br>esinemisel |                 |
| 1065608         | naatriumenoksapa<br>riin, 10000RÜ 1ml           | B01AB0<br>5 | CLEXANE, süstelahus<br>süstlis, 1ml 10TK               | Sanofi Winthrop<br>Industrie               | 100              | O99.8-O99.8   |                               |        |              |   |                 |
|                 |   |             |  |  | 50               |   |                               |        |              |   |                 |
|                 |   |             |  |  | 100              | I80-I82, I26-I26,<br>I67.6-I67.6  |                               |        |              | kuni 10 päevaks või kaasuva pahaloomulise kasvaja<br>esinemisel |                 |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus    | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                      | Müügiloa hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla   | Märkused        |
|-----------------|--|-------------|--|--|------------------|---|--------|--------|--------------|---|-----------------|
| 1065529         | naatriumenoksapa<br>riin, 2000RÜ 0.2ml | B01AB0<br>5 | CLEXANE, süstelahus<br>süstlis, 0.2ml 10TK | Sanofi Winthrop<br>Industrie               | 75               | M17-M17,<br>S72.7-S72.7,<br>S72.1-S72.1,<br>S72.2-S72.2,<br>M16-M16,<br>S72.0-S72.0 |        |        |              |   | kuni 30 päevaks |
|                 |  |             |  |  | 100              | O99.8-O99.8   |        |        |              |   |                 |
|                 |  |             |  |  | 100              | I80-I82, I26-I26,<br>I67.6-I67.6  |        |        |              | kuni 10 päevaks või kaasuva pahaloomulise kasvaja<br>esinemisel |                 |
|                 |  |             |  |  | 50               |   |        |        |              |   |                 |
| 1745939         | naatriumenoksapa<br>riin, 2000RÜ 0.2ml | B01AB0<br>5 | LOSMINA, süstelahus<br>süstlis, 0.2ml 10TK | Laboratorios<br>Farmaceuticos<br>Rovi S.A. | 100              | O99.8-O99.8   |        |        |              |   |                 |
|                 |  |             |  |  | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6  |        |        |              | kuni 10 päevaks või kaasuva pahaloomulise kasvaja<br>esinemisel |                 |
|                 |  |             |  |  | 50               |   |        |        |              |   |                 |
|                 |  |             |  |  | 75               | M17-M17,<br>S72.7-S72.7,<br>S72.1-S72.1,<br>S72.2-S72.2,<br>M16-M16,<br>S72.0-S72.0 |        |        |              | kuni 30 päevaks   |                 |
| 1065541         | naatriumenoksapa<br>riin, 4000RÜ 0.4ml | B01AB0<br>5 | CLEXANE, süstelahus<br>süstlis, 0.4ml 10TK | Sanofi Winthrop<br>Industrie               | 50               |   |        |        |              |   |                 |
|                 |  |             |  |  | 75               | M17-M17,<br>S72.7-S72.7,<br>S72.1-S72.1,<br>S72.2-S72.2,<br>M16-M16,<br>S72.0-S72.0 |        |        |              | kuni 30 päevaks   |                 |
|                 |  |             |  |  | 100              | O99.8-O99.8   |        |        |              |   |                 |
|                 |  |             |  |  | 100              | I26-I26, I67.6-<br>I67.6, I80-I82   |        |        |              | kuni 10 päevaks või kaasuva pahaloomulise kasvaja<br>esinemisel |                 |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus    | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                      | Müügiloa hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla  | Märkused  |
|-----------------|--|-------------|--|--|------------------|---|--------|--------|--------------|--|---|
| 1781489         | naatriumenoksapa<br>riin, 4000RÜ 0.4ml | B01AB0<br>5 | LOSMINA, süstelahus<br>süstlis, 0.4ml 10TK | Laboratorios<br>Farmaceuticos<br>Rovi S.A. | 75               | M17-M17,<br>S72.7-S72.7,<br>S72.1-S72.1,<br>S72.2-S72.2,<br>M16-M16,<br>S72.0-S72.0 |        |        |              |  | kuni 30 päevaks   |
|                 |  |             |  |  | 100              | O99.8-O99.8   |        |        |              |  |   |
|                 |  |             |  |  | 50               |   |        |        |              |  |   |
|                 |  |             |  |  | 100              | I26-I26, I67.6-<br>I67.6, I80-I82   |        |        |              | kuni 10 päevaks või kaasuva pahaloomulise kasvaja<br>esinemisel  |   |
| 1065552         | naatriumenoksapa<br>riin, 6000RÜ 0.6ml | B01AB0<br>5 | CLEXANE, süstelahus<br>süstlis, 0.6ml 2TK  | Sanofi Winthrop<br>Industrie               | 50               |   |        |        |              |  |   |
|                 |  |             |  |  | 100              | O99.8-O99.8   |        |        |              |  |   |
|                 |  |             |  |  | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6  |        |        |              | kuni 10 päevaks või kaasuva pahaloomulise kasvaja<br>esinemisel  |   |
| 1065563         | naatriumenoksapa<br>riin, 6000RÜ 0.6ml | B01AB0<br>5 | CLEXANE, süstelahus<br>süstlis, 0.6ml 10TK | Sanofi Winthrop<br>Industrie               | 50               |   |        |        |              |  |   |
|                 |  |             |  |  | 100              | O99.8-O99.8   |        |        |              |  |   |
|                 |  |             |  |  | 100              | I80-I82, I26-I26,<br>I67.6-I67.6  |        |        |              | kuni 10 päevaks või kaasuva pahaloomulise kasvaja<br>esinemisel  |   |
| 1065574         | naatriumenoksapa<br>riin, 8000RÜ 0.8ml | B01AB0<br>5 | CLEXANE, süstelahus<br>süstlis, 0.8ml 2TK  | Sanofi Winthrop<br>Industrie               | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6  |        |        |              |  | kuni 10 päevaks või kaasuva pahaloomulise kasvaja<br>esinemisel |
|                 |  |             |  |  | 100              | O99.8-O99.8   |        |        |              |  |   |
|                 |  |             |  |  | 50               |   |        |        |              |  |   |
| 1065585         | naatriumenoksapa<br>riin, 8000RÜ 0.8ml | B01AB0<br>5 | CLEXANE, süstelahus<br>süstlis, 0.8ml 10TK | Sanofi Winthrop<br>Industrie               | 100              | O99.8-O99.8   |        |        |              |  |   |
|                 |  |             |  |  | 50               |   |        |        |              |  |   |
|                 |  |             |  |  | 100              | I80-I82, I26-I26,<br>I67.6-I67.6  |        |        |              | kuni 10 päevaks või kaasuva pahaloomulise kasvaja<br>esinemisel  |   |
| 1201521         | naatriumfenüülbut<br>üraat, 500mg      | A16AX0<br>3 | AMMONAPS, tablett,<br>250TK                | Immedica Pharma<br>AB                      | 100              | E72.2-E72.2   |        |        |              | konsiiliumi (vähemalt 2 pediaatri ühise) otsuse alusel<br>järgmistel tingimustel: haigus kulgeb metaboolsete<br>kriisidega vaatamata muule suukaudsele ravile, patsiendi<br>prognoos paranemisele on hea (püsivat ajukahjustust või<br>organpuudulikkust ei esine), ravi jätkatakse patsiendil,<br>kellel 1 kuu kestnud ravi on andnud hea tulemuse<br>(hüperammoneemilisi kriise ei ole esinenud või on nende<br>sagedus oluliselt vähenenud) |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus  | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                    | Müügiloo hoidja                     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                 | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|--|-------------|--|-------------------------------------|------------------|--|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1065822         | naatriumlevotürok<br>siin, 100mcg  | H03AA0<br>1 | L-THYROXIN BERLIN-<br>CHEMIE, tablett, 100TK             | Berlin-Chemie AG                    | 100              | E89.0-E89.0,<br>E03-E03, E89.3-<br>E89.3 |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |  |                                     | 50               |  |        |        |              |               |          |
| 1892022         | naatriumlevotürok<br>siin, 100mcg  | H03AA0<br>1 | L-THYROXIN BERLIN-<br>CHEMIE, tablett, 100TK             | Ideal Trade Links<br>UAB            | 100              | E89.0-E89.0,<br>E89.3-E89.3,<br>E03-E03  |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |  |                                     | 50               |  |        |        |              |               |          |
| 1065866         | naatriumlevotürok<br>siin, 50mcg   | H03AA0<br>1 | L-THYROXIN BERLIN-<br>CHEMIE, tablett, 100TK             | Berlin-Chemie AG                    | 100              | E89.0-E89.0,<br>E03-E03, E89.3-<br>E89.3 |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |  |                                     | 50               |  |        |        |              |               |          |
| 1891997         | naatriumlevotürok<br>siin, 50mcg   | H03AA0<br>1 | L-THYROXIN BERLIN-<br>CHEMIE, tablett, 100TK             | Ideal Trade Links<br>UAB            | 100              | E89.0-E89.0,<br>E89.3-E89.3,<br>E03-E03  |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |  |                                     | 50               |  |        |        |              |               |          |
| 1836558         | naatriumpikosulfaa<br>t+magneesiumoksi<br>id+sidrunhape,<br>10mg+3,5g+10,97<br>g   | A06AB8<br>0 | CITRAFLEET,<br>suukaudse lahuse<br>pulber kotikeses, 2TK | Casen Recordati<br>S.L.             | 50               |  |        |        |              |               |          |
| 1448524         | naatriumpikosulfaa<br>t+magneesiumoksi<br>id+sidrunhape,<br>10mg+3,5g+12g  | A06AB8<br>0 | PICOPREP, suukaudse<br>lahuse pulber, 2TK                | Ferring GmbH                        | 50               |  |        |        |              |               |          |
| 1035346         | naatriumsulfaat,<br>veevaba+kaaliumk<br>loriid+naatriumklori<br>id+makrogool+naa<br>triumvesinikkarbon<br>aat,<br>5,7g+0,75g+1,46g<br>+64g+1,68g | A06AD8<br>1 | FORTTRANS, suukaudse<br>lahuse pulber, 4TK               | Ipsen Consumer<br>Healthcare S.A.S. | 50               |  |        |        |              |               |          |
| 1023949         | nabumetoon, 1g   | M01AX0<br>1 | RELIFEX, dispergeeruv<br>tablett, 20TK                   | Viartis SIA                         | 50               |  |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus        | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                              | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |
|-----------------|--|-------------|---|--|------------------|---------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|--|
| 1205479         | nabumetoon, 1g                             | M01AX0<br>1 | RELIFEX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>20TK                           | Viartis SIA  | 50               |                                       |        |        |              |               |  |
| 1147902         | naftidrofurüül,<br>100mg                   | C04AX2<br>1 | ENELBIN 100 RETARD,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 50TK  | Zentiva k.s.   | 50               |                                       |        |        |              |               |  |
| 1147913         | naftidrofurüül,<br>100mg                   | C04AX2<br>1 | ENELBIN 100 RETARD,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 100TK | Zentiva k.s.   | 50               |                                       |        |        |              |               |  |
| 1671263         | naloksegool, 25mg                          | A06AH0<br>3 | MOVENTIG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                          | Gruenthal<br>GmbH  | 75               | K59.0-K59.0                           |        |        |              |               | kroonilise opioid-indutseeritud kõhukinnisuse raviks<br>patsiendile, kes kasutab igapäevaselt tugevatoimelist<br>opioidi (morfiin, oksükodoon, fentanüül) ning kes ei ole<br>vähemalt 2 kuu möödumisel opioidravi alustamisest<br>saavutanud lahtistite abil piisavat raviefekti |
| 1644713         | naprokseen,<br>550mg                       | M01AE0<br>2 | NALGESIN FORTE,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                 | KRKA d.d. Novo<br>mesto                                    | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46         |        |        |              |               |  |
|                 |  |             |   |  | 100              | C00-D48                               |        |        |              |               |  |
|                 |  |             |   |  | 50               |                                       |        |        |              |               |  |
|                 |  |             |   |  | 75               | M15-M19                               |        |        | 63,00        |               |  |
| 1437791         | naprokseen+esom<br>eprasool,<br>500mg+20mg | M01AE5<br>2 | VIMOVO, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 60TK                | Grunenthal GmbH  | 50               |                                       |        |        |              |               |  |
| 1072437         | nebivolool, 5mg                            | C07AB1<br>2 | NEBILET, tablett, 28TK  | Menarini<br>International<br>Operations<br>Luxembourg S.A. | 75               | I10-I13, I47-I49,<br>I15-I15, I50-I50 |        |        |              |               |  |
|                 |  |             |   |  | 50               |                                       |        |        |              |               |  |
| 1237429         | nebivolool, 5mg                            | C07AB1<br>2 | NEBIVOLOL STADA,<br>tablett, 100TK  | Stada Arzneimittel<br>AG                                   | 50               |                                       |        |        |              |               |  |
|                 |  |             |   |  | 75               | I10-I13, I47-I49,<br>I15-I15, I50-I50 |        |        |              |               |  |
| 1259355         | nebivolool, 5mg                            | C07AB1<br>2 | NEBICARD 5MG,<br>tablett, 60TK  | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.                          | 75               | I10-I13, I47-I49,<br>I15-I15, I50-I50 |        |        |              |               |  |
|                 |  |             |   |  | 50               |                                       |        |        |              |               |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                  | Eriala                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|--|------------------|---|---------------------------|--------|--------------|---------------|--|--|
| 1259377         | nebivolool, 5mg                     | C07AB1<br>2 | NEBICARD 5MG,<br>tablett, 90TK   | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.                          | 50               |   |                           |        |              |               |  |  |
|                 |                                     |             |  |  | 75               | I10-I13, I47-I49,<br>I15-I15, I50-I50     |                           |        |              |               |  |  |
| 1269862         | nebivolool, 5mg                     | C07AB1<br>2 | NEBIVOLOL ACTAVIS,<br>tablett, 28TK  | Teva B.V.  | 50               |   |                           |        |              |               |  |  |
|                 |                                     |             |  |  | 75               | I10-I13, I47-I49,<br>I15-I15, I50-I50     |                           |        |              |               |  |  |
| 1269907         | nebivolool, 5mg                     | C07AB1<br>2 | NEBIVOLOL ACTAVIS,<br>tablett, 90TK  | Teva B.V.  | 50               |   |                           |        |              |               |  |  |
|                 |                                     |             |  |  | 75               | I10-I13, I47-I49,<br>I15-I15, I50-I50     |                           |        |              |               |  |  |
| 1344259         | nebivolool, 5mg                     | C07AB1<br>2 | NEBIPHAR, tablett,<br>28TK   | Teva Pharma B.V.   | 75               | I10-I13, I47-I49,<br>I15-I15, I50-I50     |                           |        |              |               |  |  |
|                 |                                     |             |  |  | 50               |   |                           |        |              |               |  |  |
| 1445149         | nebivolool, 5mg                     | C07AB1<br>2 | NEBILET, tablett, 90TK   | Menarini<br>International<br>Operations<br>Luxembourg S.A. | 75               | I10-I13, I47-I49,<br>I15-I15, I50-I50     |                           |        |              |               |  |  |
|                 |                                     |             |  |  | 50               |   |                           |        |              |               |  |  |
| 1780084         | nebivolool, 5mg                     | C07AB1<br>2 | NOLIBETA, tablett,<br>90TK   | KRKA d.d. Novo<br>mesto                                    | 75               | I10-I13, I47-I49,<br>I15-I15, I50-I50     |                           |        |              |               |  |  |
|                 |                                     |             |  |  | 50               |   |                           |        |              |               |  |  |
| 1880276         | nebivolool, 5mg                     | C07AB1<br>2 | NEBILET, tablett, 90TK   | Ideal Trade Links<br>UAB                                   | 75               | I10-I13, I47-I49,<br>I15-I15, I50-I50     |                           |        |              |               |  |  |
|                 |                                     |             |  |  | 50               |   |                           |        |              |               |  |  |
| 1343001         | nepafenak, 1mg<br>1ml               | S01BC1<br>0 | NEVANAC, silmatilgad,<br>suspensioon, 5ml 1TK                                | Novartis<br>Europharm<br>Limited                           | 50               |   |                           |        |              |               | katarakti operatsiooni järgseks kuni 60-päevaseks raviks<br>kaasuva diabeetilise retinopaatia esinemisel |  |
| 1072572         | nifedipiin, 10mg                    | C08CA0<br>5 | CORINFAR, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 100TK           | Teva Pharma B.V.   | 50               |   |                           |        |              |               |  |  |
| 1072550         | nifedipiin, 20mg                    | C08CA0<br>5 | CORINFAR RETARD,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 100TK | Teva Pharma B.V.   | 100              | I27.0-I27.0                               |                           |        |              |               |  |  |
|                 |                                     |             |  |  | 75               | I10-I13, I15-I15,<br>I20-I20, O10-<br>O16 |                           |        |              |               |  |  |
|                 |                                     |             |  |  | 50               |   |                           |        |              |               |  |  |
|                 |                                     |             |  |  | 75               | M34-M34                                   | Reumatoloog,<br>Pediaater | esmane |              |               |  |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                   | Müügiloa hoidja                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala     | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|----------------------------------|------------------|-------------|------------|--------|--------------|---------------|--|
| 1342190         | nilotiniib, 200mg                   | L01EA0<br>3 | TASIGNA, kõvakapsel,<br>112TK           | Novartis<br>Europharm<br>Limited | 100              | C92.1-C92.1 | Hematoloog |        |              |               | konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi, eelnev ravi imatiniibiga annuses 600mg on ebaõnnestunud või osutunud talumatuks (imatiniibravi on põhjustanud III või IV astme kõrvaltoime või üle 3 kuu püsinud II astme kõrvaltoime CTC klassifikatsiooni järgi) ning ravi alustatakse kuni 3. rea ravina; ravi võib jätkata kuni hematoloogilise ravivastuse püsimiseni (haigus ei progresseeru nilotiniibravi foonil |
| 3024470         | nilotiniib, 200mg                   | L01EA0<br>3 | NILOTINIB STADA,<br>kõvakapsel, 112TK   | Stada Arzneimittel<br>AG         | 100              | C92.1-C92.1 | Hematoloog |        |              |               | konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi, eelnev ravi imatiniibiga annuses 600mg on ebaõnnestunud või osutunud talumatuks (imatiniibravi on põhjustanud III või IV astme kõrvaltoime või üle 3 kuu püsinud II astme kõrvaltoime CTC klassifikatsiooni järgi) ning ravi alustatakse kuni 3. rea ravina; ravi võib jätkata kuni hematoloogilise ravivastuse püsimiseni (haigus ei progresseeru nilotiniibravi foonil |
| 3024582         | nilotiniib, 200mg                   | L01EA0<br>3 | NILOTINIB ZENTIVA,<br>kõvakapsel, 112TK | Zentiva k.s.                     | 100              | C92.1-C92.1 | Hematoloog |        |              |               | konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi, eelnev ravi imatiniibiga annuses 600mg on ebaõnnestunud või osutunud talumatuks (imatiniibravi on põhjustanud III või IV astme kõrvaltoime või üle 3 kuu püsinud II astme kõrvaltoime CTC klassifikatsiooni järgi) ning ravi alustatakse kuni 3. rea ravina; ravi võib jätkata kuni hematoloogilise ravivastuse püsimiseni (haigus ei progresseeru nilotiniibravi foonil |
| 3089752         | nilotiniib, 200mg                   | L01EA0<br>3 | NILOTINIB ACCORD,<br>kõvakapsel, 112TK  | Accord Healthcare<br>S.L.U.      | 100              | C92.1-C92.1 | Hematoloog |        |              |               | konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi, eelnev ravi imatiniibiga annuses 600mg on ebaõnnestunud või osutunud talumatuks (imatiniibravi on põhjustanud III või IV astme kõrvaltoime või üle 3 kuu püsinud II astme kõrvaltoime CTC klassifikatsiooni järgi) ning ravi alustatakse kuni 3. rea ravina; ravi võib jätkata kuni hematoloogilise ravivastuse püsimiseni (haigus ei progresseeru nilotiniibravi foonil |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus        | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                | Müügiloa hoidja                                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla   | Märkused   |
|-----------------|--|-------------|--|--|------------------|---|-------------|--------|--------------|---|--|
| 1675571         | nintedaniib,<br>100mg                      | L01EX0<br>9 | OFEV, pehmekapsel,<br>60TK                           | Boehringer<br>Ingelheim<br>International<br>GmbH | 100              | J84.1-J84.1   | Pulmonoloog |        |              |   | patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=50% eeldatavast. Soodustus ei hõlma nintedaniibi ja pirfenidooni kombinatsioonravi.  |
|                 |  |             |  |  | 100              | J67-J67, J84.1-<br>J84.1, M34.8-<br>M34.8, J84.8-<br>J84.8, J84.9-<br>J84.9 | Pulmonoloog |        |              | konsiiliumi (kahe pulmonoloogi ühise) otsuse alusel progresseeruva fenotüübiga teiste krooniliste fibroseerivate interstitsiaalsete kopsuhaiguste ja süsteemse skleroosiga seotud progresseeruva kuluga fibroseeriva interstitsiaalse kopsuhaiguse raviks patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=45% |  |
| 1675593         | nintedaniib,<br>150mg                      | L01EX0<br>9 | OFEV, pehmekapsel,<br>60TK                           | Boehringer<br>Ingelheim<br>International<br>GmbH | 100              | J67-J67, J84.1-<br>J84.1, M34.8-<br>M34.8, J84.8-<br>J84.8, J84.9-<br>J84.9 | Pulmonoloog |        |              |   | konsiiliumi (kahe pulmonoloogi ühise) otsuse alusel progresseeruva fenotüübiga teiste krooniliste fibroseerivate interstitsiaalsete kopsuhaiguste ja süsteemse skleroosiga seotud progresseeruva kuluga fibroseeriva interstitsiaalse kopsuhaiguse raviks patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=45%  |
|                 |  |             |  |  | 100              | J84.1-J84.1   | Pulmonoloog |        |              | patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=50% eeldatavast. Soodustus ei hõlma nintedaniibi ja pirfenidooni kombinatsioonravi.   |  |
| 1885114         | nirapariib, 100mg                          | L01XK0<br>2 | ZEJULA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited             | 100              | C48-C48,<br>C57.0-C57.0,<br>C56-C56   | Onkoloog    |        |              |   | monoteraapiana kaugelearenenud epiteliaalse (FIGO III ja IV staadium) madalalt diferentseerunud munasarjavähi, munajuhavähi või primaarse peritoneaalvähi säilitusraviks HRD positiivse staatusega patsientidel, kellel on tekkinud (täielik või osaline) ravivastus esmavaliku platinapõhise keemiaravi läbimise järgselt   |
| 3037193         | nirapariib+abirater<br>oon,<br>100mg+500mg | L01XK5<br>2 | AKEEGA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK | Janssen - Cilag<br>International                 | 100              | C61-C61   | Onkoloog    |        |              |   | koos prednisooni või prednisolooniga metastaatilise kastratsioonresistentse eesnäärmevähi raviks BRCA1/2 mutatsiooniga (iduliini ja/või somaatiline) patsientidele, kellele ei ole kemoteraapia kliiniliselt näidustatud ja kes ei ole enne haiguse metastaseerumist saanud ravi teise põlvkonna androgeenireseptori inhibiitoritega ja kes ei ole saanud varasemalt süsteemset mCRPC ravi (lubatud kuni 4 kuud ravi abiraterooniga) (RHK-10 diagnoos C61) ega ravi PARP inhibiitoriga |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                  | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                                 | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                    | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|--|-------------|--|---|------------------|-----------------------------|----------|--------|--------------|---------------|---|
| 3037182         | niraparib+abirater<br>oon, 50mg+500mg                | L01XK5<br>2 | AKEEGA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK                         | Janssen - Cilag<br>International                | 100              | C61-C61                     | Onkoloog |        |              |               | koos prednisooni või prednisolooniga metastaatilise<br>kastratsioonresistentse eesnäärmevähi raviks BRCA1/2<br>mutatsiooniga (iduliini ja/või somaatiline) patsientidele,<br>kellele ei ole kemoterapia kliiniliselt näidustatud ja kes ei<br>ole enne haiguse metastaseerumist saanud ravi teise<br>põlvkonna androgeenireseptori inhibiitoritega ja kes ei ole<br>saanud varasemalt süsteemset mCRPC ravi (lubatud kuni<br>4 kuud ravi abiraterooniga) (RHK-10 diagnoos C61) ega<br>ravi PARP inhibiitoriga   |
| 1872200         | nirmatrelviir+ritona<br>viir,<br>150mg+0/0+100m<br>g | J05AE30     | PAXLOVID, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>150mg 20TK / 100mg<br>10TK | Pfizer Europe MA<br>EEIG                        | 100              | U07.2-U07.2,<br>U07.1-U07.1 |          |        |              |               | riskirühma patsientidele, kellel esinevad COVID-19<br>sümptomid ning kellel tervishoiuteenuse osutaja juures<br>tehtud COVID-19 antigeeni kiirtest või PCR test või<br>kodune antigeeni kiirtest koos epidemioloogilise seosega<br>on kinnitanud COVID-19-sse haigestumist. Riskirühma<br>kuuluvad patsiendid, kellel esineb vähemalt 1<br>järgnevatest riskiteguritest: vanus üle 70 a,<br>immuunsupresseeriv haigus või -ravi, KOK või muu raske<br>kopsuhaigus (bronhiektasiasitõbi, krooniline bronhiit,<br>emfüseem) või patsiendil esineb vähemalt 3 Terviseameti<br>kodulehel avaldatud juhendis „Juhis tervishoiuteenuse<br>osutajale esmatasandil (COVID-19)“, Lisa 2. COVID-19<br>riskirühmade nimekirjas nimetatud riskirühma<br>haigusseisundit |
| 1214806         | nitisinoon, 10mg                                     | A16AX0<br>4 | ORFADIN, kõvakapsel,<br>60TK   | Swedish Orphan<br>Biovitrum<br>International AB | 100              | E70.2-E70.2                 |          |        |              |               | alkaptonuuria raviks  |
| 1197738         | nitisinoon, 2mg                                      | A16AX0<br>4 | ORFADIN, kõvakapsel,<br>60TK   | Swedish Orphan<br>Biovitrum<br>International AB | 100              | E70.2-E70.2                 |          |        |              |               | alkaptonuuria raviks  |
| 1197749         | nitisinoon, 5mg                                      | A16AX0<br>4 | ORFADIN, kõvakapsel,<br>60TK   | Swedish Orphan<br>Biovitrum<br>International AB | 100              | E70.2-E70.2                 |          |        |              |               | alkaptonuuria raviks  |
| 1261842         | nitrendipiin, 10mg                                   | C08CA0<br>8 | NITRESAN 10 MG,<br>tablett, 50TK   | Pro.Med.Cs Praha<br>a.s.                        | 50               |                             |          |        |              |               |   |
|                 |  |             |  |   | 75               | I10-I13, I15-I15            |          |        |              |               |   |
| 1014545         | nitrendipiin, 20mg                                   | C08CA0<br>8 | LUSOPRESS, tablett,<br>28TK  | Istituto Luso<br>Farmaco D'Italia<br>S.p.A.     | 50               |                             |          |        |              |               |   |
|                 |  |             |  |   | 75               | I10-I13, I15-I15            |          |        |              |               |   |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus                | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja        | Soodus-tus % | Diagnoos                                       | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-------------|--|----------|---|------------------------|--------------|--|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1261886     | nitrendipiin, 20mg                           | C08CA08  | NITRESAN 20 MG, tablett, 50TK                                   | Pro.Med.Cs Praha a.s.  | 75           | I10-I13, I15-I15                               |                           |        |           |            |   |
|             |  |          |   |                        | 50           |  |                           |        |           |            |   |
| 1865347     | nitrofurantoiin, 100mg                       | J01XE01  | MAGROMAG, toimeainet modifitseeritud vabastav kõvakapsel, 20TK  | Olainfarm AS           | 50           |  |                           |        |           |            |   |
| 1003857     | nitrofurantoiin, 50mg                        | J01XE01  | NITROFURANTOIN ORIFARM, tablett, 20TK                           | Orifarm Healthcare A/S | 50           |  |                           |        |           |            |   |
| 3059917     | nitrofurantoiin, 50mg                        | J01XE01  | NITROFURANTOIN ORIFARM, tablett, 20TK                           | Ideal Trade Links UAB  | 50           |  |                           |        |           |            |   |
| 1175464     | noretisteroon+östradiol, 0,5mg+1mg           | G03FA01  | ACTIVELLE, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK               | Novo Nordisk A/S       | 50           |  |                           |        |           |            |   |
| 1887992     | noretisteroon+östradiol, 0,5mg+1mg           | G03FA01  | ACTIVELLE, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK               | Lex Ano UAB            | 50           |  |                           |        |           |            |   |
| 1030453     | noretisteroon+östradiol, 0+1mg/1mg+2mg/0+2mg | G03FB05  | TRISEQUENS, õhukese polümeerikattega tablett, 6TK / 10TK / 12TK | Novo Nordisk A/S       | 50           |  |                           |        |           |            |   |
|             |  |          |   |                        | 100          | E89.4-E89.4, E28.3-E28.3, E23.0-E23.0, Q96-Q97 | Endokrinoloog, Ginekoloog | esmane |           | 50,00      | haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient on alla 50. eluaasta vana |
| 3068849     | noretisteroon+östradiol, 0+1mg/1mg+2mg/0+2mg | G03FB05  | TRISEQUENS, õhukese polümeerikattega tablett, 6TK / 10TK / 12TK | Ideal Trade Links UAB  | 100          | E89.4-E89.4, E28.3-E28.3, E23.0-E23.0, Q96-Q97 | Endokrinoloog, Ginekoloog | esmane |           | 50,00      | haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient on alla 50. eluaasta vana |
|             |  |          |   |                        | 50           |  |                           |        |           |            |   |
| 1116560     | noretisteroon+östradiol, 1mg+1mg/0+1mg       | G03FB05  | NOVOFEM, õhukese polümeerikattega tablett, 12TK / 16TK          | Novo Nordisk A/S       | 100          | E89.4-E89.4, E28.3-E28.3, E23.0-E23.0, Q96-Q97 | Endokrinoloog, Ginekoloog | esmane |           | 50,00      | haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient on alla 50. eluaasta vana |
|             |  |          |   |                        | 50           |  |                           |        |           |            |   |
| 1030464     | noretisteroon+östradiol, 1mg+2mg             | G03FA01  | KLIOGEST, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK                | Novo Nordisk A/S       | 50           |  |                           |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|-------------------------------|------------------|--|-------------|--------|--------------|---------------|--|
| 1005455         | norfloksatsiin,<br>400mg            | J01MA0<br>6 | NOLICIN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>20TK               | KRKA d.d. Novo<br>mesto       | 50               |  |             |        |              |               |  |
| 1005927         | nortriptüliin, 25mg                 | N06AA1<br>0 | NORITREN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK             | H. Lundbeck A/S               | 75               | G63-G63, G43-<br>G43, G62.0-<br>G62.0  |             |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |   |                               | 100              | F32.2-F32.3,<br>F70-F79, F11.4-<br>F11.7, F18.4-<br>F18.7, F20-F29,<br>F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7,<br>F19.4-F19.7,<br>F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7,<br>F00-F09, F60.3-<br>F60.3, F13.4-<br>F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-<br>F17.7, F15.4-<br>F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane |              |               |  |
|                 |                                     |             |   |                               | 50               |  |             |        |              |               |  |
| 1845514         | ofatumumab,<br>20mg 0.4ml           | L04AG1<br>2 | KESIMPZA,<br>süstesuspensioon pen-<br>süstlis, 0.4ml 1TK            | Novartis Ireland<br>Limited   | 100              | G35-G35  | Neuroloog   | esmane |              |               | konsiiliumi (3 neuroloogi ühise otsuse alusel (ägenemiste<br>ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks |
| 1012374         | ofloksatsiin,<br>200mg              | J01MA0<br>1 | MEDOFLOXINE 200<br>MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK | Medochemie<br>Limited         | 50               |  |             |        |              |               |  |
| 1089402         | ofloksatsiin,<br>200mg              | J01MA0<br>1 | OFLOXIN 200, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK           | Zentiva k.s.                  | 50               |  |             |        |              |               |  |
| 3078884         | okrelizumab,<br>920mg 23ml          | L04AG0<br>8 | OCREVUS, süstelahus,<br>23ml 1TK                                    | Roche<br>Registration<br>GmbH | 100              | G35-G35  | Neuroloog   | esmane |              |               | konsiiliumi (3 neuroloogi ühise otsuse alusel (ägenemiste<br>ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks |
| 1009673         | okskarbesepiin,<br>300mg            | N03AF0<br>2 | TRILEPTAL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>50TK             | Novartis Baltics<br>SIA       | 50               |  |             |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |   |                               | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |              |               |  |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja           | Soodus-tus % | Diagnoos    | Eriala                                | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused   |
|-------------|-------------------------------|----------|--|---------------------------|--------------|-------------|---------------------------------------|--------|-----------|---|--|
| 1036044     | okskarbasepiin, 300mg         | N03AF02  | APYDAN 300 MG, tablett, 50TK                                       | Desitin Arzneimittel GmbH | 50           |             |                                       |        |           |   |  |
|             |                               |          |  |                           | 100          | G40-G40     | Neuroloog                             | esmane |           |   |  |
| 1009684     | okskarbasepiin, 600mg         | N03AF02  | TRILEPTAL, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK                  | Novartis Baltics SIA      | 100          | G40-G40     | Neuroloog                             | esmane |           |   |  |
|             |                               |          |  |                           | 50           |             |                                       |        |           |   |  |
| 1036033     | okskarbasepiin, 600mg         | N03AF02  | APYDAN 600 MG, tablett, 50TK                                       | Desitin Arzneimittel GmbH | 50           |             |                                       |        |           |   |  |
|             |                               |          |  |                           | 100          | G40-G40     | Neuroloog                             | esmane |           |   |  |
| 1028483     | oksübutüniin, 5mg             | G04BD04  | DRIPTANE, tablett, 60TK  | Viartis SIA               | 75           | N31-N31     | Neuroloog, Uroloog, Pediaater         | esmane |           |   |  |
|             |                               |          |  |                           | 50           |             |                                       |        |           |   |  |
| 1402568     | oksükodoon, 10mg              | N02AA05  | OXYCONTIN 10 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK | Mundipharma Ges.m.b.H.    | 100          | R52.1-R52.1 | Reumatoloog, Neuroloog, Anestesioloog | esmane |           |   | esmise väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist |
|             |                               |          |  |                           | 100          | C00-D48     |                                       |        |           | patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist |  |
|             |                               |          |  |                           | 50           |             |                                       |        |           |   |  |
| 1526576     | oksükodoon, 10mg              | N02AA05  | OXYCODONE VITABALANS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK       | Vitabalans Oy             | 100          | C00-D48     |                                       |        |           |   | patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist  |
|             |                               |          |  |                           | 100          | R52.1-R52.1 | Reumatoloog, Anestesioloog, Neuroloog | esmane |           |   | esmise väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist |
|             |                               |          |  |                           | 50           |             |                                       |        |           |   |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla   | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|---------------------------|------------------|-------------|---|--------|--------------|---|---|
| 1402580         | oksükodoon,<br>20mg                 | N02AA0<br>5 | OXYCONTIN 20 MG,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 60TK | Mundipharma<br>Ges.m.b.H. | 100              | C00-D48     |   |        |              |   | patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist   |
|                 |                                     |             |   |                           | 50               |             |   |        |              |   |   |
|                 |                                     |             |   |                           | 100              | R52.1-R52.1 | Neuroloog,<br>Reumatoloog,<br>Anestesioloog | esmane |              | esmise väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neurooloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist |   |
| 1402603         | oksükodoon,<br>40mg                 | N02AA0<br>5 | OXYCONTIN 40 MG,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 60TK | Mundipharma<br>Ges.m.b.H. | 100              | R52.1-R52.1 | Reumatoloog,<br>Neuroloog,<br>Anestesioloog | esmane |              |   | esmise väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neurooloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist |
|                 |                                     |             |   |                           | 50               |             |   |        |              |   |   |
|                 |                                     |             |   |                           | 100              | C00-D48     |   |        |              | patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist   |   |
| 1526554         | oksükodoon, 5mg                     | N02AA0<br>5 | OXYCODONE<br>VITABALANS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK       | Vitabalans Oy             | 100              | C00-D48     |   |        |              |   | patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist   |
|                 |                                     |             |   |                           | 50               |             |   |        |              |   |   |
|                 |                                     |             |   |                           | 100              | R52.1-R52.1 | Reumatoloog,<br>Anestesioloog,<br>Neuroloog | esmane |              | esmise väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neurooloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                    | Eriala  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla  | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|---------------------------|------------------|-----------------------------|---|--------|--------------|--|--|
| 1402625         | oksükodoon,<br>80mg                 | N02AA0<br>5 | OXYCONTIN 80 MG,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 60TK | Mundipharma<br>Ges.m.b.H. | 100              | R52.1-R52.1                 | Reumatoloog,<br>Neuroloog,<br>Anestesioloog                 | esmane |              |  | esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega<br>anestesioloogil, reumatoloogil ja neurooloogil ühe aasta<br>jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa<br>kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või<br>ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei<br>taga piisavat valutustamist |
|                 |                                     |             |   |                           | 100              | C00-D48                     |   |        |              | patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada<br>suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi<br>sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga<br>piisavat valutustamist |  |
|                 |                                     |             |   |                           | 50               |                             |   |        |              |  |  |
| 1004926         | oktreotiid, 0,1mg<br>1ml            | H01CB0<br>2 | SANDOSTATIN, süste-<br>/infusioonilahus, 1ml<br>5TK                         | Novartis Baltics<br>SIA   | 100              | E22.0-E22.0                 | Pediaater –<br>endokrinoloog,<br>Endokrinoloog              |        |              | akromegaalia raviks  |  |
| 1041309         | oktreotiid, 10mg                    | H01CB0<br>2 | SANDOSTATIN LAR,<br>süstesuspensiooni<br>pulber ja lahusti, 1TK             | Novartis Baltics<br>SIA   | 100              | C00-D48, E22.0-<br>E22.0    | Onkoloog,<br>Pediaater –<br>endokrinoloog,<br>Endokrinoloog |        |              | neuroendokriinkasvaja või akromegaalia raviks  |  |
| 1041310         | oktreotiid, 20mg                    | H01CB0<br>2 | SANDOSTATIN LAR,<br>süstesuspensiooni<br>pulber ja lahusti, 1TK             | Novartis Baltics<br>SIA   | 100              | C00-D48, E22.0-<br>E22.0    | Pediaater –<br>endokrinoloog,<br>Onkoloog,<br>Endokrinoloog |        |              | neuroendokriinkasvaja või akromegaalia raviks  |  |
| 1041321         | oktreotiid, 30mg                    | H01CB0<br>2 | SANDOSTATIN LAR,<br>süstesuspensiooni<br>pulber ja lahusti, 1TK             | Novartis Baltics<br>SIA   | 100              | C00-D48, E22.0-<br>E22.0    | Pediaater –<br>endokrinoloog,<br>Endokrinoloog,<br>Onkoloog |        |              | neuroendokriinkasvaja või akromegaalia raviks  |  |
| 1267714         | olansapiin, 10mg                    | N05AH0<br>3 | OLANZAPIN ACTAVIS,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK          | Teva B.V.                 | 50               |                             |   |        |              |  |  |
|                 |                                     |             |   |                           | 100              | F32.3-F32.3,<br>F33.3-F33.3 | Psühhiaater   | esmane |              |  |  |
|                 |                                     |             |   |                           | 100              | F20-F29, F30-<br>F31        | Psühhiaater   |        |              |  |  |
| 1289516         | olansapiin, 10mg                    | N05AH0<br>3 | OLANZAPINE<br>ACTAVIS, suus<br>dispergeeruv tablett,<br>28TK                | Teva B.V.                 | 100              | F32.3-F32.3,<br>F33.3-F33.3 | Psühhiaater   | esmane |              |  |  |
|                 |                                     |             |   |                           | 100              | F20-F29, F30-<br>F31        | Psühhiaater   |        |              |  |  |
|                 |                                     |             |   |                           | 50               |                             |   |        |              |  |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                    | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|---------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1326259         | olansapiin, 10mg                    | N05AH0<br>3 | ZALASTA, tablett, 28TK   | KRKA d.d. Novo<br>mesto   | 50               |                             |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 100              | F20-F29, F30-<br>F31        | Psühhiaater |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 100              | F32.3-F32.3,<br>F33.3-F33.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
| 1326507         | olansapiin, 10mg                    | N05AH0<br>3 | ZALASTA, suus<br>dispergeeruv tablett,<br>28TK                           | KRKA d.d. Novo<br>mesto   | 100              | F32.3-F32.3,<br>F33.3-F33.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 50               |                             |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 100              | F20-F29, F30-<br>F31        | Psühhiaater |        |              |               |          |
| 1342820         | olansapiin, 10mg                    | N05AH0<br>3 | OLANZAPINE TEVA,<br>suus dispergeeruv<br>tablett, 28TK                   | Teva B.V.                 | 100              | F20-F29, F30-<br>F31        | Psühhiaater |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 100              | F32.3-F32.3,<br>F33.3-F33.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 50               |                             |             |        |              |               |          |
| 1354294         | olansapiin, 10mg                    | N05AH0<br>3 | OLANZAPINE ACCORD<br>10 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Accord Healthcare<br>B.V. | 50               |                             |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 100              | F32.3-F32.3,<br>F33.3-F33.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 100              | F20-F29, F30-<br>F31        | Psühhiaater |        |              |               |          |
| 1768642         | olansapiin, 10mg                    | N05AH0<br>3 | FARPENTA, suus<br>dispergeeruv tablett,<br>28TK                          | Rivopharm Limited         | 100              | F20-F29, F30-<br>F31        | Psühhiaater |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 100              | F32.3-F32.3,<br>F33.3-F33.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 50               |                             |             |        |              |               |          |
| 1289572         | olansapiin, 15mg                    | N05AH0<br>3 | OLANZAPINE<br>ACTAVIS, suus<br>dispergeeruv tablett,<br>28TK             | Teva B.V.                 | 50               |                             |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 100              | F32.3-F32.3,<br>F33.3-F33.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 100              | F20-F29, F30-<br>F31        | Psühhiaater |        |              |               |          |
| 1326552         | olansapiin, 15mg                    | N05AH0<br>3 | ZALASTA, suus<br>dispergeeruv tablett,<br>28TK                           | KRKA d.d. Novo<br>mesto   | 100              | F20-F29, F30-<br>F31        | Psühhiaater |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 100              | F32.3-F32.3,<br>F33.3-F33.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 50               |                             |             |        |              |               |          |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                    | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|---------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1354351         | olansapiin, 15mg                    | N05AH0<br>3 | OLANZAPINE ACCORD<br>15 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Accord Healthcare<br>B.V. | 100              | F32.3-F32.3,<br>F33.3-F33.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 100              | F20-F29, F30-<br>F31        | Psühhiaater |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 50               |                             |             |        |              |               |          |
| 1768664         | olansapiin, 15mg                    | N05AH0<br>3 | FARPENTA, suus<br>dispergeeruv tablett,<br>28TK                          | Rivopharm Limited         | 100              | F32.3-F32.3,<br>F33.3-F33.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 50               |                             |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 100              | F20-F29, F30-<br>F31        | Psühhiaater |        |              |               |          |
| 1267455         | olansapiin, 5mg                     | N05AH0<br>3 | OLANZAPIN ACTAVIS,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK       | Teva B.V.                 | 100              | F32.3-F32.3,<br>F33.3-F33.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 100              | F20-F29, F30-<br>F31        | Psühhiaater |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 50               |                             |             |        |              |               |          |
| 1289459         | olansapiin, 5mg                     | N05AH0<br>3 | OLANZAPINE<br>ACTAVIS, suus<br>dispergeeruv tablett,<br>28TK             | Teva B.V.                 | 100              | F32.3-F32.3,<br>F33.3-F33.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 50               |                             |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 100              | F20-F29, F30-<br>F31        | Psühhiaater |        |              |               |          |
| 1326406         | olansapiin, 5mg                     | N05AH0<br>3 | ZALASTA, suus<br>dispergeeruv tablett,<br>28TK                           | KRKA d.d. Novo<br>mesto   | 100              | F20-F29, F30-<br>F31        | Psühhiaater |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 50               |                             |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 100              | F32.3-F32.3,<br>F33.3-F33.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
| 1342763         | olansapiin, 5mg                     | N05AH0<br>3 | OLANZAPINE TEVA,<br>suus dispergeeruv<br>tablett, 28TK                   | Teva B.V.                 | 50               |                             |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 100              | F32.3-F32.3,<br>F33.3-F33.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 100              | F20-F29, F30-<br>F31        | Psühhiaater |        |              |               |          |
| 1354104         | olansapiin, 5mg                     | N05AH0<br>3 | OLANZAPINE ACCORD<br>5 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK  | Accord Healthcare<br>B.V. | 100              | F20-F29, F30-<br>F31        | Psühhiaater |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 100              | F32.3-F32.3,<br>F33.3-F33.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 50               |                             |             |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                   | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                              | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla  | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|---------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------|--------|--------------|--|----------|
| 1768620         | olansapiin, 5mg                     | N05AH0<br>3 | FARPENTA, suus<br>dispergeeruv tablett,<br>28TK         | Rivopharm Limited         | 50               |                                       |             |        |              |  |          |
|                 |                                     |             |   |                           | 100              | F32.3-F32.3,<br>F33.3-F33.3           | Psühhiaater | esmane |              |  |          |
|                 |                                     |             |   |                           | 100              | F20-F29, F30-<br>F31                  | Psühhiaater |        |              |  |          |
| 1771196         | olapariib, 100mg                    | L01XK0<br>1 | LYNPARZA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK  | Astrazeneca AB            | 100              | C48-C48, C56-<br>C56, C57.0-<br>C57.0 | Onkoloog    |        |              | levinud (FIGO III ja IV staadium) madalalt<br>diferentseerunud epiteliaalse munasarja-, munajuha või<br>primaarse peritoneaalvähi raviks: säilitusraviks HRD<br>positiivse staatusega patsientidel, kellel on saavutatud<br>osaline või täielik ravivastus pärast esimese rea<br>platinapõhise keemiaravi lõpetamist ning retsidiveerunud<br>haiguse korral BRCA mutatsiooniga (iduliini või<br>somaatiline) patsientidele, keda on eelnevalt ravitud kahe<br>või enama platinapõhise keemiaraviga ning kes on<br>saanud osalise või täieliku ravivastuse viimasele<br>platinapõhisele keemiaravile. Soodustus ei laiene<br>patsientidele, kelle ravi olapariibiga on ravimootja<br>vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. juulit 2020. a |          |
| 1771219         | olapariib, 150mg                    | L01XK0<br>1 | LYNPARZA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK  | Astrazeneca AB            | 100              | C48-C48, C56-<br>C56, C57.0-<br>C57.0 | Onkoloog    |        |              | levinud (FIGO III ja IV staadium) madalalt<br>diferentseerunud epiteliaalse munasarja-, munajuha või<br>primaarse peritoneaalvähi raviks: säilitusraviks HRD<br>positiivse staatusega patsientidel, kellel on saavutatud<br>osaline või täielik ravivastus pärast esimese rea<br>platinapõhise keemiaravi lõpetamist ning retsidiveerunud<br>haiguse korral BRCA mutatsiooniga (iduliini või<br>somaatiline) patsientidele, keda on eelnevalt ravitud kahe<br>või enama platinapõhise keemiaraviga ning kes on<br>saanud osalise või täieliku ravivastuse viimasele<br>platinapõhisele keemiaravile. Soodustus ei laiene<br>patsientidele, kelle ravi olapariibiga on ravimootja<br>vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. juulit 2020. a |          |
| 1407664         | olmesartaanmedo<br>ksomiil, 10mg    | C09CA0<br>8 | OLIMESTRA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 75               | I10-I13, I15-I15                      |             |        |              |  |          |
|                 |                                     |             |   |                           | 50               |                                       |             |        |              |  |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                 | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|---|-------------|--|--|------------------|------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1676459         | olmesartaanmedo<br>ksomiil, 10mg                    | C09CA0<br>8 | OLMESARTAN<br>MEDOXOMIL ACCORD,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK              | Accord Healthcare<br>B.V.                                  | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |   |             |  |  | 50               |                  |        |        |              |               |          |
| 1407833         | olmesartaanmedo<br>ksomiil, 20mg                    | C09CA0<br>8 | OLIMESTRA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                                      | KRKA, d.d., Novo<br>mesto                                  | 50               |                  |        |        |              |               |          |
|                 |   |             |  |  | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
| 1676538         | olmesartaanmedo<br>ksomiil, 20mg                    | C09CA0<br>8 | OLMESARTAN<br>MEDOXOMIL ACCORD,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK              | Accord Healthcare<br>B.V.                                  | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |   |             |  |  | 50               |                  |        |        |              |               |          |
| 1407934         | olmesartaanmedo<br>ksomiil, 40mg                    | C09CA0<br>8 | OLIMESTRA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                                      | KRKA d.d. Novo<br>mesto                                    | 50               |                  |        |        |              |               |          |
|                 |   |             |  |  | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
| 1676617         | olmesartaanmedo<br>ksomiil, 40mg                    | C09CA0<br>8 | OLMESARTAN<br>MEDOXOMIL ACCORD,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK              | Accord Healthcare<br>B.V.                                  | 50               |                  |        |        |              |               |          |
|                 |   |             |  |  | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
| 1727434         | olmesartaanmedo<br>ksomiil+amlodipiin,<br>20mg+5mg  | C09DB0<br>2 | OLMESARTAN<br>MEDOXOMIL/AMLODIP<br>INE ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK  | Accord Healthcare<br>B.V.                                  | 50               |                  |        |        |              |               |          |
|                 |   |             |  |  | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
| 1308563         | olmesartaanmedo<br>ksomiil+amlodipiin,<br>40mg+10mg | C09DB0<br>2 | SANORAL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK  | Menarini<br>International<br>Operations<br>Luxembourg S.A. | 50               |                  |        |        |              |               |          |
|                 |   |             |  |  | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
| 1720628         | olmesartaanmedo<br>ksomiil+amlodipiin,<br>40mg+10mg | C09DB0<br>2 | OLSSA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK  | KRKA, d.d., Novo<br>mesto                                  | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |   |             |  |  | 50               |                  |        |        |              |               |          |
| 1727232         | olmesartaanmedo<br>ksomiil+amlodipiin,<br>40mg+10mg | C09DB0<br>2 | OLMESARTAN<br>MEDOXOMIL/AMLODIP<br>INE ZENTIVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Zentiva k.s.   | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |   |             |  |  | 50               |                  |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus  | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|--|-------------|--|--|------------------|------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1727579         | olmesartaanmedo<br>ksomiil+amlodipiin,<br>40mg+10mg                                  | C09DB0<br>2 | OLMESARTAN<br>MEDOXOMIL/AMLODIP<br>INE ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK        | Accord Healthcare<br>B.V.                                  | 50               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |  |  | 75               |                  |        |        |              |               |          |
| 1308451         | olmesartaanmedo<br>ksomiil+amlodipiin,<br>40mg+5mg                                   | C09DB0<br>2 | SANORAL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK  | Menarini<br>International<br>Operations<br>Luxembourg S.A. | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |  |  | 50               |                  |        |        |              |               |          |
| 1720538         | olmesartaanmedo<br>ksomiil+amlodipiin,<br>40mg+5mg                                   | C09DB0<br>2 | OLSSA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK  | KRKA, d.d., Novo<br>mesto                                  | 50               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |  |  | 75               |                  |        |        |              |               |          |
| 1727175         | olmesartaanmedo<br>ksomiil+amlodipiin,<br>40mg+5mg                                   | C09DB0<br>2 | OLMESARTAN<br>MEDOXOMIL/AMLODIP<br>INE ZENTIVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK       | Zentiva k.s.   | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |  |  | 50               |                  |        |        |              |               |          |
| 1727502         | olmesartaanmedo<br>ksomiil+amlodipiin,<br>40mg+5mg                                   | C09DB0<br>2 | OLMESARTAN<br>MEDOXOMIL/AMLODIP<br>INE ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK        | Accord Healthcare<br>B.V.                                  | 50               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |  |  | 75               |                  |        |        |              |               |          |
| 1452866         | olmesartaanmedo<br>ksomiil+amlodipiin<br>+hüdroklorotiasiid,<br>40mg+10mg+12,5<br>mg | C09DX0<br>3 | SANORAL HCT,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                                       | Menarini<br>International<br>Operations<br>Luxembourg S.A. | 50               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |  |  | 75               |                  |        |        |              |               |          |
| 1786394         | olmesartaanmedo<br>ksomiil+amlodipiin<br>+hüdroklorotiasiid,<br>40mg+10mg+12,5<br>mg | C09DX0<br>3 | OLMESARTAN<br>MEDOXOMIL/AMLODIP<br>INE/HCT ACCORD,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Accord Healthcare<br>B.V.                                  | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |  |  | 50               |                  |        |        |              |               |          |
| 1790939         | olmesartaanmedo<br>ksomiil+amlodipiin<br>+hüdroklorotiasiid,<br>40mg+10mg+12,5<br>mg | C09DX0<br>3 | OLSITRI, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK  | KRKA d.d. Novo<br>mesto                                    | 50               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |  |  | 75               |                  |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus  | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|--|-------------|--|--|------------------|------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1797509         | olmesartaanmedo<br>ksomiil+amlodipiin<br>+hüdroklorotiasiid,<br>40mg+10mg+12,5<br>mg | C09DX0<br>3 | OLMESARTAN<br>MEDOXOMIL/AMLODIP<br>INE/HYDROCHLOROT<br>HIAZIDE TEVA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Teva B.V.  | 50               |                  |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |  |  | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
| 1801527         | olmesartaanmedo<br>ksomiil+amlodipiin<br>+hüdroklorotiasiid,<br>40mg+10mg+12,5<br>mg | C09DX0<br>3 | GADUAR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK   | Zentiva k.s.   | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |  |  | 50               |                  |        |        |              |               |          |
| 1452709         | olmesartaanmedo<br>ksomiil+amlodipiin<br>+hüdroklorotiasiid,<br>40mg+5mg+12,5m<br>g  | C09DX0<br>3 | SANORAL HCT,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK   | Menarini<br>International<br>Operations<br>Luxembourg S.A. | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |  |  | 50               |                  |        |        |              |               |          |
| 1786350         | olmesartaanmedo<br>ksomiil+amlodipiin<br>+hüdroklorotiasiid,<br>40mg+5mg+12,5m<br>g  | C09DX0<br>3 | OLMESARTAN<br>MEDOXOMIL/AMLODIP<br>INE/HCT ACCORD,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                   | Accord Healthcare<br>B.V.                                  | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |  |  | 50               |                  |        |        |              |               |          |
| 1790771         | olmesartaanmedo<br>ksomiil+amlodipiin<br>+hüdroklorotiasiid,<br>40mg+5mg+12,5m<br>g  | C09DX0<br>3 | OLSITRI, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK  | KRKA d.d. Novo<br>mesto                                    | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |  |  | 50               |                  |        |        |              |               |          |
| 1801482         | olmesartaanmedo<br>ksomiil+amlodipiin<br>+hüdroklorotiasiid,<br>40mg+5mg+12,5m<br>g  | C09DX0<br>3 | GADUAR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK   | Zentiva k.s.   | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |  |  | 50               |                  |        |        |              |               |          |
| 1530672         | olmesartaanmedo<br>ksomiil+hüdrokloro<br>tiasiid,<br>20mg+12,5mg                     | C09DA8<br>6 | CO-OLIMESTRA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK  | KRKA d.d. Novo<br>mesto                                    | 50               |                  |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |  |  | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                            | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja                                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|--|-------------|---|--|------------------|------------------|-------------|--------|--------------|---------------|---|
| 1530762         | olmesartaanmedo<br>ksomiil+hüdrokloro<br>tiasiid,<br>20mg+25mg | C09DA8<br>6 | CO-OLIMESTRA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK       | KRKA d.d. Novo<br>mesto                          | 75               | I10-I13, I15-I15 |             |        |              |               |   |
|                 |  |             |   |  | 50               |                  |             |        |              |               |   |
| 1648481         | olodaterool+tiotropium,<br>2,5mcg+2,5mcg<br>1mõõtannus         | R03AL0<br>6 | SPIOLTO RESPIMAT,<br>inhalatsioonilahus,<br>60mõõtannus 1TK         | Boehringer<br>Ingelheim<br>International<br>GmbH | 75               | J43-J44          | Pulmonoloog | esmane |              |               |   |
|                 |  |             |   |  | 50               |                  |             |        |              |               |   |
| 1140220         | olopatadiin, 1mg<br>1ml  | S01GX0<br>9 | OPATANOL, silmatilgad,<br>lahus, 5ml 1TK                            | Novartis<br>Europharm<br>Limited                 | 50               |                  |             |        |              |               |   |
| 1774728         | olopatadiin, 1mg<br>1ml  | S01GX0<br>9 | OLOPATADINE<br>UNIMED PHARMA,<br>silmatilgad, lahus, 10ml<br>1TK    | Unimed Pharma<br>spol. s r.o.                    | 50               |                  |             |        |              |               |   |
| 1062166         | omeprasool, 20mg   | A02BC0<br>1 | OMEPRAZOLE-<br>RATIOPHARM,<br>gastroresistentne<br>kõvakapsel, 30TK | Ratiopharm GmbH                                  | 75               | K25-K27          |             |        |              |               | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise<br>haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
|                 |  |             |   |  | 50               |                  |             |        |              |               |   |
| 1062201         | omeprasool, 20mg   | A02BC0<br>1 | GASEC GASTROCAPS<br>20 MG,<br>gastroresistentne<br>kõvakapsel, 28TK | Teva B.V.  | 75               | K25-K27          |             |        |              |               | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise<br>haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
|                 |  |             |   |  | 50               |                  |             |        |              |               |   |
| 1269222         | omeprasool, 20mg   | A02BC0<br>1 | OMEP 20MG,<br>gastroresistentne<br>kõvakapsel, 30TK                 | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.                | 75               | K25-K27          |             |        |              |               | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise<br>haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
|                 |  |             |   |  | 50               |                  |             |        |              |               |   |
| 1269244         | omeprasool, 20mg   | A02BC0<br>1 | OMEP 20MG,<br>gastroresistentne<br>kõvakapsel, 56TK                 | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.                | 75               | K25-K27          |             |        |              |               | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise<br>haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
|                 |  |             |   |  | 50               |                  |             |        |              |               |   |
| 1352393         | omeprasool, 20mg   | A02BC0<br>1 | OMEPRAZOLE STADA<br>20 MG,<br>gastroresistentne<br>kõvakapsel, 30TK | Stada Arzneimittel<br>AG                         | 50               |                  |             |        |              |               |   |
|                 |  |             |   |  | 75               | K25-K27          |             |        |              |               | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise<br>haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| 1423077         | omeprasool, 20mg   | A02BC0<br>1 | ULTOP,<br>gastroresistentne<br>kõvakapsel, 28TK                     | KRKA, d.d., Novo<br>mesto                        | 75               | K25-K27          |             |        |              |               | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise<br>haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
|                 |  |             |   |  | 50               |                  |             |        |              |               |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus       | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                      | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |
|-----------------|---|-------------|--|-----------------------------|------------------|----------|--------|--------|--------------|---------------|--|
| 1516250         | omeprasool, 20mg                          | A02BC01     | GASEC GASTROCAPS 20 MG, gastroresistentne kõvakapsel, 56TK | Teva B.V.                   | 75               | K25-K27  |        |        |              |               | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
|                 |   |             |  |                             | 50               |          |        |        |              |               |  |
| 1112825         | omeprasool, 40mg                          | A02BC01     | GASEC GASTROCAPS 40 MG, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK | Teva B.V.                   | 50               |          |        |        |              |               |  |
|                 |   |             |  |                             | 75               | K25-K27  |        |        |              |               | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| 1269301         | omeprasool, 40mg                          | A02BC01     | OMEP 40MG, gastroresistentne kõvakapsel, 15TK              | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 50               |          |        |        |              |               |  |
|                 |   |             |  |                             | 75               | K25-K27  |        |        |              |               | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| 1269323         | omeprasool, 40mg                          | A02BC01     | OMEP 40MG, gastroresistentne kõvakapsel, 30TK              | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 75               | K25-K27  |        |        |              |               | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
|                 |   |             |  |                             | 50               |          |        |        |              |               |  |
| 1269345         | omeprasool, 40mg                          | A02BC01     | OMEP 40MG, gastroresistentne kõvakapsel, 56TK              | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 50               |          |        |        |              |               |  |
|                 |   |             |  |                             | 75               | K25-K27  |        |        |              |               | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| 1352551         | omeprasool, 40mg                          | A02BC01     | OMEPRAZOLE STADA 40 MG, gastroresistentne kõvakapsel, 30TK | Stada Arzneimittel AG       | 75               | K25-K27  |        |        |              |               | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
|                 |   |             |  |                             | 50               |          |        |        |              |               |  |
| 1888892         | omeprasool, 40mg                          | A02BC01     | OMEP 40MG, gastroresistentne kõvakapsel, 30TK              | Lex Ano UAB                 | 75               | K25-K27  |        |        |              |               | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
|                 |   |             |  |                             | 50               |          |        |        |              |               |  |
| 1137372         | oomega-3-rasvhappe etüülestrid 90, 1000mg | C10AX80     | OMACOR, pehmekapsel, 28TK                                  | BASF AS                     | 50               |          |        |        |              |               |  |
| 1828380         | oomega-3-rasvhappe etüülestrid 90, 1000mg | C10AX80     | OMACOR, pehmekapsel, 28TK                                  | Lex Ano UAB                 | 50               |          |        |        |              |               |  |
| 1889219         | oomega-3-rasvhappe etüülestrid 90, 1000mg | C10AX80     | OMACOR, pehmekapsel, 28TK                                  | Ideal Trade Links UAB       | 50               |          |        |        |              |               |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloo hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|-------------------------------|------------------|----------|-----------|--------|--------------|---------------|--|
| 1722642         | opikapoon, 50mg                     | N04BX0<br>4 | ONGENTYS,<br>kõvakapsel, 30TK                          | Bial - Portela & Ca<br>S.A.   | 100              | G20-G20  | Neuroloog |        |              |               | patsientidele, kes on saanud adekvaatses annuses entakapooni ravi, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on ravi entakapooniga vastunäidustatud.   |
| 1110643         | oseltamiviir, 75mg                  | J05AH0<br>2 | TAMIFLU, kõvakapsel,<br>10TK                           | Roche<br>Registration<br>GmbH | 50               |          |           |        |              |               |  |
| 1649088         | oseltamiviir, 75mg                  | J05AH0<br>2 | EBILFUMIN,<br>kõvakapsel, 10TK                         | Actavis Group<br>PTC ehf.     | 50               |          |           |        |              |               |  |
| 1841329         | oseltamiviir, 75mg                  | J05AH0<br>2 | SEGOSANA,<br>kõvakapsel, 10TK                          | Zentiva k.s.                  | 50               |          |           |        |              |               |  |
| 1710379         | osimertiniib, 40mg                  | L01EB0<br>4 | TAGRISSO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Astrazeneca AB                | 100              | C34-C34  | Onkoloog  |        |              |               | monoteraapiana kasvaja täieliku resektsiooni järgselt adjuvantraviks IB...IIIA raskusastmega mitteväikerkulise kopsuvähiga täiskasvanud patsientidel, kelle kasvajatel on epidermaalse kasvufaktori retseptori (EGFR) 19. eksoni deletsioonid või 21. eksoni asendusmutatsioonid (L858R) kuni kolmeks aastaks ning monoteraapiana lokaalselt levinud või metastaatilise mitteväikerkulise kopsuvähi esmavaliku raviks täiskasvanud patsientidel, kellel esinevad EGFR aktiveerivad mutatsioonid ning monoteraapiana lokaalselt levinud või metastaatilise EGFR T790M-mutatsioonpositiivse mitteväikerakk kopsuvähiga patsientidele, kelle haigus on progresseerunud pärast ravi EGFR-türosiini kinaasi inhibiitoritega |



| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                            | Müügiloo hoidja       | Soodus-tus % | Diagnoos | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-------------|-------------------------------|----------|--|-----------------------|--------------|----------|----------|--------|-----------|------------|---|
| 1710380     | osimertiniib, 80mg            | L01EB04  | TAGRISSE, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Astrazeneca AB        | 100          | C34-C34  | Onkoloog |        |           |            | monoteraapiana kasvaja täieliku resektiooni järgselt adjuvantraviks IB...IIIA raskusastmega mitteväikerakulise kopsuvähiga täiskasvanud patsientidel, kelle kasvajatel on epidermaalse kasvufaktori retseptori (EGFR) 19. eksoni deletsioonid või 21. eksoni asendusmutatsioonid (L858R) kuni kolmeks aastaks ning monoteraapiana lokaalselt levinud või metastaatilise mitteväikerakulise kopsuvähi esmavaliku raviks täiskasvanud patsientidel, kellel esinevad EGFR aktiveerivad mutatsioonid ning monoteraapiana lokaalselt levinud või metastaatilise EGFR T790M-mutatsioonpositiivse mitteväikerakk kopsuvähiga patsientidele, kelle haigus on progresseerunud pärast ravi EGFR-türosiini kinaasi inhibiitoritega |
| 1811540     | palbotsikliib, 100mg          | L01EF01  | IBRANCE, õhukese polümeerikattega tablett, 21TK  | Pfizer Europe MA EEIG | 100          | C50-C50  | Onkoloog |        |           |            | hormoonretseptor (HR)-positiivse, inimese epidermaalse kasvufaktori retseptor 2 (HER2)-negatiivse, lokaalselt kaugelearenenud või metastaatilise rinnavähi I rea raviks kombinatsioonis aromataasi inhibiitoriga patsiendile kuni haiguse progresseerumiseni ning kombinatsioonis fulvestrandiga I rea raviks kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle haigus on adjuvantse või neoadjuvantse aromataasi inhibiitori foonil või 12 kuud pärast selle lõpetamist progresseerunud ning kombinatsioonis fulvestrandiga II rea raviks kuni haiguse progresseerumiseni patsientidele, kes ei ole varasemalt ravi CDK-4/6 inhibiitoritega saanud  |
| 1811562     | palbotsikliib, 125mg          | L01EF01  | IBRANCE, õhukese polümeerikattega tablett, 21TK  | Pfizer Europe MA EEIG | 100          | C50-C50  | Onkoloog |        |           |            | hormoonretseptor (HR)-positiivse, inimese epidermaalse kasvufaktori retseptor 2 (HER2)-negatiivse, lokaalselt kaugelearenenud või metastaatilise rinnavähi I rea raviks kombinatsioonis aromataasi inhibiitoriga patsiendile kuni haiguse progresseerumiseni ning kombinatsioonis fulvestrandiga I rea raviks kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle haigus on adjuvantse või neoadjuvantse aromataasi inhibiitori foonil või 12 kuud pärast selle lõpetamist progresseerunud ning kombinatsioonis fulvestrandiga II rea raviks kuni haiguse progresseerumiseni patsientidele, kes ei ole varasemalt ravi CDK-4/6 inhibiitoritega saanud  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                           | Müügiloa hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala     | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|-----------------------|------------------|-------------|------------|--------|--------------|---------------|--|
| 1811528         | palbotsikliib, 75mg                 | L01EF01     | IBRANCE, õhukese polümeerikattega tablett, 21TK | Pfizer Europe MA EEIG | 100              | C50-C50     | Onkoloog   |        |              |               | hormoonretseptor (HR)-positiivse, inimese epidermaalse kasvufaktori retseptor 2 (HER2)-negatiivse, lokaalselt kaugelearenenud või metastaatilise rinnavähi I rea raviks kombinatsioonis aromataasi inhibiitoriga patsiendile kuni haiguse progresseerumiseni ning kombinatsioonis fulvestrandiga I rea raviks kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle haigus on adjuvantse või neoadjuvantse aromataasi inhibiitori foonil või 12 kuud pärast selle lõpetamist progresseerunud ning kombinatsioonis fulvestrandiga II rea raviks kuni haiguse progresseerumiseni patsientidele, kes ei ole varasemalt ravi CDK-4/6 inhibiitoritega saanud   |
| 1696068         | panobinostaat, 10mg                 | L01XH03     | FARYDAK, kõvakapsel, 6TK                        | pharmaand GmbH        | 100              | C90.0-C90.0 | Hematoloog |        |              |               | kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise panobinostaadiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: kasutamiseks kombinatsioonis bortesomiibi ja deksametasooniga, retsidiveerunud ja/või refraktaarse hulgemüeloomiga täiskasvanud patsientidele, keda on varasemalt ravitud vähemalt kahe raviskeemiga, sealhulgas bortesomiibi ja immuunomoduleeriva ravimiga ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi panobinostaadiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. aprilli 2018. a. |
| 1696091         | panobinostaat, 15mg                 | L01XH03     | FARYDAK, kõvakapsel, 6TK                        | pharmaand GmbH        | 100              | C90.0-C90.0 | Hematoloog |        |              |               | kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise panobinostaadiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: kasutamiseks kombinatsioonis bortesomiibi ja deksametasooniga, retsidiveerunud ja/või refraktaarse hulgemüeloomiga täiskasvanud patsientidele, keda on varasemalt ravitud vähemalt kahe raviskeemiga, sealhulgas bortesomiibi ja immuunomoduleeriva ravimiga ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi panobinostaadiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. aprilli 2018. a. |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala     | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla  | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|------------------------|------------------|-------------|------------|--------|--------------|--|--|
| 1696125         | panobinostaat,<br>20mg              | L01XH0<br>3 | FARYDAK, kõvakapsel,<br>6TK                                    | pharmaand GmbH         | 100              | C90.0-C90.0 | Hematoloog |        |              |  | kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise panobinostaadiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: kasutamiseks kombinatsioonis bortesomiibi ja deksametasooniga, retsidiveerunud ja/või refraktaarse hulgimüeloomiga täiskasvanud patsientidele, keda on varasemalt ravitud vähemalt kahe raviskeemiga, sealhulgas bortesomiibi ja immuunomoduleeriva ravimiga ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi panobinostaadiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. aprilli 2018. a. |
| 1043020         | pantoprasool,<br>20mg               | A02BC0<br>2 | CONTROLOC 20 MG,<br>gastroresistentne tablett,<br>14TK         | Takeda GmbH            | 50               |             |            |        |              |  |  |
|                 |                                     |             |  |                        | 75               | K25-K27     |            |        |              | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |  |
| 1249770         | pantoprasool,<br>20mg               | A02BC0<br>2 | NOLPAZA,<br>gastroresistentne tablett,<br>28TK                 | KRKA, d.d., Novo mesto | 50               |             |            |        |              |  |  |
|                 |                                     |             |  |                        | 75               | K25-K27     |            |        |              | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |  |
| 1249792         | pantoprasool,<br>20mg               | A02BC0<br>2 | NOLPAZA,<br>gastroresistentne tablett,<br>56TK                 | KRKA, d.d., Novo mesto | 75               | K25-K27     |            |        |              |  | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega   |
|                 |                                     |             |  |                        | 50               |             |            |        |              |  |  |
| 1277232         | pantoprasool,<br>20mg               | A02BC0<br>2 | PANTOPRAZOLE<br>ACTAVIS,<br>gastroresistentne tablett,<br>28TK | Teva B.V.              | 75               | K25-K27     |            |        |              |  | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega   |
|                 |                                     |             |  |                        | 50               |             |            |        |              |  |  |
| 1418813         | pantoprasool,<br>20mg               | A02BC0<br>2 | OZZION,<br>gastroresistentne tablett,<br>28TK                  | Zentiva k.s.           | 75               | K25-K27     |            |        |              |  | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega   |
|                 |                                     |             |  |                        | 50               |             |            |        |              |  |  |
| 1441178         | pantoprasool,<br>20mg               | A02BC0<br>2 | PANTOPRAZOLE-<br>MEPHA,<br>gastroresistentne tablett,<br>14TK  | Teva B.V.              | 50               |             |            |        |              |  |  |
|                 |                                     |             |  |                        | 75               | K25-K27     |            |        |              | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |  |
| 1441189         | pantoprasool,<br>20mg               | A02BC0<br>2 | PANTOPRAZOLE-<br>MEPHA,<br>gastroresistentne tablett,<br>28TK  | Teva B.V.              | 75               | K25-K27     |            |        |              |  | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega   |
|                 |                                     |             |  |                        | 50               |             |            |        |              |  |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja         | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla   | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|-------------------------|------------------|----------|--------|--------|--------------|---|---|
| 1537006         | pantoprasool,<br>20mg               | A02BC0<br>2 | PANTOPRAZOLE-<br>MEPHA,<br>gastroresistentne tablett,<br>56TK            | Teva B.V.               | 50               |          |        |        |              |   |   |
|                 |                                     |             |  |                         | 75               | K25-K27  |        |        |              | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise<br>haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |   |
| 1043031         | pantoprasool,<br>40mg               | A02BC0<br>2 | CONTROLOC 40 MG,<br>gastroresistentne tablett,<br>14TK                   | Takeda GmbH             | 75               | K25-K27  |        |        |              |   | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise<br>haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
|                 |                                     |             |  |                         | 50               |          |        |        |              |   |   |
| 1249646         | pantoprasool,<br>40mg               | A02BC0<br>2 | NOLPAZA,<br>gastroresistentne tablett,<br>14TK                           | KRKA d.d. Novo<br>mesto | 75               | K25-K27  |        |        |              |   | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise<br>haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
|                 |                                     |             |  |                         | 50               |          |        |        |              |   |   |
| 1249668         | pantoprasool,<br>40mg               | A02BC0<br>2 | NOLPAZA,<br>gastroresistentne tablett,<br>28TK                           | KRKA d.d. Novo<br>mesto | 75               | K25-K27  |        |        |              |   | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise<br>haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
|                 |                                     |             |  |                         | 50               |          |        |        |              |   |   |
| 1249680         | pantoprasool,<br>40mg               | A02BC0<br>2 | NOLPAZA,<br>gastroresistentne tablett,<br>56TK                           | KRKA d.d. Novo<br>mesto | 75               | K25-K27  |        |        |              |   | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise<br>haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
|                 |                                     |             |  |                         | 50               |          |        |        |              |   |   |
| 1277344         | pantoprasool,<br>40mg               | A02BC0<br>2 | PANTOPRAZOLE<br>ACTAVIS,<br>gastroresistentne tablett,<br>28TK           | Teva B.V.               | 50               |          |        |        |              |   |   |
|                 |                                     |             |  |                         | 75               | K25-K27  |        |        |              | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise<br>haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |   |
| 1280449         | pantoprasool,<br>40mg               | A02BC0<br>2 | PANTOPRAZOL -<br>RATIOPHARM 40 MG,<br>gastroresistentne tablett,<br>14TK | Ratiopharm GmbH         | 50               |          |        |        |              |   |   |
|                 |                                     |             |  |                         | 75               | K25-K27  |        |        |              | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise<br>haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |   |
| 1418835         | pantoprasool,<br>40mg               | A02BC0<br>2 | OZZION,<br>gastroresistentne tablett,<br>28TK                            | Zentiva k.s.            | 50               |          |        |        |              |   |   |
|                 |                                     |             |  |                         | 75               | K25-K27  |        |        |              | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise<br>haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |   |
| 1441190         | pantoprasool,<br>40mg               | A02BC0<br>2 | PANTOPRAZOLE-<br>MEPHA,<br>gastroresistentne tablett,<br>14TK            | Teva B.V.               | 50               |          |        |        |              |   |   |
|                 |                                     |             |  |                         | 75               | K25-K27  |        |        |              | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise<br>haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |   |
| 1441202         | pantoprasool,<br>40mg               | A02BC0<br>2 | PANTOPRAZOLE-<br>MEPHA,<br>gastroresistentne tablett,<br>28TK            | Teva B.V.               | 50               |          |        |        |              |   |   |
|                 |                                     |             |  |                         | 75               | K25-K27  |        |        |              | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise<br>haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |   |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja                   | Soodus-tus % | Diagnoos                 | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-------------|-------------------------------|----------|---|-----------------------------------|--------------|--------------------------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1537028     | pantoprasool, 40mg            | A02BC02  | PANTOPRAZOLE-MEPHA, gastroresistentne tablett, 56TK             | Teva B.V.                         | 75           | K25-K27                  |             |        |           |            | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
|             |                               |          |   |                                   | 50           |                          |             |        |           |            |  |
| 1810268     | pantoprasool, 40mg            | A02BC02  | NOLPAZA, gastroresistentne tablett, 28TK                        | First Pharma OÜ                   | 75           | K25-K27                  |             |        |           |            | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
|             |                               |          |   |                                   | 50           |                          |             |        |           |            |  |
| 1060232     | paroksetiin, 20mg             | N06AB05  | SEROXAT, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK                 | GlaxoSmithKline (Ireland) Limited | 50           |                          |             |        |           |            |  |
|             |                               |          |   |                                   | 100          | F33.2-F33.3, F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |           |            |  |
| 1096837     | paroksetiin, 20mg             | N06AB05  | REXETIN, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK                 | Gedeon Richter Plc.               | 50           |                          |             |        |           |            |  |
|             |                               |          |   |                                   | 100          | F33.2-F33.3, F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |           |            |  |
| 1110799     | paroksetiin, 20mg             | N06AB05  | PAROXETIN HEXAL 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK   | Hexal AG                          | 50           |                          |             |        |           |            |  |
|             |                               |          |   |                                   | 100          | F33.2-F33.3, F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |           |            |  |
| 1185072     | paroksetiin, 20mg             | N06AB05  | PAROXETIN ACTAVIS 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Teva B.V.                         | 50           |                          |             |        |           |            |  |
|             |                               |          |   |                                   | 100          | F33.2-F33.3, F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |           |            |  |
| 1244900     | paroksetiin, 20mg             | N06AB05  | ARKETIS 20 MG, tablett, 30TK                                    | Medochemie Limited                | 50           |                          |             |        |           |            |  |
|             |                               |          |   |                                   | 100          | F33.2-F33.3, F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |           |            |  |
| 1855155     | paroksetiin, 20mg             | N06AB05  | SEROXAT, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK                 | Ideal Trade Links UAB             | 100          | F33.2-F33.3, F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |           |            |  |
|             |                               |          |   |                                   | 50           |                          |             |        |           |            |  |
| 1245103     | paroksetiin, 40mg             | N06AB05  | ARKETIS 40 MG, tablett, 30TK                                    | Medochemie Limited                | 50           |                          |             |        |           |            |  |
|             |                               |          |   |                                   | 100          | F33.2-F33.3, F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |           |            |  |
| 1482027     | pasopaniib, 200mg             | L01EX03  | VOTRIENT, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK                | Novartis Europharm Limited        | 100          | C64-C64                  | Onkoloog    |        |           |            | IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks  |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                      | Müügiloa hoidja            | Soodus-tus % | Diagnoos | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused                                  |
|-------------|-------------------------------|----------|--|----------------------------|--------------|----------|----------|--------|-----------|------------|---|
| 1830215     | pasopaniib, 200mg             | L01EX03  | PAZOPANIB AUXILIA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK  | Auxilia Pharma OÜ          | 100          | C64-C64  | Onkoloog |        |           |            | IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks |
| 1830237     | pasopaniib, 200mg             | L01EX03  | PAZOPANIB AUXILIA, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK | Auxilia Pharma OÜ          | 100          | C64-C64  | Onkoloog |        |           |            | IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks |
| 1834062     | pasopaniib, 200mg             | L01EX03  | PAZOPANIB ZENTIVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK  | Zentiva k.s.               | 100          | C64-C64  | Onkoloog |        |           |            | IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks |
| 1851151     | pasopaniib, 200mg             | L01EX03  | PAZOPANIB TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK     | Teva B.V.                  | 100          | C64-C64  | Onkoloog |        |           |            | IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks |
| 1886575     | pasopaniib, 200mg             | L01EX03  | PAZOPANIB ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK   | Accord Healthcare B.V.     | 100          | C64-C64  | Onkoloog |        |           |            | IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks |
| 1482050     | pasopaniib, 400mg             | L01EX03  | VOTRIENT, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK           | Novartis Europharm Limited | 100          | C64-C64  | Onkoloog |        |           |            | IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks |
| 1834107     | pasopaniib, 400mg             | L01EX03  | PAZOPANIB ZENTIVA, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK  | Zentiva k.s.               | 100          | C64-C64  | Onkoloog |        |           |            | IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks |
| 1851207     | pasopaniib, 400mg             | L01EX03  | PAZOPANIB TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK     | Teva B.V.                  | 100          | C64-C64  | Onkoloog |        |           |            | IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks |
| 1886676     | pasopaniib, 400mg             | L01EX03  | PAZOPANIB ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK   | Accord Healthcare B.V.     | 100          | C64-C64  | Onkoloog |        |           |            | IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja                     | Soodus-tus % | Diagnoos                  | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused                                  |
|-------------|-------------------------------|----------|---|-------------------------------------|--------------|---------------------------|----------|--------|-----------|------------|---|
| 1886700     | pasopaniib, 400mg             | L01EX03  | PAZOPANIB ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK          | Accord Healthcare B.V.              | 100          | C64-C64                   | Onkoloog |        |           |            | IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks |
| 1147980     | pentoksüfülliin, 400mg        | C04AD03  | PENTILIN, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK      | KRKA d.d. Novo mesto                | 50           |                           |          |        |           |            |   |
| 1028854     | pentoksüfülliin, 600mg        | C04AD03  | VASONIT RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 20TK | G.L. Pharma GmbH                    | 50           |                           |          |        |           |            |   |
| 1473409     | pentoksüfülliin, 600mg        | C04AD03  | VASONIT RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK | G.L. Pharma GmbH                    | 50           |                           |          |        |           |            |   |
| 1168422     | perindopriil, 10mg            | C09AA04  | PRESTARIUM ARGININE 10MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK  | Les Laboratoires Servier            | 50           |                           |          |        |           |            |   |
|             |                               |          |   |                                     | 75           | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |          |        |           |            |   |
| 1843231     | perindopriil, 10mg            | C09AA04  | PERINDOPRIL ZENTIVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK       | Zentiva k.s.                        | 50           |                           |          |        |           |            |   |
|             |                               |          |   |                                     | 75           | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |          |        |           |            |   |
| 1843242     | perindopriil, 10mg            | C09AA04  | PERINDOPRIL ZENTIVA, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK       | Zentiva k.s.                        | 50           |                           |          |        |           |            |   |
|             |                               |          |   |                                     | 75           | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |          |        |           |            |   |
| 1302860     | perindopriil, 4mg             | C09AA04  | STOPRESS, tablett, 30TK   | Pharmaceutical Works Polpharma S.A. | 50           |                           |          |        |           |            |   |
|             |                               |          |   |                                     | 75           | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |          |        |           |            |   |
| 1377233     | perindopriil, 4mg             | C09AA04  | PRENESSA, tablett, 30TK   | KRKA, d.d., Novo mesto              | 75           | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |          |        |           |            |   |
|             |                               |          |   |                                     | 50           |                           |          |        |           |            |   |
| 1845020     | perindopriil, 4mg             | C09AA04  | PRENESSA, tablett, 90TK   | First Pharma OÜ                     | 50           |                           |          |        |           |            |   |
|             |                               |          |   |                                     | 75           | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |          |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus    | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                              | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|--|-------------|---|---|------------------|---------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1168310         | perindopriil, 5mg                      | C09AA0<br>4 | PRESTARIUM<br>ARGININE 5MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Les Laboratoires<br>Servier               | 50               |                                       |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |   | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13          |        |        |              |               |          |
| 1843208         | perindopriil, 5mg                      | C09AA0<br>4 | PERINDOPRIL<br>ZENTIVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK        | Zentiva k.s.                              | 50               |                                       |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |   | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13          |        |        |              |               |          |
| 1843219         | perindopriil, 5mg                      | C09AA0<br>4 | PERINDOPRIL<br>ZENTIVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>90TK        | Zentiva k.s.                              | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13          |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |   | 50               |                                       |        |        |              |               |          |
| 1302871         | perindopriil, 8mg                      | C09AA0<br>4 | STOPRESS, tablett,<br>30TK  | Pharmaceutical<br>Works Polpharma<br>S.A. | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13          |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |   | 50               |                                       |        |        |              |               |          |
| 1377312         | perindopriil, 8mg                      | C09AA0<br>4 | PRENESSA, tablett,<br>30TK  | KRKA, d.d., Novo<br>mesto                 | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13          |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |   | 50               |                                       |        |        |              |               |          |
| 1822823         | perindopriil, 8mg                      | C09AA0<br>4 | PRENESSA, tablett,<br>90TK  | First Pharma OÜ                           | 50               |                                       |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |   | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13          |        |        |              |               |          |
| 1289101         | perindopriil+amlodi<br>piin, 10mg+10mg | C09BB0<br>4 | COVERAM, tablett,<br>30TK   | Les Laboratoires<br>Servier               | 50               |                                       |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |   | 75               | I20-I20, I50-I50,<br>I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
| 1288953         | perindopriil+amlodi<br>piin, 10mg+5mg  | C09BB0<br>4 | COVERAM, tablett,<br>30TK   | Les Laboratoires<br>Servier               | 75               | I20-I20, I50-I50,<br>I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |   | 50               |                                       |        |        |              |               |          |
| 1499250         | perindopriil+amlodi<br>piin, 4mg+10mg  | C09BB0<br>4 | DALNESSA, tablett,<br>30TK  | KRKA, d.d., Novo<br>mesto                 | 50               |                                       |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |   | 75               | I20-I20, I50-I50,<br>I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
| 1499003         | perindopriil+amlodi<br>piin, 4mg+5mg   | C09BB0<br>4 | DALNESSA, tablett,<br>30TK  | KRKA, d.d., Novo<br>mesto                 | 75               | I20-I20, I50-I50,<br>I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |   | 50               |                                       |        |        |              |               |          |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                            | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                   | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                              | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|--|-------------|---|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1288818         | perindopriil+amlodi<br>piin, 5mg+10mg                          | C09BB0<br>4 | COVERAM, tablett,<br>30TK                               | Les Laboratoires<br>Servier | 50               |                                       |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |                             | 75               | I20-I20, I50-I50,<br>I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
| 1288672         | perindopriil+amlodi<br>piin, 5mg+5mg                           | C09BB0<br>4 | COVERAM, tablett,<br>30TK                               | Les Laboratoires<br>Servier | 50               |                                       |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |                             | 75               | I20-I20, I50-I50,<br>I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
| 1499126         | perindopriil+amlodi<br>piin, 8mg+10mg                          | C09BB0<br>4 | DALNESSA, tablett,<br>30TK                              | KRKA, d.d., Novo<br>mesto   | 75               | I20-I20, I50-I50,<br>I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |                             | 50               |                                       |        |        |              |               |          |
| 1499069         | perindopriil+amlodi<br>piin, 8mg+5mg                           | C09BB0<br>4 | DALNESSA, tablett,<br>30TK                              | KRKA, d.d., Novo<br>mesto   | 75               | I20-I20, I50-I50,<br>I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |                             | 50               |                                       |        |        |              |               |          |
| 1588079         | perindopriil+amlodi<br>piin+indapamiid,<br>10mg+10mg+2,5m<br>g | C09BX0<br>1 | TRIPLIXAM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Les Laboratoires<br>Servier | 50               |                                       |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |                             | 75               | I10-I13, I15-I15                      |        |        |              |               |          |
| 1588091         | perindopriil+amlodi<br>piin+indapamiid,<br>10mg+10mg+2,5m<br>g | C09BX0<br>1 | TRIPLIXAM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>90TK | Les Laboratoires<br>Servier | 75               | I10-I13, I15-I15                      |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |                             | 50               |                                       |        |        |              |               |          |
| 1883460         | perindopriil+amlodi<br>piin+indapamiid,<br>10mg+10mg+2,5m<br>g | C09BX0<br>1 | CO-AMLESSA NEO,<br>tablett, 90TK                        | KRKA d.d. Novo<br>mesto     | 75               | I10-I13, I15-I15                      |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |                             | 50               |                                       |        |        |              |               |          |
| 1588024         | perindopriil+amlodi<br>piin+indapamiid,<br>10mg+5mg+2,5mg      | C09BX0<br>1 | TRIPLIXAM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Les Laboratoires<br>Servier | 75               | I10-I13, I15-I15                      |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |                             | 50               |                                       |        |        |              |               |          |
| 1588046         | perindopriil+amlodi<br>piin+indapamiid,<br>10mg+5mg+2,5mg      | C09BX0<br>1 | TRIPLIXAM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>90TK | Les Laboratoires<br>Servier | 50               |                                       |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |                             | 75               | I10-I13, I15-I15                      |        |        |              |               |          |
| 1883415         | perindopriil+amlodi<br>piin+indapamiid,<br>10mg+5mg+2,5mg      | C09BX0<br>1 | CO-AMLESSA NEO,<br>tablett, 90TK                        | KRKA d.d. Novo<br>mesto     | 75               | I10-I13, I15-I15                      |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |                             | 50               |                                       |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                            | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                   | Müügiloo hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|--|-------------|---|-----------------------------|------------------|------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1602481         | perindopriil+amlodi<br>piin+indapamiid,<br>4mg+10mg+1,25m<br>g | C09BX0<br>1 | CO-DALNESSA, tablett,<br>30TK                           | KRKA, d.d., Novo<br>mesto   | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |                             | 50               |                  |        |        |              |               |          |
| 1602504         | perindopriil+amlodi<br>piin+indapamiid,<br>4mg+10mg+1,25m<br>g | C09BX0<br>1 | CO-DALNESSA, tablett,<br>60TK                           | KRKA, d.d., Novo<br>mesto   | 50               |                  |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |                             | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
| 1602571         | perindopriil+amlodi<br>piin+indapamiid,<br>4mg+5mg+1,25mg      | C09BX0<br>1 | CO-DALNESSA, tablett,<br>30TK                           | KRKA, d.d., Novo<br>mesto   | 50               |                  |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |                             | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
| 1602593         | perindopriil+amlodi<br>piin+indapamiid,<br>4mg+5mg+1,25mg      | C09BX0<br>1 | CO-DALNESSA, tablett,<br>60TK                           | KRKA, d.d., Novo<br>mesto   | 50               |                  |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |                             | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
| 1810897         | perindopriil+amlodi<br>piin+indapamiid,<br>4mg+5mg+1,25mg      | C09BX0<br>1 | PRINDAL, tablett, 30TK                                  | Zentiva k.s.                | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |                             | 50               |                  |        |        |              |               |          |
| 1587977         | perindopriil+amlodi<br>piin+indapamiid,<br>5mg+10mg+1,25m<br>g | C09BX0<br>1 | TRIPLIXAM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Les Laboratoires<br>Servier | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |                             | 50               |                  |        |        |              |               |          |
| 1587999         | perindopriil+amlodi<br>piin+indapamiid,<br>5mg+10mg+1,25m<br>g | C09BX0<br>1 | TRIPLIXAM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>90TK | Les Laboratoires<br>Servier | 50               |                  |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |                             | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
| 1587922         | perindopriil+amlodi<br>piin+indapamiid,<br>5mg+5mg+1,25mg      | C09BX0<br>1 | TRIPLIXAM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Les Laboratoires<br>Servier | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |                             | 50               |                  |        |        |              |               |          |
| 1587944         | perindopriil+amlodi<br>piin+indapamiid,<br>5mg+5mg+1,25mg      | C09BX0<br>1 | TRIPLIXAM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>90TK | Les Laboratoires<br>Servier | 50               |                  |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |                             | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
| 1883369         | perindopriil+amlodi<br>piin+indapamiid,<br>5mg+5mg+1,25mg      | C09BX0<br>1 | CO-AMLESSA NEO,<br>tablett, 90TK                        | KRKA d.d. Novo<br>mesto     | 50               |                  |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |                             | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
| 1602683         | perindopriil+amlodi<br>piin+indapamiid,<br>8mg+10mg+2,5mg      | C09BX0<br>1 | CO-DALNESSA, tablett,<br>30TK                           | KRKA, d.d., Novo<br>mesto   | 50               |                  |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |                             | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                       | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                     | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|---|-------------|---|-----------------------------|------------------|------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1602706         | perindopriil+amlodi<br>piin+indapamiid,<br>8mg+10mg+2,5mg | C09BX0<br>1 | CO-DALNESSA, tablett,<br>60TK   | KRKA, d.d., Novo<br>mesto   | 50               |                              |        |        |              |               |          |
|                 |   |             |   |                             | 75               | I10-I13, I15-I15             |        |        |              |               |          |
| 1811045         | perindopriil+amlodi<br>piin+indapamiid,<br>8mg+10mg+2,5mg | C09BX0<br>1 | PRINDAL, tablett, 30TK  | Zentiva k.s.                | 75               | I10-I13, I15-I15             |        |        |              |               |          |
|                 |   |             |   |                             | 50               |                              |        |        |              |               |          |
| 1602795         | perindopriil+amlodi<br>piin+indapamiid,<br>8mg+5mg+2,5mg  | C09BX0<br>1 | CO-DALNESSA, tablett,<br>30TK   | KRKA, d.d., Novo<br>mesto   | 75               | I10-I13, I15-I15             |        |        |              |               |          |
|                 |   |             |   |                             | 50               |                              |        |        |              |               |          |
| 1602818         | perindopriil+amlodi<br>piin+indapamiid,<br>8mg+5mg+2,5mg  | C09BX0<br>1 | CO-DALNESSA, tablett,<br>60TK   | KRKA, d.d., Novo<br>mesto   | 50               |                              |        |        |              |               |          |
|                 |   |             |   |                             | 75               | I10-I13, I15-I15             |        |        |              |               |          |
| 1810987         | perindopriil+amlodi<br>piin+indapamiid,<br>8mg+5mg+2,5mg  | C09BX0<br>1 | PRINDAL, tablett, 30TK  | Zentiva k.s.                | 75               | I10-I13, I15-I15             |        |        |              |               |          |
|                 |   |             |   |                             | 50               |                              |        |        |              |               |          |
| 1339488         | perindopriil+indap<br>amiid,<br>10mg+2,5mg                | C09BA8<br>3 | NOLITERAX 10 MG/2,5<br>MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK       | Les Laboratoires<br>Servier | 50               |                              |        |        |              |               |          |
|                 |   |             |   |                             | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
| 1686720         | perindopriil+indap<br>amiid,<br>10mg+2,5mg                | C09BA8<br>3 | PERINDOPRIL/INDAPA<br>MIDE TEVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Teva Pharma B.V.            | 50               |                              |        |        |              |               |          |
|                 |   |             |   |                             | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
| 1686742         | perindopriil+indap<br>amiid,<br>10mg+2,5mg                | C09BA8<br>3 | PERINDOPRIL/INDAPA<br>MIDE TEVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>90TK | Teva Pharma B.V.            | 50               |                              |        |        |              |               |          |
|                 |   |             |   |                             | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
| 1834219         | perindopriil+indap<br>amiid,<br>10mg+2,5mg                | C09BA8<br>3 | CO-PRENESSANEO,<br>tablett, 30TK  | KRKA, d.d., Novo<br>mesto   | 50               |                              |        |        |              |               |          |
|                 |   |             |   |                             | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
| 1229587         | perindopriil+indap<br>amiid,<br>2,5mg+0,625mg             | C09BA8<br>3 | NOLIPREL ARGININE,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK            | Les Laboratoires<br>Servier | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
|                 |   |             |   |                             | 50               |                              |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus           | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                     | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|---|-------------|---|-----------------------------|------------------|------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1544374         | perindopriil+indap<br>amiid,<br>2,5mg+0,625mg | C09BA8<br>3 | PERINDOPRIL/INDAPA<br>MIDE TEVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Teva Pharma B.V.            | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
|                 |   |             |   |                             | 50               |                              |        |        |              |               |          |
| 1600647         | perindopriil+indap<br>amiid,<br>2,5mg+0,625mg | C09BA8<br>3 | PERINDOPRIL/INDAPA<br>MIDE TEVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>90TK | Teva Pharma B.V.            | 50               |                              |        |        |              |               |          |
|                 |   |             |   |                             | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
| 1407068         | perindopriil+indap<br>amiid,<br>2mg+0,625mg   | C09BA8<br>3 | CO-PRENESSA, tablett,<br>30TK   | KRKA d.d. Novo<br>mesto     | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
|                 |   |             |   |                             | 50               |                              |        |        |              |               |          |
| 1295894         | perindopriil+indap<br>amiid,<br>4mg+1,25mg    | C09BA8<br>3 | PRENEWEL, tablett,<br>60TK  | KRKA, d.d., Novo<br>mesto   | 50               |                              |        |        |              |               |          |
|                 |   |             |   |                             | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
| 1407158         | perindopriil+indap<br>amiid,<br>4mg+1,25mg    | C09BA8<br>3 | CO-PRENESSA, tablett,<br>30TK   | KRKA d.d. Novo<br>mesto     | 50               |                              |        |        |              |               |          |
|                 |   |             |   |                             | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
| 1229879         | perindopriil+indap<br>amiid,<br>5mg+1,25mg    | C09BA8<br>3 | NOLIPREL FORTE<br>ARGININE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK      | Les Laboratoires<br>Servier | 50               |                              |        |        |              |               |          |
|                 |   |             |   |                             | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
| 1544486         | perindopriil+indap<br>amiid,<br>5mg+1,25mg    | C09BA8<br>3 | PERINDOPRIL/INDAPA<br>MIDE TEVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Teva Pharma B.V.            | 50               |                              |        |        |              |               |          |
|                 |   |             |   |                             | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
| 1600670         | perindopriil+indap<br>amiid,<br>5mg+1,25mg    | C09BA8<br>3 | PERINDOPRIL/INDAPA<br>MIDE TEVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>90TK | Teva Pharma B.V.            | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
|                 |   |             |   |                             | 50               |                              |        |        |              |               |          |
| 1834130         | perindopriil+indap<br>amiid,<br>5mg+1,25mg    | C09BA8<br>3 | CO-PRENESSANEO,<br>tablett, 30TK  | KRKA, d.d., Novo<br>mesto   | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
|                 |   |             |   |                             | 50               |                              |        |        |              |               |          |
| 1407248         | perindopriil+indap<br>amiid, 8mg+2,5mg        | C09BA8<br>3 | CO-PRENESSA, tablett,<br>30TK   | KRKA d.d. Novo<br>mesto     | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
|                 |   |             |   |                             | 50               |                              |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus    | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                   | Müügiloa hoidja                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                     | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|--|-------------|---|----------------------------------|------------------|------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|---|
| 1458367         | perindopriil+indap<br>amiid, 8mg+2,5mg | C09BA8<br>3 | PRENEWEL 8 MG/ 2,5<br>MG, tablett, 60TK                 | KRKA, d.d., Novo<br>mesto        | 50               |                              |        |        |              |               |   |
|                 |  |             |   |                                  | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |   |
| 1837155         | perindopriil+indap<br>amiid, 8mg+2,5mg | C09BA8<br>3 | CO-PRENESSA, tablett,<br>30TK                           | Ideal Trade Links<br>UAB         | 50               |                              |        |        |              |               |   |
|                 |  |             |   |                                  | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |   |
| 1104680         | pimekroliimus,<br>10mg 1g              | D11AH0<br>2 | ELIDEL, kreem, 15g<br>1TK                               | VIATRIS<br>HEALTHCARE<br>Limited | 50               |                              |        |        |              |               |   |
| 1563454         | pioglitason, 15mg                      | A10BG0<br>3 | PIOGLITAZONE<br>ACCORD, tablett, 28TK                   | Accord Healthcare<br>S.L.U.      | 75               | E14-E14, E11-<br>E11         |        |        |              |               | Il tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi<br>peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati<br>või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või<br>sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud |
|                 |  |             |   |                                  | 50               |                              |        |        |              |               |   |
| 1498495         | pioglitason, 30mg                      | A10BG0<br>3 | ZIPION 30MG, tablett,<br>28TK                           | Zentiva k.s.                     | 75               | E14-E14, E11-<br>E11         |        |        |              |               | Il tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi<br>peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati<br>või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või<br>sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud |
|                 |  |             |   |                                  | 50               |                              |        |        |              |               |   |
| 1563555         | pioglitason, 30mg                      | A10BG0<br>3 | PIOGLITAZONE<br>ACCORD, tablett, 28TK                   | Accord Healthcare<br>S.L.U.      | 50               |                              |        |        |              |               |   |
|                 |  |             |   |                                  | 75               | E14-E14, E11-<br>E11         |        |        |              |               | Il tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi<br>peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati<br>või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või<br>sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud |
| 1563757         | pioglitason, 45mg                      | A10BG0<br>3 | PIOGLITAZONE<br>ACCORD, tablett, 28TK                   | Accord Healthcare<br>S.L.U.      | 50               |                              |        |        |              |               |   |
|                 |  |             |   |                                  | 75               | E14-E14, E11-<br>E11         |        |        |              |               | Il tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi<br>peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati<br>või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või<br>sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud |
| 1813766         | piratsetaam,<br>800mg                  | N06BX0<br>3 | NOOTROPIL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Ideal Trade Links<br>UAB         | 50               | G25.3-G25.3                  |        |        |              |               |   |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                       | Müügiloa hoidja             | Soodustus % | Diagnoos    | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-------------|-------------------------------|----------|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1826377     | piratsetaam, 800mg            | N06BX03  | NOOTROPIL, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK           | First Pharma OÜ             | 50          | G25.3-G25.3 |             |        |           |            |   |
| 1829347     | piratsetaam, 800mg            | N06BX03  | NOOTROPIL, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK           | Lex Ano UAB                 | 50          | G25.3-G25.3 |             |        |           |            |   |
| 1750856     | pirfenidoon, 267mg            | L04AX05  | ESBRIET, õhukese polümeerikattega tablett, 252TK            | Roche Registration GmbH     | 100         | J84.1-J84.1 | Pulmonoloog |        |           |            | patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=50% eeldatavast. Soodustus ei hõlma nintedaniibi ja pirfenidooni kombinatsioonravi. |
| 1880434     | pirfenidoon, 267mg            | L04AX05  | PIRFENIDONE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 252TK   | Teva GmbH                   | 100         | J84.1-J84.1 | Pulmonoloog |        |           |            | patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=50% eeldatavast. Soodustus ei hõlma nintedaniibi ja pirfenidooni kombinatsioonravi. |
| 1897678     | pirfenidoon, 267mg            | L04AX05  | PIRFENIDONE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 252TK | Accord Healthcare B.V.      | 100         | J84.1-J84.1 | Pulmonoloog |        |           |            | patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=50% eeldatavast. Soodustus ei hõlma nintedaniibi ja pirfenidooni kombinatsioonravi. |
| 1750801     | pirfenidoon, 801mg            | L04AX05  | ESBRIET, õhukese polümeerikattega tablett, 84TK             | Roche Registration GmbH     | 100         | J84.1-J84.1 | Pulmonoloog |        |           |            | patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=50% eeldatavast. Soodustus ei hõlma nintedaniibi ja pirfenidooni kombinatsioonravi. |
| 1843534     | pirfenidoon, 801mg            | L04AX05  | PIRFENIDONE ZENTIVA, õhukese polümeerikattega tablett, 84TK | Zentiva k.s.                | 100         | J84.1-J84.1 | Pulmonoloog |        |           |            | patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=50% eeldatavast. Soodustus ei hõlma nintedaniibi ja pirfenidooni kombinatsioonravi. |
| 1880445     | pirfenidoon, 801mg            | L04AX05  | PIRFENIDONE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 84TK    | Teva GmbH                   | 100         | J84.1-J84.1 | Pulmonoloog |        |           |            | patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=50% eeldatavast. Soodustus ei hõlma nintedaniibi ja pirfenidooni kombinatsioonravi. |
| 1897689     | pirfenidoon, 801mg            | L04AX05  | PIRFENIDONE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 84TK  | Accord Healthcare B.V.      | 100         | J84.1-J84.1 | Pulmonoloog |        |           |            | patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=50% eeldatavast. Soodustus ei hõlma nintedaniibi ja pirfenidooni kombinatsioonravi. |
| 1039889     | piroksikaam, 20mg             | M01AC01  | BREXIN, tablett, 20TK                                       | CHIESI Pharmaceuticals GmbH | 50          |             |             |        |           |            |   |
| 1890930     | piroksikaam, 20mg             | M01AC01  | BREXIN, tablett, 30TK                                       | Ideal Trade Links UAB       | 50          |             |             |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala     | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|---|------------------|-------------|------------|--------|--------------|---------------|---|
| 1271775         | polüstürensulfon<br>aat, 949mg 1g   | V03AE0<br>1 | SORBISTERIT,<br>suukaudse/rektaalsuspe<br>nsiooni pulber, 500g<br>1TK | Fresenius Medical<br>Care Nephrologica<br>Deutschland<br>GmbH | 100<br>50        | N18-N18     |            |        |              |               |   |
| 3087615         | pomalidomiid, 2mg                   | L04AX0<br>6 | POMALIDOMIDE<br>ZENTIVA, kõvakapsel,<br>21TK                          | Zentiva k.s.  | 100              | C90.0-C90.0 | Hematoloog |        |              |               | kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise pomalidomiidiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: kasutamine kombinatsioonis deksametasooniga retsiveerunud, progresseerunud või refraktaarse hulgemüeloomiga täiskasvanud patsiendil, kelle eelnevad raviskeemid on sisaldanud bortesomiibi, talidomiidi (ainult vereloome tüvirakkude siirdamise näidustusega patsiendid) ja lenalidomiidi, kuid kelle haigus on viimase ravikuuri ajal või 6 kuud pärast ravi lõpetamist progresseerunud või retsiveerunud ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi) |
| 1622225         | pomalidomiid, 3mg                   | L04AX0<br>6 | IMNOVID, kõvakapsel,<br>21TK  | Bristol-Myers<br>Squibb Pharma<br>EEIG                        | 100              | C90.0-C90.0 | Hematoloog |        |              |               | kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise pomalidomiidiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: kasutamine kombinatsioonis deksametasooniga retsiveerunud, progresseerunud või refraktaarse hulgemüeloomiga täiskasvanud patsiendil, kelle eelnevad raviskeemid on sisaldanud bortesomiibi, talidomiidi (ainult vereloome tüvirakkude siirdamise näidustusega patsiendid) ja lenalidomiidi, kuid kelle haigus on viimase ravikuuri ajal või 6 kuud pärast ravi lõpetamist progresseerunud või retsiveerunud ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi) |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                         | Müügiloa hoidja                        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala     | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|--|------------------|-------------|------------|--------|--------------|---------------|--|
| 3035629         | pomalidomiid, 3mg                   | L04AX0<br>6 | POMALIDOMIDE<br>GRINDEKS,<br>kõvakapsel, 21TK | Grindeks AS                            | 100              | C90.0-C90.0 | Hematoloog |        |              |               | kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise pomalidomiidiga on hinnanud konsilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: kasutamine kombinatsioonis deksametasooniga retsiveerunud, progresseerunud või refraktaarse hulgemüeloomiga täiskasvanud patsiendil, kelle eelnevad raviskeemid on sisaldanud bortesomiibi, talidomiidi (ainult vereloome tüvirakkude siirdamise näidustusega patsiendid) ja lenalidomiidi, kuid kelle haigus on viimase ravikuuri ajal või 6 kuud pärast ravi lõpetamist progresseerunud või retsiveerunud ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi) |
| 1622236         | pomalidomiid, 4mg                   | L04AX0<br>6 | IMNOVID, kõvakapsel,<br>21TK                  | Bristol-Myers<br>Squibb Pharma<br>EEIG | 100              | C90.0-C90.0 | Hematoloog |        |              |               | kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise pomalidomiidiga on hinnanud konsilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: kasutamine kombinatsioonis deksametasooniga retsiveerunud, progresseerunud või refraktaarse hulgemüeloomiga täiskasvanud patsiendil, kelle eelnevad raviskeemid on sisaldanud bortesomiibi, talidomiidi (ainult vereloome tüvirakkude siirdamise näidustusega patsiendid) ja lenalidomiidi, kuid kelle haigus on viimase ravikuuri ajal või 6 kuud pärast ravi lõpetamist progresseerunud või retsiveerunud ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi) |
| 3035630         | pomalidomiid, 4mg                   | L04AX0<br>6 | POMALIDOMIDE<br>GRINDEKS,<br>kõvakapsel, 21TK | Grindeks AS                            | 100              | C90.0-C90.0 | Hematoloog |        |              |               | kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise pomalidomiidiga on hinnanud konsilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: kasutamine kombinatsioonis deksametasooniga retsiveerunud, progresseerunud või refraktaarse hulgemüeloomiga täiskasvanud patsiendil, kelle eelnevad raviskeemid on sisaldanud bortesomiibi, talidomiidi (ainult vereloome tüvirakkude siirdamise näidustusega patsiendid) ja lenalidomiidi, kuid kelle haigus on viimase ravikuuri ajal või 6 kuud pärast ravi lõpetamist progresseerunud või retsiveerunud ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi) |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                         | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala     | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|---|-------------|--|----------------------------------|------------------|---|------------|--------|--------------|---------------|---|
| 3087693         | pomalidomiid, 4mg   | L04AX0<br>6 | POMALIDOMIDE<br>ZENTIVA, kõvakapsel,<br>21TK   | Zentiva k.s.                     | 100              | C90.0-C90.0   | Hematoloog |        |              |               | kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise pomalidomiidiga on hinnanud konsilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: kasutamine kombinatsioonis deksametasooniga retsidiveerunud, progresseerunud või refraktaarse hulgmüeloomiga täiskasvanud patsiendil, kelle eelnevad raviskeemid on sisaldanud bortesomiibi, talidomiidi (ainult vereloome tüvirakkude siirdamise näidustusega patsiendid) ja lenalidomiidi, kuid kelle haigus on viimase ravikuuri ajal või 6 kuud pärast ravi lõpetamist progresseerunud või retsidiveerunud ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi) |
| 3088953         | pomalidomiid, 4mg   | L04AX0<br>6 | POMALIDOMIDE<br>ACCORD, kõvakapsel,<br>21TK  | Accord Healthcare<br>S.L.U.      | 100              | C90.0-C90.0   | Hematoloog |        |              |               | kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise pomalidomiidiga on hinnanud konsilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: kasutamine kombinatsioonis deksametasooniga retsidiveerunud, progresseerunud või refraktaarse hulgmüeloomiga täiskasvanud patsiendil, kelle eelnevad raviskeemid on sisaldanud bortesomiibi, talidomiidi (ainult vereloome tüvirakkude siirdamise näidustusega patsiendid) ja lenalidomiidi, kuid kelle haigus on viimase ravikuuri ajal või 6 kuud pärast ravi lõpetamist progresseerunud või retsidiveerunud ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi) |
| 1856842         | ponesimood,<br>20mg   | L04AE0<br>4 | PONVORY, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK  | Janssen - Cilag<br>International | 100              | G35-G35   | Neuroloog  |        |              |               | konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel ägenemistega kulgeva hulgiskleroosi raviks   |
| 1863402         | ponesimood,<br>2mg/3mg/4mg/5m<br>g/6mg/7mg/8mg/9<br>mg/10mg | L04AE0<br>4 | PONVORY, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>2TK / 2TK / 2TK / 1TK /<br>1TK / 1TK / 1TK / 1TK /<br>3TK | Janssen - Cilag<br>International | 100              | G35-G35   | Neuroloog  |        |              |               | konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel ägenemistega kulgeva hulgiskleroosi raviks   |
| 1800627         | posakonasool,<br>100mg                                      | J02AC0<br>4 | POSACONAZOLE<br>ACCORD,<br>gastroresistentne tablett,<br>24TK  | Accord Healthcare<br>S.L.U.      | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8,<br>B44-B44 |            |        |              |               | vereloome tüvirakkude siirdamisega seotud transplantaat-peremehe-vastu haiguse, ägeda müeloidse leukeemia, ägeda lümfoblastse leukeemia või müelodüsplastilise sündroomi intensiivsest keemiaravist tingitud mükoosi profülaktikaks   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|--|------------------|---|-----------|--------|--------------|---------------|--|
| 1811124         | posakonasool,<br>100mg              | J02AC0<br>4 | POSACONAZOLE<br>STADA,<br>gastroresistentne tablett,<br>24TK       | Stada Arzneimittel<br>AG                         | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8,<br>B44-B44 |           |        |              |               | vereloome tüvirakkude siirdamisega seotud transplantaat-<br>peremehe-vastu haiguse, ägeda müeloidse leukeemia,<br>ägeda lümfoblastse leukeemia või müelodüsplastilise<br>sündroomi intensiivsest keemiaravist tingitud mükoosi<br>profülaktikaks |
| 1800010         | posakonasool,<br>40mg 1ml           | J02AC0<br>4 | POSACONAZOLE<br>AHCL, suukaudne<br>suspensioon, 105ml 1TK          | Accord Healthcare<br>S.L.U.                      | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8,<br>B44-B44 |           |        |              |               | vereloome tüvirakkude siirdamisega seotud transplantaat-<br>peremehe-vastu haiguse, ägeda müeloidse leukeemia,<br>ägeda lümfoblastse leukeemia või müelodüsplastilise<br>sündroomi intensiivsest keemiaravist tingitud mükoosi<br>profülaktikaks |
| 1323256         | pramipeksool,<br>0,088mg            | N04BC0<br>5 | EZAPREV 0,088 MG,<br>tablett, 30TK                                 | Norameda UAB                                     | 100              | G20-G20   | Neuroloog | esmane |              |               |  |
|                 |                                     |             |  |  | 50               |   |           |        |              |               |  |
| 1041253         | pramipeksool,<br>0,18mg             | N04BC0<br>5 | MIRAPEXIN, tablett,<br>30TK  | Boehringer<br>Ingelheim<br>International<br>GmbH | 100              | G20-G20   | Neuroloog | esmane |              |               |  |
|                 |                                     |             |  |  | 50               |   |           |        |              |               |  |
| 1450998         | pramipeksool,<br>0,26mg             | N04BC0<br>5 | MIRAPEXIN, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | Boehringer<br>Ingelheim<br>International<br>GmbH | 100              | G20-G20   | Neuroloog | esmane |              |               |  |
|                 |                                     |             |  |  | 50               |   |           |        |              |               |  |
| 1451023         | pramipeksool,<br>0,52mg             | N04BC0<br>5 | MIRAPEXIN, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | Boehringer<br>Ingelheim<br>International<br>GmbH | 100              | G20-G20   | Neuroloog | esmane |              |               |  |
|                 |                                     |             |  |  | 50               |   |           |        |              |               |  |
| 1637210         | pramipeksool,<br>0,52mg             | N04BC0<br>5 | OPRYMEA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK   | KRKA d.d. Novo<br>mesto                          | 50               |   |           |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |  |  | 100              | G20-G20   | Neuroloog | esmane |              |               |  |
| 1041264         | pramipeksool,<br>0,7mg              | N04BC0<br>5 | MIRAPEXIN, tablett,<br>30TK  | Boehringer<br>Ingelheim<br>International<br>GmbH | 50               |   |           |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |  |  | 100              | G20-G20   | Neuroloog | esmane |              |               |  |
| 1323313         | pramipeksool,<br>0,7mg              | N04BC0<br>5 | EZAPREV 0,7 MG,<br>tablett, 100TK                                  | Norameda UAB                                     | 100              | G20-G20   | Neuroloog | esmane |              |               |  |
|                 |                                     |             |  |  | 50               |   |           |        |              |               |  |
| 1373824         | pramipeksool,<br>0,7mg              | N04BC0<br>5 | OPRYMEA, tablett,<br>30TK  | KRKA d.d. Novo<br>mesto                          | 50               |   |           |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |  |  | 100              | G20-G20   | Neuroloog | esmane |              |               |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja                                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|--|------------------|--|-----------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1451067         | pramipeksool,<br>1,05mg             | N04BC0<br>5 | MIRAPEXIN, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | Boehringer<br>Ingelheim<br>International<br>GmbH | 50               |  |           |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |  | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |              |               |          |
| 1637265         | pramipeksool,<br>1,05mg             | N04BC0<br>5 | OPRYMEA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK   | KRKA d.d. Novo<br>mesto                          | 50               |  |           |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |  | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |              |               |          |
| 1451135         | pramipeksool,<br>2,1mg              | N04BC0<br>5 | MIRAPEXIN, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | Boehringer<br>Ingelheim<br>International<br>GmbH | 50               |  |           |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |  | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |              |               |          |
| 1637344         | pramipeksool,<br>2,1mg              | N04BC0<br>5 | OPRYMEA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK   | KRKA d.d. Novo<br>mesto                          | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |  | 50               |  |           |        |              |               |          |
| 1451168         | pramipeksool,<br>3,15mg             | N04BC0<br>5 | MIRAPEXIN, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | Boehringer<br>Ingelheim<br>International<br>GmbH | 50               |  |           |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |  | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |              |               |          |
| 1118034         | pravastatiin, 20mg                  | C10AA0<br>3 | PRAVAHEXAL 20 MG,<br>tablett, 30TK                                 | Hexal AG   | 100              | N18-N18  |           |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |  | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |           |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |  | 50               |  |           |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus          | ATC<br>kood             | Ravim, pakendi suurus                      | Müügiloa hoidja                                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|--|-------------------------|--|---|------------------|---|--|--------|--------------|---------------|----------|
| 1065776         | prednisoloon, 5mg                            | H02AB0<br>6             | PREDNISOLON-<br>RICHTER, tablett,<br>100TK | Gedeon Richter<br>Plc.                            | 75               | N00-N08   | Pediaater,<br>Nefroloog  |        |              |               |          |
|                 |  |                         |  |   | 75               | L40-L40   | Dermatovenerol<br>oog, Pediaater                                   |        |              |               |          |
|                 |  |                         |  |   | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46                                 | Reumatoloog,<br>Pediaater  | esmane |              |               |          |
|                 |  |                         |  |   | 75               | J45-J45   |  |        |              |               |          |
|                 |  |                         |  |   | 75               | L12-L12, L23-<br>L23, L13.0-<br>L13.0, L10-L10,<br>L20-L20    | Pediaater,<br>Allergoloog-<br>immunoloog,<br>Dermatovenerol<br>oog |        |              |               |          |
|                 |  |                         |  |   | 100              | D59-D59, D69-<br>D69, D60-D64                                 | Hematoloog,<br>Pediaater   | esmane |              |               |          |
|                 |  |                         |  |   | 100              | E89.6-E89.6,<br>E27-E27, E89.3-<br>E89.3, E23-E23,<br>E25-E25 | Endokrinoloog,<br>Pediaater  | esmane |              |               |          |
|                 |  |                         |  |   | 100              | C00-D48   |  |        |              |               |          |
|                 |  |                         |  |   | 50               |   |  |        |              |               |          |
|                 |  |                         |  |   | 75               | K50-K51, K73-<br>K74  | Pediaater,<br>Gastroenteroloo<br>g                                 |        |              |               |          |
| 100             | G70-G70                                      | Neuroloog,<br>Pediaater | esmane                                     |   |                  |   |  |        |              |               |          |
| 1031702         | prednisoloon+salit<br>süülhape,<br>0,2%+0,4% | D07XA8<br>1             | ALPICORT, nahalahus,<br>100ml 1TK          | Dr. August Wolff<br>GmbH & Co. KG<br>Arzneimittel | 50               |   |  |        |              |               |          |
| 1897803         | prednisoloon+salit<br>süülhape,<br>0,2%+0,4% | D07XA8<br>1             | ALPICORT, nahalahus,<br>100ml 1TK          | Ideal Trade Links<br>UAB                          | 50               |   |  |        |              |               |          |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                | Müügi- ja hoidja     | Soodus-tus % | Diagnoos    | Eriala    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused  |
|-------------|-------------------------------|----------|--------------------------------------|----------------------|--------------|-------------|-----------|--------|-----------|---|---|
| 1655513     | pregabaliin, 150mg            | N02BF02  | PRAGIOLA, kõvakapsel, 14TK           | KRKA d.d. Novo mesto | 100          | G40-G40     | Neuroloog | esmane |           |   |   |
|             |                               |          |                                      |                      | 50           |             |           |        |           |   |   |
|             |                               |          |                                      |                      | 75           | G63.2-G63.2 |           |        |           | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |   |
| 1655546     | pregabaliin, 150mg            | N02BF02  | PRAGIOLA, kõvakapsel, 56TK           | KRKA d.d. Novo mesto | 75           | G63.2-G63.2 |           |        |           |   | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |
|             |                               |          |                                      |                      | 50           |             |           |        |           |   |   |
|             |                               |          |                                      |                      | 100          | G40-G40     | Neuroloog | esmane |           |   |   |
| 1657829     | pregabaliin, 150mg            | N02BF02  | BRIEKA, kõvakapsel, 56TK             | Teva B.V.            | 100          | G40-G40     | Neuroloog | esmane |           |   |   |
|             |                               |          |                                      |                      | 50           |             |           |        |           |   |   |
|             |                               |          |                                      |                      | 75           | G63.2-G63.2 |           |        |           | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |   |
| 1693122     | pregabaliin, 150mg            | N02BF02  | PREGABALIN ZENTIVA, kõvakapsel, 14TK | Zentiva k.s.         | 100          | G40-G40     | Neuroloog | esmane |           |   |   |
|             |                               |          |                                      |                      | 75           | G63.2-G63.2 |           |        |           | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |   |
|             |                               |          |                                      |                      | 50           |             |           |        |           |   |   |
| 1693133     | pregabaliin, 150mg            | N02BF02  | PREGABALIN ZENTIVA, kõvakapsel, 56TK | Zentiva k.s.         | 100          | G40-G40     | Neuroloog | esmane |           |   |   |
|             |                               |          |                                      |                      | 75           | G63.2-G63.2 |           |        |           | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |   |
|             |                               |          |                                      |                      | 50           |             |           |        |           |   |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                     | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla   | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|-----------------------------|------------------|-------------|-----------|--------|--------------|---|---|
| 1695630         | pregabaliin,<br>150mg               | N02BF0<br>2 | PREGABALIN<br>ACCORD, kõvakapsel,<br>14TK | Accord Healthcare<br>S.L.U. | 75               | G63.2-G63.2 |           |        |              |   | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |
|                 |                                     |             |   |                             | 50               |             |           |        |              |   |   |
|                 |                                     |             |   |                             | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |              |   |   |
| 1695663         | pregabaliin,<br>150mg               | N02BF0<br>2 | PREGABALIN<br>ACCORD, kõvakapsel,<br>56TK | Accord Healthcare<br>S.L.U. | 50               |             |           |        |              |   |   |
|                 |                                     |             |   |                             | 75               | G63.2-G63.2 |           |        |              | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |   |
|                 |                                     |             |   |                             | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |              |   |   |
| 1766347         | pregabaliin,<br>150mg               | N02BF0<br>2 | SIRANALEN,<br>kõvakapsel, 14TK            | Medochemie<br>Limited       | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |              |   |   |
|                 |                                     |             |   |                             | 50               |             |           |        |              |   |   |
|                 |                                     |             |   |                             | 75               | G63.2-G63.2 |           |        |              | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |   |
| 1766370         | pregabaliin,<br>150mg               | N02BF0<br>2 | SIRANALEN,<br>kõvakapsel, 56TK            | Medochemie<br>Limited       | 50               |             |           |        |              |   |   |
|                 |                                     |             |   |                             | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |              |   |   |
|                 |                                     |             |   |                             | 75               | G63.2-G63.2 |           |        |              | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |   |
| 1820326         | pregabaliin,<br>150mg               | N02BF0<br>2 | PRAGIOLA, kõvakapsel,<br>56TK             | First Pharma OÜ             | 50               |             |           |        |              |   |   |
|                 |                                     |             |   |                             | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |              |   |   |
|                 |                                     |             |   |                             | 75               | G63.2-G63.2 |           |        |              | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |   |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus       | Müügiloa hoidja        | Soodus-tus % | Diagnoos    | Eriala    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-------------|-------------------------------|----------|-----------------------------|------------------------|--------------|-------------|-----------|--------|-----------|------------|---|
| 1848371     | pregabaliin, 150mg            | N02BF02  | PRAGIOLA, kõvakapsel, 56TK  | Ideal Trade Links UAB  | 75           | G63.2-G63.2 |           |        |           |            | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |
|             |                               |          |                             |                        | 50           |             |           |        |           |            |   |
|             |                               |          |                             |                        | 100          | G40-G40     | Neuroloog | esmane |           |            |   |
| 1655760     | pregabaliin, 300mg            | N02BF02  | PRAGIOLA, kõvakapsel, 14TK  | KRKA, d.d., Novo mesto | 50           |             |           |        |           |            |   |
|             |                               |          |                             |                        | 75           | G63.2-G63.2 |           |        |           |            | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |
|             |                               |          |                             |                        | 100          | G40-G40     | Neuroloog | esmane |           |            |   |
| 1766415     | pregabaliin, 300mg            | N02BF02  | SIRANALEN, kõvakapsel, 14TK | Medochemie Limited     | 100          | G40-G40     | Neuroloog | esmane |           |            |   |
|             |                               |          |                             |                        | 75           | G63.2-G63.2 |           |        |           |            | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |
|             |                               |          |                             |                        | 50           |             |           |        |           |            |   |
| 1655355     | pregabaliin, 75mg             | N02BF02  | PRAGIOLA, kõvakapsel, 14TK  | KRKA d.d. Novo mesto   | 75           | G63.2-G63.2 |           |        |           |            | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |
|             |                               |          |                             |                        | 50           |             |           |        |           |            |   |
|             |                               |          |                             |                        | 100          | G40-G40     | Neuroloog | esmane |           |            |   |
| 1655388     | pregabaliin, 75mg             | N02BF02  | PRAGIOLA, kõvakapsel, 56TK  | KRKA d.d. Novo mesto   | 50           |             |           |        |           |            |   |
|             |                               |          |                             |                        | 75           | G63.2-G63.2 |           |        |           |            | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |
|             |                               |          |                             |                        | 100          | G40-G40     | Neuroloog | esmane |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                      | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla   | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|-----------------------------|------------------|-------------|-----------|--------|--------------|---|---|
| 1657740         | pregabaliin, 75mg                   | N02BF0<br>2 | BRIEKA, kõvakapsel,<br>56TK                | Teva B.V.                   | 50               |             |           |        |              |   |   |
|                 |                                     |             |  |                             | 75               | G63.2-G63.2 |           |        |              | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |   |
|                 |                                     |             |  |                             | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |              |   |   |
| 1693043         | pregabaliin, 75mg                   | N02BF0<br>2 | PREGABALIN<br>ZENTIVA, kõvakapsel,<br>14TK | Zentiva k.s.                | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |              |   |   |
|                 |                                     |             |  |                             | 75               | G63.2-G63.2 |           |        |              | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |   |
|                 |                                     |             |  |                             | 50               |             |           |        |              |   |   |
| 1693065         | pregabaliin, 75mg                   | N02BF0<br>2 | PREGABALIN<br>ZENTIVA, kõvakapsel,<br>56TK | Zentiva k.s.                | 75               | G63.2-G63.2 |           |        |              |   | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |
|                 |                                     |             |  |                             | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |              |   |   |
|                 |                                     |             |  |                             | 50               |             |           |        |              |   |   |
| 1695438         | pregabaliin, 75mg                   | N02BF0<br>2 | PREGABALIN<br>ACCORD, kõvakapsel,<br>14TK  | Accord Healthcare<br>S.L.U. | 50               |             |           |        |              |   |   |
|                 |                                     |             |  |                             | 75               | G63.2-G63.2 |           |        |              | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |   |
|                 |                                     |             |  |                             | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |              |   |   |
| 1695461         | pregabaliin, 75mg                   | N02BF0<br>2 | PREGABALIN<br>ACCORD, kõvakapsel,<br>56TK  | Accord Healthcare<br>S.L.U. | 75               | G63.2-G63.2 |           |        |              |   | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |
|                 |                                     |             |  |                             | 50               |             |           |        |              |   |   |
|                 |                                     |             |  |                             | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |              |   |   |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                   | Eriala    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla   | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|------------------------------|------------------|--|-----------|--------|--------------|---|----------|
| 1766303         | pregabaliin, 75mg                   | N02BF0<br>2 | SIRANALEN,<br>kõvakapsel, 56TK   | Medochemie<br>Limited        | 100              | G40-G40                                    | Neuroloog | esmane |              |   |          |
|                 |                                     |             |  |                              | 75               | G63.2-G63.2                                |           |        |              | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |          |
|                 |                                     |             |  |                              | 50               |  |           |        |              |   |          |
| 1077027         | primidoon, 250mg                    | N03AA0<br>3 | LISKANTIN, tablett,<br>100TK   | Desitin<br>Arzneimittel GmbH | 50               |  |           |        |              |   |          |
|                 |                                     |             |  |                              | 100              | G40-G40                                    | Neuroloog | esmane |              |   |          |
| 1020126         | propafenoon,<br>150mg               | C01BC0<br>3 | RYTMONORM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>50TK                      | Viatris SIA                  | 50               |  |           |        |              |   |          |
| 1044526         | propafenoon,<br>150mg               | C01BC0<br>3 | PROPANORM 150 MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>50TK            | Pro.Med.Cs Praha<br>a.s.     | 50               |  |           |        |              |   |          |
| 1704833         | propafenoon,<br>150mg               | C01BC0<br>3 | PROPAFENONE<br>ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK          | Accord Healthcare<br>B.V.    | 50               |  |           |        |              |   |          |
| 1020137         | propafenoon,<br>300mg               | C01BC0<br>3 | RYTMONORM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>50TK                      | Viatris SIA                  | 50               |  |           |        |              |   |          |
| 1704888         | propafenoon,<br>300mg               | C01BC0<br>3 | PROPAFENONE<br>ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK          | Accord Healthcare<br>B.V.    | 50               |  |           |        |              |   |          |
| 1053223         | propranolool,<br>40mg               | C07AA0<br>5 | PROPRA-<br>RATIOPHARM 40 MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>50TK | Ratiopharm GmbH              | 75               | G43-G43, I47-<br>I49, I15-I15, I10-<br>I13 |           |        |              |   |          |
|                 |                                     |             |  |                              | 50               |  |           |        |              |   |          |
| 1596944         | propranolool,<br>40mg               | C07AA0<br>5 | PROPRANOLOL<br>ACCORD 40MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>50TK  | Accord Healthcare<br>B.V.    | 75               | G43-G43, I47-<br>I49, I15-I15, I10-<br>I13 |           |        |              |   |          |
|                 |                                     |             |  |                              | 50               |  |           |        |              |   |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus          | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                     | Eriala                  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|--|-------------|---|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------|--------|--------------|---------------|---|
| 1141311         | pseudoefedriin+ts<br>etirisiin,<br>120mg+5mg | R01BA9<br>3 | CIRRUS, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 14TK | UCB Pharma Oy<br>Finland         | 50               |                              |                         |        |              |               |   |
| 1074451         | püridostigmiinbro<br>miid, 60mg              | N07AA0<br>2 | KALYMIN 60 N, tablett,<br>100TK                                 | Teva Pharma B.V.                 | 50<br>100        | G70-G70                      | Pediaater,<br>Neuroloog | esmane |              |               |   |
| 1664647         | püridostigmiinbro<br>miid, 60mg              | N07AA0<br>2 | MESTINON, kaetud<br>tablett, 150TK                              | VIATRIS<br>HEALTHCARE<br>Limited | 50<br>100        | G70-G70                      | Pediaater,<br>Neuroloog | esmane |              |               |   |
| 1865189         | püridostigmiinbro<br>miid, 60mg              | N07AA0<br>2 | KALYMIN 60 N, tablett,<br>100TK                                 | Ideal Trade Links<br>UAB         | 100<br>50        | G70-G70                      | Neuroloog,<br>Pediaater | esmane |              |               |   |
| 1750553         | raltegraviir, 600mg                          | J05AJ01     | ISENTRESS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK         | Merck Sharp &<br>Dohme B.V.      | 100              | Z20.6-Z20.6                  | Infektsionist           |        |              |               | kombinatsioonis tenofoviirdisoproksiil+emtritsitabiiniga<br>kokkupuute-järgseks (PEP) profülaktiliseks raviks HIV-<br>infektsiooni nakatumise vältimiseks kuni 30 päevaks v.a<br>tööülesannete täitmisega seotud kokkupuutejuhtudel HIV-<br>nakkusega |
| 1059218         | ramipriil, 10mg                              | C09AA0<br>5 | CARDACE, tablett,<br>28TK                                       | Sanofi Winthrop<br>Industrie     | 50<br>75         | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |                         |        |              |               |   |
| 1153527         | ramipriil, 10mg                              | C09AA0<br>5 | RAMICOR 10 MG,<br>tablett, 30TK                                 | Hexal AG                         | 75<br>50         | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |                         |        |              |               |   |
| 1169939         | ramipriil, 10mg                              | C09AA0<br>5 | RAMIPRIL ACTAVIS<br>10MG, tablett, 28TK                         | Teva B.V.                        | 75<br>50         | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |                         |        |              |               |   |
| 1190078         | ramipriil, 10mg                              | C09AA0<br>5 | AMPRIIL 10 MG, tablett,<br>30TK                                 | KRKA, d.d., Novo<br>mesto        | 75<br>50         | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |                         |        |              |               |   |
| 1190090         | ramipriil, 10mg                              | C09AA0<br>5 | AMPRIIL 10 MG, tablett,<br>60TK                                 | KRKA, d.d., Novo<br>mesto        | 75<br>50         | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |                         |        |              |               |   |
| 1217977         | ramipriil, 10mg                              | C09AA0<br>5 | RAMICOR 10 MG,<br>tablett, 60TK                                 | Hexal AG                         | 50<br>75         | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |                         |        |              |               |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                   | Müügiloo hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                     | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|------------------------------|------------------|------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1502345         | ramipriil, 10mg                     | C09AA0<br>5 | CARDACE, tablett,<br>56TK               | Sanofi Winthrop<br>Industrie | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                              | 50               |                              |        |        |              |               |          |
| 1583423         | ramipriil, 10mg                     | C09AA0<br>5 | RAMIPRIL ACTAVIS<br>10MG, tablett, 90TK | Teva B.V.                    | 50               |                              |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                              | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
| 3063574         | ramipriil, 10mg                     | C09AA0<br>5 | CARDACE, tablett,<br>56TK               | Ideal Trade Links<br>UAB     | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                              | 75               |                              |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                              | 50               |                              |        |        |              |               |          |
| 1005826         | ramipriil, 2,5mg                    | C09AA0<br>5 | CARDACE 2,5 MG,<br>tablett, 28TK        | Sanofi Winthrop<br>Industrie | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                              | 50               |                              |        |        |              |               |          |
| 1074743         | ramipriil, 2,5mg                    | C09AA0<br>5 | CARDACE 2,5 MG,<br>tablett, 98TK        | Sanofi Winthrop<br>Industrie | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                              | 50               |                              |        |        |              |               |          |
| 1153381         | ramipriil, 2,5mg                    | C09AA0<br>5 | RAMICOR 2,5 MG,<br>tablett, 30TK        | Hexal AG                     | 50               |                              |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                              | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
| 1189953         | ramipriil, 2,5mg                    | C09AA0<br>5 | AMPRIIL 2,5 MG, tablett,<br>30TK        | KRKA, d.d., Novo<br>mesto    | 50               |                              |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                              | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
| 1005859         | ramipriil, 5mg                      | C09AA0<br>5 | CARDACE 5 MG,<br>tablett, 28TK          | Sanofi Winthrop<br>Industrie | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                              | 50               |                              |        |        |              |               |          |
| 1074754         | ramipriil, 5mg                      | C09AA0<br>5 | CARDACE 5 MG,<br>tablett, 98TK          | Sanofi Winthrop<br>Industrie | 50               |                              |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                              | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
| 1153459         | ramipriil, 5mg                      | C09AA0<br>5 | RAMICOR 5 MG, tablett,<br>30TK          | Hexal AG                     | 50               |                              |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                              | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
| 1169849         | ramipriil, 5mg                      | C09AA0<br>5 | RAMIPRIL ACTAVIS<br>5MG, tablett, 28TK  | Teva B.V.                    | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                              | 50               |                              |        |        |              |               |          |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus    | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                | Müügiloo hoidja             | Soodus-tus % | Diagnoos                           | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-------------|----------------------------------|----------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1190034     | ramipriil, 5mg                   | C09AA05  | AMPRIIL 5 MG, tablett, 30TK          | KRKA, d.d., Novo mesto      | 50           |                                    |        |        |           |            |          |
|             |                                  |          |                                      |                             | 75           | I15-I15, I50-I50, I10-I13          |        |        |           |            |          |
| 1190056     | ramipriil, 5mg                   | C09AA05  | AMPRIIL 5 MG, tablett, 60TK          | KRKA, d.d., Novo mesto      | 75           | I15-I15, I50-I50, I10-I13          |        |        |           |            |          |
|             |                                  |          |                                      |                             | 50           |                                    |        |        |           |            |          |
| 1217966     | ramipriil, 5mg                   | C09AA05  | RAMICOR 5 MG, tablett, 60TK          | Hexal AG                    | 50           |                                    |        |        |           |            |          |
|             |                                  |          |                                      |                             | 75           | I15-I15, I50-I50, I10-I13          |        |        |           |            |          |
| 1502198     | ramipriil, 5mg                   | C09AA05  | CARDACE 5 MG, tablett, 56TK          | Sanofi Winthrop Industrie   | 50           |                                    |        |        |           |            |          |
|             |                                  |          |                                      |                             | 75           | I15-I15, I50-I50, I10-I13          |        |        |           |            |          |
| 1583412     | ramipriil, 5mg                   | C09AA05  | RAMIPRIIL ACTAVIS 5MG, tablett, 90TK | Teva B.V.                   | 50           |                                    |        |        |           |            |          |
|             |                                  |          |                                      |                             | 75           | I15-I15, I50-I50, I10-I13          |        |        |           |            |          |
| 3063091     | ramipriil, 5mg                   | C09AA05  | CARDACE 5 MG, tablett, 56TK          | Ideal Trade Links UAB       | 75           | I15-I15, I50-I50, I10-I13          |        |        |           |            |          |
|             |                                  |          |                                      |                             | 50           |                                    |        |        |           |            |          |
| 3063169     | ramipriil, 5mg                   | C09AA05  | CARDACE 5 MG, tablett, 98TK          | Ideal Trade Links UAB       | 50           |                                    |        |        |           |            |          |
|             |                                  |          |                                      |                             | 75           | I15-I15, I50-I50, I10-I13          |        |        |           |            |          |
| 1510467     | ramipriil+amlodipii n, 10mg+10mg | C09BB07  | RAMDACORDIA, kõvakapsel, 30TK        | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 75           | I20-I20, I50-I50, I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
|             |                                  |          |                                      |                             | 50           |                                    |        |        |           |            |          |
| 1510388     | ramipriil+amlodipii n, 10mg+5mg  | C09BB07  | RAMDACORDIA, kõvakapsel, 30TK        | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 75           | I20-I20, I50-I50, I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
|             |                                  |          |                                      |                             | 50           |                                    |        |        |           |            |          |
| 1510423     | ramipriil+amlodipii n, 5mg+10mg  | C09BB07  | RAMDACORDIA, kõvakapsel, 30TK        | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 50           |                                    |        |        |           |            |          |
|             |                                  |          |                                      |                             | 75           | I20-I20, I50-I50, I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
| 1510344     | ramipriil+amlodipii n, 5mg+5mg   | C09BB07  | RAMDACORDIA, kõvakapsel, 30TK        | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 50           |                                    |        |        |           |            |          |
|             |                                  |          |                                      |                             | 75           | I20-I20, I50-I50, I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus              | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                     | Eriala                  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|--|-------------|---|--|------------------|------------------------------|-------------------------|--------|--------------|---------------|---|
| 1512953         | ramipriil+hüdroklor<br>otiasiid,<br>10mg+12,5mg  | C09BA8<br>4 | CARDACE FORTE,<br>tablett, 56TK                                 | Sanofi Winthrop<br>Industrie                               | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |                         |        |              |               |   |
|                 |  |             |   |  | 50               |                              |                         |        |              |               |   |
| 1881738         | ramipriil+hüdroklor<br>otiasiid,<br>10mg+25mg    | C09BA8<br>4 | CARDACE FORTE,<br>tablett, 56TK                                 | First Pharma OÜ  | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |                         |        |              |               |   |
|                 |  |             |   |  | 50               |                              |                         |        |              |               |   |
| 1881749         | ramipriil+hüdroklor<br>otiasiid,<br>10mg+25mg    | C09BA8<br>4 | CARDACE FORTE,<br>tablett, 60TK                                 | First Pharma OÜ  | 50               |                              |                         |        |              |               |   |
|                 |  |             |   |  | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |                         |        |              |               |   |
| 1113657         | ramipriil+hüdroklor<br>otiasiid,<br>2,5mg+12,5mg | C09BA8<br>4 | CO-RAMICOR 2,5<br>MG/12,5 MG, tablett,<br>30TK                  | Hexal AG   | 50               |                              |                         |        |              |               |   |
|                 |  |             |   |  | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |                         |        |              |               |   |
| 1190269         | ramipriil+hüdroklor<br>otiasiid,<br>2,5mg+12,5mg | C09BA8<br>4 | AMPRIIL HL<br>2,5MG/12,5MG, tablett,<br>30TK                    | KRKA, d.d., Novo<br>mesto                                  | 50               |                              |                         |        |              |               |   |
|                 |  |             |   |  | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |                         |        |              |               |   |
| 1113680         | ramipriil+hüdroklor<br>otiasiid,<br>5mg+25mg     | C09BA8<br>4 | CO-RAMICOR 5 MG/25<br>MG, tablett, 30TK                         | Hexal AG   | 50               |                              |                         |        |              |               |   |
|                 |  |             |   |  | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |                         |        |              |               |   |
| 1141715         | ramipriil+hüdroklor<br>otiasiid,<br>5mg+25mg     | C09BA8<br>4 | CARDACE PLUS,<br>tablett, 28TK                                  | Sanofi Winthrop<br>Industrie                               | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |                         |        |              |               |   |
|                 |  |             |   |  | 50               |                              |                         |        |              |               |   |
| 1190179         | ramipriil+hüdroklor<br>otiasiid,<br>5mg+25mg     | C09BA8<br>4 | AMPRIIL HD<br>5MG/25MG, tablett,<br>30TK                        | KRKA, d.d., Novo<br>mesto                                  | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |                         |        |              |               |   |
|                 |  |             |   |  | 50               |                              |                         |        |              |               |   |
| 1881637         | ramipriil+hüdroklor<br>otiasiid,<br>5mg+25mg     | C09BA8<br>4 | CARDACE PLUS,<br>tablett, 56TK                                  | First Pharma OÜ  | 50               |                              |                         |        |              |               |   |
|                 |  |             |   |  | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |                         |        |              |               |   |
| 1361652         | ranolasiin, 375mg                                | C01EB1<br>8 | RANEXA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 60TK | Menarini<br>International<br>Operations<br>Luxembourg S.A. | 75               | I20-I20                      | Kardioloog,<br>Sisearst | esmane |              |               | III-IV funktsionaalse klassi stenokardia esineb vaatamata<br>adekvaatsele antiisheemilisele ravile (beeta-<br>adrenoblokaator, kaltsiumikanali blokaator ja pika toimega<br>nitropreparaat) või need ravimid on vastunäidustatud ja<br>on teostatud koronaarhaiguse invasiivne uurimine ning<br>võimalusel revaskulariseerimine |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|--|------------------|----------|-------------------------|--------|--------------|---------------|---|
| 1859081         | ranolasiin, 375mg                   | C01EB1<br>8 | RANOLAZINE STADA,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 60TK | Stada Arzneimittel<br>AG                                   | 75               | I20-I20  | Kardioloog,<br>Sisearst | esmane |              |               | III-IV funktsionaalse klassi stenokardia esineb vaatamata<br>adekvaatsele antiisheemilisele ravile (beeta-<br>adrenoblokaator, kaltsiumikanali blokaator ja pika toimega<br>nitropreparaat) või need ravimid on vastunäidustatud ja<br>on teostatud koronaarhaiguse invasiivne uurimine ning<br>võimalusel revaskulariseerimine |
| 1869138         | ranolasiin, 375mg                   | C01EB1<br>8 | TEZULIX, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 60TK             | KRKA, d.d., Novo<br>mesto                                  | 75               | I20-I20  | Sisearst,<br>Kardioloog | esmane |              |               | III-IV funktsionaalse klassi stenokardia esineb vaatamata<br>adekvaatsele antiisheemilisele ravile (beeta-<br>adrenoblokaator, kaltsiumikanali blokaator ja pika toimega<br>nitropreparaat) või need ravimid on vastunäidustatud ja<br>on teostatud koronaarhaiguse invasiivne uurimine ning<br>võimalusel revaskulariseerimine |
| 1361674         | ranolasiin, 500mg                   | C01EB1<br>8 | RANEXA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 60TK              | Menarini<br>International<br>Operations<br>Luxembourg S.A. | 75               | I20-I20  | Kardioloog,<br>Sisearst | esmane |              |               | III-IV funktsionaalse klassi stenokardia esineb vaatamata<br>adekvaatsele antiisheemilisele ravile (beeta-<br>adrenoblokaator, kaltsiumikanali blokaator ja pika toimega<br>nitropreparaat) või need ravimid on vastunäidustatud ja<br>on teostatud koronaarhaiguse invasiivne uurimine ning<br>võimalusel revaskulariseerimine |
| 1859115         | ranolasiin, 500mg                   | C01EB1<br>8 | RANOLAZINE STADA,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 60TK | Stada Arzneimittel<br>AG                                   | 75               | I20-I20  | Sisearst,<br>Kardioloog | esmane |              |               | III-IV funktsionaalse klassi stenokardia esineb vaatamata<br>adekvaatsele antiisheemilisele ravile (beeta-<br>adrenoblokaator, kaltsiumikanali blokaator ja pika toimega<br>nitropreparaat) või need ravimid on vastunäidustatud ja<br>on teostatud koronaarhaiguse invasiivne uurimine ning<br>võimalusel revaskulariseerimine |
| 1869161         | ranolasiin, 500mg                   | C01EB1<br>8 | TEZULIX, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 60TK             | KRKA, d.d., Novo<br>mesto                                  | 75               | I20-I20  | Kardioloog,<br>Sisearst | esmane |              |               | III-IV funktsionaalse klassi stenokardia esineb vaatamata<br>adekvaatsele antiisheemilisele ravile (beeta-<br>adrenoblokaator, kaltsiumikanali blokaator ja pika toimega<br>nitropreparaat) või need ravimid on vastunäidustatud ja<br>on teostatud koronaarhaiguse invasiivne uurimine ning<br>võimalusel revaskulariseerimine |
| 1361685         | ranolasiin, 750mg                   | C01EB1<br>8 | RANEXA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 60TK              | Menarini<br>International<br>Operations<br>Luxembourg S.A. | 75               | I20-I20  | Sisearst,<br>Kardioloog | esmane |              |               | III-IV funktsionaalse klassi stenokardia esineb vaatamata<br>adekvaatsele antiisheemilisele ravile (beeta-<br>adrenoblokaator, kaltsiumikanali blokaator ja pika toimega<br>nitropreparaat) või need ravimid on vastunäidustatud ja<br>on teostatud koronaarhaiguse invasiivne uurimine ning<br>võimalusel revaskulariseerimine |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                        | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|--|-------------|--|-----------------------------------|------------------|----------|-------------------------|--------|--------------|---------------|---|
| 1859148         | ranolasiin, 750mg  | C01EB1<br>8 | RANOLAZINE STADA,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 60TK | Stada Arzneimittel<br>AG          | 75               | I20-I20  | Sisearst,<br>Kardioloog | esmane |              |               | III-IV funktsionaalse klassi stenokardia esineb vaatamata<br>adekvaatsele antiisheemilisele ravile (beeta-<br>adrenoblokaator, kaltsiumikanali blokaator ja pika toimega<br>nitropreparaat) või need ravimid on vastunäidustatud ja<br>on teostatud koronaarhaiguse invasiivne uurimine ning<br>võimalusel revaskulariseerimine |
| 1869194         | ranolasiin, 750mg  | C01EB1<br>8 | TEZULIX, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 60TK             | KRKA, d.d., Novo<br>mesto         | 75               | I20-I20  | Sisearst,<br>Kardioloog | esmane |              |               | III-IV funktsionaalse klassi stenokardia esineb vaatamata<br>adekvaatsele antiisheemilisele ravile (beeta-<br>adrenoblokaator, kaltsiumikanali blokaator ja pika toimega<br>nitropreparaat) või need ravimid on vastunäidustatud ja<br>on teostatud koronaarhaiguse invasiivne uurimine ning<br>võimalusel revaskulariseerimine |
| 1203422         | rasagiliin, 1mg  | N04BD0<br>2 | AZILECT, tablett, 28TK   | Teva B.V.                         | 50               |          |                         |        |              |               |   |
|                 |  |             |  |                                   | 100              | G20-G20  | Neuroloog               | esmane |              |               |   |
| 1678215         | rasagiliin, 1mg  | N04BD0<br>2 | RALAGO, tablett, 30TK  | KRKA, d.d., Novo<br>mesto         | 100              | G20-G20  | Neuroloog               | esmane |              |               |   |
|                 |  |             |  |                                   | 50               |          |                         |        |              |               |   |
| 1679272         | rasagiliin, 1mg  | N04BD0<br>2 | SAGILIA, tablett, 30TK   | Medochemie<br>Limited             | 50               |          |                         |        |              |               |   |
|                 |  |             |  |                                   | 100              | G20-G20  | Neuroloog               | esmane |              |               |   |
| 1011036         | raud(III)hüdrosiid-<br>polümaltooskompl<br>eks, 100mg      | B03AB8<br>0 | FERRUM LEK,<br>närimistablett, 30TK  | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 50               | D50-D50  |                         |        |              | 3,00          |   |
|                 |  |             |  |                                   | 75               | D50-D50  |                         |        |              |               | rasedatele  |
| 1011025         | raud(III)hüdrosiid-<br>polümaltooskompl<br>eks, 10mg 1ml   | B03AB8<br>0 | FERRUM LEK, siirup,<br>100ml 1TK   | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 75               | D50-D50  |                         |        |              |               | rasedatele  |
|                 |  |             |  |                                   | 50               | D50-D50  |                         |        |              | 3,00          |   |
| 1883134         | relugoliks, 120mg  | L02BX0<br>4 | ORGOVYX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                        | Accord Healthcare<br>S.L.U.       | 100              | C61-C61  | Uroloog,<br>Onkoloog    |        |              |               | lokaalse või lokaalselt levinud kõrge riskiga (kliiniline<br>staadium $\geq$ T2c või Gleasoni skoor 8-10 või PSA $\geq$ 20<br>ng/ml või regionaalsete lümfisõlmede haaratus või<br>positiivne resektsioonipiir) multimodaalse ravi osana kuni<br>2 aasta vältel ning metastaseerunud eesnäärmevähiga<br>patsientidele           |
| 1858103         | relugoliks+östradio<br>ol+noretisteroon,<br>40mg+1mg+0,5mg | H01CC5<br>4 | RYEQO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                          | Gedeon Richter<br>Plc.            | 75               | D25-D25  | Günekoloog              | esmane |              |               | mõõdukate kuni raskete sümptomitega patsientidele,<br>kellel esmavaliku ravimid (traneksaamhape,<br>hormonaalsed kontratseptiivid, emakasisesed<br>rasestumisvastased vahendid) on ebaefektiivsed või<br>talumatud.   |
|                 |  |             |  |                                   | 75               | N80-N80  | Günekoloog              |        |              |               | endometrioosi sümptomaatiliseks raviks naistele, keda on<br>eelnevalt ravitud endometrioosi ravimitega või kirurgiliselt  |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                           | Müügiloa hoidja            | Soodus-tus % | Diagnoos    | Eriala  | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-------------|-------------------------------|----------|---|----------------------------|--------------|-------------|---|--------|-----------|------------|--|
| 1752410     | ribotsiklib, 200mg            | L01EF02  | KISQALI, õhukese polümeerikattega tablett, 63TK | Novartis Europharm Limited | 100          | C50-C50     | Onkoloog  |        |           |            | hormoonretseptor (HR)-positiivse, inimese epidermaalse kasvufaktori retseptor 2 (HER2)-negatiivse, lokaalselt kaugelearenenud või metastaatilise rinnavähi I rea raviks kombinatsioonis aromataasi inhibiitoriga patsiendile kuni haiguse progresseerumiseni ning kombinatsioonis fulvestrandiga I rea raviks kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle haigus on adjuvantse või neoadjuvantse aromataasi inhibiitori foonil või 12 kuud pärast selle lõpetamist progresseerunud ning kombinatsioonis fulvestrandiga II rea raviks kuni haiguse progresseerumiseni patsientidele, kes ei ole varasemalt ravi CDK-4/6 inhibiitoritega saanud |
| 1035289     | rilusool, 50mg                | N07XX02  | RILUTEK, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK | Sanofi Winthrop Industrie  | 100<br>50    | G12.2-G12.2 | Neuroloog                                       | esmane |           |            | mehhaanilise ventilatsiooni vajaduseta patsientidele   |
| 1882155     | rimegepant, 75mg              | N02CD06  | VYDURA, suukaudne lüofilisaat, 2TK              | Pfizer Europe MA EEIG      | 75           | G43-G43     |   |        |           |            | auraga või aurata migreeni akuutseks raviks täiskasvanutel, kellel on ebaõnnestunud 2 või enam triptaanravi  |
| 1644375     | riotsiguat, 0,5mg             | C02KX05  | ADEMPAS, õhukese polümeerikattega tablett, 42TK | Bayer AG                   | 100          | I27.0-I27.0 | Pulmonoloog, Pediaater, Kardioloog, Reumatoloog |        |           |            | konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel kroonilise trombemboolilise pulmonaalhüpertensiooniga patsiendile, kellel kirurgiline ravi ei ole teostatav või kellel haigus kirurgilise ravi järel püsib või taastekib ning kelle seisund vastab NYHA III-IV funktsionaalsele klassile  |
| 1644432     | riotsiguat, 1,5mg             | C02KX05  | ADEMPAS, õhukese polümeerikattega tablett, 42TK | Bayer AG                   | 100          | I27.0-I27.0 | Kardioloog, Pulmonoloog, Reumatoloog, Pediaater |        |           |            | konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel kroonilise trombemboolilise pulmonaalhüpertensiooniga patsiendile, kellel kirurgiline ravi ei ole teostatav või kellel haigus kirurgilise ravi järel püsib või taastekib ning kelle seisund vastab NYHA III-IV funktsionaalsele klassile  |
| 1644409     | riotsiguat, 1mg               | C02KX05  | ADEMPAS, õhukese polümeerikattega tablett, 42TK | Bayer AG                   | 100          | I27.0-I27.0 | Pulmonoloog, Reumatoloog, Kardioloog, Pediaater |        |           |            | konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel kroonilise trombemboolilise pulmonaalhüpertensiooniga patsiendile, kellel kirurgiline ravi ei ole teostatav või kellel haigus kirurgilise ravi järel püsib või taastekib ning kelle seisund vastab NYHA III-IV funktsionaalsele klassile  |



| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                           | Müügiloa hoidja                  | Soodus-tus % | Diagnoos    | Eriala  | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-------------|-------------------------------|----------|---|----------------------------------|--------------|-------------|---|--------|-----------|------------|---|
| 3042953     | riotsiguaat, 1mg              | C02KX05  | ADEMPAS, õhukese polümeerikattega tablett, 42TK | Bayer AG                         | 100          | I27.0-I27.0 | Kardioloog, Pulmonoloog, Reumatoloog, Pediaater |        |           |            | konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel kroonilise trombemboolilise pulmonaalhüpertensiooniga patsiendile, kellel kirurgiline ravi ei ole teostatav või kellel haigus kirurgilise ravi järel püsib või taastekib ning kelle seisund vastab NYHA III-IV funktsionaalsele klassile   |
| 1644498     | riotsiguaat, 2,5mg            | C02KX05  | ADEMPAS, õhukese polümeerikattega tablett, 42TK | Bayer AG                         | 100          | I27.0-I27.0 | Pediaater, Kardioloog, Pulmonoloog, Reumatoloog |        |           |            | konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel kroonilise trombemboolilise pulmonaalhüpertensiooniga patsiendile, kellel kirurgiline ravi ei ole teostatav või kellel haigus kirurgilise ravi järel püsib või taastekib ning kelle seisund vastab NYHA III-IV funktsionaalsele klassile   |
| 3042942     | riotsiguaat, 2,5mg            | C02KX05  | ADEMPAS, õhukese polümeerikattega tablett, 42TK | Bayer AG                         | 100          | I27.0-I27.0 | Pediaater, Reumatoloog, Pulmonoloog, Kardioloog |        |           |            | konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel kroonilise trombemboolilise pulmonaalhüpertensiooniga patsiendile, kellel kirurgiline ravi ei ole teostatav või kellel haigus kirurgilise ravi järel püsib või taastekib ning kelle seisund vastab NYHA III-IV funktsionaalsele klassile   |
| 1644465     | riotsiguaat, 2mg              | C02KX05  | ADEMPAS, õhukese polümeerikattega tablett, 42TK | Bayer AG                         | 100          | I27.0-I27.0 | Reumatoloog, Pediaater, Kardioloog, Pulmonoloog |        |           |            | konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel kroonilise trombemboolilise pulmonaalhüpertensiooniga patsiendile, kellel kirurgiline ravi ei ole teostatav või kellel haigus kirurgilise ravi järel püsib või taastekib ning kelle seisund vastab NYHA III-IV funktsionaalsele klassile   |
| 3042931     | riotsiguaat, 2mg              | C02KX05  | ADEMPAS, õhukese polümeerikattega tablett, 42TK | Bayer AG                         | 100          | I27.0-I27.0 | Kardioloog, Pediaater, Reumatoloog, Pulmonoloog |        |           |            | konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel kroonilise trombemboolilise pulmonaalhüpertensiooniga patsiendile, kellel kirurgiline ravi ei ole teostatav või kellel haigus kirurgilise ravi järel püsib või taastekib ning kelle seisund vastab NYHA III-IV funktsionaalsele klassile   |
| 1848438     | risankizumab, 150mg 1ml       | L04AC18  | SKYRIZI, süstelahus pen-süstlis, 1ml 1TK        | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | 100          | L40-L40     | Pediaater, Dermatoveneroloog                    |        |           |            | patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus L40 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud. |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja         | Soodus-tus % | Diagnoos                 | Eriala                           | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-------------|-------------------------------|----------|--|-------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1845446     | risdiplaam, 0,75mg 1ml        | M09AX10  | EVRYSDI, suukaudse lahuse pulber, 80ml 1TK                     | Roche Registration GmbH | 100          | G12.0-G12.0, G12.1-G12.1 | Neuroloog, Pediaater – neuroloog |        |           |            | geneetiliselt kinnitatud 5q spinaalse lihastroofia raviks patsiendile, kellel on määratud kuni 4 SMN2 geenikoopiat ja diagnoositud I, II või III tüüpi SMA ning kes on ravi alustamisel alla 26-aastane ning ei vaja püsiventilatsiooni. Ravi alustamise ja lõpetamise otsuse on langetanud arstide eksperdikomisjon (kaks lasteneuroloogi või neuroloogi ja geneetik) ning patsient on SMA ravimise kogemusega lasteneuroloogi või neuroloogi jälgimisel. Ravivastuse hindamine toimub iga kolme kuu tagant. Ravi lõpetatakse püsiventilatsiooni vajaduse tekkel või kui ilmneb motoorsete funktsioonide kliiniliselt oluline halvenemine mõõdetuna motoorsete funktsioonide hindamise skaalal (I tüübi korral HINE-2 või CHOP-INTEND ning II-III tüübi korral MFM32, RULM või HFMSE alusel) |
| 1060456     | risperidoon, 1mg              | N05AX08  | RISPOLEPT 1 mg, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK         | Johnson & Johnson UAB   | 100          | F32.3-F32.3, F33.3-F33.3 | Psühhiaater                      | esmane |           |            |   |
|             |                               |          |  |                         | 100          | F20-F29, F30-F31         | Psühhiaater                      |        |           |            |   |
|             |                               |          |  |                         | 50           |                          |                                  |        |           |            |   |
| 1271258     | risperidoon, 1mg              | N05AX08  | MEDORISPER, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK             | Medochemie Limited      | 50           |                          |                                  |        |           |            |   |
|             |                               |          |  |                         | 100          | F20-F29, F30-F31         | Psühhiaater                      |        |           |            |   |
|             |                               |          |  |                         | 100          | F32.3-F32.3, F33.3-F33.3 | Psühhiaater                      | esmane |           |            |   |
| 1041028     | risperidoon, 1mg 1ml          | N05AX08  | RISPOLEPT, suukaudne lahus, 100ml 1TK                          | Johnson & Johnson UAB   | 100          | F32.3-F32.3, F33.3-F33.3 | Psühhiaater                      | esmane |           |            |   |
|             |                               |          |  |                         | 100          | F20-F29                  | Psühhiaater                      |        |           |            |   |
|             |                               |          |  |                         | 50           |                          |                                  |        |           |            |   |
| 1151974     | risperidoon, 2mg              | N05AX08  | RISPERIDON ACTAVIS 2MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Teva B.V.               | 50           |                          |                                  |        |           |            |   |
|             |                               |          |  |                         | 100          | F32.3-F32.3, F33.3-F33.3 | Psühhiaater                      | esmane |           |            |   |
|             |                               |          |  |                         | 100          | F20-F29, F30-F31         | Psühhiaater                      |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                 |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|--------------------------|------------------|--|-------------|--------|--------------|---------------|--|
| 1271337         | risperidoon, 2mg                    | N05AX0<br>8 | MEDORISPER,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK             | Medochemie<br>Limited    | 100              | F32.3-F32.3,<br>F33.3-F33.3  | Psühhiaater | esmane |              |               |  |
|                 |                                     |             |   |                          | 50               |  |             |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |   |                          | 100              | F20-F29, F30-<br>F31   | Psühhiaater |        |              |               |  |
| 1067521         | risperidoon, 3mg                    | N05AX0<br>8 | RISPOLEPT 3 mg,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK         | Johnson &<br>Johnson UAB | 100              | F20-F29, F30-<br>F31   | Psühhiaater |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |   |                          | 50               |  |             |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |   |                          | 100              | F32.3-F32.3,<br>F33.3-F33.3  | Psühhiaater | esmane |              |               |  |
| 1271416         | risperidoon, 3mg                    | N05AX0<br>8 | MEDORISPER,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK             | Medochemie<br>Limited    | 50               |  |             |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |   |                          | 100              | F32.3-F32.3,<br>F33.3-F33.3  | Psühhiaater | esmane |              |               |  |
|                 |                                     |             |   |                          | 100              | F20-F29, F30-<br>F31   | Psühhiaater |        |              |               |  |
| 1152010         | risperidoon, 4mg                    | N05AX0<br>8 | RISPERIDON ACTAVIS<br>4MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Teva B.V.                | 100              | F20-F29, F30-<br>F31   | Psühhiaater |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |   |                          | 50               |  |             |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |   |                          | 100              | F32.3-F32.3,<br>F33.3-F33.3  | Psühhiaater | esmane |              |               |  |
| 1381665         | rivaroksabaan,<br>10mg              | B01AF0<br>1 | XARELTO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK                   | Bayer AG                 | 50               |  |             |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |   |                          | 75               | I80-I82, M16-<br>M17, S72.7-<br>S72.7, S72.0-<br>S72.2, I67.6-<br>I67.6, I26-I26 |             |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |   |                          | 100              | I26-I26, I67.6-<br>I67.6, I80-I82  |             |        |              |               | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla                            | Märkused                                 |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|-----------------------------------|------------------|--|--------|--------|--------------|--|--|
| 1381676         | rivaroksabaan,<br>10mg              | B01AF0<br>1 | XARELTO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK              | Bayer AG                          | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6   |        |        |              |  | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |
|                 |                                     |             |  |                                   | 50               |  |        |        |              |  |  |
|                 |                                     |             |  |                                   | 75               | I80-I82, M16-<br>M17, S72.7-<br>S72.7, S72.0-<br>S72.2, I67.6-<br>I67.6, I26-I26 |        |        |              |  |  |
| 1729818         | rivaroksabaan,<br>10mg              | B01AF0<br>1 | RUNAPLAX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK             | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 50               |  |        |        |              |  |  |
|                 |                                     |             |  |                                   | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6   |        |        |              | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |  |
|                 |                                     |             |  |                                   | 75               | I80-I82, M16-<br>M17, S72.7-<br>S72.7, S72.0-<br>S72.2, I67.6-<br>I67.6, I26-I26 |        |        |              |  |  |
| 1791828         | rivaroksabaan,<br>10mg              | B01AF0<br>1 | RIVAROXABAN TEVA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK  | Teva GmbH                         | 50               |  |        |        |              |  |  |
|                 |                                     |             |  |                                   | 100              | I26-I26, I67.6-<br>I67.6, I80-I82  |        |        |              | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |  |
|                 |                                     |             |  |                                   | 75               | I80-I82, M16-<br>M17, S72.7-<br>S72.7, S72.0-<br>S72.2, I67.6-<br>I67.6, I26-I26 |        |        |              |  |  |
| 1844366         | rivaroksabaan,<br>10mg              | B01AF0<br>1 | RIVAROXABAN<br>STADA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Stada Arzneimittel<br>AG          | 50               |  |        |        |              |  |  |
|                 |                                     |             |  |                                   | 75               | I80-I82, M16-<br>M17, S72.7-<br>S72.7, S72.0-<br>S72.2, I67.6-<br>I67.6, I26-I26 |        |        |              |  |  |
|                 |                                     |             |  |                                   | 100              | I80-I82, I26-I26,<br>I67.6-I67.6   |        |        |              | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla                            | Märkused                                 |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|-----------------------------------|------------------|--|--------|--------|--------------|--|--|
| 1850341         | rivaroksabaan,<br>10mg              | B01AF0<br>1 | KARDATUXAN,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK          | Gedeon Richter<br>Plc.            | 100              | I80-I82, I26-I26,<br>I67.6-I67.6   |        |        |              |  | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |
|                 |                                     |             |  |                                   | 50               |  |        |        |              |  |  |
|                 |                                     |             |  |                                   | 75               | I80-I82, M16-<br>M17, S72.7-<br>S72.7, S72.0-<br>S72.2, I67.6-<br>I67.6, I26-I26 |        |        |              |  |  |
| 3055621         | rivaroksabaan,<br>10mg              | B01AF0<br>1 | RIVAROXABAN<br>VIATRIS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Viatris Limited                   | 100              | I26-I26, I67.6-<br>I67.6, I80-I82  |        |        |              |  | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |
|                 |                                     |             |  |                                   | 75               | I80-I82, M16-<br>M17, S72.7-<br>S72.7, S72.0-<br>S72.2, I67.6-<br>I67.6, I26-I26 |        |        |              |  |  |
|                 |                                     |             |  |                                   | 50               |  |        |        |              |  |  |
| 1552621         | rivaroksabaan,<br>15mg              | B01AF0<br>1 | XARELTO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                | Bayer AG                          | 50               |  |        |        |              |  |  |
|                 |                                     |             |  |                                   | 75               | I48-I48, I67.6-<br>I67.6, I80-I82,<br>I26-I26                                    |        |        |              |  |  |
|                 |                                     |             |  |                                   | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6   |        |        |              | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |  |
| 1552632         | rivaroksabaan,<br>15mg              | B01AF0<br>1 | XARELTO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>42TK                | Bayer AG                          | 50               |  |        |        |              |  |  |
|                 |                                     |             |  |                                   | 75               | I48-I48, I67.6-<br>I67.6, I80-I82,<br>I26-I26                                    |        |        |              |  |  |
|                 |                                     |             |  |                                   | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6   |        |        |              | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |  |
| 1729908         | rivaroksabaan,<br>15mg              | B01AF0<br>1 | RUNAPLAX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK               | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6   |        |        |              |  | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |
|                 |                                     |             |  |                                   | 75               | I48-I48, I67.6-<br>I67.6, I80-I82,<br>I26-I26                                    |        |        |              |  |  |
|                 |                                     |             |  |                                   | 50               |  |        |        |              |  |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                      | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla                            | Märkused                                 |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|--------------------------|------------------|---|--------|--------|--------------|--|--|
| 1791918         | rivaroksabaan,<br>15mg              | B01AF0<br>1 | RIVAROXABAN TEVA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK        | Teva GmbH                | 100              | I26-I26, I67.6-<br>I67.6, I80-I82             |        |        |              |  | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |
|                 |                                     |             |  |                          | 50               |   |        |        |              |  |  |
|                 |                                     |             |  |                          | 75               | I48-I48, I67.6-<br>I67.6, I80-I82,<br>I26-I26 |        |        |              |  |  |
| 1844568         | rivaroksabaan,<br>15mg              | B01AF0<br>1 | RIVAROXABAN<br>STADA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK       | Stada Arzneimittel<br>AG | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6              |        |        |              |  | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |
|                 |                                     |             |  |                          | 75               | I48-I48, I67.6-<br>I67.6, I80-I82,<br>I26-I26 |        |        |              |  |  |
|                 |                                     |             |  |                          | 50               |   |        |        |              |  |  |
| 1850486         | rivaroksabaan,<br>15mg              | B01AF0<br>1 | KARDATUXAN,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK              | Gedeon Richter<br>Plc.   | 75               | I48-I48, I67.6-<br>I67.6, I80-I82,<br>I26-I26 |        |        |              |  |  |
|                 |                                     |             |  |                          | 100              | I26-I26, I67.6-<br>I67.6, I80-I82             |        |        |              | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |  |
|                 |                                     |             |  |                          | 50               |   |        |        |              |  |  |
| 1896262         | rivaroksabaan,<br>15mg              | B01AF0<br>1 | RIVAROXABAN<br>VIATRIS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK     | Viatris Limited          | 100              | I26-I26, I67.6-<br>I67.6, I80-I82             |        |        |              |  | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |
|                 |                                     |             |  |                          | 50               |   |        |        |              |  |  |
|                 |                                     |             |  |                          | 75               | I48-I48, I67.6-<br>I67.6, I80-I82,<br>I26-I26 |        |        |              |  |  |
| 1844906         | rivaroksabaan,<br>15mg/20mg         | B01AF0<br>1 | RIVAROXABAN<br>STADA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>42TK / 7TK | Stada Arzneimittel<br>AG | 50               |   |        |        |              |  |  |
|                 |                                     |             |  |                          | 75               | I48-I48, I67.6-<br>I67.6, I80-I82,<br>I26-I26 |        |        |              |  |  |
|                 |                                     |             |  |                          | 100              | I80-I82, I26-I26,<br>I67.6-I67.6              |        |        |              | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                      | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla                            | Märkused                                 |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|-----------------------------------|------------------|---|--------|--------|--------------|--|--|
| 1552687         | rivaroksabaan,<br>20mg              | B01AF0<br>1 | XARELTO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK              | Bayer AG                          | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6              |        |        |              |  | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |
|                 |                                     |             |  |                                   | 50               |   |        |        |              |  |  |
|                 |                                     |             |  |                                   | 75               | I48-I48, I67.6-<br>I67.6, I80-I82,<br>I26-I26 |        |        |              |  |  |
| 1730001         | rivaroksabaan,<br>20mg              | B01AF0<br>1 | RUNAPLAX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK             | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6              |        |        |              |  | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |
|                 |                                     |             |  |                                   | 50               |   |        |        |              |  |  |
|                 |                                     |             |  |                                   | 75               | I48-I48, I67.6-<br>I67.6, I80-I82,<br>I26-I26 |        |        |              |  |  |
| 1792010         | rivaroksabaan,<br>20mg              | B01AF0<br>1 | RIVAROXABAN TEVA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK  | Teva GmbH                         | 75               | I48-I48, I67.6-<br>I67.6, I80-I82,<br>I26-I26 |        |        |              |  |  |
|                 |                                     |             |  |                                   | 50               |   |        |        |              |  |  |
|                 |                                     |             |  |                                   | 100              | I26-I26, I67.6-<br>I67.6, I80-I82             |        |        |              | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |  |
| 1844760         | rivaroksabaan,<br>20mg              | B01AF0<br>1 | RIVAROXABAN<br>STADA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Stada Arzneimittel<br>AG          | 75               | I48-I48, I67.6-<br>I67.6, I80-I82,<br>I26-I26 |        |        |              |  |  |
|                 |                                     |             |  |                                   | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6              |        |        |              | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |  |
|                 |                                     |             |  |                                   | 50               |   |        |        |              |  |  |
| 1850622         | rivaroksabaan,<br>20mg              | B01AF0<br>1 | KARDATUXAN,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK        | Gedeon Richter<br>Plc.            | 100              | I26-I26, I67.6-<br>I67.6, I80-I82             |        |        |              |  | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |
|                 |                                     |             |  |                                   | 50               |   |        |        |              |  |  |
|                 |                                     |             |  |                                   | 75               | I48-I48, I67.6-<br>I67.6, I80-I82,<br>I26-I26 |        |        |              |  |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                      | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                      | Eriala    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla                            | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|--------------------------------------|------------------|---|-----------|--------|--------------|--|----------|
| 1897027         | rivaroksabaan,<br>20mg              | B01AF0<br>1 | RIVAROXABAN<br>VIATRIS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK        | Viartis Limited                      | 50               |   |           |        |              |  |          |
|                 |                                     |             |   |                                      | 100              | I80-I82, I26-I26,<br>I67.6-I67.6              |           |        |              | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |          |
|                 |                                     |             |   |                                      | 75               | I48-I48, I67.6-<br>I67.6, I80-I82,<br>I26-I26 |           |        |              |  |          |
| 1225741         | ropinirool, 2mg                     | N04BC0<br>4 | REQUIP-MODUTAB,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 28TK  | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited | 100              | G20-G20                                       | Neuroloog | esmane |              |  |          |
|                 |                                     |             |   |                                      | 50               |   |           |        |              |  |          |
| 1436598         | ropinirool, 2mg                     | N04BC0<br>4 | ROLPRYNA SR 2MG,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 28TK | KRKA, d.d., Novo<br>mesto            | 50               |   |           |        |              |  |          |
|                 |                                     |             |   |                                      | 100              | G20-G20                                       | Neuroloog | esmane |              |  |          |
| 1225796         | ropinirool, 4mg                     | N04BC0<br>4 | REQUIP-MODUTAB,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 28TK  | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited | 50               |   |           |        |              |  |          |
|                 |                                     |             |   |                                      | 100              | G20-G20                                       | Neuroloog | esmane |              |  |          |
| 1436633         | ropinirool, 4mg                     | N04BC0<br>4 | ROLPRYNA SR 4MG,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 28TK | KRKA, d.d., Novo<br>mesto            | 100              | G20-G20                                       | Neuroloog | esmane |              |  |          |
|                 |                                     |             |   |                                      | 50               |   |           |        |              |  |          |
| 1225819         | ropinirool, 8mg                     | N04BC0<br>4 | REQUIP-MODUTAB,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 28TK  | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited | 100              | G20-G20                                       | Neuroloog | esmane |              |  |          |
|                 |                                     |             |   |                                      | 50               |   |           |        |              |  |          |
| 1436677         | ropinirool, 8mg                     | N04BC0<br>4 | ROLPRYNA SR 8MG,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 28TK | KRKA, d.d., Novo<br>mesto            | 50               |   |           |        |              |  |          |
|                 |                                     |             |   |                                      | 100              | G20-G20                                       | Neuroloog | esmane |              |  |          |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|-----------------------------------|------------------|--|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1106053         | rosuvastatiin,<br>10mg              | C10AA0<br>7 | CRESTOR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK          | Gruenenthal<br>GmbH               | 50               |  |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                   | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                   | 100              | N18-N18  |        |        |              |               |          |
| 1384758         | rosuvastatiin,<br>10mg              | C10AA0<br>7 | ROXARDIO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK         | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 50               |  |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                   | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                   | 100              | N18-N18  |        |        |              |               |          |
| 1384792         | rosuvastatiin,<br>10mg              | C10AA0<br>7 | ROXARDIO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK         | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                   | 100              | N18-N18  |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                   | 50               |  |        |        |              |               |          |
| 1396874         | rosuvastatiin,<br>10mg              | C10AA0<br>7 | ROSUCARD 10MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Zentiva k.s.                      | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                   | 100              | N18-N18  |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                   | 50               |  |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja         | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|-------------------------|------------------|--|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1396896         | rosuvastatiin,<br>10mg              | C10AA0<br>7 | ROSUCARD 10MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>90TK          | Zentiva k.s.            | 100              | N18-N18  |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                         | 50               |  |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                         | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |              |               |          |
| 1477267         | rosuvastatiin,<br>10mg              | C10AA0<br>7 | ROSUVASTATIN TAD<br>10 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | TAD Pharma<br>GmbH      | 50               |  |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                         | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                         | 100              | N18-N18  |        |        |              |               |          |
| 1477975         | rosuvastatiin,<br>10mg              | C10AA0<br>7 | ROSWERA 10 MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK          | KRKA d.d. Novo<br>mesto | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                         | 50               |  |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                         | 100              | N18-N18  |        |        |              |               |          |
| 1477997         | rosuvastatiin,<br>10mg              | C10AA0<br>7 | ROSWERA 10 MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK          | KRKA d.d. Novo<br>mesto | 50               |  |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                         | 100              | N18-N18  |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                         | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla  | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|---------------------------|------------------|--|--------|--------|--------------|--|--|
| 1587360         | rosuvastatiin,<br>10mg              | C10AA0<br>7 | ROVASYN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK                | Medochemie<br>Limited     | 75               | E78-E78  |        |        |              |  | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0 mmol/l |
|                 |                                     |             |  |                           | 75               | Z95-Z95, I21-<br>I22, I25-I25,<br>Z45-Z45, I63-<br>I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-<br>E14, I65-I66                      |        |        |              |  |  |
|                 |                                     |             |  |                           | 75               | I11-I12  |        |        |              | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni<br>esinemisel |  |
|                 |                                     |             |  |                           | 50               |  |        |        |              |  |  |
|                 |                                     |             |  |                           | 100              | N18-N18  |        |        |              | alates III staadiumist   |  |
| 1654174         | rosuvastatiin,<br>10mg              | C10AA0<br>7 | ROSUVASTATIN<br>ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Accord Healthcare<br>B.V. | 50               |  |        |        |              |  |  |
|                 |                                     |             |  |                           | 100              | N18-N18  |        |        |              |  |  |
|                 |                                     |             |  |                           | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |              |  |  |
| 1654219         | rosuvastatiin,<br>10mg              | C10AA0<br>7 | ROSUVASTATIN<br>ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Accord Healthcare<br>B.V. | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |              |  |  |
|                 |                                     |             |  |                           | 50               |  |        |        |              |  |  |
|                 |                                     |             |  |                           | 100              | N18-N18  |        |        |              |  |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|-----------------------------------|------------------|--|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1684638         | rosuvastatiin,<br>10mg              | C10AA0<br>7 | ROSUVASTATIN TEVA<br>PHARMA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Teva B.V.                         | 50               |  |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                                   | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                                   | 100              | N18-N18  |        |        |              |               |          |
| 1397099         | rosuvastatiin,<br>20mg              | C10AA0<br>7 | ROSUCARD 20MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK            | Zentiva k.s.                      | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                                   | 50               |  |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                                   | 100              | N18-N18  |        |        |              |               |          |
| 1397112         | rosuvastatiin,<br>20mg              | C10AA0<br>7 | ROSUCARD 20MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>90TK            | Zentiva k.s.                      | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                                   | 50               |  |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                                   | 100              | N18-N18  |        |        |              |               |          |
| 1473476         | rosuvastatiin,<br>20mg              | C10AA0<br>7 | ROXARDIO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                    | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 100              | N18-N18  |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                                   | 50               |  |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                                   | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|-----------------------------------|------------------|--|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1473511         | rosuvastatiin,<br>20mg              | C10AA0<br>7 | ROXARDIO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK                  | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 50               |  |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                                   | 100              | N18-N18  |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                                   | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |              |               |          |
| 1477481         | rosuvastatiin,<br>20mg              | C10AA0<br>7 | ROSUVASTATIN TAD<br>20 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | TAD Pharma<br>GmbH                | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                                   | 50               |  |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                                   | 100              | N18-N18  |        |        |              |               |          |
| 1478190         | rosuvastatiin,<br>20mg              | C10AA0<br>7 | ROSWERA 20 MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK          | KRKA d.d. Novo<br>mesto           | 50               |  |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                                   | 100              | N18-N18  |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                                   | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |              |               |          |
| 1478213         | rosuvastatiin,<br>20mg              | C10AA0<br>7 | ROSWERA 20 MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK          | KRKA d.d. Novo<br>mesto           | 50               |  |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                                   | 100              | N18-N18  |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                                   | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|---------------------------|------------------|--|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1587517         | rosuvastatiin,<br>20mg              | C10AA0<br>7 | ROVASYN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK                     | Medochemie<br>Limited     | 100              | N18-N18  |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                           | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                           | 50               |  |        |        |              |               |          |
| 1654321         | rosuvastatiin,<br>20mg              | C10AA0<br>7 | ROSUVASTATIN<br>ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK      | Accord Healthcare<br>B.V. | 100              | N18-N18  |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                           | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                           | 50               |  |        |        |              |               |          |
| 1654365         | rosuvastatiin,<br>20mg              | C10AA0<br>7 | ROSUVASTATIN<br>ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK      | Accord Healthcare<br>B.V. | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                           | 50               |  |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                           | 100              | N18-N18  |        |        |              |               |          |
| 1684773         | rosuvastatiin,<br>20mg              | C10AA0<br>7 | ROSUVASTATIN TEVA<br>PHARMA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Teva B.V.                 | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                           | 50               |  |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                           | 100              | N18-N18  |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|---------------------------|------------------|--|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1890963         | rosuvastatiin,<br>20mg              | C10AA0<br>7 | CRESTOR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                | Ideal Trade Links<br>UAB  | 75               | I63-I63, I25-I25,<br>I70.2-I70.2, I11-<br>I12, E10-E11,<br>I65-I66, I21-I22,<br>Z95-Z95, E13-<br>E14, Z45-Z45              |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 100              | N18-N18  |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 50               |  |        |        |              |               |          |
| 1477863         | rosuvastatiin, 5mg                  | C10AA0<br>7 | ROSWERA 5 MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK        | KRKA d.d. Novo<br>mesto   | 50               |  |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 100              | N18-N18  |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |              |               |          |
| 1653993         | rosuvastatiin, 5mg                  | C10AA0<br>7 | ROSUVASTATIN<br>ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Accord Healthcare<br>B.V. | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 50               |  |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 100              | N18-N18  |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus    | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                   | Müügiloa hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla   | Märkused   |
|-----------------|--|-------------|---|--------------------------------|------------------|---|--------|--------|--------------|---|--|
| 1620964         | rosuvastatiin+eseti<br>miib, 10mg+10mg | C10BA0<br>6 | DELIPID PLUS,<br>kõvakapsel, 30TK                       | Egis<br>Pharmaceuticals<br>PLC | 75               | I11-I12   |        |        |              |   | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust      |
|                 |  |             |   |                                | 100              | N18-N18   |        |        |              |   | patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust |
|                 |  |             |   |                                | 75               | I70.2-I70.2, Z45-<br>Z45, I25-I25,<br>I21-I22, I63-I63,<br>I65-I66, Z95-Z95 |        |        |              |   |  |
|                 |  |             |   |                                | 50               |   |        |        |              |   |  |
|                 |  |             |   |                                | 75               | E10-E11, E13-<br>E14  |        |        |              | kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust |  |
| 1757921         | rosuvastatiin+eseti<br>miib, 10mg+10mg | C10BA0<br>6 | ROSAZIMIB, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | KRKA d.d. Novo<br>mesto        | 100              | N18-N18   |        |        |              |   | patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust |
|                 |  |             |   |                                | 75               | I11-I12   |        |        |              |   | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust      |
|                 |  |             |   |                                | 75               | I70.2-I70.2, Z45-<br>Z45, I25-I25,<br>I21-I22, I63-I63,<br>I65-I66, Z95-Z95 |        |        |              |   |  |
|                 |  |             |   |                                | 50               |   |        |        |              |   |  |
|                 |  |             |   |                                | 75               | E10-E11, E13-<br>E14  |        |        |              | kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust |  |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus    | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |
|-----------------|--|-------------|---|--------------------------|------------------|---|--------|--------|--------------|---------------|--|
| 1789870         | rosuvastatiin+eseti<br>miib, 10mg+10mg | C10BA0<br>6 | ROZESTA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Zentiva k.s.             | 75               | I70.2-I70.2, Z45-<br>Z45, I25-I25,<br>I21-I22, I63-I63,<br>I65-I66, Z95-Z95 |        |        |              |               |  |
|                 |  |             |   |                          | 100              | N18-N18   |        |        |              |               | patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust |
|                 |  |             |   |                          | 75               | I11-I12   |        |        |              |               | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust      |
|                 |  |             |   |                          | 75               | E10-E11, E13-<br>E14  |        |        |              |               | kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust  |
|                 |  |             |   |                          | 50               |   |        |        |              |               |  |
| 1879735         | rosuvastatiin+eseti<br>miib, 10mg+10mg | C10BA0<br>6 | DELIPID PLUS,<br>kõvakapsel, 30TK                     | Ideal Trade Links<br>UAB | 50               |   |        |        |              |               |  |
|                 |  |             |   |                          | 75               | I70.2-I70.2, Z45-<br>Z45, I25-I25,<br>I21-I22, I63-I63,<br>I65-I66, Z95-Z95 |        |        |              |               |  |
|                 |  |             |   |                          | 75               | I11-I12   |        |        |              |               | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust      |
|                 |  |             |   |                          | 100              | N18-N18   |        |        |              |               | patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust |
|                 |  |             |   |                          | 75               | E10-E11, E13-<br>E14  |        |        |              |               | kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus    | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla  | Märkused  |
|-----------------|--|-------------|--|--------------------------------|------------------|---|--------|--------|--------------|--|---|
| 1885428         | rosuvastatiin+eseti<br>miib, 10mg+10mg | C10BA0<br>6 | ROSUVASTATIN/<br>EZETIMIBE TEVA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Teva B.V.                      | 50               |   |        |        |              |  |   |
|                 |  |             |  |                                | 75               | E13-E14, E10-<br>E11  |        |        |              | kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust  |   |
|                 |  |             |  |                                | 75               | I70.2-I70.2, Z45-<br>Z45, I25-I25,<br>I21-I22, I63-I63,<br>I65-I66, Z95-Z95 |        |        |              |  |   |
|                 |  |             |  |                                | 100              | N18-N18   |        |        |              | patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust |   |
|                 |  |             |  |                                | 75               | I11-I12   |        |        |              | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust      |   |
| 1621044         | rosuvastatiin+eseti<br>miib, 20mg+10mg | C10BA0<br>6 | DELIPID PLUS,<br>kõvakapsel, 30TK  | Egis<br>Pharmaceuticals<br>PLC | 75               | E13-E14, E10-<br>E11  |        |        |              |  | kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust |
|                 |  |             |  |                                | 50               |   |        |        |              |  |   |
|                 |  |             |  |                                | 75               | I11-I12   |        |        |              | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust      |   |
|                 |  |             |  |                                | 100              | N18-N18   |        |        |              | patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust |   |
|                 |  |             |  |                                | 75               | I70.2-I70.2, Z45-<br>Z45, I25-I25,<br>I21-I22, I63-I63,<br>I65-I66, Z95-Z95 |        |        |              |  |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus    | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                   | Müügiloa hoidja         | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla   | Märkused  |
|-----------------|--|-------------|---|-------------------------|------------------|---|--------|--------|--------------|---|---|
| 1758102         | rosuvastatiin+eseti<br>miib, 20mg+10mg | C10BA0<br>6 | ROSAZIMIB, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | KRKA d.d. Novo<br>mesto | 75               | E10-E11, E13-<br>E14  |        |        |              |   | kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse<br>kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust |
|                 |  |             |   |                         | 75               | I70.2-I70.2, Z45-<br>Z45, I25-I25,<br>I21-I22, I63-I63,<br>I65-I66, Z95-Z95 |        |        |              |   |   |
|                 |  |             |   |                         | 75               | I11-I12   |        |        |              | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni<br>esinemisel kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse<br>annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust      |   |
|                 |  |             |   |                         | 50               |   |        |        |              |   |   |
|                 |  |             |   |                         | 100              | N18-N18   |        |        |              | patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III<br>staadiumist ja vaatamata rosuvastatiini optimaalse<br>annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust |   |
| 1789926         | rosuvastatiin+eseti<br>miib, 20mg+10mg | C10BA0<br>6 | ROZESTA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK   | Zentiva k.s.            | 75               | E10-E11, E13-<br>E14  |        |        |              |   | kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse<br>kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust |
|                 |  |             |   |                         | 100              | N18-N18   |        |        |              | patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III<br>staadiumist ja vaatamata rosuvastatiini optimaalse<br>annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust |   |
|                 |  |             |   |                         | 75               | I11-I12   |        |        |              | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni<br>esinemisel kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse<br>annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust      |   |
|                 |  |             |   |                         | 50               |   |        |        |              |   |   |
|                 |  |             |   |                         | 75               | I70.2-I70.2, Z45-<br>Z45, I25-I25,<br>I21-I22, I63-I63,<br>I65-I66, Z95-Z95 |        |        |              |   |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus    | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle   | Vanus<br>alla  | Märkused |
|-----------------|--|-------------|--|--------------------------|------------------|---|--------|--------|--|--|----------|
| 1879803         | rosuvastatiin+eseti<br>miib, 20mg+10mg | C10BA0<br>6 | DELIPID PLUS,<br>kõvakapsel, 30TK  | Ideal Trade Links<br>UAB | 50               |   |        |        |  |  |          |
|                 |  |             |  |                          | 75               | I70.2-I70.2, Z45-<br>Z45, I25-I25,<br>I21-I22, I63-I63,<br>I65-I66, Z95-Z95 |        |        |  |  |          |
|                 |  |             |  |                          | 100              | N18-N18   |        |        |  | patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust |          |
|                 |  |             |  |                          | 75               | E10-E11, E13-<br>E14  |        |        | kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust  |  |          |
|                 |  |             |  |                          | 75               | I11-I12   |        |        | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust      |  |          |
| 1885462         | rosuvastatiin+eseti<br>miib, 20mg+10mg | C10BA0<br>6 | ROSUVASTATIN/<br>EZETIMIBE TEVA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Teva B.V.                | 75               | I70.2-I70.2, Z45-<br>Z45, I25-I25,<br>I21-I22, I63-I63,<br>I65-I66, Z95-Z95 |        |        |  |  |          |
|                 |  |             |  |                          | 75               | E13-E14, E10-<br>E11  |        |        | kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust  |  |          |
|                 |  |             |  |                          | 50               |   |        |        |  |  |          |
|                 |  |             |  |                          | 75               | I11-I12   |        |        | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust      |  |          |
|                 |  |             |  |                          | 100              | N18-N18   |        |        | patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust |  |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus    | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus             | Müügiloa hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla  | Märkused   |
|-----------------|--|-------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------|---|--------|--------|--------------|--|--|
| 1888386         | rosuvastatiin+eseti<br>miib, 20mg+10mg | C10BA0<br>6 | DELIPID PLUS,<br>kõvakapsel, 30TK | Lex Ano UAB                    | 100              | N18-N18   |        |        |              |  | patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust |
|                 |  |             |                                   |                                | 75               | E13-E14, E10-E11  |        |        |              | kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust  |  |
|                 |  |             |                                   |                                | 75               | I11-I12   |        |        |              | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust      |  |
|                 |  |             |                                   |                                | 50               |   |        |        |              |  |  |
|                 |  |             |                                   |                                | 75               | I70.2-I70.2, Z45-Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95 |        |        |              |  |  |
| 1621112         | rosuvastatiin+eseti<br>miib, 40mg+10mg | C10BA0<br>6 | DELIPID PLUS,<br>kõvakapsel, 30TK | Egis<br>Pharmaceuticals<br>PLC | 50               |   |        |        |              |  |  |
|                 |  |             |                                   |                                | 75               | I70.2-I70.2, Z45-Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95 |        |        |              |  |  |
|                 |  |             |                                   |                                | 100              | N18-N18   |        |        |              | patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust |  |
|                 |  |             |                                   |                                | 75               | E13-E14, E10-E11  |        |        |              | kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust  |  |
|                 |  |             |                                   |                                | 75               | I11-I12   |        |        |              | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust      |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                               | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                   | Müügiloa hoidja         | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla  | Märkused   |
|-----------------|---|-------------|---|-------------------------|------------------|---|--------|--------|--------------|--|--|
| 1758191         | rosuvastatiin+eseti<br>miib, 40mg+10mg                            | C10BA0<br>6 | ROSAZIMIB, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | KRKA d.d. Novo<br>mesto | 100              | N18-N18   |        |        |              |  | patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust |
|                 |   |             |   |                         | 75               | I11-I12   |        |        |              | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust      |  |
|                 |   |             |   |                         | 75               | E10-E11, E13-<br>E14  |        |        |              | kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust  |  |
|                 |   |             |   |                         | 50               |   |        |        |              |  |  |
|                 |   |             |   |                         | 75               | I70.2-I70.2, Z45-<br>Z45, I25-I25,<br>I21-I22, I63-I63,<br>I65-I66, Z95-Z95 |        |        |              |  |  |
| 1789959         | rosuvastatiin+eseti<br>miib, 40mg+10mg                            | C10BA0<br>6 | ROZESTA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK   | Zentiva k.s.            | 50               |   |        |        |              |  |  |
|                 |   |             |   |                         | 75               | I70.2-I70.2, Z45-<br>Z45, I25-I25,<br>I21-I22, I63-I63,<br>I65-I66, Z95-Z95 |        |        |              |  |  |
|                 |   |             |   |                         | 75               | E10-E11, E13-<br>E14  |        |        |              | kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust  |  |
|                 |   |             |   |                         | 75               | I11-I12   |        |        |              | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust      |  |
|                 |   |             |   |                         | 100              | N18-N18   |        |        |              | patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust |  |
| 1731136         | rosuvastatiin+perin<br>dopriil+indapamiid,<br>10mg+4mg+1,25m<br>g | C10BX1<br>3 | ROXIPER, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK   | KRKA d.d. Novo<br>mesto | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13  |        |        |              |  | kui samaaegselt on täidetud rosuvastatiini kõrgema soodusmääraga (75% või 100%) väljakirjutamise tingimused  |
|                 |   |             |   |                         | 50               |   |        |        |              |  |  |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus                          | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                           | Müügiloa hoidja            | Soodus-tus % | Diagnoos                  | Eriala               | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused  |
|-------------|--|----------|---|----------------------------|--------------|---------------------------|----------------------|--------|-----------|---|---|
| 1731259     | rosuvastatiin+perindopriil+indapamiid, 10mg+8mg+2,5mg  | C10BX13  | ROXIPER, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | KRKA d.d. Novo mesto       | 75           | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |                      |        |           |   | kui samaaegselt on täidetud rosuvastatiini kõrgema soodusmääraga (75% või 100%) väljakirjutamise tingimused   |
|             |  |          |   |                            | 50           |                           |                      |        |           |   |   |
| 1731192     | rosuvastatiin+perindopriil+indapamiid, 20mg+4mg+1,25mg | C10BX13  | ROXIPER, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | KRKA d.d. Novo mesto       | 50           |                           |                      |        |           |   |   |
|             |  |          |   |                            | 75           | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |                      |        |           | kui samaaegselt on täidetud rosuvastatiini kõrgema soodusmääraga (75% või 100%) väljakirjutamise tingimused |   |
| 1731316     | rosuvastatiin+perindopriil+indapamiid, 20mg+8mg+2,5mg  | C10BX13  | ROXIPER, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | KRKA d.d. Novo mesto       | 75           | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |                      |        |           |   | kui samaaegselt on täidetud rosuvastatiini kõrgema soodusmääraga (75% või 100%) väljakirjutamise tingimused   |
|             |  |          |   |                            | 50           |                           |                      |        |           |   |   |
| 1666021     | ruksolitiiniib, 10mg                                   | L01EJ01  | JAKAVI, tablett, 56TK                           | Novartis Europharm Limited | 100          | D45-D45                   | Hematoloog, Onkoloog | esmane |           |   | täiskasvanud patsientidele, kes on resistentsed või ei talu hüdroksüureat   |
| 1632901     | ruksolitiiniib, 15mg                                   | L01EJ01  | JAKAVI, tablett, 56TK                           | Novartis Europharm Limited | 100          | D47.1-D47.1               | Hematoloog           |        |           |   | konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) otsuse alusel primaarse või sekundaarse müelofibroosi raviks keskmise-2 või kõrge riskiga (IPSS>=2) patsientidele, kellel eelnev ravi hüdroksüureaga (annuses vähemalt 2 g päevas vähemalt 3 kuu jooksul) on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks |
| 1632934     | ruksolitiiniib, 20mg                                   | L01EJ01  | JAKAVI, tablett, 56TK                           | Novartis Europharm Limited | 100          | D47.1-D47.1               | Hematoloog           |        |           |   | konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) otsuse alusel primaarse või sekundaarse müelofibroosi raviks keskmise-2 või kõrge riskiga (IPSS>=2) patsientidele, kellel eelnev ravi hüdroksüureaga (annuses vähemalt 2 g päevas vähemalt 3 kuu jooksul) on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                    | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                      | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala                  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla   | Märkused  |
|-----------------|--|-------------|---|--------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|--------|--------------|---|---|
| 1632877         | ruksolitiiniib, 5mg                                    | L01EJ01     | JAKAVI, tablett, 56TK   | Novartis<br>Europharm<br>Limited     | 100              | D45-D45              | Onkoloog,<br>Hematoloog | esmane |              |   | täiskasvanud patsientidele, kes on resistentsed või ei talu hüdroksüureat |
|                 |  |             |   |                                      | 100              | D47.1-D47.1          | Hematoloog              |        |              | konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) otsuse alusel primaarse või sekundaarse müelofibroosi raviks keskmise-2 või kõrge riskiga (IPSS>=2) patsientidele, kellel eelnev ravi hüdroksüureaga (annuses vähemalt 2 g päevas vähemalt 3 kuu jooksul) on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks |   |
| 1725522         | saksagliptiin+dapa<br>glifloosin,<br>5mg+10mg          | A10BD2<br>1 | QTERN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                         | Astrazeneca AB                       | 75               | E11-E11, E14-<br>E14 |                         |        |              |   |   |
|                 |  |             |   |                                      | 50               |                      |                         |        |              |   |   |
| 1031308         | salbutamool,<br>200mcg 1annus                          | R03AC0<br>2 | VENTOLIN DISKUS,<br>inhalatsioonipulber,<br>60annus 1TK                     | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited | 75               | J45-J45              |                         |        |              |   |   |
|                 |  |             |   |                                      | 50               |                      |                         |        |              |   |   |
|                 |  |             |   |                                      | 75               | J44-J44, J43-<br>J43 | Pulmonoloog             | esmane |              |   |   |
| 1004319         | salbutamool,<br>400mcg 1ml                             | R03CC0<br>2 | VENTOLIN SYRUP,<br>siirup, 150ml 1TK  | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited | 75               | J44-J44, J43-<br>J43 | Pulmonoloog             | esmane |              |   |   |
|                 |  |             |   |                                      | 50               |                      |                         |        |              |   |   |
|                 |  |             |   |                                      | 75               | J45-J45              |                         |        |              |   |   |
| 1004948         | salbutamool,<br>5000mcg 1ml                            | R03AC0<br>2 | VENTOLIN,<br>nebuliseeritav lahus,<br>20ml 1TK                              | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited | 75               | J44-J44, J43-<br>J43 | Pulmonoloog             | esmane |              |   |   |
|                 |  |             |   |                                      | 50               |                      |                         |        |              |   |   |
|                 |  |             |   |                                      | 75               | J45-J45              |                         |        |              |   |   |
| 1007907         | salmeterool,<br>50mcg 1annus                           | R03AC1<br>2 | SEREVENT DISKUS 50<br>MCG,<br>inhalatsioonipulber,<br>60annus 1TK           | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited | 50               |                      |                         |        |              |   |   |
|                 |  |             |   |                                      | 75               | J45-J45              |                         |        |              |   |   |
|                 |  |             |   |                                      | 75               | J43-J44              | Pulmonoloog             | esmane |              |   |   |
| 1717219         | salmeterool+flutika<br>soon,<br>25mcg+125mcg           | R03AK0<br>6 | SERKEP,<br>inhalatsiooniaerosool,<br>suspensioon, 120annus<br>1TK           | Viatriis Limited                     | 75               | J45-J45              |                         |        |              |   |   |
|                 |  |             |   |                                      | 50               |                      |                         |        |              |   |   |
| 1107346         | salmeterool+flutika<br>soon,<br>25mcg+125mcg<br>1annus | R03AK0<br>6 | SERETIDE INHALER,<br>inhalatsiooniaerosool,<br>suspensioon, 120annus<br>1TK | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited | 75               | J45-J45              |                         |        |              |   |   |
|                 |  |             |   |                                      | 50               |                      |                         |        |              |   |   |



| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus                     | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                   | Soodus-tus % | Diagnoos | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-------------|---|----------|--|-----------------------------------|--------------|----------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1717220     | salmeterool+flutika soon, 25mcg+250mcg            | R03AK06  | SERKEP, inhalatsiooniaerosool, suspensioon, 120annus 1TK           | Viatris Limited                   | 75           | J45-J45  |             |        |           |            |   |
|             |   |          |  |                                   | 50           |          |             |        |           |            |   |
| 1107357     | salmeterool+flutika soon, 25mcg+250mcg 1annus     | R03AK06  | SERETIDE INHALER, inhalatsiooniaerosool, suspensioon, 120annus 1TK | GlaxoSmithKline (Ireland) Limited | 50           |          |             |        |           |            |   |
|             |   |          |  |                                   | 75           | J45-J45  |             |        |           |            |   |
| 1107335     | salmeterool+flutika soon, 25mcg+50mcg 1annus      | R03AK06  | SERETIDE INHALER, inhalatsiooniaerosool, suspensioon, 120annus 1TK | GlaxoSmithKline (Ireland) Limited | 75           | J45-J45  |             |        |           |            |   |
|             |   |          |  |                                   | 50           |          |             |        |           |            |   |
| 1037607     | salmeterool+flutika soon, 50mcg+100mcg 1annus     | R03AK06  | SERETIDE DISKUS 100, annustatud inhalatsioonipulber, 60annus 1TK   | GlaxoSmithKline (Ireland) Limited | 75           | J45-J45  |             |        |           |            |   |
|             |   |          |  |                                   | 50           |          |             |        |           |            |   |
| 1636466     | salmeterool+flutika soon, 50mcg+250mcg            | R03AK06  | AIRFLUSAL FORSPIRO, annustatud inhalatsioonipulber, 60annus 1TK    | Sandoz Pharmaceuticals d.d.       | 75           | J45-J45  |             |        |           |            |   |
|             |   |          |  |                                   | 50           |          |             |        |           |            |   |
| 1037595     | salmeterool+flutika soon, 50mcg+250mcg 1annus     | R03AK06  | SERETIDE DISKUS 250, annustatud inhalatsioonipulber, 60annus 1TK   | GlaxoSmithKline (Ireland) Limited | 75           | J45-J45  |             |        |           |            |   |
|             |   |          |  |                                   | 50           |          |             |        |           |            |   |
| 1827514     | salmeterool+flutika soon, 50mcg+250mcg 1mõõtannus | R03AK06  | EVERIO AIRMASTER, annustatud inhalatsioonipulber, 60mõõtannus 1TK  | Zentiva k.s.                      | 75           | J45-J45  |             |        |           |            |   |
|             |   |          |  |                                   | 50           |          |             |        |           |            |   |
| 1636512     | salmeterool+flutika soon, 50mcg+500mcg            | R03AK06  | AIRFLUSAL FORSPIRO, annustatud inhalatsioonipulber, 60annus 1TK    | Sandoz Pharmaceuticals d.d.       | 75           | J43-J44  | Pulmonoloog | esmane |           |            | C-D staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel eosinofiilide arv perifeerses veres on $\geq 100$ rakku/mikroliitris ning kellel on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasid ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga |
|             |   |          |  |                                   | 75           | J45-J45  |             |        |           |            |   |
|             |   |          |  |                                   | 50           |          |             |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                        | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügi-<br>loa hoidja                 | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|--|-------------|--|--------------------------------------|------------------|-------------|-------------|--------|--------------|---------------|---|
| 1153167         | salmeterool+flutika<br>soon,<br>50mcg+500mcg<br>1annus     | R03AK0<br>6 | SERETIDE DISKUS<br>500, annustatud<br>inhalatsioonipulber,<br>60annus 1TK  | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited | 75               | J43-J44     | Pulmonoloog | esmane |              |               | C-D staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel eosinofiilide arv perifeerses veres on $\geq 100$ rakku/mikroliitris ning kellel on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasis ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga       |
|                 |  |             |  |                                      | 75               | J45-J45     |             |        |              |               |   |
|                 |  |             |  |                                      | 50               |             |             |        |              |               |   |
| 1827558         | salmeterool+flutika<br>soon,<br>50mcg+500mcg<br>1mõõtannus | R03AK0<br>6 | EVERIO AIRMASTER,<br>annustatud<br>inhalatsioonipulber,<br>60mõõtannus 1TK | Zentiva k.s.                         | 75               | J43-J44     | Pulmonoloog | esmane |              |               | C-D staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel eosinofiilide arv perifeerses veres on $\geq 100$ rakku/mikroliitris ning kellel on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasis ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga       |
|                 |  |             |  |                                      | 50               |             |             |        |              |               |   |
|                 |  |             |  |                                      | 75               | J45-J45     |             |        |              |               |   |
| 1391789         | sapropteriiin,<br>100mg                                    | A16AX0<br>7 | KUVAN, lahustuv tablett,<br>120TK  | BioMarin<br>International<br>Limited | 100              | E70.0-E70.1 |             |        |              | 18,00         | konsiiliumi (vähemalt 2 pediaatri või meditsiinigeneetiku ühise) otsuse alusel järgmistel tingimustel: tegemist on biopteriinitundliku haigusvormiga ning dieedi järgimine ei ole taganud ravijuhendi kohase vere fenüülalaniini taseme eesmärkväärtuse saavutamist; ravi võib jätkata kuni 12. eluaastani patsiendil, kellel ravimi kasutamisega püsib fenüülalaniini tase eesmärkväärtuste piires |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                        | Müügiloa hoidja                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala                           | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla   | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|----------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|--------|--------------|---|---|
| 1675649         | sekukinumab,<br>150mg 1ml           | L04AC1<br>0 | COSENTYX, süstelahus<br>pen-süstlis, 1ml 1TK | Novartis<br>Europharm<br>Limited | 100              | L40-L40              | Dermatovenerol<br>oog, Pediaater |        |              |   | patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus L40 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud. |
|                 |                                     |             |  |                                  | 100              | M45-M45, M46-<br>M46 | Pediaater,<br>Reumatoloog        |        |              | ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus M45 ja M46 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud. |   |
|                 |                                     |             |  |                                  | 100              | M07.0-M07.3          | Reumatoloog,<br>Pediaater        |        |              | ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus M07.0–3 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud.    |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                        | Müügiloa hoidja                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala                              | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|----------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|--------|--------------|---------------|---|
| 1833960         | sekukinumab,<br>300mg 2ml           | L04AC1<br>0 | COSENTYX, süstelahus<br>pen-süstlis, 2ml 1TK | Novartis<br>Europharm<br>Limited | 100              | M07.0-M07.3          | Reumatoloog,<br>Pediaater           |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus M07.0–3 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud.    |
|                 |                                     |             |  |                                  | 100              | L40-L40              | Pediaater,<br>Dermatovenerol<br>oog |        |              |               | patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus L40 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud.                                 |
|                 |                                     |             |  |                                  | 100              | M45-M45, M46-<br>M46 | Pediaater,<br>Reumatoloog           |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus M45 ja M46 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud. |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla  | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|----------------------------------|------------------|----------------------|--|--------|--------------|--|---|
| 1857034         | sekukinumab,<br>75mg 0.5ml          | L04AC1<br>0 | COSENTYX, süstelahus<br>süstlis, 0.5ml 1TK            | Novartis<br>Europharm<br>Limited | 100              | M45-M45, M46-<br>M46 | Reumatoloog,<br>Pediaater                                |        |              |  | ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus M45 ja M46 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud. |
|                 |                                     |             |   |                                  | 100              | M07.0-M07.3          | Pediaater,<br>Reumatoloog                                |        |              | ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus M07.0–3 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud. |   |
|                 |                                     |             |   |                                  | 100              | L40-L40              | Dermatovenerol<br>oog, Pediaater                         |        |              | patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus L40 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud.                              |   |
| 1719031         | seleksipaag,<br>1000mcg             | B01AC2<br>7 | UPTRAVI, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Janssen - Cilag<br>International | 100              | I27.0-I27.0          | Kardioloog,<br>Pediaater,<br>Reumatoloog,<br>Pulmonoloog |        |              | NYHA III kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni kombineeritud raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui haiguse kontrolli all hoidmiseks ei piisa endoteliinireseptori antagonistist (ERA) ja 5. tüüpi fosfodiesteraasi (PDE5) inhibiitorist  |   |
| 1719042         | seleksipaag,<br>1200mcg             | B01AC2<br>7 | UPTRAVI, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Janssen - Cilag<br>International | 100              | I27.0-I27.0          | Reumatoloog,<br>Kardioloog,<br>Pulmonoloog,<br>Pediaater |        |              | NYHA III kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni kombineeritud raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui haiguse kontrolli all hoidmiseks ei piisa endoteliinireseptori antagonistist (ERA) ja 5. tüüpi fosfodiesteraasi (PDE5) inhibiitorist  |   |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                            | Müügiloa hoidja               | Soodus-tus % | Diagnoos    | Eriala  | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-------------|-------------------------------|----------|--|-------------------------------|--------------|-------------|---|--------|-----------|------------|---|
| 1719053     | seleksipaag, 1400mcg          | B01AC27  | UPTRAVI, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK  | Janssen - Cilag International | 100          | I27.0-I27.0 | Pulmonoloog, Pediaater, Reumatoloog, Kardioloog |        |           |            | NYHA III kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni kombineeritud raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui haiguse kontrolli all hoidmiseks ei piisa endoteliinireseptori antagonistist (ERA) ja 5. tüüpi fosfodiesteraasi (PDE5) inhibiitorist |
| 1719064     | seleksipaag, 1600mcg          | B01AC27  | UPTRAVI, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK  | Janssen - Cilag International | 100          | I27.0-I27.0 | Pulmonoloog, Kardioloog, Reumatoloog, Pediaater |        |           |            | NYHA III kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni kombineeritud raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui haiguse kontrolli all hoidmiseks ei piisa endoteliinireseptori antagonistist (ERA) ja 5. tüüpi fosfodiesteraasi (PDE5) inhibiitorist |
| 1718973     | seleksipaag, 200mcg           | B01AC27  | UPTRAVI, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK  | Janssen - Cilag International | 100          | I27.0-I27.0 | Reumatoloog, Pulmonoloog, Kardioloog, Pediaater |        |           |            | NYHA III kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni kombineeritud raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui haiguse kontrolli all hoidmiseks ei piisa endoteliinireseptori antagonistist (ERA) ja 5. tüüpi fosfodiesteraasi (PDE5) inhibiitorist |
| 1718984     | seleksipaag, 200mcg           | B01AC27  | UPTRAVI, õhukese polümeerikattega tablett, 140TK | Janssen - Cilag International | 100          | I27.0-I27.0 | Pediaater, Reumatoloog, Pulmonoloog, Kardioloog |        |           |            | NYHA III kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni kombineeritud raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui haiguse kontrolli all hoidmiseks ei piisa endoteliinireseptori antagonistist (ERA) ja 5. tüüpi fosfodiesteraasi (PDE5) inhibiitorist |
| 1719008     | seleksipaag, 400mcg           | B01AC27  | UPTRAVI, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK  | Janssen - Cilag International | 100          | I27.0-I27.0 | Pediaater, Pulmonoloog, Kardioloog, Reumatoloog |        |           |            | NYHA III kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni kombineeritud raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui haiguse kontrolli all hoidmiseks ei piisa endoteliinireseptori antagonistist (ERA) ja 5. tüüpi fosfodiesteraasi (PDE5) inhibiitorist |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                           | Müügiloa hoidja               | Soodus-tus % | Diagnoos    | Eriala  | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-------------|-------------------------------|----------|---|-------------------------------|--------------|-------------|---|--------|-----------|------------|---|
| 1719019     | seleksipaag, 600mcg           | B01AC27  | UPTRAVI, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Janssen - Cilag International | 100          | I27.0-I27.0 | Pulmonoloog, Reumatoloog, Kardioloog, Pediaater                     |        |           |            | NYHA III kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni kombineeritud raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui haiguse kontrolli all hoidmiseks ei piisa endoteliinireseptori antagonistist (ERA) ja 5. tüüpi fosfodiesteraasi (PDE5) inhibiitorist |
| 1719020     | seleksipaag, 800mcg           | B01AC27  | UPTRAVI, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Janssen - Cilag International | 100          | I27.0-I27.0 | Pediaater, Pulmonoloog, Kardioloog, Reumatoloog                     |        |           |            | NYHA III kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni kombineeritud raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui haiguse kontrolli all hoidmiseks ei piisa endoteliinireseptori antagonistist (ERA) ja 5. tüüpi fosfodiesteraasi (PDE5) inhibiitorist |
| 1851476     | selumetiniib, 10mg            | L01EE04  | KOSELUGO, kõvakapsel, 60TK                      | Astrazeneca AB                | 100          | Q85.0-Q85.0 | Hematoloog, Pediaater – hematoloog-onkoloog, Neuroloog              |        |           |            | monoteraapiana sümptomaatiliste mitte-opereeritavate pleksiformsete neurofibroomide raviks 3-aastastel ja vanematel lastel, kellel on 1. tüüpi neurofibromatoos   |
| 1851487     | selumetiniib, 25mg            | L01EE04  | KOSELUGO, kõvakapsel, 60TK                      | Astrazeneca AB                | 100          | Q85.0-Q85.0 | Neurokirurg, Neuroloog, Hematoloog, Pediaater – hematoloog-onkoloog |        |           |            | monoteraapiana sümptomaatiliste mitte-opereeritavate pleksiformsete neurofibroomide raviks 3-aastastel ja vanematel lastel, kellel on 1. tüüpi neurofibromatoos   |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                       | Müügiloa hoidja  | Soodus-tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused  |
|-------------|-------------------------------|----------|---|------------------|--------------|------------------|--------|--------|-----------|---|---|
| 1788509     | semaglutiid, 0,25mg 1annus    | A10BJ06  | OZEMPIC, süstelahus pen-süstlis, 4annus 1TK | Novo Nordisk A/S | 75           | E11-E11, E14-E14 |        |        |           |   | II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks rasvumusega patsientidel (KMI $\geq$ 30kg/m <sup>2</sup> ); kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea prepararaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud tingimusel, et eelnev ravi SGLT-2 inhibiitoriga maksimaalses talutavas annuses ei ole andnud rahuldavat efekti või on vastunäidustatud. Patsiendid, kelle ravi semaglutiidiga on alustatud enne 01.01.2023, võivad jätkata ravi tuginedes kuni 31.12.2022 kehtinud rakendustingimustele. |
|             |                               |          |   |                  | 50           | E14-E14, E11-E11 |        |        |           | II tüüpi diabeedi raviks juhul, kui ravi suukaudsete diabeediravimitega ei ole efektiivne või on vastunäidustatud   |   |
| 1788510     | semaglutiid, 0,5mg 1annus     | A10BJ06  | OZEMPIC, süstelahus pen-süstlis, 4annus 1TK | Novo Nordisk A/S | 50           | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |   | II tüüpi diabeedi raviks juhul, kui ravi suukaudsete diabeediravimitega ei ole efektiivne või on vastunäidustatud   |
|             |                               |          |   |                  | 75           | E14-E14, E11-E11 |        |        |           | II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks rasvumusega patsientidel (KMI $\geq$ 30kg/m <sup>2</sup> ); kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea prepararaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud tingimusel, et eelnev ravi SGLT-2 inhibiitoriga maksimaalses talutavas annuses ei ole andnud rahuldavat efekti või on vastunäidustatud. Patsiendid, kelle ravi semaglutiidiga on alustatud enne 01.01.2023, võivad jätkata ravi tuginedes kuni 31.12.2022 kehtinud rakendustingimustele. |   |
| 3082508     | semaglutiid, 1,5mg            | A10BJ06  | RYBELSUS, tablett, 30TK                     | Novo Nordisk A/S | 75           | E11-E11, E14-E14 |        |        |           |   | II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks patsientidel, kellel metformiin ja SGLT-2 inhibiitor ei ole andnud rahuldavat efekti või on vastunäidustatud.   |
|             |                               |          |   |                  | 50           | E11-E11, E14-E14 |        |        |           | kombinatsioonraviks või monoraviks, kui metformiin on vastunäidustatud  |   |
| 1815892     | semaglutiid, 14mg             | A10BJ06  | RYBELSUS, tablett, 30TK                     | Novo Nordisk A/S | 50           | E11-E11, E14-E14 |        |        |           |   | kombinatsioonraviks või monoraviks, kui metformiin on vastunäidustatud  |
|             |                               |          |   |                  | 75           | E11-E11, E14-E14 |        |        |           | II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks patsientidel, kellel metformiin ja SGLT-2 inhibiitor ei ole andnud rahuldavat efekti või on vastunäidustatud.   |   |



| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                             | Müügiloa hoidja  | Soodus-tus % | Diagnoos         | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused  |
|-------------|-------------------------------|----------|---|------------------|--------------|------------------|-------------|--------|-----------|---|---|
| 1788521     | semaglutiid, 1mg<br>1annus    | A10BJ06  | OZEMPIC, süstelahus pen-süstlis, 4annus 1TK       | Novo Nordisk A/S | 50           | E14-E14, E11-E11 |             |        |           |   | II tüüpi diabeedi raviks juhul, kui ravi suukaudsete diabeediravimitega ei ole efektiivne või on vastunäidustatud                                   |
|             |                               |          |   |                  | 75           | E14-E14, E11-E11 |             |        |           | II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks rasvumusega patsientidel (KMI $\geq$ 30kg/m <sup>2</sup> ); kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea prepararaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud tingimusel, et eelnev ravi SGLT-2 inhibiitoriga maksimaalses talutavas annuses ei ole andnud rahuldavat efekti või on vastunäidustatud. Patsiendid, kelle ravi semaglutiidiga on alustatud enne 01.01.2023, võivad jätkata ravi tuginedes kuni 31.12.2022 kehtinud rakendustingimustele. |   |
| 1815825     | semaglutiid, 3mg              | A10BJ06  | RYBELSUS, tablett, 30TK                           | Novo Nordisk A/S | 75           | E14-E14, E11-E11 |             |        |           |   | II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks patsientidel, kellel metformiin ja SGLT-2 inhibiitor ei ole andnud rahuldavat efekti või on vastunäidustatud. |
|             |                               |          |   |                  | 50           | E14-E14, E11-E11 |             |        |           | kombinatsioonraviks või monoraviks, kui metformiin on vastunäidustatud  |   |
| 3082553     | semaglutiid, 4mg              | A10BJ06  | RYBELSUS, tablett, 30TK                           | Novo Nordisk A/S | 50           | E11-E11, E14-E14 |             |        |           |   | kombinatsioonraviks või monoraviks, kui metformiin on vastunäidustatud  |
|             |                               |          |   |                  | 75           | E11-E11, E14-E14 |             |        |           | II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks patsientidel, kellel metformiin ja SGLT-2 inhibiitor ei ole andnud rahuldavat efekti või on vastunäidustatud.   |   |
| 1815869     | semaglutiid, 7mg              | A10BJ06  | RYBELSUS, tablett, 30TK                           | Novo Nordisk A/S | 50           | E14-E14, E11-E11 |             |        |           |   | kombinatsioonraviks või monoraviks, kui metformiin on vastunäidustatud  |
|             |                               |          |   |                  | 75           | E14-E14, E11-E11 |             |        |           | II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks patsientidel, kellel metformiin ja SGLT-2 inhibiitor ei ole andnud rahuldavat efekti või on vastunäidustatud.   |   |
| 3082609     | semaglutiid, 9mg              | A10BJ06  | RYBELSUS, tablett, 30TK                           | Novo Nordisk A/S | 75           | E11-E11, E14-E14 |             |        |           |   | II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks patsientidel, kellel metformiin ja SGLT-2 inhibiitor ei ole andnud rahuldavat efekti või on vastunäidustatud. |
|             |                               |          |   |                  | 50           | E14-E14, E11-E11 |             |        |           | kombinatsioonraviks või monoraviks, kui metformiin on vastunäidustatud  |   |
| 1027066     | sertindool, 12mg              | N05AE03  | SERDOLECT, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | H. Lundbeck A/S  | 50           |                  |             |        |           |   |   |
|             |                               |          |   |                  | 100          | F20-F29          | Psühhiaater |        |           |   | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                    | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|---------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|--------|--------------|---------------|---|
| 1027077         | sertindool, 16mg                    | N05AE0<br>3 | SERDOLECT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK               | H. Lundbeck A/S           | 100              | F20-F29                     | Psühhiaater |        |              |               | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või<br>põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
|                 |                                     |             |   |                           | 50               |                             |             |        |              |               |   |
| 1027088         | sertindool, 20mg                    | N05AE0<br>3 | SERDOLECT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK               | H. Lundbeck A/S           | 50               |                             |             |        |              |               |   |
|                 |                                     |             |   |                           | 100              | F20-F29                     | Psühhiaater |        |              |               | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või<br>põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| 1027055         | sertindool, 4mg                     | N05AE0<br>3 | SERDOLECT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK               | H. Lundbeck A/S           | 50               |                             |             |        |              |               |   |
|                 |                                     |             |   |                           | 100              | F20-F29                     | Psühhiaater |        |              |               | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või<br>põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| 1013746         | sertraliin, 100mg                   | N06AB0<br>6 | ASENTRA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                 | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |   |
|                 |                                     |             |   |                           | 50               |                             |             |        |              |               |   |
| 1160615         | sertraliin, 100mg                   | N06AB0<br>6 | SERTRALINE<br>LANNACHER, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | G.L. Pharma<br>GmbH       | 50               |                             |             |        |              |               |   |
|                 |                                     |             |   |                           | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |   |
| 1669989         | sertraliin, 100mg                   | N06AB0<br>6 | SERTRALINE<br>ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK    | Accord Healthcare<br>B.V. | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |   |
|                 |                                     |             |   |                           | 50               |                             |             |        |              |               |   |
| 1897612         | sertraliin, 100mg                   | N06AB0<br>6 | ASENTRA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                 | Ideal Trade Links<br>UAB  | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |   |
|                 |                                     |             |   |                           | 50               |                             |             |        |              |               |   |
| 1008638         | sertraliin, 50mg                    | N06AB0<br>6 | ZOLOFT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                  | Upjohn EESV               | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |   |
|                 |                                     |             |   |                           | 50               |                             |             |        |              |               |   |
| 1143100         | sertraliin, 50mg                    | N06AB0<br>6 | ASENTRA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                 | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 50               |                             |             |        |              |               |   |
|                 |                                     |             |   |                           | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |   |
| 1160569         | sertraliin, 50mg                    | N06AB0<br>6 | SERTRALINE<br>LANNACHER, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | G.L. Pharma<br>GmbH       | 50               |                             |             |        |              |               |   |
|                 |                                     |             |   |                           | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |   |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja        | Soodus-tus % | Diagnoos                 | Eriala  | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-------------|-------------------------------|----------|--|------------------------|--------------|--------------------------|---|--------|-----------|------------|---|
| 1239218     | sertraliin, 50mg              | N06AB06  | SERTRALINE-TEVA 50 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK  | Teva Pharma B.V.       | 100          | F33.2-F33.3, F32.2-F32.3 | Psühhiaater                                     | esmane |           |            |   |
|             |                               |          |  |                        | 50           |                          |   |        |           |            |   |
| 1669888     | sertraliin, 50mg              | N06AB06  | SERTRALINE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK      | Accord Healthcare B.V. | 50           |                          |   |        |           |            |   |
|             |                               |          |  |                        | 100          | F33.2-F33.3, F32.2-F32.3 | Psühhiaater                                     | esmane |           |            |   |
| 1831968     | sertraliin, 50mg              | N06AB06  | ZOLOFT, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK                 | Lex Ano UAB            | 100          | F33.2-F33.3, F32.2-F32.3 | Psühhiaater                                     | esmane |           |            |   |
|             |                               |          |  |                        | 50           |                          |   |        |           |            |   |
| 1484984     | sevelameer, 800mg             | V03AE02  | SEVELAMER AUXILIA, õhukese polümeerikattega tablett, 180TK     | Auxilia Pharma OÜ      | 100          | N18-N18                  | Pediaater, Nefroloog                            |        |           |            | juhul, kui kaltsiumipõhine fosforisiduja on vastunäidustatud (seerumi kaltsiumisisaldus >2,54 mmol/l)   |
|             |                               |          |  |                        | 50           |                          |   |        |           |            |   |
| 1221039     | sildenafil, 20mg              | G04BE03  | REVATIO, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK                | Upjohn EESV            | 50           | I27.0-I27.0              | Pulmonoloog, Kardioloog, Reumatoloog, Pediaater |        |           |            |   |
|             |                               |          |  |                        | 100          | I27.0-I27.0              | Pediaater, Pulmonoloog, Reumatoloog, Kardioloog |        |           |            | NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel |
| 1702987     | sildenafil, 20mg              | G04BE03  | SILDENAFIL TEVA PHARMA, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK | Teva Pharma B.V.       | 50           | I27.0-I27.0              | Pediaater, Reumatoloog, Kardioloog, Pulmonoloog |        |           |            |   |
|             |                               |          |  |                        | 100          | I27.0-I27.0              | Kardioloog, Pediaater, Reumatoloog, Pulmonoloog |        |           |            | NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                   | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|-----------------------------|------------------|--|--|--------|--------------|---------------|---|
| 1734117         | sildenafil, 20mg                    | G04BE0<br>3 | GRANPIDAM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>90TK | Accord Healthcare<br>S.L.U. | 100              | I27.0-I27.0  | Pulmonoloog,<br>Reumatoloog,<br>Pediaater,<br>Kardioloog |        |              |               | NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse<br>sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega<br>seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks<br>patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala<br>spetsialisti) otsuse alusel |
|                 |                                     |             |   |                             | 50               | I27.0-I27.0  | Pulmonoloog,<br>Reumatoloog,<br>Pediaater,<br>Kardioloog |        |              |               |   |
| 1755378         | sildenafil, 20mg                    | G04BE0<br>3 | SILUNGO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>90TK   | Noramedia UAB               | 50               | I27.0-I27.0  | Reumatoloog,<br>Kardioloog,<br>Pulmonoloog,<br>Pediaater |        |              |               |   |
|                 |                                     |             |   |                             | 100              | I27.0-I27.0  | Pulmonoloog,<br>Kardioloog,<br>Pediaater,<br>Reumatoloog |        |              |               | NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse<br>sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega<br>seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks<br>patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala<br>spetsialisti) otsuse alusel |
| 1080166         | simvastatiin, 10mg                  | C10AA0<br>1 | SIMVACOR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK  | Hexal AG                    | 100              | N18-N18  |  |        |              |               |   |
|                 |                                     |             |   |                             | 50               |  |  |        |              |               |   |
|                 |                                     |             |   |                             | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |  |        |              |               |   |
| 1594447         | simvastatiin, 10mg                  | C10AA0<br>1 | VASILIP, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK   | KRKA d.d. Novo<br>mesto     | 100              | N18-N18  |  |        |              |               |   |
|                 |                                     |             |   |                             | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |  |        |              |               |   |
|                 |                                     |             |   |                             | 50               |  |  |        |              |               |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja         | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|-------------------------|------------------|--|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1010260         | simvastatiin, 20mg                  | C10AA0<br>1 | VASILIP, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                    | KRKA d.d. Novo<br>mesto | 100              | N18-N18  |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                         | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                         | 50               |  |        |        |              |               |          |
| 1080177         | simvastatiin, 20mg                  | C10AA0<br>1 | SIMVACOR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                   | Hexal AG                | 50               |  |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                         | 100              | N18-N18  |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                         | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |              |               |          |
| 1083956         | simvastatiin, 20mg                  | C10AA0<br>1 | SIMVASTATIN-<br>RATIOPHARM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Ratiopharm GmbH         | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                         | 100              | N18-N18  |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                         | 50               |  |        |        |              |               |          |
| 1594458         | simvastatiin, 20mg                  | C10AA0<br>1 | VASILIP, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK                    | KRKA d.d. Novo<br>mesto | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                         | 50               |  |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                         | 100              | N18-N18  |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja         | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|-------------------------|------------------|--|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1621493         | simvastatiin, 20mg                  | C10AA0<br>1 | SIMVACOR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK                  | Hexal AG                | 50               |  |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                         | 100              | N18-N18  |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                         | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |              |               |          |
| 1083978         | simvastatiin, 40mg                  | C10AA0<br>1 | SIMVASTATIN-<br>RATIOPHARM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Ratiopharm GmbH         | 50               |  |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                         | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                         | 100              | N18-N18  |        |        |              |               |          |
| 1129700         | simvastatiin, 40mg                  | C10AA0<br>1 | SIMVACOR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                   | Hexal AG                | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                         | 50               |  |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                         | 100              | N18-N18  |        |        |              |               |          |
| 1594469         | simvastatiin, 40mg                  | C10AA0<br>1 | VASILIP, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK                    | KRKA d.d. Novo<br>mesto | 100              | N18-N18  |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                         | 50               |  |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                         | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|-----------------------------------|------------------|----------------------|-------------|--------|--------------|---------------|--|
| 1809873         | siponimood,<br>0,25mg               | L04AE0<br>3 | MAYZENT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>12TK               | Novartis<br>Europharm<br>Limited  | 100              | G35-G35              | Neuroloog   | esmane |              |               | konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel<br>sekundaarse progresseeruva hulgiskleroosi aktiivse<br>vormi, mida kinnitavad ägenemiste esinemise või<br>piltidiagnostikal ilmnev põletikuline aktiivsus, raviks<br>täiskasvanud patsientidele |
| 1875810         | siponimood, 1mg                     | L04AE0<br>3 | MAYZENT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK               | Novartis<br>Europharm<br>Limited  | 100              | G35-G35              | Neuroloog   | esmane |              |               | konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel<br>sekundaarse progresseeruva hulgiskleroosi aktiivse<br>vormi, mida kinnitavad ägenemiste esinemise või<br>piltidiagnostikal ilmnev põletikuline aktiivsus, raviks<br>täiskasvanud patsientidele |
| 1809895         | siponimood, 2mg                     | L04AE0<br>3 | MAYZENT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK               | Novartis<br>Europharm<br>Limited  | 100              | G35-G35              | Neuroloog   | esmane |              |               | konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel<br>sekundaarse progresseeruva hulgiskleroosi aktiivse<br>vormi, mida kinnitavad ägenemiste esinemise või<br>piltidiagnostikal ilmnev põletikuline aktiivsus, raviks<br>täiskasvanud patsientidele |
| 1107739         | siroliimus, 1mg                     | L04AH0<br>1 | RAPAMUNE, kaetud<br>tablett, 30TK                                   | Pfizer Europe MA<br>EEIG          | 100              | D18.1-D18.1          | Pulmonoloog |        |              |               | lümfangioleiomüomatoosi näidustusel  |
|                 |                                     |             |   |                                   | 100              | Z94-Z94, T86-<br>T86 |             |        |              |               |  |
| 1286568         | sitagliptiin, 100mg                 | A10BH0<br>1 | JANUVIA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK               | Merck Sharp &<br>Dohme B.V.       | 75               | E14-E14, E11-<br>E11 |             |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |   |                                   | 50               |                      |             |        |              |               |  |
| 1680869         | sitagliptiin, 100mg                 | A10BH0<br>1 | SITAGLIPTIN TEVA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK   | Teva B.V.                         | 75               | E14-E14, E11-<br>E11 |             |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |   |                                   | 50               |                      |             |        |              |               |  |
| 1817603         | sitagliptiin, 100mg                 | A10BH0<br>1 | JUZINA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                | Gedeon Richter<br>Plc.            | 75               | E11-E11, E14-<br>E14 |             |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |   |                                   | 50               |                      |             |        |              |               |  |
| 1820753         | sitagliptiin, 100mg                 | A10BH0<br>1 | JAZETA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                | Zentiva k.s.                      | 50               |                      |             |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |   |                                   | 75               | E14-E14, E11-<br>E11 |             |        |              |               |  |
| 1829707         | sitagliptiin, 100mg                 | A10BH0<br>1 | SITAGLIPTIN SANDOZ,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 75               | E11-E11, E14-<br>E14 |             |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |   |                                   | 50               |                      |             |        |              |               |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus           | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                                 | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala                             | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |
|-----------------|---|-------------|---|---|------------------|----------------------|------------------------------------|--------|--------------|---------------|--|
| 1831801         | sitagliptiin, 100mg                           | A10BH0<br>1 | SITAGLIPTIN<br>GRINDEKS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Grindeks AS                                     | 50               |                      |                                    |        |              |               |  |
|                 |   |             |   |   | 75               | E11-E11, E14-<br>E14 |                                    |        |              |               |  |
| 1874640         | sitagliptiin, 100mg                           | A10BH0<br>1 | SITAGLIPTIN ZENTIVA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK  | Zentiva k.s.                                    | 75               | E14-E14, E11-<br>E11 |                                    |        |              |               |  |
|                 |   |             |   |   | 50               |                      |                                    |        |              |               |  |
| 1831744         | sitagliptiin, 25mg                            | A10BH0<br>1 | SITAGLIPTIN<br>GRINDEKS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Grindeks AS                                     | 50               |                      |                                    |        |              |               |  |
|                 |   |             |   |   | 75               | E11-E11, E14-<br>E14 |                                    |        |              |               |  |
| 1286502         | sitagliptiin, 50mg                            | A10BH0<br>1 | JANUVIA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                 | Merck Sharp &<br>Dohme B.V.                     | 50               |                      |                                    |        |              |               |  |
|                 |   |             |   |   | 75               | E11-E11, E14-<br>E14 |                                    |        |              |               |  |
| 1820719         | sitagliptiin, 50mg                            | A10BH0<br>1 | JAZETA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                  | Zentiva k.s.                                    | 75               | E14-E14, E11-<br>E11 |                                    |        |              |               |  |
|                 |   |             |   |   | 50               |                      |                                    |        |              |               |  |
| 1829538         | sitagliptiin, 50mg                            | A10BH0<br>1 | SITAGLIPTIN SANDOZ,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK   | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.               | 50               |                      |                                    |        |              |               |  |
|                 |   |             |   |   | 75               | E11-E11, E14-<br>E14 |                                    |        |              |               |  |
| 1831777         | sitagliptiin, 50mg                            | A10BH0<br>1 | SITAGLIPTIN<br>GRINDEKS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Grindeks AS                                     | 75               | E11-E11, E14-<br>E14 |                                    |        |              |               |  |
|                 |   |             |   |   | 50               |                      |                                    |        |              |               |  |
| 1874572         | sitagliptiin, 50mg                            | A10BH0<br>1 | SITAGLIPTIN ZENTIVA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK  | Zentiva k.s.                                    | 50               |                      |                                    |        |              |               |  |
|                 |   |             |   |   | 75               | E11-E11, E14-<br>E14 |                                    |        |              |               |  |
| 1725825         | sofosbuviiir+velpat<br>asviir,<br>400mg+100mg | J05AP55     | EPCLUSA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                 | Gilead Sciences<br>Ireland Unlimited<br>Company | 100              | B18.2-B18.2          | Gastroenteroloog,<br>Infektsionist |        |              |               | kroonilise progresseeruva C-viirushepatiidi raviks |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                                      | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                                 | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|--|-------------|--|---|------------------|---|--|--------|--------------|---------------|---|
| 1751015         | sofosbuvir+velpat<br>asviir+voksilaprevii<br>r,<br>400mg+100mg+10<br>0mg | J05AP56     | VOSEVI, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                   | Gilead Sciences<br>Ireland Unlimited<br>Company | 100              | B18.2-B18.2   | Gastroenteroloog,<br>Infektsionist             |        |              |               | kroonilise progresseeruva C-viirushepatiidi kordusraviks<br>tingimisel, et patsient ei ole eelneva otsese toimega<br>viirusvastase raviga saavutanud püsivat viroloogilist<br>ravivastust |
| 1597440         | solifenatsiin, 10mg  | G04BD0<br>8 | SOLIFENACIN PMCS<br>10MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Pro.Med.Cs Praha<br>a.s.                        | 50               |   |  |        |              |               |   |
| 1686517         | solifenatsiin, 10mg  | G04BD0<br>8 | TAMISTEN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                 | Medochemie<br>Limited                           | 50               |   |  |        |              |               |   |
| 1597372         | solifenatsiin, 5mg   | G04BD0<br>8 | SOLIFENACIN PMCS<br>5MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK  | Pro.Med.Cs Praha<br>a.s.                        | 50               |   |  |        |              |               |   |
| 1685932         | solifenatsiin, 5mg   | G04BD0<br>8 | TAMISTEN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                 | Medochemie<br>Limited                           | 50               |   |  |        |              |               |   |
| 1875900         | somatrogon,<br>24mg  | H01AC0<br>8 | NGENLA, süstelahus<br>pen-süstlis, 1TK                                 | Pfizer Europe MA<br>EEIG                        | 100              | E23-E23, E89.3-<br>E89.3  | Endokrinoloog,<br>Pediaater –<br>endokrinoloog |        |              |               | kuni kasvatsoonide sulgumiseni  |
| 1875911         | somatrogon,<br>60mg  | H01AC0<br>8 | NGENLA, süstelahus<br>pen-süstlis, 1TK                                 | Pfizer Europe MA<br>EEIG                        | 100              | E23-E23, E89.3-<br>E89.3  | Endokrinoloog,<br>Pediaater –<br>endokrinoloog |        |              |               | kuni kasvatsoonide sulgumiseni  |
| 1041185         | somatropiin, 12mg  | H01AC0<br>1 | GENOTROPIN,<br>süstelahuse pulber ja<br>lahusti, 1TK                   | Pfizer Europe MA<br>EEIG                        | 100              | Q87.1-Q87.1,<br>Q96-Q96,<br>E23.0-E23.0,<br>E23.1-E23.1,<br>E89.3-E89.3,<br>E23.3-E23.3 | Endokrinoloog                                  |        |              |               |   |
|                 |  |             |  |   | 50               |   |  |        |              |               |   |
|                 |  |             |  |   | 100              | E89.3-E89.3,<br>E23-E23, Q96-<br>Q96, Q87.1-<br>Q87.1, P05.1-<br>P05.1, N18-N18         | Pediaater –<br>endokrinoloog,<br>Endokrinoloog |        |              |               | kuni kasvatsoonide sulgumiseni  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                       |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|--------------------------|------------------|---|--|--------|--------------|---------------|--------------------------------|
| 1369009         | somatropiin,<br>3,3mg 1ml           | H01AC0<br>1 | OMNITROPE,<br>süstelahus, 1.5ml 5TK                          | Sandoz GmbH              | 100              | Q87.1-Q87.1,<br>Q96-Q96,<br>E23.0-E23.0,<br>E23.1-E23.1,<br>E89.3-E89.3,<br>E23.3-E23.3 | Endokrinoloog                                  |        |              |               |                                |
|                 |                                     |             |  |                          | 100              | E89.3-E89.3,<br>E23-E23, Q96-<br>Q96, Q87.1-<br>Q87.1, P05.1-<br>P05.1, N18-N18         | Endokrinoloog,<br>Pediaater –<br>endokrinoloog |        |              |               | kuni kasvatsoonide sulgumiseni |
|                 |                                     |             |  |                          | 50               |   |  |        |              |               |                                |
| 1022072         | somatropiin,<br>5,3mg               | H01AC0<br>1 | GENOTROPIN,<br>süstelahuse pulber ja<br>lahusti, 1TK         | Pfizer Europe MA<br>EEIG | 100              | E89.3-E89.3,<br>E23-E23, Q96-<br>Q96, Q87.1-<br>Q87.1, P05.1-<br>P05.1, N18-N18         | Endokrinoloog,<br>Pediaater –<br>endokrinoloog |        |              |               | kuni kasvatsoonide sulgumiseni |
|                 |                                     |             |  |                          | 100              | Q87.1-Q87.1,<br>Q96-Q96,<br>E23.0-E23.0,<br>E23.1-E23.1,<br>E89.3-E89.3,<br>E23.3-E23.3 | Endokrinoloog                                  |        |              |               |                                |
|                 |                                     |             |  |                          | 50               |   |  |        |              |               |                                |
| 1415528         | somatropiin,<br>5,83mg 1ml          | H01AC0<br>1 | SAIZEN 5,83 MG/ML,<br>süstelahus kolbampullis,<br>1.03ml 1TK | Merck Serono<br>S.p.A.   | 50               |   |  |        |              |               |                                |
|                 |                                     |             |  |                          | 100              | Q87.1-Q87.1,<br>Q96-Q96,<br>E23.0-E23.0,<br>E23.1-E23.1,<br>E89.3-E89.3,<br>E23.3-E23.3 | Endokrinoloog                                  |        |              |               |                                |
|                 |                                     |             |  |                          | 100              | E89.3-E89.3,<br>E23-E23, Q96-<br>Q96, Q87.1-<br>Q87.1, P05.1-<br>P05.1, N18-N18         | Endokrinoloog,<br>Pediaater –<br>endokrinoloog |        |              |               | kuni kasvatsoonide sulgumiseni |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                    | Müügiloa hoidja        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                       |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|------------------------|------------------|--|--|--------|--------------|---------------|--------------------------------|
| 1369032         | somatropiin,<br>6,7mg 1ml           | H01AC0<br>1 | OMNITROPE,<br>süstelahus, 1.5ml 1TK                      | Sandoz GmbH            | 100              | Q87.1-Q87.1,<br>Q96-Q96,<br>E23.0-E23.0,<br>E23.1-E23.1,<br>E89.3-E89.3,<br>E23.3-E23.3  | Endokrinoloog                                  |        |              |               |                                |
|                 |                                     |             |  |                        | 100              | E89.3-E89.3,<br>E23-E23, Q96-<br>Q96, Q87.1-<br>Q87.1, P05.1-<br>P05.1, N18-N18          | Pediaater –<br>endokrinoloog,<br>Endokrinoloog |        |              |               | kuni kasvatsoonide sulgumiseni |
|                 |                                     |             |  |                        | 50               |  |  |        |              |               |                                |
| 1415540         | somatropiin, 8mg<br>1ml             | H01AC0<br>1 | SAIZEN 8 MG/ML,<br>süstelahus kolbampullis,<br>1.5ml 1TK | Merck Serono<br>S.p.A. | 50               |  | Pediaater –<br>endokrinoloog,<br>Endokrinoloog |        |              |               |                                |
|                 |                                     |             |  |                        | 100              | Q96-Q96, Q87-<br>Q87, E23.0-<br>E23.0, E23.1-<br>E23.1, E89.3-<br>E89.3, E23.3-<br>E23.3 | Endokrinoloog                                  |        |              |               |                                |
|                 |                                     |             |  |                        | 100              | E89.3-E89.3,<br>E23-E23, Q96-<br>Q96, Q87.1-<br>Q87.1, P05.1-<br>P05.1, N18-N18          | Pediaater –<br>endokrinoloog,<br>Endokrinoloog |        |              |               | kuni kasvatsoonide sulgumiseni |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla  | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|-----------------|------------------|----------|----------|--------|--------------|--|--|
| 1249938         | sorafeniib, 200mg                   | L01EX0<br>2 | NEXAVAR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>112TK           | Bayer AG        | 100              | C64-C64  | Onkoloog |        |              |  | IV staadiumis heledarakulise neeru kartsinoomi teise rea ravina pärast interferooni sisaldava ravi ebaõnnestumist patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine sorafeniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1, haiguse prognoos Hengi kriteeriumide järgi hea või keskmine ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena. |
|                 |                                     |             |  |                 | 100              | C22-C22  | Onkoloog |        |              | kuni haiguse progresseerumiseni, kui ravi alustamise sorafeniibiga on hinnatud konsiilium (vähemalt 3 onkoloogi) vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud kaugelearenenud hepatotsellulaarne kartsinoom, patsiendi üldseisund on hea (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi) ning maksa funktsioon ei ole oluliselt häiritud. |  |
| 1756852         | sorafeniib, 200mg                   | L01EX0<br>2 | SORAFENIB TEVA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>112TK | Teva B.V.       | 100              | C64-C64  | Onkoloog |        |              |  | IV staadiumis heledarakulise neeru kartsinoomi teise rea ravina pärast interferooni sisaldava ravi ebaõnnestumist patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine sorafeniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1, haiguse prognoos Hengi kriteeriumide järgi hea või keskmine ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena. |
|                 |                                     |             |  |                 | 100              | C22-C22  | Onkoloog |        |              | kuni haiguse progresseerumiseni, kui ravi alustamise sorafeniibiga on hinnatud konsiilium (vähemalt 3 onkoloogi) vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud kaugelearenenud hepatotsellulaarne kartsinoom, patsiendi üldseisund on hea (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi) ning maksa funktsioon ei ole oluliselt häiritud. |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla  | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|-----------------------------------|------------------|----------|----------|--------|--------------|--|--|
| 1794359         | sorafeniib, 200mg                   | L01EX0<br>2 | SORAFENIB SANDOZ,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>112TK  | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 100              | C64-C64  | Onkoloog |        |              |  | IV staadiumis heledarakulise neeru kartsinoomi teise rea ravina pärast interferooni sisaldava ravi ebaõnnestumist patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine sorafeniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1, haiguse prognoos Hengi kriteeriumide järgi hea või keskmine ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena. |
|                 |                                     |             |   |                                   | 100              | C22-C22  | Onkoloog |        |              | kuni haiguse progresseerumiseni, kui ravi alustamise sorafeniibiga on hinnatud konsiilium (vähemalt 3 onkoloogi) vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud kaugelearenenud hepatotsellulaarne kartsinoom, patsiendi üldseisund on hea (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi) ning maksa funktsioon ei ole oluliselt häiritud.   |  |
| 1806791         | sorafeniib, 200mg                   | L01EX0<br>2 | SORAFENIB ZENTIVA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>112TK | Zentiva k.s.                      | 100              | C22-C22  | Onkoloog |        |              |  | kuni haiguse progresseerumiseni, kui ravi alustamise sorafeniibiga on hinnatud konsiilium (vähemalt 3 onkoloogi) vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud kaugelearenenud hepatotsellulaarne kartsinoom, patsiendi üldseisund on hea (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi) ning maksa funktsioon ei ole oluliselt häiritud.   |
|                 |                                     |             |   |                                   | 100              | C64-C64  | Onkoloog |        |              | IV staadiumis heledarakulise neeru kartsinoomi teise rea ravina pärast interferooni sisaldava ravi ebaõnnestumist patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine sorafeniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1, haiguse prognoos Hengi kriteeriumide järgi hea või keskmine ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena. |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                     | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|-----------------------------|------------------|------------------------------|----------|--------|--------------|---------------|--|
| 1890839         | sorafeniib, 200mg                   | L01EX0<br>2 | SORAFENIB ACCORD,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>112TK     | Accord Healthcare<br>S.L.U. | 100              | C64-C64                      | Onkoloog |        |              |               | IV staadiumis heledarakulise neeru kartsinoomi teise rea ravina pärast interferooni sisaldava ravi ebaõnnestumist patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine sorafeniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1, haiguse prognoos Hengi kriteeriumide järgi hea või keskmine ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena. |
|                 |                                     |             |  |                             | 100              | C22-C22                      | Onkoloog |        |              |               | kuni haiguse progresseerumiseni, kui ravi alustamise sorafeniibiga on hinnatud konsiilium (vähemalt 3 onkoloogi) vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud kaugelearenenud hepatotsellulaarne kartsinoom, patsiendi üldseisund on hea (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi) ning maksa funktsioon ei ole oluliselt häiritud.   |
| 1071863         | sotalool, 80mg                      | C07AA0<br>7 | SOTAHEXAL 80 MG,<br>tablett, 50TK                                      | Hexal AG                    | 75               | I47-I49                      |          |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |  |                             | 50               |                              |          |        |              |               |  |
| 1001091         | spironolaktoon,<br>100mg            | C03DA0<br>1 | SPIRIX, tablett, 20TK  | Orifarm<br>Healthcare A/S   | 100              | I27.0-I27.0                  |          |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |  |                             | 75               | I15-I15                      |          |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |  |                             | 50               |                              |          |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |  |                             | 75               | I10-I13                      |          |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |  |                             | 75               | I50-I50                      |          |        |              |               |  |
| 1689060         | spironolaktoon,<br>100mg            | C03DA0<br>1 | SPIRONOLACTONE<br>ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>20TK | Accord Healthcare<br>B.V.   | 50               |                              |          |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |  |                             | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |          |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |  |                             | 100              | I27.0-I27.0                  |          |        |              |               |  |
| 1689071         | spironolaktoon,<br>100mg            | C03DA0<br>1 | SPIRONOLACTONE<br>ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Accord Healthcare<br>B.V.   | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |          |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |  |                             | 50               |                              |          |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |  |                             | 100              | I27.0-I27.0                  |          |        |              |               |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                     | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|---------------------------|------------------|------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1000944         | spironolaktoon,<br>25mg             | C03DA0<br>1 | SPIRIX, tablett, 20TK  | Orifarm<br>Healthcare A/S | 75               | I50-I50                      |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 75               | I15-I15                      |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 50               |                              |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 75               | I10-I13                      |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 100              | I27.0-I27.0                  |        |        |              |               |          |
| 1688946         | spironolaktoon,<br>25mg             | C03DA0<br>1 | SPIRONOLACTONE<br>ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>20TK | Accord Healthcare<br>B.V. | 50               |                              |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 100              | I27.0-I27.0                  |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
| 1688957         | spironolaktoon,<br>25mg             | C03DA0<br>1 | SPIRONOLACTONE<br>ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Accord Healthcare<br>B.V. | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 50               |                              |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 100              | I27.0-I27.0                  |        |        |              |               |          |
| 1001013         | spironolaktoon,<br>50mg             | C03DA0<br>1 | SPIRIX, tablett, 20TK  | Orifarm<br>Healthcare A/S | 75               | I10-I13                      |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 50               |                              |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 75               | I50-I50                      |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 75               | I15-I15                      |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 100              | I27.0-I27.0                  |        |        |              |               |          |
| 1042018         | spironolaktoon,<br>50mg             | C03DA0<br>1 | VEROSPIRON,<br>kõvakapsel, 30TK  | Gedeon Richter<br>Plc.    | 75               | I50-I50                      |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 75               | I10-I13                      |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 75               | I15-I15                      |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 100              | I27.0-I27.0                  |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 50               |                              |        |        |              |               |          |
| 1071650         | spironolaktoon,<br>50mg             | C03DA0<br>1 | SPIRIX, tablett, 100TK   | Orifarm<br>Healthcare A/S | 75               | I50-I50                      |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 100              | I27.0-I27.0                  |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 75               | I15-I15                      |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 75               | I10-I13                      |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 50               |                              |        |        |              |               |          |
| 1689004         | spironolaktoon,<br>50mg             | C03DA0<br>1 | SPIRONOLACTONE<br>ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>20TK | Accord Healthcare<br>B.V. | 100              | I27.0-I27.0                  |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 50               |                              |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                           | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus               | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala                         | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |
|-----------------|---|-------------|--|-------------------------------------|------------------|--|--------------------------------|--------|--------------|---------------|--|
| 1689015         | spironolaktoon,<br>50mg                           | C03DA0<br>1 | SPIRONOLACTONE<br>ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Accord Healthcare<br>B.V.           | 100              | I27.0-I27.0  |                                |        |              |               |  |
|                 |   |             |  |                                     | 50               |  |                                |        |              |               |  |
|                 |   |             |  |                                     | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13                           |                                |        |              |               |  |
| 1280056         | stiripentool,<br>250mg                            | N03AX1<br>7 | DIACOMIT, kõvakapsel,<br>60TK  | Biocodex                            | 100              | G40-G40  | Neuroloog                      |        |              |               | koos klobasaami ja valproaadiga väikelapse raske müokloonilise epilepsia (SMEI, Dravet sündroom) korral, kui kombinatsioonravi klobasaami ja valproaadiga on osutunud ebapiisavaks ning topiramaat ja levetiratsetaam on ebaefektiivsed või vastunäidustatud |
| 1280146         | stiripentool,<br>250mg                            | N03AX1<br>7 | DIACOMIT, suukaudse<br>suspensiooni pulber,<br>60TK                    | Biocodex                            | 100              | G40-G40  | Neuroloog                      |        |              |               | koos klobasaami ja valproaadiga väikelapse raske müokloonilise epilepsia (SMEI, Dravet sündroom) korral, kui kombinatsioonravi klobasaami ja valproaadiga on osutunud ebapiisavaks ning topiramaat ja levetiratsetaam on ebaefektiivsed või vastunäidustatud |
| 1280089         | stiripentool,<br>500mg                            | N03AX1<br>7 | DIACOMIT, kõvakapsel,<br>60TK  | Biocodex                            | 100              | G40-G40  | Neuroloog                      |        |              |               | koos klobasaami ja valproaadiga väikelapse raske müokloonilise epilepsia (SMEI, Dravet sündroom) korral, kui kombinatsioonravi klobasaami ja valproaadiga on osutunud ebapiisavaks ning topiramaat ja levetiratsetaam on ebaefektiivsed või vastunäidustatud |
| 1280113         | stiripentool,<br>500mg                            | N03AX1<br>7 | DIACOMIT, suukaudse<br>suspensiooni pulber,<br>60TK                    | Biocodex                            | 100              | G40-G40  | Neuroloog                      |        |              |               | koos klobasaami ja valproaadiga väikelapse raske müokloonilise epilepsia (SMEI, Dravet sündroom) korral, kui kombinatsioonravi klobasaami ja valproaadiga on osutunud ebapiisavaks ning topiramaat ja levetiratsetaam on ebaefektiivsed või vastunäidustatud |
| 1008818         | sulfametoksasool+<br>trimetoprim,<br>40mg+8mg 1ml | J01EE01     | BACTRIM, siirup, 100ml<br>1TK  | Eumedica<br>Pharmaceuticals<br>GmbH | 100              | Z21-Z21, Z20.6-<br>Z20.6, B20-B24                      | Infektsionist                  |        |              |               |  |
|                 |   |             |  |                                     | 50               |  |                                |        |              |               |  |
| 1023455         | sulfasalasiin,<br>500mg                           | A07EC0<br>1 | SALAZOPYRIN EN,<br>gastroresistentne tablett,<br>100TK                 | Pfizer Europe MA<br>EEIG            | 75               | K51-K51, K50-<br>K50                                   | Pediaater,<br>Gastroenteroloog |        |              |               |  |
|                 |   |             |  |                                     | 50               |  |                                |        |              |               |  |
|                 |   |             |  |                                     | 75               | M08-M08, M45-<br>M45, M06-M06,<br>M05-M05, M46-<br>M46 | Pediaater,<br>Reumatoloog      | esmane |              |               |  |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                    | Müügiloa hoidja                      | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|--------------------------------------|------------------|----------|-------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1705115         | sulpiriid, 100mg                    | N05AL0<br>1 | BETAMAKS, tablett,<br>30TK                               | Grindeks AS                          | 50               |          |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                      | 100              | F20-F29  | Psühhiaater |        |              |               |          |
| 1705126         | sulpiriid, 200mg                    | N05AL0<br>1 | BETAMAKS, tablett,<br>30TK                               | Grindeks AS                          | 50               |          |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                      | 100              | F20-F29  | Psühhiaater |        |              |               |          |
| 1705081         | sulpiriid, 50mg                     | N05AL0<br>1 | BETAMAKS, tablett,<br>30TK                               | Grindeks AS                          | 100              | F20-F29  | Psühhiaater |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                      | 50               |          |             |        |              |               |          |
| 1018482         | sultamitsilliin,<br>375mg           | J01CR0<br>4 | UNASYN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>12TK     | Pfizer Europe MA<br>EEIG             | 50               |          |             |        |              |               |          |
| 1139914         | sumatriptaan,<br>100mg              | N02CC0<br>1 | IMIGRAN FDT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>2TK | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited | 50               |          |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                      | 75               | G43-G43  |             |        |              |               |          |
| 1139947         | sumatriptaan,<br>100mg              | N02CC0<br>1 | IMIGRAN FDT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>6TK | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited | 50               |          |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                      | 75               | G43-G43  |             |        |              |               |          |
| 1234213         | sumatriptaan,<br>100mg              | N02CC0<br>1 | CINIE 100 MG, tablett,<br>6TK                            | Zentiva k.s.                         | 75               | G43-G43  |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                      | 50               |          |             |        |              |               |          |
| 1234505         | sumatriptaan,<br>100mg              | N02CC0<br>1 | SUMATRIPTAN<br>STADA, tablett, 6TK                       | Stada Arzneimittel<br>AG             | 50               |          |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                      | 75               | G43-G43  |             |        |              |               |          |
| 1278053         | sumatriptaan,<br>100mg              | N02CC0<br>1 | SUMATRIPTAN<br>ACTAVIS, kaetud<br>tablett, 6TK           | Teva B.V.                            | 50               |          |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                      | 75               | G43-G43  |             |        |              |               |          |
| 1139880         | sumatriptaan,<br>50mg               | N02CC0<br>1 | IMIGRAN FDT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>2TK | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited | 75               | G43-G43  |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                      | 50               |          |             |        |              |               |          |
| 1139903         | sumatriptaan,<br>50mg               | N02CC0<br>1 | IMIGRAN FDT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>6TK | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited | 75               | G43-G43  |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                      | 50               |          |             |        |              |               |          |
| 1234156         | sumatriptaan,<br>50mg               | N02CC0<br>1 | CINIE 50 MG, tablett,<br>6TK                             | Zentiva k.s.                         | 50               |          |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                      | 75               | G43-G43  |             |        |              |               |          |
| 1277995         | sumatriptaan,<br>50mg               | N02CC0<br>1 | SUMATRIPTAN<br>ACTAVIS, kaetud<br>tablett, 6TK           | Teva B.V.                            | 75               | G43-G43  |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                      | 50               |          |             |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus     | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                         | Müügiloo hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                  |
|-----------------|---|-------------|---|-----------------------------|------------------|----------|----------|--------|--------------|---------------|---|
| 1835805         | sumatriptaan+naproksleen,<br>85mg+500mg | N02CC5<br>1 | MIGSUN, õhukese polümeerikattega tablett, 9TK | Orion Corporation           | 50<br>75         | G43-G43  |          |        |              |               |   |
| 1353305         | sunitiniib, 12,5mg                      | L01EX0<br>1 | SUTENT, kõvakapsel, 28TK                      | Pfizer Europe MA EEIG       | 100              | C64-C64  | Onkoloog |        |              |               | IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks |
| 1725263         | sunitiniib, 12,5mg                      | L01EX0<br>1 | SUNITINIB TEVA, kõvakapsel, 28TK              | Teva B.V.                   | 100              | C64-C64  | Onkoloog |        |              |               | IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks |
| 1759103         | sunitiniib, 12,5mg                      | L01EX0<br>1 | SUNITINIB SANDOZ, kõvakapsel, 28TK            | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 100              | C64-C64  | Onkoloog |        |              |               | IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks |
| 1776854         | sunitiniib, 12,5mg                      | L01EX0<br>1 | SUNITINIB VIATRIS, kõvakapsel, 28TK           | Viatrix Limited             | 100              | C64-C64  | Onkoloog |        |              |               | IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks |
| 1803383         | sunitiniib, 12,5mg                      | L01EX0<br>1 | SUNITINIB ZENTIVA, kõvakapsel, 28TK           | Zentiva k.s.                | 100              | C64-C64  | Onkoloog |        |              |               | IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks |
| 1807792         | sunitiniib, 12,5mg                      | L01EX0<br>1 | SUNITINIB NORAMEDA, kõvakapsel, 28TK          | Norameda UAB                | 100              | C64-C64  | Onkoloog |        |              |               | IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks |
| 1842397         | sunitiniib, 12,5mg                      | L01EX0<br>1 | SUNITINIB ACCORD, kõvakapsel, 28TK            | Accord Healthcare S.L.U.    | 100              | C64-C64  | Onkoloog |        |              |               | IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks |
| 1842409         | sunitiniib, 12,5mg                      | L01EX0<br>1 | SUNITINIB ACCORD, kõvakapsel, 28TK            | Accord Healthcare S.L.U.    | 100              | C64-C64  | Onkoloog |        |              |               | IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks |
| 1858248         | sunitiniib, 12,5mg                      | L01EX0<br>1 | SUNITINIB STADA, kõvakapsel, 28TK             | Stada Arzneimittel AG       | 100              | C64-C64  | Onkoloog |        |              |               | IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks |
| 1353293         | sunitiniib, 25mg                        | L01EX0<br>1 | SUTENT, kõvakapsel, 28TK                      | Pfizer Europe MA EEIG       | 100              | C64-C64  | Onkoloog |        |              |               | IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks |
| 1834983         | sunitiniib, 25mg                        | L01EX0<br>1 | SUNITINIB VIASANA, kõvakapsel, 30TK           | Viasana UAB                 | 100              | C64-C64  | Onkoloog |        |              |               | IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks |
| 1842421         | sunitiniib, 25mg                        | L01EX0<br>1 | SUNITINIB ACCORD, kõvakapsel, 28TK            | Accord Healthcare S.L.U.    | 100              | C64-C64  | Onkoloog |        |              |               | IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks |
| 1842432         | sunitiniib, 25mg                        | L01EX0<br>1 | SUNITINIB ACCORD, kõvakapsel, 28TK            | Accord Healthcare S.L.U.    | 100              | C64-C64  | Onkoloog |        |              |               | IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks |
| 1353282         | sunitiniib, 50mg                        | L01EX0<br>1 | SUTENT, kõvakapsel, 28TK                      | Pfizer Europe MA EEIG       | 100              | C64-C64  | Onkoloog |        |              |               | IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks |
| 1725308         | sunitiniib, 50mg                        | L01EX0<br>1 | SUNITINIB TEVA, kõvakapsel, 28TK              | Teva B.V.                   | 100              | C64-C64  | Onkoloog |        |              |               | IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus       | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloa hoidja                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala        | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|---|-------------|--|-----------------------------------|------------------|----------|---------------|--------|--------------|---------------|---|
| 1759169         | sunitiniib, 50mg                          | L01EX0<br>1 | SUNITINIB SANDOZ,<br>kõvakapsel, 28TK                  | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 100              | C64-C64  | Onkoloog      |        |              |               | IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks   |
| 1776876         | sunitiniib, 50mg                          | L01EX0<br>1 | SUNITINIB VIATRIS,<br>kõvakapsel, 28TK                 | Viartis Limited                   | 100              | C64-C64  | Onkoloog      |        |              |               | IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks   |
| 1803653         | sunitiniib, 50mg                          | L01EX0<br>1 | SUNITINIB ZENTIVA,<br>kõvakapsel, 28TK                 | Zentiva k.s.                      | 100              | C64-C64  | Onkoloog      |        |              |               | IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks   |
| 1807826         | sunitiniib, 50mg                          | L01EX0<br>1 | SUNITINIB<br>NORAMEDA,<br>kõvakapsel, 28TK             | Norameda UAB                      | 100              | C64-C64  | Onkoloog      |        |              |               | IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks   |
| 1835007         | sunitiniib, 50mg                          | L01EX0<br>1 | SUNITINIB VIASANA,<br>kõvakapsel, 30TK                 | Viasana UAB                       | 100              | C64-C64  | Onkoloog      |        |              |               | IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks   |
| 1842487         | sunitiniib, 50mg                          | L01EX0<br>1 | SUNITINIB ACCORD,<br>kõvakapsel, 28TK                  | Accord Healthcare<br>S.L.U.       | 100              | C64-C64  | Onkoloog      |        |              |               | IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks   |
| 1842498         | sunitiniib, 50mg                          | L01EX0<br>1 | SUNITINIB ACCORD,<br>kõvakapsel, 28TK                  | Accord Healthcare<br>S.L.U.       | 100              | C64-C64  | Onkoloog      |        |              |               | IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks   |
| 1858361         | sunitiniib, 50mg                          | L01EX0<br>1 | SUNITINIB STADA,<br>kõvakapsel, 28TK                   | Stada Arzneimittel<br>AG          | 100              | C64-C64  | Onkoloog      |        |              |               | IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks   |
| 1113422         | zidovudiin, 10mg<br>1ml                   | J05AF01     | RETROVIR, suukaudne<br>lahus, 200ml 1TK                | Viiv Healthcare<br>B.V.           | 50               |          | Infektsionist |        |              |               | HIV-nakkuse profülaktikaks, v a tööülesannete täitmisega<br>seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega |
| 1036460         | zidovudiin+lamivu<br>diin,<br>300mg+150mg | J05AR0<br>1 | COMBIVIR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Viiv Healthcare<br>B.V.           | 50               |          | Infektsionist |        |              |               | HIV-nakkuse profülaktikaks, v a tööülesannete täitmisega<br>seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                    | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|-----------------|------------------|--|-------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1005815         | zuklopentiksool,<br>10mg            | N05AF0<br>5 | CISORDINOL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>50TK | H. Lundbeck A/S | 100              | F32.2-F32.3,<br>F70-F79, F11.4-<br>F11.7, F18.4-<br>F18.7, F20-F29,<br>F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7,<br>F19.4-F19.7,<br>F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7,<br>F00-F09, F60.3-<br>F60.3, F13.4-<br>F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-<br>F17.7, F15.4-<br>F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                 | 50               |  |             |        |              |               |          |
| 1006232         | zuklopentiksool,<br>200mg 1ml       | N05AF0<br>5 | CISORDINOL DEPOT,<br>süstelahus, 1ml 1TK                 | H. Lundbeck A/S | 100              | F32.2-F32.3,<br>F70-F79, F11.4-<br>F11.7, F18.4-<br>F18.7, F20-F29,<br>F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7,<br>F19.4-F19.7,<br>F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7,<br>F00-F09, F60.3-<br>F60.3, F13.4-<br>F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-<br>F17.7, F15.4-<br>F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                 | 50               |  |             |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                           | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|-----------------|------------------|--|-------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1065226         | zuklopentiksool,<br>200mg 1ml       | N05AF0<br>5 | CISORDINOL DEPOT,<br>süstelahus, 1ml 10TK       | H. Lundbeck A/S | 50               |  |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                 | 100              | F32.2-F32.3,<br>F70-F79, F11.4-<br>F11.7, F18.4-<br>F18.7, F20-F29,<br>F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7,<br>F19.4-F19.7,<br>F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7,<br>F00-F09, F60.3-<br>F60.3, F13.4-<br>F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-<br>F17.7, F15.4-<br>F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
| 1006322         | zuklopentiksool,<br>50mg 1ml        | N05AF0<br>5 | CISORDINOL-<br>ACUTARD, süstelahus,<br>1ml 10TK | H. Lundbeck A/S | 50               |  |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                 | 100              | F32.2-F32.3,<br>F70-F79, F11.4-<br>F11.7, F18.4-<br>F18.7, F20-F29,<br>F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7,<br>F19.4-F19.7,<br>F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7,<br>F00-F09, F60.3-<br>F60.3, F13.4-<br>F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-<br>F17.7, F15.4-<br>F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                    | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla   | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|--------------------------------|------------------|-----------------------------|--|--------|--------------|---|--|
| 1679036         | tadalafiil, 20mg                    | G04BE0<br>8 | TADALAFIL ACCORD,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK    | Accord Healthcare<br>B.V.      | 50               | I27.0-I27.0                 | Pediaater,<br>Pulmonoloog,<br>Kardioloog,<br>Reumatoloog |        |              |   |  |
|                 |                                     |             |  |                                | 100              | I27.0-I27.0                 | Pulmonoloog,<br>Pediaater,<br>Reumatoloog,<br>Kardioloog |        |              | NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse<br>sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega<br>seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks<br>patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala<br>spetsialisti) otsuse alusel |  |
| 1849282         | tadalafiil, 20mg                    | G04BE0<br>8 | ZENAVIL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                | Medochemie<br>Limited          | 50               | I27.0-I27.0                 | Pediaater,<br>Pulmonoloog,<br>Reumatoloog,<br>Kardioloog |        |              |   |  |
|                 |                                     |             |  |                                | 100              | I27.0-I27.0                 | Reumatoloog,<br>Pediaater,<br>Pulmonoloog,<br>Kardioloog |        |              | NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse<br>sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega<br>seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks<br>patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala<br>spetsialisti) otsuse alusel |  |
| 1811630         | tafamidis, 61mg                     | N07XX0<br>8 | VYNDAQEL,<br>pehmekapsel, 30TK                                       | Pfizer Europe MA<br>EEIG       | 100              | E85.4-E85.4,<br>E85.0-E85.0 | Kardioloog   |        |              |   | patsiendile, kellel on dokumenteeritud transtüretiiniga<br>seotud amüloidoosi kardiomüopaatia, NYHA I-III klassi<br>südamepuudulikkuse esinemine, anamneesis<br>südamepuudulikkus või südamepuudulikkuse kliinilised<br>nähud, mis vajasis ravi diureetikumiga.                |
| 1753703         | tafluprost,<br>0,015mg 1ml          | S01EE0<br>5 | TAFLOTAN, silmatilgad,<br>lahus, 3ml 1TK                             | Santen Oy                      | 100              | H40-H42                     | Oftalmoloog  | esmane |              |   | kui ravi jätkamine teiste glaukoomiravimitega on<br>meditsiiniliselt vastunäidustatud bensalkooniumkloriidile<br>tekkinud tõendatud ülitundlikkuse või olulise toksilise<br>toime tõttu silma eesmisele osale  |
| 1870051         | tafluprost,<br>0,015mg 1ml          | S01EE0<br>5 | TAFLOTAN, silmatilgad,<br>lahus, 7ml 1TK                             | Santen Oy                      | 100              | H40-H42                     | Oftalmoloog  | esmane |              |   | kui ravi jätkamine teiste glaukoomiravimitega on<br>meditsiiniliselt vastunäidustatud bensalkooniumkloriidile<br>tekkinud tõendatud ülitundlikkuse või olulise toksilise<br>toime tõttu silma eesmisele osale  |
| 1179840         | takroliimus, 0,3mg<br>1g            | D11AH0<br>1 | PROTOPIC, salv, 30g<br>1TK   | LEO Pharma A/S                 | 50               |                             |  |        |              |   |  |
| 1294646         | takroliimus, 0,5mg                  | L04AD0<br>2 | ADVAGRAF, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 50TK | Astellas Pharma<br>Europe B.V. | 100              | Z94-Z94, T86-<br>T86        |  |        |              |   | patsientidele, kellel esineb kõrge immunoloogiline risk<br>(PRA >20%), korduvsirdamise puhul, maksa- või<br>kopsusiirdamise pihul, steroidresistentse ägeda<br>äratõukereaktsiooni ravi järgselt ning müokardiinfarkti või<br>müokardi revaskulariseeriva protseduuri järgselt |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|-----------------------------------|------------------|----------------------|--------|--------|--------------|---------------|--|
| 1776618         | takroliimus, 0,5mg                  | L04AD0<br>2 | DAILIPORT, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 50TK | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 100              | Z94-Z94, T86-<br>T86 |        |        |              |               | patsientidele, kellel esineb kõrge immunoloogiline risk<br>(PRA >20%), korduvsirdamise puhul, maksa- või<br>kopsusiirdamise pihul, steroidresistentse ägeda<br>äratõukereaktsiooni ravi järgselt ning müokardiinfarkti või<br>müokardi revaskulariseeriva protseduuri järgselt |
| 1661105         | takroliimus,<br>0,75mg              | L04AD0<br>2 | ENVARUSUS, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK    | Chiesi<br>Farmaceutici<br>S.p.A.  | 100              | Z94-Z94, T86-<br>T86 |        |        |              |               | patsientidele, kellel esineb kõrge immunoloogiline risk<br>(PRA >20%), korduvsirdamise puhul, maksa- või<br>kopsusiirdamise pihul, steroidresistentse ägeda<br>äratõukereaktsiooni ravi järgselt ning müokardiinfarkti või<br>müokardi revaskulariseeriva protseduuri järgselt |
| 1294680         | takroliimus, 1mg                    | L04AD0<br>2 | ADVAGRAF, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 50TK  | Astellas Pharma<br>Europe B.V.    | 100              | Z94-Z94, T86-<br>T86 |        |        |              |               | patsientidele, kellel esineb kõrge immunoloogiline risk<br>(PRA >20%), korduvsirdamise puhul, maksa- või<br>kopsusiirdamise pihul, steroidresistentse ägeda<br>äratõukereaktsiooni ravi järgselt ning müokardiinfarkti või<br>müokardi revaskulariseeriva protseduuri järgselt |
| 1661149         | takroliimus, 1mg                    | L04AD0<br>2 | ENVARUSUS, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 60TK    | Chiesi<br>Farmaceutici<br>S.p.A.  | 100              | Z94-Z94, T86-<br>T86 |        |        |              |               | patsientidele, kellel esineb kõrge immunoloogiline risk<br>(PRA >20%), korduvsirdamise puhul, maksa- või<br>kopsusiirdamise pihul, steroidresistentse ägeda<br>äratõukereaktsiooni ravi järgselt ning müokardiinfarkti või<br>müokardi revaskulariseeriva protseduuri järgselt |
| 1776652         | takroliimus, 1mg                    | L04AD0<br>2 | DAILIPORT, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 50TK | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 100              | Z94-Z94, T86-<br>T86 |        |        |              |               | patsientidele, kellel esineb kõrge immunoloogiline risk<br>(PRA >20%), korduvsirdamise puhul, maksa- või<br>kopsusiirdamise pihul, steroidresistentse ägeda<br>äratõukereaktsiooni ravi järgselt ning müokardiinfarkti või<br>müokardi revaskulariseeriva protseduuri järgselt |
| 1179851         | takroliimus, 1mg<br>1g              | D11AH0<br>1 | PROTOPIC, salv, 30g<br>1TK  | LEO Pharma A/S                    | 50               |                      |        |        |              |               |  |
| 1665277         | takroliimus, 1mg<br>1g              | D11AH0<br>1 | LEBSANAN, salv, 30g<br>1TK  | Norameda UAB                      | 50               |                      |        |        |              |               |  |
| 1488337         | takroliimus, 3mg                    | L04AD0<br>2 | ADVAGRAF, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 50TK  | Astellas Pharma<br>Europe B.V.    | 100              | Z94-Z94, T86-<br>T86 |        |        |              |               | patsientidele, kellel esineb kõrge immunoloogiline risk<br>(PRA >20%), korduvsirdamise puhul, maksa- või<br>kopsusiirdamise pihul, steroidresistentse ägeda<br>äratõukereaktsiooni ravi järgselt ning müokardiinfarkti või<br>müokardi revaskulariseeriva protseduuri järgselt |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja                                   | Soodus-tus % | Diagnoos         | Eriala                | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-------------|-------------------------------|----------|---|---|--------------|------------------|-----------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1776731     | takroliimus, 3mg              | L04AD02  | DAILIPOINT, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 50TK          | Sandoz Pharmaceuticals d.d.                       | 100          | Z94-Z94, T86-T86 |                       |        |           |            | patsientidele, kellel esineb kõrge immunoloogiline risk (PRA >20%), korduvsirdamise puhul, maksa- või kopsusiirdamise pihul, steroidresistentse ägeda äratõukereaktsiooni ravi järgselt ning müokardiinfarkti või müokardi revaskulariseeriva protseduuri järgselt |
| 1661161     | takroliimus, 4mg              | L04AD02  | ENVARISUS, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK              | Chiesi Farmaceutici S.p.A.                        | 100          | Z94-Z94, T86-T86 |                       |        |           |            | patsientidele, kellel esineb kõrge immunoloogiline risk (PRA >20%), korduvsirdamise puhul, maksa- või kopsusiirdamise pihul, steroidresistentse ägeda äratõukereaktsiooni ravi järgselt ning müokardiinfarkti või müokardi revaskulariseeriva protseduuri järgselt |
| 1294668     | takroliimus, 5mg              | L04AD02  | ADVAGRAF, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 50TK            | Astellas Pharma Europe B.V.                       | 100          | Z94-Z94, T86-T86 |                       |        |           |            | patsientidele, kellel esineb kõrge immunoloogiline risk (PRA >20%), korduvsirdamise puhul, maksa- või kopsusiirdamise pihul, steroidresistentse ägeda äratõukereaktsiooni ravi järgselt ning müokardiinfarkti või müokardi revaskulariseeriva protseduuri järgselt |
| 1776775     | takroliimus, 5mg              | L04AD02  | DAILIPOINT, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 50TK          | Sandoz Pharmaceuticals d.d.                       | 100          | Z94-Z94, T86-T86 |                       |        |           |            | patsientidele, kellel esineb kõrge immunoloogiline risk (PRA >20%), korduvsirdamise puhul, maksa- või kopsusiirdamise pihul, steroidresistentse ägeda äratõukereaktsiooni ravi järgselt ning müokardiinfarkti või müokardi revaskulariseeriva protseduuri järgselt |
| 1347230     | talidomiid, 50mg              | L04AX02  | THALIDOMIDE BMS, kõvakapsel, 28TK   | Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG                  | 100          | C90.0-C90.0      | Hematoloog            |        |           |            | ravimi väljakirjutamise õigus hulgimüeloomi suukaudseks mono- või kombinatsioonraviks  |
| 1015704     | tamoksifeen, 20mg             | L02BA01  | TAMOXIFEN "EBEWE", tablett, 30TK  | Sandoz Pharmaceuticals d.d.                       | 100          | C50-C50          | Günekoloog, Üldkirurg |        |           |            | günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks   |
|             |                               |          |   |   | 100          | D18.1-D18.1      | Pulmonoloog, Onkoloog |        |           |            |  |
|             |                               |          |   |   | 100          | C00-D48          | Onkoloog              |        |           |            |  |
|             |                               |          |   |   | 50           |                  |                       |        |           |            |  |
| 1188143     | tamsulosiin, 0,4mg            | G04CA02  | FLOSIN 0,4MG, toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel, 30TK       | Menarini International Operations Luxembourg S.A. | 50           |                  |                       |        |           |            |  |
| 1188378     | tamsulosiin, 0,4mg            | G04CA02  | TAMSULOSIN AUXILIA, toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel, 30TK | Auxilia Pharma OÜ                                 | 50           |                  |                       |        |           |            |  |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus   | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|---------------------------------------|-------------|---|--|------------------|----------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1188402         | tamsulosiin, 0,4mg                    | G04CA02     | TAMSULOSIN AUXILIA, toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel, 60TK   | Auxilia Pharma OÜ                        | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1188480         | tamsulosiin, 0,4mg                    | G04CA02     | TAMSULOSIN LANNACHER, toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel, 30TK | G.L. Pharma GmbH                         | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1188659         | tamsulosiin, 0,4mg                    | G04CA02     | TAMSULOSIN STADA, toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel, 100TK    | Stada Arzneimittel AG                    | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1195826         | tamsulosiin, 0,4mg                    | G04CA02     | OMSAL, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 30TK                 | Gedeon Richter Plc.                      | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1436015         | tamsulosiin, 0,4mg                    | G04CA02     | TANYZ ERAS 0.4MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK         | KRKA d.d. Novo mesto                     | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 3041558         | tamsulosiin, 0,4mg                    | G04CA02     | FLOSIN 0,4MG, toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel, 30TK         | Lex Ano UAB                              | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 3073845         | tamsulosiin, 0,4mg                    | G04CA02     | FLOSIN 0,4MG, toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel, 100TK        | Lex Ano UAB                              | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1390463         | tamsulosiin+dutast eriid, 0,4mg+0,5mg | G04CA52     | COMBODART, kõvakapsel, 30TK   | GlaxoSmithKline Trading Services Limited | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1769609         | tamsulosiin+dutast eriid, 0,4mg+0,5mg | G04CA52     | DUTASTERIDE/TAMSU LOSIN OLAINFARM, kõvakapsel, 30TK                         | JSC Olainfarm                            | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1769744         | tamsulosiin+dutast eriid, 0,4mg+0,5mg | G04CA52     | DUTROZEN, kõvakapsel, 30TK  | Zentiva k.s.                             | 50               |          |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus         | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|---|-------------|--|--|------------------|------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1776821         | tamsulosiin+dutast<br>eriid,<br>0,4mg+0,5mg | G04CA5<br>2 | DUTASTERIDE/TAMSU<br>LOSIN TEVA,<br>kõvakapsel, 30TK                   | Teva B.V.  | 50               |                  |        |        |              |               |          |
| 1782660         | tamsulosiin+dutast<br>eriid,<br>0,4mg+0,5mg | G04CA5<br>2 | TADUSTA, kõvakapsel,<br>30TK   | KRKA d.d. Novo<br>mesto                          | 50               |                  |        |        |              |               |          |
| 1894226         | tamsulosiin+dutast<br>eriid,<br>0,4mg+0,5mg | G04CA5<br>2 | COMBODART,<br>kõvakapsel, 90TK   | Ideal Trade Links<br>UAB                         | 50               |                  |        |        |              |               |          |
| 3000496         | tamsulosiin+solife<br>natsiin,<br>0,4mg+6mg | G04CA5<br>3 | SOLITOMBO,<br>toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 60TK | Adamed Pharma<br>S.A.                            | 50               |                  |        |        |              |               |          |
| 1046292         | telmisartaan,<br>40mg                       | C09CA0<br>7 | MICARDIS, tablett,<br>28TK   | Boehringer<br>Ingelheim<br>International<br>GmbH | 50               |                  |        |        |              |               |          |
|                 |   |             |  |  | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
| 1395424         | telmisartaan,<br>40mg                       | C09CA0<br>7 | TELMISARTAN-<br>RATIOPHARM 40MG,<br>tablett, 28TK                      | Ratiopharm GmbH                                  | 50               |                  |        |        |              |               |          |
|                 |   |             |  |  | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
| 1430233         | telmisartaan,<br>40mg                       | C09CA0<br>7 | TELMISARTAN<br>SANDOZ 40 MG, tablett,<br>28TK                          | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.                | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |   |             |  |  | 50               |                  |        |        |              |               |          |
| 1482263         | telmisartaan,<br>40mg                       | C09CA0<br>7 | TOLURA, tablett, 30TK  | KRKA d.d. Novo<br>mesto                          | 50               |                  |        |        |              |               |          |
|                 |   |             |  |  | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
| 1482274         | telmisartaan,<br>40mg                       | C09CA0<br>7 | TOLURA, tablett, 56TK  | KRKA d.d. Novo<br>mesto                          | 50               |                  |        |        |              |               |          |
|                 |   |             |  |  | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
| 1046258         | telmisartaan,<br>80mg                       | C09CA0<br>7 | MICARDIS, tablett,<br>28TK   | Boehringer<br>Ingelheim<br>International<br>GmbH | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |   |             |  |  | 50               |                  |        |        |              |               |          |
| 1395569         | telmisartaan,<br>80mg                       | C09CA0<br>7 | TELMISARTAN-<br>RATIOPHARM 80MG,<br>tablett, 28TK                      | Ratiopharm GmbH                                  | 50               |                  |        |        |              |               |          |
|                 |   |             |  |  | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                     | Müügiloo hoidja                                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|--|-------------|---|--|------------------|------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1430389         | telmisartaan,<br>80mg                              | C09CA0<br>7 | TELMISARTAN<br>SANDOZ 80 MG, tablett,<br>28TK             | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.                | 50               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |  | 75               |                  |        |        |              |               |          |
| 1482331         | telmisartaan,<br>80mg                              | C09CA0<br>7 | TOLURA, tablett, 30TK                                     | KRKA d.d. Novo<br>mesto                          | 50               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |  | 75               |                  |        |        |              |               |          |
| 1482342         | telmisartaan,<br>80mg                              | C09CA0<br>7 | TOLURA, tablett, 56TK                                     | KRKA d.d. Novo<br>mesto                          | 50               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |  | 75               |                  |        |        |              |               |          |
| 1499452         | telmisartaan+amlo<br>dipiin,<br>80mg+10mg          | C09DB0<br>4 | TWYNSTA, tablett,<br>28TK                                 | Boehringer<br>Ingelheim<br>International<br>GmbH | 50               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |  | 75               |                  |        |        |              |               |          |
| 1643161         | telmisartaan+amlo<br>dipiin,<br>80mg+10mg          | C09DB0<br>4 | MIXOR, tablett, 28TK                                      | Zentiva k.s.                                     | 50               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |  | 75               |                  |        |        |              |               |          |
| 1707049         | telmisartaan+amlo<br>dipiin,<br>80mg+10mg          | C09DB0<br>4 | TELDIPIN, tablett, 28TK                                   | KRKA d.d. Novo<br>mesto                          | 50               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |  | 75               |                  |        |        |              |               |          |
| 1499384         | telmisartaan+amlo<br>dipiin, 80mg+5mg              | C09DB0<br>4 | TWYNSTA, tablett,<br>28TK                                 | Boehringer<br>Ingelheim<br>International<br>GmbH | 50               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |  | 75               |                  |        |        |              |               |          |
| 1643071         | telmisartaan+amlo<br>dipiin, 80mg+5mg              | C09DB0<br>4 | MIXOR, tablett, 28TK                                      | Zentiva k.s.                                     | 50               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |  | 75               |                  |        |        |              |               |          |
| 1706969         | telmisartaan+amlo<br>dipiin, 80mg+5mg              | C09DB0<br>4 | TELDIPIN, tablett, 28TK                                   | KRKA d.d. Novo<br>mesto                          | 50               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |  | 75               |                  |        |        |              |               |          |
| 1609613         | telmisartaan+hüdr<br>oklorotiasiid,<br>40mg+12,5mg | C09DA8<br>5 | TOLUCOMBI, tablett,<br>56TK                               | KRKA d.d. Novo<br>mesto                          | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |  | 50               |                  |        |        |              |               |          |
| 1114793         | telmisartaan+hüdr<br>oklorotiasiid,<br>80mg+12,5mg | C09DA8<br>5 | MICARDISPLUS,<br>tablett, 28TK                            | Boehringer<br>Ingelheim<br>International<br>GmbH | 50               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |  | 75               |                  |        |        |              |               |          |
| 1566615         | telmisartaan+hüdr<br>oklorotiasiid,<br>80mg+12,5mg | C09DA8<br>5 | TELMISARTAN/HYDRO<br>CHLOROTHIAZIDE<br>TAD, tablett, 30TK | TAD Pharma<br>GmbH                               | 50               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |  | 75               |                  |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|--|-------------|---|--|------------------|------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1566996         | telmisartaan+hüdr<br>oklorotiasiid,<br>80mg+12,5mg | C09DA8<br>5 | TEZEO HCT 80<br>MG/12,5 MG, tablett,<br>28TK                            | Zentiva k.s.                                     | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |  | 50               |                  |        |        |              |               |          |
| 1567267         | telmisartaan+hüdr<br>oklorotiasiid,<br>80mg+12,5mg | C09DA8<br>5 | TELMISARTAN<br>/HYDROCHLOROTHIA<br>ZIDE SANDOZ, kaetud<br>tablett, 28TK | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.                | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |  | 50               |                  |        |        |              |               |          |
| 1609691         | telmisartaan+hüdr<br>oklorotiasiid,<br>80mg+12,5mg | C09DA8<br>5 | TOLUCOMBI, tablett,<br>56TK   | KRKA d.d. Novo<br>mesto                          | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |  | 50               |                  |        |        |              |               |          |
| 1612910         | telmisartaan+hüdr<br>oklorotiasiid,<br>80mg+12,5mg | C09DA8<br>5 | TELMISARTAN/HYDRO<br>CHLOROTHIAZIDE<br>TEVA PHARMA, tablett,<br>28TK    | Teva B.V.  | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |  | 50               |                  |        |        |              |               |          |
| 1676954         | telmisartaan+hüdr<br>oklorotiasiid,<br>80mg+12,5mg | C09DA8<br>5 | TELMISARTAN/HYDRO<br>CHLOROTHIAZIDE<br>ACCORD, tablett, 28TK            | Accord Healthcare<br>B.V.                        | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |  | 50               |                  |        |        |              |               |          |
| 1367524         | telmisartaan+hüdr<br>oklorotiasiid,<br>80mg+25mg   | C09DA8<br>5 | MICARDISPLUS,<br>tablett, 28TK  | Boehringer<br>Ingelheim<br>International<br>GmbH | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |  | 50               |                  |        |        |              |               |          |
| 1566705         | telmisartaan+hüdr<br>oklorotiasiid,<br>80mg+25mg   | C09DA8<br>5 | TELMISARTAN/HYDRO<br>CHLOROTHIAZIDE<br>TAD, tablett, 30TK               | TAD Pharma<br>GmbH                               | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |  | 50               |                  |        |        |              |               |          |
| 1567379         | telmisartaan+hüdr<br>oklorotiasiid,<br>80mg+25mg   | C09DA8<br>5 | TELMISARTAN<br>/HYDROCHLOROTHIA<br>ZIDE SANDOZ, kaetud<br>tablett, 28TK | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.                | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |  | 50               |                  |        |        |              |               |          |
| 1609770         | telmisartaan+hüdr<br>oklorotiasiid,<br>80mg+25mg   | C09DA8<br>5 | TOLUCOMBI, tablett,<br>56TK   | KRKA d.d. Novo<br>mesto                          | 50               |                  |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |  | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
| 1613045         | telmisartaan+hüdr<br>oklorotiasiid,<br>80mg+25mg   | C09DA8<br>5 | TELMISARTAN/HYDRO<br>CHLOROTHIAZIDE<br>TEVA PHARMA, tablett,<br>28TK    | Teva B.V.  | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |  | 50               |                  |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus              | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|--|-------------|--|-----------------------------|------------------|------------------|---|--------|--------------|---------------|---|
| 1677045         | telmisartaan+hüdr<br>oklorotiasiid,<br>80mg+25mg | C09DA8<br>5 | TELMISARTAN/HYDRO<br>CHLOROTHIAZIDE<br>ACCORD, tablett, 28TK | Accord Healthcare<br>B.V.   | 50               | I10-I13, I15-I15 |   |        |              |               |   |
|                 |  |             |  |                             | 75               |                  |   |        |              |               |   |
| 1458963         | temosolomiid,<br>100mg                           | L01AX0<br>3 | TEMOZOLOMIDE<br>TEVA, kõvakapsel, 5TK                        | Teva B.V.                   | 100              | C71-C71          | Onkoloog,<br>Pediaater –<br>hematoloog-<br>onkoloog |        |              |               | konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel<br>heas üldseisundis patsiendile (funktsionaalne klass 0...1<br>WHO järgi) |
|                 |  |             |  |                             | 50               |                  |   |        |              |               |   |
| 1462115         | temosolomiid,<br>100mg                           | L01AX0<br>3 | TEMOZOLOMIDE<br>ACCORD, kõvakapsel,<br>5TK                   | Accord Healthcare<br>S.L.U. | 100              | C71-C71          | Onkoloog,<br>Pediaater –<br>hematoloog-<br>onkoloog |        |              |               | konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel<br>heas üldseisundis patsiendile (funktsionaalne klass 0...1<br>WHO järgi) |
|                 |  |             |  |                             | 50               |                  |   |        |              |               |   |
| 1534676         | temosolomiid,<br>100mg                           | L01AX0<br>3 | BLASTOMAT 100 MG,<br>kõvakapsel, 5TK                         | Zentiva k.s.                | 100              | C71-C71          | Pediaater –<br>hematoloog-<br>onkoloog,<br>Onkoloog |        |              |               | konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel<br>heas üldseisundis patsiendile (funktsionaalne klass 0...1<br>WHO järgi) |
|                 |  |             |  |                             | 50               |                  |   |        |              |               |   |
| 1462137         | temosolomiid,<br>140mg                           | L01AX0<br>3 | TEMOZOLOMIDE<br>ACCORD, kõvakapsel,<br>5TK                   | Accord Healthcare<br>S.L.U. | 50               | C71-C71          | Onkoloog,<br>Pediaater –<br>hematoloog-<br>onkoloog |        |              |               | konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel<br>heas üldseisundis patsiendile (funktsionaalne klass 0...1<br>WHO järgi) |
|                 |  |             |  |                             | 100              |                  |   |        |              |               |   |
| 1534698         | temosolomiid,<br>140mg                           | L01AX0<br>3 | BLASTOMAT 140 MG,<br>kõvakapsel, 5TK                         | Zentiva k.s.                | 100              | C71-C71          | Pediaater –<br>hematoloog-<br>onkoloog,<br>Onkoloog |        |              |               | konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel<br>heas üldseisundis patsiendile (funktsionaalne klass 0...1<br>WHO järgi) |
|                 |  |             |  |                             | 50               |                  |   |        |              |               |   |
| 1458941         | temosolomiid,<br>20mg                            | L01AX0<br>3 | TEMOZOLOMIDE<br>TEVA, kõvakapsel, 5TK                        | Teva B.V.                   | 50               | C71-C71          | Pediaater –<br>hematoloog-<br>onkoloog,<br>Onkoloog |        |              |               | konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel<br>heas üldseisundis patsiendile (funktsionaalne klass 0...1<br>WHO järgi) |
|                 |  |             |  |                             | 100              |                  |   |        |              |               |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                       | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja                                 | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|---|-------------|--|---|------------------|-------------|--|--------|--------------|---------------|---|
| 1462092         | temosolomiid,<br>20mg                                     | L01AX0<br>3 | TEMOZOLOMIDE<br>ACCORD, kõvakapsel,<br>5TK   | Accord Healthcare<br>S.L.U.                     | 50               |             |  |        |              |               |   |
|                 |   |             |  |   | 100              | C71-C71     | Pediaater –<br>hematoloog-<br>onkoloog,<br>Onkoloog  |        |              |               | konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel<br>heas üldseisundis patsiendile (funktsionaalne klass 0...1<br>WHO järgi)   |
| 1534654         | temosolomiid,<br>20mg                                     | L01AX0<br>3 | BLASTOMAT 20 MG,<br>kõvakapsel, 5TK  | Zentiva k.s.                                    | 100              | C71-C71     | Pediaater –<br>hematoloog-<br>onkoloog,<br>Onkoloog  |        |              |               | konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel<br>heas üldseisundis patsiendile (funktsionaalne klass 0...1<br>WHO järgi)   |
|                 |   |             |  |   | 50               |             |  |        |              |               |   |
| 1462171         | temosolomiid,<br>250mg                                    | L01AX0<br>3 | TEMOZOLOMIDE<br>ACCORD, kõvakapsel,<br>5TK   | Accord Healthcare<br>S.L.U.                     | 50               |             |  |        |              |               |   |
|                 |   |             |  |   | 100              | C71-C71     | Onkoloog,<br>Pediaater –<br>hematoloog-<br>onkoloog  |        |              |               | konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel<br>heas üldseisundis patsiendile (funktsionaalne klass 0...1<br>WHO järgi)   |
| 1736513         | tenofoviiralafenami<br>id, 25mg                           | J05AF13     | VEMLIDY, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK  | Gilead Sciences<br>Ireland Unlimited<br>Company | 100              | B18.0-B18.1 | Gastroenteroloog,<br>Infektsionist   |        |              |               | kroonilise progresseeruva kuluga B-viirushepatiidi raviks   |
| 1734825         | tenofoviirdisoproks<br>iil, 245mg                         | J05AF07     | TENOFOVIR<br>DISOPROXIL MYLAN,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK               | Mylan<br>Pharmaceuticals<br>Limited             | 100              | B18.0-B18.1 | Gastroenteroloog,<br>Infektsionist   |        |              |               | kroonilise progresseeruva kuluga B-viirushepatiidi raviks   |
| 1678541         | tenofoviirdisoproks<br>iil+emtritsitabiin,<br>245mg+200mg | J05AR0<br>3 | EMTRICITABINE/TENO<br>FOVIR DISOPROXIL<br>TEVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Teva B.V.                                       | 50               | Z29.2-Z29.2 | uroloogia<br>androloogia<br>lisapädevusega ,<br>sünnitusabi ja<br>günekoloogia,<br>Infektsionist,<br>Dermatovenerol<br>oog |        |              |               | kuni kolmeks kuuks kokkupuute-eelseks (PrEP)<br>profülaktiliseks raviks HIV-infektsiooni nakatumise<br>vältimiseks HIV-negatiivsele isikule   |
|                 |   |             |  |   | 100              | Z20.6-Z20.6 | Infektsionist  |        |              |               | kokkupuute-järgseks (PEP) profülaktiliseks raviks HIV-<br>infektsiooni nakatumise vältimiseks kuni 30-päevaks v.a<br>tööülesannete täitmisega seotud kokkupuutejuhtudel HIV-<br>nakkusega |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus                     | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja             | Soodus-tus % | Diagnoos    | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-------------|---|----------|---|-----------------------------|--------------|-------------|--|--------|-----------|------------|--|
| 1760217     | tenofoviirdisoproksil+emtritsitabiin, 245mg+200mg | J05AR03  | EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL ACCORDPHARMA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Accord Healthcare B.V.      | 100          | Z20.6-Z20.6 | Infektsionist  |        |           |            | kokkupuute-järgseks (PEP) profülaktiliseks raviks HIV-infektsiooni nakatumise vältimiseks kuni 30-päevaks v.a tööülesannete täitmisega seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega |
|             |   |          |   |                             | 50           | Z29.2-Z29.2 | sünnitusabi ja günekoloogia, Infektsionist, uroloogia androloogia lisapädevusega , Dermatoveneroloog |        |           |            | kuni kolmeks kuuks kokkupuute-eelseks (PrEP) profülaktiliseks raviks HIV-infektsiooni nakatumise vältimiseks HIV-negatiivsele isikule  |
| 3039836     | teofülliin, 200mg                                 | R03DA04  | TEOTARD, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 100TK                          | First Pharma OÜ             | 75           | J43-J44     | Pulmonoloog  | esmane |           |            |  |
|             |   |          |   |                             | 75           | J45-J45     |  |        |           |            |  |
|             |   |          |   |                             | 50           |             |  |        |           |            |  |
| 1158757     | terbinafiin, 250mg                                | D01BA02  | TERBINAFINE SANDOZ 250 MG, tablett, 30TK  | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 50           |             |  |        |           |            |  |
| 1176319     | terbinafiin, 250mg                                | D01BA02  | TERBINAFIN ACTAVIS, tablett, 28TK   | Teva B.V.                   | 50           |             |  |        |           |            |  |
| 1176353     | terbinafiin, 250mg                                | D01BA02  | TERBINAFIN ACTAVIS, tablett, 56TK   | Teva B.V.                   | 50           |             |  |        |           |            |  |
| 1681501     | terbinafiin, 250mg                                | D01BA02  | TERBINAFIN ACTAVIS, tablett, 28TK   | First Pharma OÜ             | 50           |             |  |        |           |            |  |
| 1873469     | terbinafiin, 250mg                                | D01BA02  | LAMISIL, tablett, 14TK  | Ideal Trade Links UAB       | 50           |             |  |        |           |            |  |
| 1880670     | terbinafiin, 250mg                                | D01BA02  | TERBINAFINE SANDOZ 250 MG, tablett, 30TK  | Ideal Trade Links UAB       | 50           |             |  |        |           |            |  |
| 1882964     | terbinafiin, 250mg                                | D01BA02  | TERBINAFINE SANDOZ 250 MG, tablett, 30TK  | Lex Ano UAB                 | 50           |             |  |        |           |            |  |
| 1882975     | terbinafiin, 250mg                                | D01BA02  | TERBINAFINE SANDOZ 250 MG, tablett, 60TK  | Ideal Trade Links UAB       | 50           |             |  |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|-------------------------------------|------------------|--|---|--------|--------------|---------------|---|
| 1624092         | teriflunomiid,<br>14mg              | L04AK0<br>2 | AUBAGIO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                  | Sanofi Winthrop<br>Industrie        | 100              | G35-G35  | Neuroloog   | esmane |              |               | konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel (ägenemiste<br>ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks |
| 1858013         | teriflunomiid,<br>14mg              | L04AK0<br>2 | TEREBYO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                  | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.   | 100              | G35-G35  | Neuroloog   | esmane |              |               | konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel (ägenemiste<br>ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks |
| 1858147         | teriflunomiid,<br>14mg              | L04AK0<br>2 | TERIFLUNOMIDE<br>TEVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK    | Teva B.V.                           | 100              | G35-G35  | Neuroloog   | esmane |              |               | konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel (ägenemiste<br>ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks |
| 1858697         | teriflunomiid,<br>14mg              | L04AK0<br>2 | TERIFLUNOMIDE<br>ZENTIVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Zentiva k.s.                        | 100              | G35-G35  | Neuroloog   | esmane |              |               | konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel (ägenemiste<br>ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks |
| 1861129         | teriflunomiid,<br>14mg              | L04AK0<br>2 | BOXARID, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                  | Gedeon Richter<br>Plc.              | 100              | G35-G35  | Neuroloog   | esmane |              |               | konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel (ägenemiste<br>ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks |
| 1890851         | teriflunomiid,<br>14mg              | L04AK0<br>2 | TERIFLUNOMIDE<br>ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK  | Accord Healthcare<br>S.L.U.         | 100              | G35-G35  | Neuroloog   | esmane |              |               | konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel (ägenemiste<br>ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks |
| 1891267         | teriflunomiid,<br>14mg              | L04AK0<br>2 | TERIFLUNOMIDE<br>MYLAN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK   | Mylan<br>Pharmaceuticals<br>Limited | 100              | G35-G35  | Neuroloog   | esmane |              |               | konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel (ägenemiste<br>ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks |
| 1022623         | testosteroon,<br>250mg 1ml          | G03BA0<br>3 | SUSTANON,<br>süstelahus, 1ml 1TK                                       | Aspen Pharma<br>Trading Limited     | 50               |  |   |        |              |               |   |
|                 |                                     |             |  |                                     | 100              | E29.1-E29.1,<br>E89.5-E89.5,<br>E23-E23, Q98-<br>Q98 | Günekoloog,<br>Pediaater –<br>endokrinoloog,<br>uroloogia<br>androloogia<br>lisapädevusega ,<br>Endokrinoloog |        |              |               |   |
|                 |                                     |             |  |                                     | 100              | C00-D48  | Hematoloog,<br>Onkoloog   |        |              |               |   |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus        | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                          | Eriala                  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |
|-----------------|--|-------------|--|--|------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------|--------------|---------------|--|
| 1343898         | tetrabensiin,<br>25mg                      | N07XX0<br>6 | TETMODIS, tablett,<br>112TK                                  | AOP Orphan<br>Pharmaceuticals<br>GmbH  | 100              | G10-G10                           | Neuroloog               | esmane |              |               | hüperkineetiliste motorsete häiretega Huntingtoni tõve<br>raviks   |
| 1436835         | tianeptiin, 12,5mg                         | N06AX1<br>4 | SALYMBRA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK       | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.      | 50               |                                   |                         |        |              |               |  |
| 1436846         | tianeptiin, 12,5mg                         | N06AX1<br>4 | SALYMBRA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>90TK       | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.      | 50               |                                   |                         |        |              |               |  |
| 1506585         | tikagreloor, 90mg                          | B01AC2<br>4 | BRILIQUE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK       | Astrazeneca AB                         | 75               | Z95-Z95, I21-<br>I22, I25.2-I25.2 | Sisearst,<br>Kardioloog | esmane |              |               | müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika<br>järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12<br>kuu vältel |
|                 |  |             |  |  | 50               |                                   |                         |        |              |               |  |
| 1798375         | tikagreloor, 90mg                          | B01AC2<br>4 | TILOBRASIL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK     | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.      | 50               |                                   |                         |        |              |               |  |
|                 |  |             |  |  | 75               | I21-I22, I25.2-<br>I25.2, Z95-Z95 | Sisearst,<br>Kardioloog | esmane |              |               | müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika<br>järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12<br>kuu vältel |
| 1808467         | tikagreloor, 90mg                          | B01AC2<br>4 | ATIXARSO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK       | KRKA d.d. Novo<br>mesto                | 75               | Z95-Z95, I21-<br>I22, I25.2-I25.2 | Sisearst,<br>Kardioloog | esmane |              |               | müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika<br>järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12<br>kuu vältel |
|                 |  |             |  |  | 50               |                                   |                         |        |              |               |  |
| 3010330         | tikagreloor, 90mg                          | B01AC2<br>4 | BRIREM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK         | Remedica Limited                       | 50               |                                   |                         |        |              |               |  |
|                 |  |             |  |  | 75               | I25.2-I25.2, I21-<br>I22, Z95-Z95 | Kardioloog,<br>Sisearst | esmane |              |               | müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika<br>järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12<br>kuu vältel |
| 1038956         | timolool, 1mg 1g                           | S01ED0<br>1 | TIMOSAN, silmageel, 5g<br>1TK                                | Santen Oy                              | 100              | H40-H42                           | Oftalmoloog             | esmane |              |               |  |
|                 |  |             |  |  | 50               |                                   |                         |        |              |               |  |
| 1252976         | timolool+bimatopr<br>ost, 5mg+0,3mg<br>1ml | S01ED8<br>2 | GANFORT, silmatilgad,<br>lahus, 3ml 1TK                      | AbbVie<br>Deutschland<br>GmbH & Co. KG | 100              | H40-H42                           | Oftalmoloog             | esmane |              |               |  |
|                 |  |             |  |  | 50               |                                   |                         |        |              |               |  |
| 1720134         | timolool+bimatopr<br>ost, 5mg+0,3mg<br>1ml | S01ED8<br>2 | BIMATOPROST/TIMOL<br>OL TEVA, silmatilgad,<br>lahus, 3ml 1TK | Teva B.V.                              | 50               |                                   |                         |        |              |               |  |
|                 |  |             |  |  | 100              | H40-H42                           | Oftalmoloog             | esmane |              |               |  |
| 1720145         | timolool+bimatopr<br>ost, 5mg+0,3mg<br>1ml | S01ED8<br>2 | BIMATOPROST/TIMOL<br>OL TEVA, silmatilgad,<br>lahus, 3ml 3TK | Teva B.V.                              | 100              | H40-H42                           | Oftalmoloog             | esmane |              |               |  |
|                 |  |             |  |  | 50               |                                   |                         |        |              |               |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus    | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|--|-------------|---|----------------------------------|------------------|----------|-------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1720178         | timolool+bimatoprost, 5mg+0,3mg<br>1ml | S01ED8<br>2 | BIMATOPROST/TIMOL<br>OL VIATRIS,<br>silmatilgad, lahus, 3ml<br>1TK        | Viartis Limited                  | 50               |          |             |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |                                  | 100              | H40-H42  | Oftalmoloog | esmane |              |               |          |
| 1801561         | timolool+bimatoprost, 5mg+0,3mg<br>1ml | S01ED8<br>2 | BIMATOPROST/TIMOL<br>OL ZENTIVA,<br>silmatilgad, lahus, 3ml<br>1TK        | Zentiva k.s.                     | 100              | H40-H42  | Oftalmoloog | esmane |              |               |          |
|                 |  |             |   |                                  | 50               |          |             |        |              |               |          |
| 1843084         | timolool+bimatoprost, 5mg+0,3mg<br>1ml | S01ED8<br>2 | BIMATOPROST/TIMOL<br>OL ELVIM, silmatilgad,<br>lahus, 3ml 1TK             | SIA Elvim                        | 100              | H40-H42  | Oftalmoloog | esmane |              |               |          |
|                 |  |             |   |                                  | 50               |          |             |        |              |               |          |
| 1392207         | timolool+brinsolamiid, 5mg+10mg<br>1ml | S01ED8<br>3 | AZARGA, silmatilgad,<br>suspensioon, 5ml 1TK                              | Novartis<br>Europharm<br>Limited | 100              | H40-H42  | Oftalmoloog | esmane |              |               |          |
|                 |  |             |   |                                  | 50               |          |             |        |              |               |          |
| 1759372         | timolool+brinsolamiid, 5mg+10mg<br>1ml | S01ED8<br>3 | BRINZOLAMIDE/TIMOL<br>OL STADA, silmatilgad,<br>suspensioon, 5ml 1TK      | Stada Arzneimittel<br>AG         | 100              | H40-H42  | Oftalmoloog | esmane |              |               |          |
|                 |  |             |   |                                  | 50               |          |             |        |              |               |          |
| 1799208         | timolool+brinsolamiid, 5mg+10mg<br>1ml | S01ED8<br>3 | BRINZOLAMIDE/TIMOL<br>OL ACCORD,<br>silmatilgad,<br>suspensioon, 5ml 1TK  | Accord Healthcare<br>B.V.        | 50               |          |             |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |                                  | 100              | H40-H42  | Oftalmoloog | esmane |              |               |          |
| 1860645         | timolool+brinsolamiid, 5mg+10mg<br>1ml | S01ED8<br>3 | BRINZOLAMIDE/TIMOL<br>OL ZENTIVA,<br>silmatilgad,<br>suspensioon, 5ml 1TK | Zentiva k.s.                     | 100              | H40-H42  | Oftalmoloog | esmane |              |               |          |
|                 |  |             |   |                                  | 50               |          |             |        |              |               |          |
| 1039799         | timolool+dorsolamiid, 5mg+20mg<br>1ml  | S01ED8<br>0 | COSOPT, silmatilgad,<br>lahus, 5ml 1TK                                    | Santen Oy                        | 50               |          |             |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |                                  | 100              | H40-H42  | Oftalmoloog | esmane |              |               |          |
| 1420243         | timolool+dorsolamiid, 5mg+20mg<br>1ml  | S01ED8<br>0 | DORZOLAMIDE/TIMOL<br>OL ELVIM, silmatilgad,<br>lahus, 5ml 1TK             | SIA Elvim                        | 50               |          |             |        |              |               |          |
|                 |  |             |   |                                  | 100              | H40-H42  | Oftalmoloog | esmane |              |               |          |
| 1755503         | timolool+dorsolamiid, 5mg+20mg<br>1ml  | S01ED8<br>0 | VIZIDOR DUO,<br>silmatilgad, lahus, 5ml<br>1TK                            | Bausch + Lomb<br>Ireland Limited | 100              | H40-H42  | Oftalmoloog | esmane |              |               |          |
|                 |  |             |   |                                  | 50               |          |             |        |              |               |          |
| 1088254         | timolool+latanoprost, 5mg+50mcg<br>1ml | S01ED8<br>4 | XALACOM, silmatilgad,<br>lahus, 2.5ml 1TK                                 | Upjohn EESV                      | 100              | H40-H42  | Oftalmoloog | esmane |              |               |          |
|                 |  |             |   |                                  | 50               |          |             |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus        | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |
|-----------------|--|-------------|---|----------------------------------|------------------|----------|-------------|--------|--------------|---------------|--|
| 1445161         | timolool+latanopro<br>st, 5mg+50mcg<br>1ml | S01ED8<br>4 | LATIRA, silmatilgad,<br>lahus, 2.5ml 1TK                                  | Ratiopharm GmbH                  | 100              | H40-H42  | Oftalmoloog | esmane |              |               |  |
|                 |  |             |   |                                  | 50               |          |             |        |              |               |  |
| 1445172         | timolool+latanopro<br>st, 5mg+50mcg<br>1ml | S01ED8<br>4 | LATIRA, silmatilgad,<br>lahus, 2.5ml 3TK                                  | Ratiopharm GmbH                  | 50               |          |             |        |              |               |  |
|                 |  |             |   |                                  | 100              | H40-H42  | Oftalmoloog | esmane |              |               |  |
| 1791255         | timolool+latanopro<br>st, 5mg+50mcg<br>1ml | S01ED8<br>4 | LATANOPROST/TIMOL<br>OL ELVIM, silmatilgad,<br>lahus, 2.5ml 1TK           | SIA Elvim                        | 100              | H40-H42  | Oftalmoloog | esmane |              |               |  |
|                 |  |             |   |                                  | 50               |          |             |        |              |               |  |
| 1618141         | timolool+tafluprost,<br>5mg+15mcg 1ml      | S01ED8<br>5 | TAPTIQOM, silmatilgad,<br>lahus üheannuselises<br>konteineris, 0.3ml 30TK | Santen Oy                        | 50               |          |             |        |              |               |  |
|                 |  |             |   |                                  | 100              | H40-H42  | Oftalmoloog | esmane |              |               | kui ravi jätkamine teiste glaukoomiravimitega on meditsiiniliselt vastunäidustatud bensalkooniumkloriidile tekkinud tõendatud ülitundlikkuse või olulise toksilise toime tõttu silma eesmisele osale ning monoteeraapia säilitusaine vaba prostaglandiini analoogiga ei ole langetanud piisavalt silma siserõhku |
| 1792289         | timolool+tafluprost,<br>5mg+15mcg 1ml      | S01ED8<br>5 | TAPTIQOM SINE,<br>silmatilgad, lahus, 7ml<br>1TK                          | Santen Oy                        | 100              | H40-H42  | Oftalmoloog | esmane |              |               | kui ravi jätkamine teiste glaukoomiravimitega on meditsiiniliselt vastunäidustatud bensalkooniumkloriidile tekkinud tõendatud ülitundlikkuse või olulise toksilise toime tõttu silma eesmisele osale ning monoteeraapia säilitusaine vaba prostaglandiini analoogiga ei ole langetanud piisavalt silma siserõhku |
|                 |  |             |   |                                  | 50               |          |             |        |              |               |  |
| 1243763         | timolool+travopro<br>st, 5mg+40mcg 1ml     | S01ED8<br>1 | DUOTRAV, silmatilgad,<br>lahus, 2.5ml 1TK                                 | Novartis<br>Europharm<br>Limited | 100              | H40-H42  | Oftalmoloog | esmane |              |               |  |
|                 |  |             |   |                                  | 50               |          |             |        |              |               |  |
| 1716656         | timolool+travopro<br>st, 5mg+40mcg 1ml     | S01ED8<br>1 | TRAVOPROST/TIMOLO<br>L VIATRIS, silmatilgad,<br>lahus, 2.5ml 1TK          | Viatris Limited                  | 50               |          |             |        |              |               |  |
|                 |  |             |   |                                  | 100              | H40-H42  | Oftalmoloog | esmane |              |               |  |
| 1832453         | timolool+travopro<br>st, 5mg+40mcg 1ml     | S01ED8<br>1 | TRAVOPROST/TIMOLO<br>L ELVIM, silmatilgad,<br>lahus, 2.5ml 1TK            | SIA Elvim                        | 100              | H40-H42  | Oftalmoloog | esmane |              |               |  |
|                 |  |             |   |                                  | 50               |          |             |        |              |               |  |
| 1004375         | tioguaaniin, 40mg                          | L01BB0<br>3 | LANVIS, tablett, 25TK   | Aspen Pharma<br>Trading Limited  | 50               |          |             |        |              |               |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|--|------------------|----------------------|---------------------------|--------|--------------|---------------|--|
| 1111341         | tiokthape, 600mg                    | A16AX0<br>1 | THIOCTACID HR,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Viartis SIA                                      | 50               |                      |                           |        |              |               |  |
| 1303276         | tiokthape, 600mg                    | A16AX0<br>1 | THIOGAMMA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK        | Woerwag Pharma<br>GmbH & Co. KG                  | 50               |                      |                           |        |              |               |  |
| 1511301         | tiotroopium,<br>2,5mcg 1annus       | R03BB0<br>4 | SPIRIVA RESPIMAT,<br>inhalatsioonilahus,<br>60annus 1TK        | Boehringer<br>Ingelheim<br>International<br>GmbH | 50               |                      |                           |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |  |  | 75               | J43-J44              | Pulmonoloog               | esmane |              |               |  |
| 1173822         | tisanidiin, 2mg                     | M03BX0<br>2 | SIRDALUD, tablett,<br>30TK                                     | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.                | 50               |                      |                           |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |  |  | 75               | G82-G82, G81-<br>G81 |                           |        |              |               |  |
| 1839191         | tisanidiin, 2mg                     | M03BX0<br>2 | SIRDALUD, tablett,<br>30TK                                     | Lex Ano UAB                                      | 75               | G82-G82, G81-<br>G81 |                           |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |  |  | 50               |                      |                           |        |              |               |  |
| 1894282         | tisanidiin, 2mg                     | M03BX0<br>2 | SIRDALUD, tablett,<br>30TK                                     | Ideal Trade Links<br>UAB                         | 50               |                      |                           |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |  |  | 75               | G81-G81, G82-<br>G82 |                           |        |              |               |  |
| 1211599         | tisanidiin, 4mg                     | M03BX0<br>2 | SIRDALUD, tablett,<br>30TK                                     | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.                | 50               |                      |                           |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |  |  | 75               | G82-G82, G81-<br>G81 |                           |        |              |               |  |
| 1894305         | tisanidiin, 4mg                     | M03BX0<br>2 | SIRDALUD, tablett,<br>30TK                                     | Ideal Trade Links<br>UAB                         | 75               | G81-G81, G82-<br>G82 |                           |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |  |  | 50               |                      |                           |        |              |               |  |
| 1553880         | tobramütsiin,<br>28mg               | J01GB0<br>1 | TOBI PODHALER,<br>inhalatsioonipulber<br>kõvakapslis, 224TK    | VIATRIS<br>HEALTHCARE<br>Limited                 | 100              | E84-E84              | Pulmonoloog,<br>Pediaater |        |              |               | Pseudomonas aeruginosa põhjustatud kroonilise<br>kopsuinfektsiooni supressiivseks raviks tsüstilise<br>fibroosiga patsientidel |
| 1646827         | tobramütsiin,<br>300mg 5ml          | J01GB0<br>1 | TOBRAMYCIN VIA<br>PHARMA, nebuliseeritav<br>lahus, 56TK        | Via Pharma UAB                                   | 100              | E84-E84              | Pediaater,<br>Pulmonoloog |        |              |               | Pseudomonas aeruginosa põhjustatud kroonilise<br>kopsuinfektsiooni supressiivseks raviks tsüstilise<br>fibroosiga patsientidel |
| 1012543         | tobramütsiin, 3mg<br>1g             | S01AA1<br>2 | TOBEX, silmasalv,<br>3.5g 1TK                                  | Novartis Baltics<br>SIA                          | 50               |                      |                           |        |              |               |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla   | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|--------------------------|------------------|-------------------------|--|--------|--------------|---|---|
| 1809075         | tofatsitiniib, 11mg                 | L04AF01     | XELJANZ, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 28TK | Pfizer Europe MA<br>EEIG | 100              | K51-K51                 | Pediaater –<br>gastroenteroloog<br>,<br>Gastroenteroloog,<br>Pediaater |        |              |   | ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt kahe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud |
|                 |                                     |             |  |                          | 100              | M45-M46,<br>M07.0-M07.3 | Pediaater,<br>Reumatoloog  |        |              | ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud  |   |
|                 |                                     |             |  |                          | 100              | M05-M06, M08-<br>M08    | Pediaater,<br>Reumatoloog  |        |              | ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt kahe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                  | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                | Eriala  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|--------------------------|------------------|-------------------------|---|--------|--------------|---------------|---|
| 1859991         | tofatsitiniib, 1mg<br>1ml           | L04AF01     | XELJANZ, suukaudne<br>lahus, 240ml 1TK | Pfizer Europe MA<br>EEIG | 100              | M08-M08, M05-<br>M06    | Reumatoloog,<br>Pediaater   |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt kahe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud |
|                 |                                     |             |  |                          | 100              | K51-K51                 | Pediaater –<br>gastroenteroloog<br>,<br>Gastroenteroloo<br>g, Pediaater |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt kahe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud |
|                 |                                     |             |  |                          | 100              | M07.0-M07.3,<br>M45-M46 | Pediaater,<br>Reumatoloog   |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloa hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla   | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|-----------------------|------------------|----------------------|---|--------|--------------|---|---|
| 1742497         | tofatsitiniib, 5mg                  | L04AF01     | XELJANZ, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK        | Pfizer Europe MA EEIG | 100              | K51-K51              | Pediaater, Pediaater – gastroenteroloog, Gastroenteroloog |        |              |   | ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt kahe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud |
|                 |                                     |             |  |                       | 100              | M07.0-M07.3, M45-M46 | Pediaater, Reumatoloog                                    |        |              | ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud  |   |
|                 |                                     |             |  |                       | 100              | M08-M08, M05-M06     | Reumatoloog, Pediaater                                    |        |              | ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt kahe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud |   |
| 7000119         | toitained ilma fenüülalaniiniga,    |             | PHLEXY-10 DRINK MIX, pulber, 20g N30                   | SHS International     | 50               |                      |   |        |              |   |   |
|                 |                                     |             |  |                       | 100              | E70.0-E70.1          |   |        |              |   |   |
| 7000131         | toitained ilma fenüülalaniiniga,    |             | XP MAXAMAID (ORANGE FLAVOURED) pulber, pulber, 500g N4 | SHS International     | 100              | E70.0-E70.1          |   |        |              |   |   |
|                 |                                     |             |  |                       | 50               |                      |   |        |              |   |   |
| 7000142         | toitained ilma fenüülalaniiniga,    |             | XP MAXAMAID (UNFLAVOURED) pulber, pulber, 500g N4      | SHS International     | 100              | E70.0-E70.1          |   |        |              |   |   |
|                 |                                     |             |  |                       | 50               |                      |   |        |              |   |   |
| 7000153         | toitained ilma fenüülalaniiniga,    |             | XP MAXAMUM (ORANGE FLAVOURED) pulber, pulber, 500g N4  | SHS International     | 100              | E70.0-E70.1          |   |        |              |   |   |
|                 |                                     |             |  |                       | 50               |                      |   |        |              |   |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                    | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|-------------------------------|------------------|-----------------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 7000164         | toitained ilma<br>fenüülalaniinita, |             | XP MAXAMUM<br>(UNFLAVOURED)<br>pulber, pulber, 500g N4  | SHS International             | 50               | E70.0-E70.1                 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                               | 100              |                             |        |        |              |               |          |
| 7000186         | toitained ilma<br>fenüülalaniinita, |             | DUOCAL Supersoluble<br>, pulber, 400 g  | SHS                           | 100              | E70.0-E70.1                 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                               | 50               |                             |        |        |              |               |          |
| 7002504         | toitained ilma<br>fenüülalaniinita, |             | PKU-EXPRESS, pulber,<br>25g N30   | Vitaflo<br>International Ltd. | 100              | E70.0-E70.1                 |        |        |              |               |          |
| 7002515         | toitained ilma<br>fenüülalaniinita, |             | PKU-GEL, pulber, 20g<br>N30   | Vitaflo<br>International Ltd. | 100              | E70.0-E70.1                 |        |        |              |               |          |
| 7002896         | toitained ilma<br>fenüülalaniinita, |             | PKU ANAMIX INFANT,<br>pulber, 400g  | SHS International<br>Ltd      | 100              | E70.1-E70.1,<br>E70.0-E70.0 |        |        |              |               |          |
| 7015777         | toitained ilma<br>fenüülalaniinita, |             | PKU Lophlex LQ Juicy<br>tropical 10, suukaudne<br>lahus, 62,5ml N60   | SHS International<br>Ltd      | 100              | E70.0-E70.1                 |        |        |              |               |          |
| 7004922         | toitained ilma<br>fenüülalaniinita, |             | PKU Squeezie,<br>suukaudne pasta, 85 g<br>manustamisvalmis<br>toitainesegu kotikeses,<br>ühes karbis on 30<br>kotikest (2550 g) | Vitaflo<br>International Ltd. | 100              | E70.0-E70.1                 |        |        |              |               |          |
| 7017588         | toitained ilma<br>fenüülalaniinita, |             | COMIDA PKU B<br>Formula, pulber, 500g<br>N1   | Vitaflo<br>International Ltd. | 100              | E70.1-E70.1,<br>E70.0-E70.0 |        |        |              |               |          |
| 7015766         | toitained ilma<br>fenüülalaniinita, |             | PKU Lophlex LQ Juicy<br>tropical 20, suukaudne<br>lahus, 125ml N30  | SHS International<br>Ltd      | 100              | E70.0-E70.1                 |        |        |              |               |          |
| 7017982         | toitained ilma<br>fenüülalaniinita, |             | Milupa PKU 2-mix ,<br>pulber, 400g x 2  | Nutricia Cuijk bv             | 100              | E70.0-E70.0,<br>E70.1-E70.1 |        |        |              |               |          |
| 7015755         | toitained ilma<br>fenüülalaniinita, |             | PKU Lophlex LQ Juicy<br>berries 10, suukaudne<br>lahus, 62,5ml N60  | SHS International<br>Ltd      | 100              | E70.0-E70.1                 |        |        |              |               |          |
| 7017577         | toitained ilma<br>fenüülalaniinita, |             | COMIDA PKU A<br>Formula, pulber, 400g<br>N1   | Vitaflo<br>International Ltd. | 100              | E70.1-E70.1,<br>E70.0-E70.0 |        |        |              |               |          |



| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus    | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja            | Soodus-tus % | Diagnoos                 | Eriala    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-------------|----------------------------------|----------|---|----------------------------|--------------|--------------------------|-----------|--------|-----------|------------|--|
| 7017599     | toitained ilma fenüülalaniinita, |          | COMIDA PKU B Formula Orange, pulber, 500g N1                      | Vitaflo International Ltd. | 100          | E70.1-E70.1, E70.0-E70.0 |           |        |           |            |  |
| 7015744     | toitained ilma fenüülalaniinita, |          | PKU Lophlex LQ Juicy berries 20, suukaudne lahus, 125ml N30       | SHS International Ltd      | 100          | E70.0-E70.1              |           |        |           |            |  |
| 1371248     | tokofersolaan, 50mg 1ml          | A11HA08  | VEDROP, suukaudne lahus, 60ml 1TK                                 | Recordati Rare Diseases    | 100          | E84-E84, Q44-Q44         | Pediaater |        |           | 19,00      | raske kroonilise kolestaasi raviks kuni 18-aastastele patsientidele konsiiliumi (vähemalt 2 pediatr'i ühise) otsuse alusel |
| 1430086     | tokofersolaan, 50mg 1ml          | A11HA08  | VEDROP, suukaudne lahus, 20ml 1TK                                 | Recordati Rare Diseases    | 100          | E84-E84, Q44-Q44         | Pediaater |        |           | 19,00      | raske kroonilise kolestaasi raviks kuni 18-aastastele patsientidele konsiiliumi (vähemalt 2 pediatr'i ühise) otsuse alusel |
| 1284498     | tolterodiin, 2mg                 | G04BD07  | UROFLOW 2 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK              | Zentiva k.s.               | 50           |                          |           |        |           |            |  |
| 1795877     | tolterodiin, 2mg                 | G04BD07  | UROFLOW 2 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK              | First Pharma OÜ            | 50           |                          |           |        |           |            |  |
| 1503762     | tolterodiin, 4mg                 | G04BD07  | UROFLOW 4MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 28TK | Zentiva k.s.               | 50           |                          |           |        |           |            |  |
| 1076778     | topiramaat, 100mg                | N03AX11  | TOPAMAX, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK                   | Johnson & Johnson UAB      | 50           |                          |           |        |           |            |  |
|             |                                  |          |   |                            | 100          | G40-G40                  | Neuroloog | esmane |           |            |  |
|             |                                  |          |   |                            | 75           | G43-G43                  |           |        |           |            |  |
| 1309878     | topiramaat, 100mg                | N03AX11  | TOPIRAMATE ORION, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK          | Orion Corporation          | 100          | G40-G40                  | Neuroloog | esmane |           |            |  |
|             |                                  |          |   |                            | 75           | G43-G43                  |           |        |           |            |  |
|             |                                  |          |   |                            | 50           |                          |           |        |           |            |  |
| 1456488     | topiramaat, 100mg                | N03AX11  | TOPIRAMATE ELVIM, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK          | SIA Elvim                  | 50           |                          |           |        |           |            |  |
|             |                                  |          |   |                            | 75           | G43-G43                  |           |        |           |            |  |
|             |                                  |          |   |                            | 100          | G40-G40                  | Neuroloog | esmane |           |            |  |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                    | Müügiloa hoidja       | Soodus-tus % | Diagnoos | Eriala    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-------------|-------------------------------|----------|--|-----------------------|--------------|----------|-----------|--------|-----------|------------|----------|
| 1076846     | topiramaat, 200mg             | N03AX11  | TOPAMAX, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK          | Johnson & Johnson UAB | 75           | G43-G43  |           |        |           |            |          |
|             |                               |          |  |                       | 100          | G40-G40  | Neuroloog | esmane |           |            |          |
|             |                               |          |  |                       | 50           |          |           |        |           |            |          |
| 1076688     | topiramaat, 25mg              | N03AX11  | TOPAMAX, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK          | Johnson & Johnson UAB | 50           |          |           |        |           |            |          |
|             |                               |          |  |                       | 100          | G40-G40  | Neuroloog | esmane |           |            |          |
|             |                               |          |  |                       | 75           | G43-G43  |           |        |           |            |          |
| 1309812     | topiramaat, 25mg              | N03AX11  | TOPIRAMATE ORION, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Orion Corporation     | 100          | G40-G40  | Neuroloog | esmane |           |            |          |
|             |                               |          |  |                       | 50           |          |           |        |           |            |          |
|             |                               |          |  |                       | 75           | G43-G43  |           |        |           |            |          |
| 1456444     | topiramaat, 25mg              | N03AX11  | TOPIRAMATE ELVIM, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | SIA Elvim             | 100          | G40-G40  | Neuroloog | esmane |           |            |          |
|             |                               |          |  |                       | 50           |          |           |        |           |            |          |
|             |                               |          |  |                       | 75           | G43-G43  |           |        |           |            |          |
| 1076734     | topiramaat, 50mg              | N03AX11  | TOPAMAX, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK          | Johnson & Johnson UAB | 75           | G43-G43  |           |        |           |            |          |
|             |                               |          |  |                       | 50           |          |           |        |           |            |          |
|             |                               |          |  |                       | 100          | G40-G40  | Neuroloog | esmane |           |            |          |
| 1309834     | topiramaat, 50mg              | N03AX11  | TOPIRAMATE ORION, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Orion Corporation     | 50           |          |           |        |           |            |          |
|             |                               |          |  |                       | 75           | G43-G43  |           |        |           |            |          |
|             |                               |          |  |                       | 100          | G40-G40  | Neuroloog | esmane |           |            |          |
| 1456466     | topiramaat, 50mg              | N03AX11  | TOPIRAMATE ELVIM, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | SIA Elvim             | 100          | G40-G40  | Neuroloog | esmane |           |            |          |
|             |                               |          |  |                       | 75           | G43-G43  |           |        |           |            |          |
|             |                               |          |  |                       | 50           |          |           |        |           |            |          |
| 1158050     | torasemiid, 100mg             | C03CA04  | TORASEMIDE HEXAL 100 MG, tablett, 30TK                   | Hexal AG              | 50           |          |           |        |           |            |          |
| 1771332     | torasemiid, 100mg             | C03CA04  | TORASEMIDE HEXAL 100 MG, tablett, 30TK                   | First Pharma OÜ       | 50           |          |           |        |           |            |          |
| 1843769     | torasemiid, 100mg             | C03CA04  | TORASEMIDE HEXAL 100 MG, tablett, 30TK                   | Lex Ano UAB           | 50           |          |           |        |           |            |          |
| 1852512     | torasemiid, 100mg             | C03CA04  | TORASEMIDE HEXAL 100 MG, tablett, 30TK                   | Ideal Trade Links UAB | 50           |          |           |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|--|------------------|----------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1032332         | torasemiid, 10mg                    | C03CA0<br>4 | TRIFAS 10 MG, tablett,<br>30TK  | Menarini<br>International<br>Operations<br>Luxembourg S.A. | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1166015         | torasemiid, 10mg                    | C03CA0<br>4 | TORASEMIDE TEVA,<br>tablett, 30TK   | Teva Pharma B.V.   | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1422717         | torasemiid, 10mg                    | C03CA0<br>4 | TORASEMIDE HEXAL,<br>tablett, 30TK  | Hexal AG   | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1770892         | torasemiid, 10mg                    | C03CA0<br>4 | TORASEMIDE HEXAL,<br>tablett, 30TK  | First Pharma OÜ  | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1770904         | torasemiid, 10mg                    | C03CA0<br>4 | TORASEMIDE HEXAL,<br>tablett, 50TK  | First Pharma OÜ  | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1866461         | torasemiid, 10mg                    | C03CA0<br>4 | TORASEMIDE HEXAL,<br>tablett, 30TK  | Lex Ano UAB  | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1873852         | torasemiid, 10mg                    | C03CA0<br>4 | TRIFAS 10 MG, tablett,<br>60TK  | Ideal Trade Links<br>UAB                                   | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1888454         | torasemiid, 10mg                    | C03CA0<br>4 | TRIFAS 10 MG, tablett,<br>30TK  | Lex Ano UAB  | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 3002511         | torasemiid, 10mg                    | C03CA0<br>4 | TORASEMIDE<br>ZENTIVA, tablett, 30TK                                      | Zentiva k.s.   | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1032321         | torasemiid, 200mg                   | C03CA0<br>4 | TRIFAS 200 MG, tablett,<br>30TK   | Menarini<br>International<br>Operations<br>Luxembourg S.A. | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1158106         | torasemiid, 200mg                   | C03CA0<br>4 | TORASEMIDE HEXAL<br>200 MG, tablett, 30TK                                 | Hexal AG   | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1854985         | torasemiid, 200mg                   | C03CA0<br>4 | TORASEMIDE HEXAL<br>200 MG, tablett, 30TK                                 | Ideal Trade Links<br>UAB                                   | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1861927         | torasemiid, 200mg                   | C03CA0<br>4 | TORASEMIDE HEXAL<br>200 MG, tablett, 30TK                                 | First Pharma OÜ  | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1165957         | torasemiid, 5mg                     | C03CA0<br>4 | TORASEMIDE TEVA,<br>tablett, 30TK   | Teva Pharma B.V.   | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1043525         | tramadool, 100mg                    | N02AX0<br>2 | TRAMADOL KRKA,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | KRKA, d.d., Novo<br>mesto                                  | 50               |          |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|---------------------------|------------------|----------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1075665         | tramadool, 100mg                    | N02AX0<br>2 | TRAMADOL<br>LANNACHER 100 MG,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | G.L. Pharma<br>GmbH       | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1174621         | tramadool, 100mg                    | N02AX0<br>2 | MABRON RETARD,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK                | Medochemie Ltd            | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1085857         | tramadool, 150mg                    | N02AX0<br>2 | TRAMADOL<br>LANNACHER 150MG,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK  | G.L. Pharma<br>GmbH       | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1174632         | tramadool, 150mg                    | N02AX0<br>2 | MABRON RETARD,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK                | Medochemie Ltd            | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1759743         | tramadool, 150mg                    | N02AX0<br>2 | OLTERON, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK                         | KRKA d.d. Novo<br>mesto   | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1085879         | tramadool, 200mg                    | N02AX0<br>2 | TRAMADOL<br>LANNACHER 200 MG,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | G.L. Pharma<br>GmbH       | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1174643         | tramadool, 200mg                    | N02AX0<br>2 | MABRON RETARD,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK                | Medochemie Ltd            | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1759822         | tramadool, 200mg                    | N02AX0<br>2 | OLTERON, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK                         | KRKA d.d. Novo<br>mesto   | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1015580         | tramadool, 50mg                     | N02AX0<br>2 | TRAMADOL KRKA,<br>kõvakapsel, 20TK   | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 50               |          |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus     | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|---|-------------|---|----------------------------------|------------------|------------------|-------------|--------|--------------|---------------|---|
| 1032679         | tramadool, 50mg                         | N02AX0<br>2 | TRAMADOL<br>LANNACHER, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>20TK | G.L. Pharma<br>GmbH              | 50               |                  |             |        |              |               |   |
| 1656952         | trametiniib, 0,5mg                      | L01EE0<br>1 | MEKINIST, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK              | Novartis<br>Europharm<br>Limited | 100              | C43-C43          | Onkoloog    |        |              |               | konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) otsuse alusel BRAF<br>V600 mutatsiooniga kauglearenenud mitteresetseeritava<br>või metastaatilise (IIIc-IV st) melanoomi raviks juhul, kui<br>patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1 ja<br>3-kuulise intervalliga hinnatuna püsib haigus vähemalt<br>stabiilsena (KT- või/ ja muu asjakohase uuringu alusel<br>hinnatuna haiguse progressiooni ei esine) |
| 1656985         | trametiniib, 2mg                        | L01EE0<br>1 | MEKINIST, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK              | Novartis<br>Europharm<br>Limited | 100              | C43-C43          | Onkoloog    |        |              |               | konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) otsuse alusel BRAF<br>V600 mutatsiooniga kauglearenenud mitteresetseeritava<br>või metastaatilise (IIIc-IV st) melanoomi raviks juhul, kui<br>patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1 ja<br>3-kuulise intervalliga hinnatuna püsib haigus vähemalt<br>stabiilsena (KT- või/ ja muu asjakohase uuringu alusel<br>hinnatuna haiguse progressiooni ei esine) |
| 1074765         | trandolapriil, 2mg                      | C09AA1<br>0 | GOPTEN, kõvakapsel,<br>28TK   | Viartis SIA                      | 75<br>50         | I10-I13, I15-I15 |             |        |              |               |   |
| 1327520         | trandolapriil, 4mg                      | C09AA1<br>0 | GOPTEN, kõvakapsel,<br>28TK   | Viartis SIA                      | 50<br>75         | I10-I13, I15-I15 |             |        |              |               |   |
| 1233290         | trandolapriil+verap<br>amiil, 2mg+180mg | C09BB1<br>0 | TARKA, toimeainet<br>modifitseeritud vabastav<br>tablett, 28TK      | Viartis SIA                      | 50<br>75         | I10-I13, I15-I15 |             |        |              |               |   |
| 1377660         | trandolapriil+verap<br>amiil, 4mg+240mg | C09BB1<br>0 | TARKA, toimeainet<br>modifitseeritud vabastav<br>tablett, 28TK      | Viartis SIA                      | 50<br>75         | I10-I13, I15-I15 |             |        |              |               |   |
| 1083316         | traneksaamhape,<br>500mg                | B02AA0<br>2 | CYKLOKAPRON,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>20TK        | Viartis SIA                      | 50               |                  |             |        |              |               |   |
| 1130454         | travoprost, 40mcg<br>1ml                | S01EE0<br>4 | TRAVATAN, silmatilgad,<br>lahus, 2.5ml 1TK                          | Novartis<br>Europharm<br>Limited | 100<br>50        | H40-H42          | Oftalmoloog | esmane |              |               |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                   | Müügiloo hoidja                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|----------------------------------|------------------|-------------|--|--------|--------------|---------------|---|
| 1608027         | travoprost, 40mcg<br>1ml            | S01EE0<br>4 | TRAVOPROST<br>ZENTIVA, silmatilgad,<br>lahus, 2.5ml 1TK | Zentiva k.s.                     | 100              | H40-H42     | Oftalmoloog  | esmane |              |               |   |
|                 |                                     |             |   |                                  | 50               |             |  |        |              |               |   |
| 1798050         | travoprost, 40mcg<br>1ml            | S01EE0<br>4 | TRAVOPROST ELVIM,<br>silmatilgad, lahus, 2.5ml<br>1TK   | SIA Elvim                        | 100              | H40-H42     | Oftalmoloog  | esmane |              |               |   |
|                 |                                     |             |   |                                  | 50               |             |  |        |              |               |   |
| 1799433         | travoprost, 40mcg<br>1ml            | S01EE0<br>4 | VIZITRAV, silmatilgad,<br>lahus, 2.5ml 1TK              | Bausch + Lomb<br>Ireland Limited | 50               |             |  |        |              |               |   |
|                 |                                     |             |   |                                  | 100              | H40-H42     | Oftalmoloog  | esmane |              |               |   |
| 1815634         | treprostiniil, 10mg<br>1ml          | B01AC2<br>1 | TREPULMIX,<br>infusioonilahus, 10ml<br>1TK              | Scipharm S.a.r.l.                | 100              | I27.0-I27.0 | Pulmonoloog,<br>Kardioloog,<br>Pediaater,<br>Reumatoloog |        |              |               | konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel kroonilise trombemboolilise pulmonaalhüpertensiooniga patsiendile, kellel kirurgiline ravi ei ole teostatav või kellel haigus kirurgilise ravi järel püsib või taastekib ning kelle seisund vastab NYHA III-IV funktsionaalsele klassile |
| 1186040         | treprostiniil, 1mg<br>1ml           | B01AC2<br>1 | REMODULIN,<br>infusioonilahus, 20ml<br>1TK              | Ferrer<br>Internacional S.A.     | 100              | I27.0-I27.0 | Pulmonoloog,<br>Kardioloog,<br>Pediaater                 |        |              |               | NYHA III või IV kl idiopaatilise või päriliku pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel patsiendile, kellel muud ravivõimalused on ebapiisavad või ravimvormi tõttu sobimatud  |
| 1815601         | treprostiniil, 1mg<br>1ml           | B01AC2<br>1 | TREPULMIX,<br>infusioonilahus, 10ml<br>1TK              | Scipharm S.a.r.l.                | 100              | I27.0-I27.0 | Pulmonoloog,<br>Kardioloog,<br>Reumatoloog,<br>Pediaater |        |              |               | konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel kroonilise trombemboolilise pulmonaalhüpertensiooniga patsiendile, kellel kirurgiline ravi ei ole teostatav või kellel haigus kirurgilise ravi järel püsib või taastekib ning kelle seisund vastab NYHA III-IV funktsionaalsele klassile |
| 1186062         | treprostiniil, 2,5mg<br>1ml         | B01AC2<br>1 | REMODULIN,<br>infusioonilahus, 20ml<br>1TK              | Ferrer<br>Internacional S.A.     | 100              | I27.0-I27.0 | Kardioloog,<br>Pediaater,<br>Pulmonoloog                 |        |              |               | NYHA III või IV kl idiopaatilise või päriliku pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel patsiendile, kellel muud ravivõimalused on ebapiisavad või ravimvormi tõttu sobimatud  |
| 1815612         | treprostiniil, 2,5mg<br>1ml         | B01AC2<br>1 | TREPULMIX,<br>infusioonilahus, 10ml<br>1TK              | Scipharm S.a.r.l.                | 100              | I27.0-I27.0 | Pulmonoloog,<br>Kardioloog,<br>Pediaater,<br>Reumatoloog |        |              |               | konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel kroonilise trombemboolilise pulmonaalhüpertensiooniga patsiendile, kellel kirurgiline ravi ei ole teostatav või kellel haigus kirurgilise ravi järel püsib või taastekib ning kelle seisund vastab NYHA III-IV funktsionaalsele klassile |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus       | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloo hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |
|-----------------|---|-------------|---|------------------------------|------------------|-------------|--|--------|--------------|---------------|--|
| 1186073         | treprostiniil, 5mg<br>1ml                 | B01AC2<br>1 | REMODULIN,<br>infusioonilahus, 20ml<br>1TK            | Ferrer<br>Internacional S.A. | 100              | I27.0-I27.0 | Pulmonoloog,<br>Pediaater,<br>Kardioloog                 |        |              |               | NYHA III või IV kl idiopaatilise või päriliku pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel patsiendile, kellel muud ravivõimalused on ebapiisavad või ravimvormi tõttu sobimatud   |
| 1815623         | treprostiniil, 5mg<br>1ml                 | B01AC2<br>1 | TREPULMIX,<br>infusioonilahus, 10ml<br>1TK            | Scipharm S.a.r.l.            | 100              | I27.0-I27.0 | Reumatoloog,<br>Pediaater,<br>Kardioloog,<br>Pulmonoloog |        |              |               | konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel kroonilise trombemboolilise pulmonaalhüpertensiooniga patsiendile, kellel kirurgiline ravi ei ole teostatav või kellel haigus kirurgilise ravi järel püsib või taastekib ning kelle seisund vastab NYHA III-IV funktsionaalsele klassile                                    |
| 1008425         | triamtsinoolon,<br>40mg 1ml               | H02AB0<br>8 | KENALOG,<br>süstesuspensioon, 1ml<br>5TK              | KRKA, d.d., Novo<br>mesto    | 50               |             |  |        |              |               |  |
| 1716319         | trifluridiin+tipiratsiil<br>, 15mg+6,14mg | L01BC8<br>3 | LONSURF, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>20TK | Les Laboratoires<br>Servier  | 100              | C18-C20     | Onkoloog   |        |              |               | III ravireas kuni haiguse progressioonini metastaatilise kolorektaalvähiga täiskasvanud patsientidele, keda on eelnevalt ravitud olemasolevate ravimeetoditega sealhulgas fluoropürimidiini, oksaliplatiini ja irinotekaanipõhiste kemoterapiatega, anti-VEGF raviga või kellele need ravimeetodid on vastunäidustatud või osutunud talumatuks |
| 1716331         | trifluridiin+tipiratsiil<br>, 15mg+6,14mg | L01BC8<br>3 | LONSURF, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Les Laboratoires<br>Servier  | 100              | C18-C20     | Onkoloog   |        |              |               | III ravireas kuni haiguse progressioonini metastaatilise kolorektaalvähiga täiskasvanud patsientidele, keda on eelnevalt ravitud olemasolevate ravimeetoditega sealhulgas fluoropürimidiini, oksaliplatiini ja irinotekaanipõhiste kemoterapiatega, anti-VEGF raviga või kellele need ravimeetodid on vastunäidustatud või osutunud talumatuks |
| 1716342         | trifluridiin+tipiratsiil<br>, 20mg+8,19mg | L01BC8<br>3 | LONSURF, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>20TK | Les Laboratoires<br>Servier  | 100              | C18-C20     | Onkoloog   |        |              |               | III ravireas kuni haiguse progressioonini metastaatilise kolorektaalvähiga täiskasvanud patsientidele, keda on eelnevalt ravitud olemasolevate ravimeetoditega sealhulgas fluoropürimidiini, oksaliplatiini ja irinotekaanipõhiste kemoterapiatega, anti-VEGF raviga või kellele need ravimeetodid on vastunäidustatud või osutunud talumatuks |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus       | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |
|-----------------|---|-------------|--|-----------------------------|------------------|----------|----------|--------|--------------|---------------|--|
| 1716364         | trifluridiin+tipiratsiil<br>, 20mg+8,19mg | L01BC8<br>3 | LONSURF, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK                                  | Les Laboratoires<br>Servier | 100              | C18-C20  | Onkoloog |        |              |               | III ravireas kuni haiguse progressioonini metastaatilise<br>kolorektaalvähiga täiskasvanud patsientidele, keda on<br>eelnevalt ravitud olemasolevate ravimeetoditega<br>sealhulgas fluoropürimidiini, oksaliplatiini ja<br>irinotekaanipõhiste kemoterapiatega, anti-VEGF raviga<br>või kellele need ravimeetodid on vastunäidustatud või<br>osutunud talumatuks |
| 1014422         | triheksüfenidüül,<br>2mg                  | N04AA0<br>1 | CYCLODOL, tablett,<br>50TK   | Grindeks AS                 | 50               |          |          |        |              |               |  |
| 1109641         | trimetasidiin, 35mg                       | C01EB1<br>5 | PREDUCTAL MR,<br>toimeainet<br>modifitseeritud vabastav<br>tablett, 60TK               | Les Laboratoires<br>Servier | 50               |          |          |        |              |               |  |
| 1293162         | trimetasidiin, 35mg                       | C01EB1<br>5 | TRIMETAZIDINE TEVA<br>35MG, toimeainet<br>prolongeeritud vabastav<br>tablett, 60TK     | Teva Pharma B.V.            | 50               |          |          |        |              |               |  |
| 1401411         | trimetasidiin, 35mg                       | C01EB1<br>5 | TRIMETAZIDINE<br>RIVOPHARM,<br>toimeainet<br>modifitseeritud vabastav<br>tablett, 60TK | Rivopharm Limited           | 50               |          |          |        |              |               |  |
| 1016312         | trimetoprim,<br>100mg                     | J01EA01     | TRIMETOP 100MG,<br>tablett, 30TK   | Vitalbans Oy                | 50               |          |          |        |              |               |  |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                    | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla   | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|-----------------|------------------|-----------------------------|--|--------|--------------|---|--|
| 1400421         | triptoreliin,<br>11,25mg            | L02AE0<br>4 | DIPHERELINE 11,25<br>MG, toimeainet<br>prolongeeritult<br>vabastava<br>süstesuspensiooni<br>pulber ja lahusti, 1TK | Ipsen Pharma    | 75               | N80-N80                     | Günekoloog   |        |              |   | III-IV astme endometriooosi põdevatele patsientidele |
|                 |                                     |             |  |                 | 100              | N97.0-N97.9,<br>Z31.0-Z31.9 |  |        | 41,00        | kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise<br>tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks   |  |
|                 |                                     |             |  |                 | 100              | C61-C61                     | Onkoloog,<br>Uroloog   |        |              | lokaalse või lokaalselt levinud kõrge riskiga (kliiniline<br>staadium $\geq$ T2c või Gleasoni skoor 8-10 või PSA $\geq$ 20<br>ng/ml või regionaalsete lümfisõlmede haaratus või<br>positiivne resektsioonipiir) multimodaalse ravi osana kuni<br>2 aasta vältel ning metastaseerunud eesnäärmevähiga<br>patsientidele |  |
|                 |                                     |             |  |                 | 75               | D25-D25                     | Günekoloog   | esmane |              | mõõdukate kuni raskete sümptomitega patsientidele,<br>kellel esmavaliku ravimid (traneksaamhape,<br>hormonaalsed kontratseptiivid, emakasisesed<br>rasestumisvastased vahendid) on ebaefektiivsed või<br>talumatud.   |  |
|                 |                                     |             |  |                 | 75               | E22.8-E22.8                 | Pediaater,<br>Pediaater –<br>endokrinoloog,<br>Endokrinoloog |        |              |   |  |
|                 |                                     |             |  |                 | 50               |                             |  |        |              |   |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                    | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|-----------------|------------------|-----------------------------|--|--------|--------------|---------------|---|
| 1818604         | triptoreliin, 22,5mg                | L02AE0<br>4 | DIPHERELINE 22,5<br>MG, toimeainet<br>prolongeeritult<br>vabastava<br>süstesuspensiooni<br>pulber ja lahusti, 1TK | Ipsen Pharma    | 100              | N97.0-N97.9,<br>Z31.0-Z31.9 |  |        |              | 41,00         | kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise<br>tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks   |
|                 |                                     |             |   |                 | 100              | C61-C61                     | Uroloog,<br>Onkoloog   |        |              |               | lokaalse või lokaalselt levinud kõrge riskiga (kliiniline<br>staadium >=T2c või Gleasoni skoor 8-10 või PSA >=20<br>ng/ml või regionaalsete lümfisõlmede haaratus või<br>positiivne resektsioonipiir) multimodaalse ravi osana kuni<br>2 aasta vältel ning metastaseerunud eesnäärmevähiga<br>patsientidele |
|                 |                                     |             |   |                 | 75               | E22.8-E22.8                 | Endokrinoloog,<br>Pediaater –<br>endokrinoloog,<br>Pediaater |        |              |               |   |
|                 |                                     |             |   |                 | 75               | N80-N80                     | Günekoloog   |        |              |               | III-IV astme endometriooosi põdevatele patsientidele  |
|                 |                                     |             |   |                 | 50               |                             |  |        |              |               |   |
|                 |                                     |             |   |                 | 75               | D25-D25                     | Günekoloog   | esmane |              |               | mõõdukate kuni raskete sümptomitega patsientidele,<br>kellel esmavaliku ravimid (traneksaanhape,<br>hormonaalsed kontratseptiivid, emakasisesed<br>rasestumisvastased vahendid) on ebaefektiivsed või<br>talumatud.   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                    | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|----------------------------------|------------------|-----------------------------|--|--------|--------------|---------------|--|
| 1040397         | triptoreliin, 3,75mg                | L02AE0<br>4 | DIPHERELINE 3,75<br>MG, toimeainet<br>prolongeeritult<br>vabastava<br>süstesuspensiooni<br>pulber ja lahusti, 1TK | Ipsen Pharma                     | 75               | E22.8-E22.8                 | Pediaater –<br>endokrinoloog,<br>Pediaater,<br>Endokrinoloog |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |   |                                  | 100              | C61-C61                     | Onkoloog,<br>Uroloog   |        |              |               | lokaalse või lokaalselt levinud kõrge riskiga (kliiniline<br>staadium >=T2c või Gleasoni skoor 8-10 või PSA >=20<br>ng/ml või regionaalsete lümfisõlmede haaratus või<br>positiivne reseksioonipiir) multimodaalse ravi osana kuni<br>2 aasta vältel ning metastaseerunud eesnäärmevähiga<br>patsientidele |
|                 |                                     |             |   |                                  | 75               | N80-N80                     | Günekoloog   |        |              |               | III-IV astme endometriooosi põdevatele patsientidele   |
|                 |                                     |             |   |                                  | 100              | N97.0-N97.9,<br>Z31.0-Z31.9 |  |        |              | 41,00         | kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise<br>tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks  |
|                 |                                     |             |   |                                  | 75               | D25-D25                     | Günekoloog   | esmane |              |               | mõõdukate kuni raskete sümptomitega patsientidele,<br>kellel esmavaliku ravimid (traneksaamhape,<br>hormonaalsed kontratseptiivid, emakasisesed<br>rasestumisvastased vahendid) on ebaefektiivsed või<br>talumatud.  |
|                 |                                     |             |   |                                  | 50               |                             |  |        |              |               |  |
| 1090189         | trosipiumkloriid,<br>15mg           | G04BD0<br>9 | SPASMED 15, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK  | Pro.Med.Cs Praha<br>a.s.         | 50               |                             |  |        |              |               |  |
| 1025064         | tsefadroksiil, 1g                   | J01DB0<br>5 | DURACEF, lahustuv<br>tablett, 10TK  | Bausch Health<br>Ireland Limited | 50               |                             |  |        |              |               |  |
| 1027134         | tsefadroksiil,<br>500mg             | J01DB0<br>5 | DURACEF, kõvakapsel,<br>12TK  | Bausch Health<br>Ireland Limited | 50               |                             |  |        |              |               |  |
| 1067318         | tsefadroksiil, 50mg<br>1ml          | J01DB0<br>5 | DURACEF, suukaudse<br>suspensiooni pulber,<br>100ml 1TK   | Bausch Health<br>Ireland Limited | 50               |                             |  |        |              |               |  |
| 3030466         | tsefadroksiil, 50mg<br>1ml          | J01DB0<br>5 | DURACEF, suukaudse<br>suspensiooni pulber,<br>60ml 1TK  | Ideal Trade Links<br>UAB         | 50               |                             |  |        |              |               |  |
| 1068320         | tsefprosiil, 250mg                  | J01DC1<br>0 | CEFZIL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK  | Bausch Health<br>Ireland Limited | 50               |                             |  |        |              |               |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                     | Müügiloa hoidja                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|-----------------------------------|------------------|----------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1068375         | tsefprosiil, 500mg                  | J01DC1<br>0 | CEFZIL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK      | Bausch Health<br>Ireland Limited  | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1028506         | tsefprosiil, 50mg<br>1ml            | J01DC1<br>0 | CEFZIL, suukaudse<br>suspensiooni pulber,<br>60ml 1TK     | Bausch Health<br>Ireland Limited  | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1007110         | tsefuroksiim,<br>250mg              | J01DC0<br>2 | ZINNAT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK      | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1438387         | tsefuroksiim,<br>250mg              | J01DC0<br>2 | AXETINE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK     | Medochemie<br>Limited             | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1659922         | tsefuroksiim,<br>250mg              | J01DC0<br>2 | FUROCEF, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK     | KRKA d.d. Novo<br>mesto           | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1841307         | tsefuroksiim,<br>250mg              | J01DC0<br>2 | ZINNAT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK      | Ideal Trade Links<br>UAB          | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1137350         | tsefuroksiim, 25mg<br>1ml           | J01DC0<br>2 | ZINNAT, suukaudse<br>suspensiooni graanulid,<br>100ml 1TK | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1007143         | tsefuroksiim,<br>500mg              | J01DC0<br>2 | ZINNAT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK      | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1287840         | tsefuroksiim,<br>500mg              | J01DC0<br>2 | ZINNAT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK      | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1438398         | tsefuroksiim,<br>500mg              | J01DC0<br>2 | AXETINE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK     | Medochemie<br>Limited             | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1580947         | tsefuroksiim,<br>500mg              | J01DC0<br>2 | AXETINE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK     | Medochemie<br>Limited             | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1659988         | tsefuroksiim,<br>500mg              | J01DC0<br>2 | FUROCEF, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK     | KRKA d.d. Novo<br>mesto           | 50               |          |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|----------------------------------|------------------|----------|----------|--------|--------------|---------------|--|
| 1660003         | tsefuroksiim,<br>500mg              | J01DC0<br>2 | FUROCEF, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK              | KRKA d.d. Novo<br>mesto          | 50               |          |          |        |              |               |  |
| 1841318         | tsefuroksiim,<br>500mg              | J01DC0<br>2 | ZINNAT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK               | Ideal Trade Links<br>UAB         | 50               |          |          |        |              |               |  |
| 1862827         | tsefuroksiim,<br>500mg              | J01DC0<br>2 | ZINNAT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK               | Lex Ano UAB                      | 50               |          |          |        |              |               |  |
| 3048117         | tsefuroksiim,<br>500mg              | J01DC0<br>2 | ZINNAT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK               | Lex Ano UAB                      | 50               |          |          |        |              |               |  |
| 1073641         | tselekoksiib,<br>100mg              | M01AH0<br>1 | CELEBEX,<br>kõvakapsel, 20TK                                       | Upjohn EESV                      | 50               |          |          |        |              |               |  |
| 1596719         | tselekoksiib,<br>100mg              | M01AH0<br>1 | ACLEXA, kõvakapsel,<br>30TK  | KRKA, d.d., Novo<br>mesto        | 50               |          |          |        |              |               |  |
| 1819335         | tselekoksiib,<br>100mg              | M01AH0<br>1 | CELECOXIB ACCORD,<br>kõvakapsel, 30TK                              | Accord Healthcare<br>B.V.        | 50               |          |          |        |              |               |  |
| 1596797         | tselekoksiib,<br>200mg              | M01AH0<br>1 | ACLEXA, kõvakapsel,<br>30TK  | KRKA, d.d., Novo<br>mesto        | 50               |          |          |        |              |               |  |
| 1815443         | tselekoksiib,<br>200mg              | M01AH0<br>1 | ACLEXA, kõvakapsel,<br>30TK  | First Pharma OÜ                  | 50               |          |          |        |              |               |  |
| 1819425         | tselekoksiib,<br>200mg              | M01AH0<br>1 | CELECOXIB ACCORD,<br>kõvakapsel, 30TK                              | Accord Healthcare<br>B.V.        | 50               |          |          |        |              |               |  |
| 1861365         | tselekoksiib,<br>200mg              | M01AH0<br>1 | ACLEXA, kõvakapsel,<br>30TK  | Ideal Trade Links<br>UAB         | 50               |          |          |        |              |               |  |
| 1684560         | tseritiniib, 150mg                  | L01ED0<br>2 | ZYKADIA, kõvakapsel,<br>150TK                                      | Novartis<br>Europharm<br>Limited | 100              | C34-C34  | Onkoloog |        |              |               | anaplastilise lümfoomkineaas-positiivse kaugelearenenud<br>varem ravimata mitteväikerakk-kopsuvähi raviks heas<br>üldseisundis (ECOG 0-2) täiskasvanud patsientidele |
| 1077836         | tsetirisiin, 10mg                   | R06AE0<br>7 | ZYRTEC, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK               | UCB Pharma Oy<br>Finland         | 50               |          |          |        |              |               |  |
| 1098918         | tsetirisiin, 10mg                   | R06AE0<br>7 | CETIRIZIN ACTAVIS,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Teva B.V.                        | 50               |          |          |        |              |               |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                    | Eriala                  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla  | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|-----------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|--------|--------------|--|--|
| 1430750         | tsetirisiin, 10mg                   | R06AE0<br>7 | CETRIX 10 MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK               | Vitabalans Oy               | 50               |                             |                         |        |              |  |  |
| 1430772         | tsetirisiin, 10mg                   | R06AE0<br>7 | CETRIX 10 MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK              | Vitabalans Oy               | 50               |                             |                         |        |              |  |  |
| 1828537         | tsetirisiin, 10mg                   | R06AE0<br>7 | ZYRTEC, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                        | Lex Ano UAB                 | 50               |                             |                         |        |              |  |  |
| 1022869         | tsetirisiin, 10mg<br>1ml            | R06AE0<br>7 | ZYRTEC, suukaudsed<br>tilgad, lahus, 20ml 1TK                               | UCB Pharma Oy<br>Finland    | 50               |                             |                         |        |              |  |  |
| 1826580         | tsetirisiin, 10mg<br>1ml            | R06AE0<br>7 | ZYRTEC, suukaudsed<br>tilgad, lahus, 20ml 1TK                               | Lex Ano UAB                 | 50               |                             |                         |        |              |  |  |
| 1895799         | tsetirisiin, 10mg<br>1ml            | R06AE0<br>7 | ZYRTEC, suukaudsed<br>tilgad, lahus, 20ml 1TK                               | Ideal Trade Links<br>UAB    | 50               |                             |                         |        |              |  |  |
| 1043356         | tsetroreliks,<br>0,25mg             | H01CC0<br>2 | CETROTIDE,<br>süstelahuse pulber ja<br>lahusti, 1TK                         | Merck Europe B.V.           | 50               |                             |                         |        |              |  |  |
|                 |                                     |             |   |                             | 100              | N97.0-N97.9,<br>Z31.0-Z31.9 |                         |        | 41,00        | kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise<br>tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks  |  |
| 1667538         | tsinakaltseet,<br>30mg              | H05BX0<br>1 | CINACALCET<br>ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK          | Accord Healthcare<br>B.V.   | 100              | N18-N18                     | Nefroloog,<br>Pediaater |        |              |  | hemo- või peritoneaaldialüüsil olevatele patsientidele,<br>kelle ravi vitamiin D analoogidega on ebaõnnestunud<br>(seerumi parathormooni taseme eesmärgväärtust <=300<br>pg/ml ei saavutata) või kellele on vitamiin D analoogid<br>vastunäidustatud |
|                 |                                     |             |   |                             | 50               |                             |                         |        |              |  |  |
| 1815656         | tsinakaltseet,<br>30mg              | H05BX0<br>1 | CINACALCET<br>ACCORDPHARMA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Accord Healthcare<br>S.L.U. | 50               |                             |                         |        |              |  |  |
|                 |                                     |             |   |                             | 100              | N18-N18                     | Nefroloog,<br>Pediaater |        |              | hemo- või peritoneaaldialüüsil olevatele patsientidele,<br>kelle ravi vitamiin D analoogidega on ebaõnnestunud<br>(seerumi parathormooni taseme eesmärgväärtust <=300<br>pg/ml ei saavutata) või kellele on vitamiin D analoogid<br>vastunäidustatud |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                         | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|-----------------------------|------------------|-------------|--------------------------------|--------|--------------|---------------|--|
| 1667572         | tsinakaltseet,<br>60mg              | H05BX0<br>1 | CINACALCET<br>ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK          | Accord Healthcare<br>B.V.   | 50               |             |                                |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |   |                             | 100              | N18-N18     | Nefroloog,<br>Pediaater        |        |              |               | hemo- või peritoneaaldialüüsil olevatele patsientidele,<br>kelle ravi vitamiin D analoogidega on ebaõnnestunud<br>(seerumi parathormooni taseme eesmärgväärtust <=300<br>pg/ml ei saavutata) või kellele on vitamiin D analoogid<br>vastunäidustatud |
| 1815689         | tsinakaltseet,<br>60mg              | H05BX0<br>1 | CINACALCET<br>ACCORDPHARMA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Accord Healthcare<br>S.L.U. | 100              | N18-N18     | Nefroloog,<br>Pediaater        |        |              |               | hemo- või peritoneaaldialüüsil olevatele patsientidele,<br>kelle ravi vitamiin D analoogidega on ebaõnnestunud<br>(seerumi parathormooni taseme eesmärgväärtust <=300<br>pg/ml ei saavutata) või kellele on vitamiin D analoogid<br>vastunäidustatud |
|                 |                                     |             |   |                             | 50               |             |                                |        |              |               |  |
| 1667606         | tsinakaltseet,<br>90mg              | H05BX0<br>1 | CINACALCET<br>ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK          | Accord Healthcare<br>B.V.   | 50               |             |                                |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |   |                             | 100              | N18-N18     | Nefroloog,<br>Pediaater        |        |              |               | hemo- või peritoneaaldialüüsil olevatele patsientidele,<br>kelle ravi vitamiin D analoogidega on ebaõnnestunud<br>(seerumi parathormooni taseme eesmärgväärtust <=300<br>pg/ml ei saavutata) või kellele on vitamiin D analoogid<br>vastunäidustatud |
| 1815713         | tsinakaltseet,<br>90mg              | H05BX0<br>1 | CINACALCET<br>ACCORDPHARMA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Accord Healthcare<br>S.L.U. | 50               |             |                                |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |   |                             | 100              | N18-N18     | Pediaater,<br>Nefroloog        |        |              |               | hemo- või peritoneaaldialüüsil olevatele patsientidele,<br>kelle ravi vitamiin D analoogidega on ebaõnnestunud<br>(seerumi parathormooni taseme eesmärgväärtust <=300<br>pg/ml ei saavutata) või kellele on vitamiin D analoogid<br>vastunäidustatud |
| 1196388         | tsink, 25mg                         | A16AX0<br>5 | WILZIN, kõvakapsel,<br>250TK  | Recordati Rare<br>Diseases  | 100              | E83.0-E83.0 | Neuroloog,<br>Gastroenteroloog | esmane |              |               |  |
| 1196377         | tsink, 50mg                         | A16AX0<br>5 | WILZIN, kõvakapsel,<br>250TK  | Recordati Rare<br>Diseases  | 100              | E83.0-E83.0 | Neuroloog,<br>Gastroenteroloog | esmane |              |               |  |
| 1005488         | tsiprofloksatsiin,<br>250mg         | J01MA0<br>2 | CIPRINOL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK                      | KRKA, d.d., Novo<br>mesto   | 100              | E84-E84     | Pediaater,<br>Pulmonoloog      |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |   |                             | 100              | D60-D64     | Hematoloog,<br>Pediaater       |        |              |               |  |
|                 |                                     |             |   |                             | 50               |             |                                |        |              |               |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                    | Eriala                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|-----------------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1042827         | tsiprofloksatsiin,<br>3mg 1ml       | S01AE0<br>3 | CILOXAN, silmatilgad,<br>lahus, 5ml 1TK  | Novartis Baltics<br>SIA           | 50               |                             |                           |        |              |               |          |
| 1005545         | tsiprofloksatsiin,<br>500mg         | J01MA0<br>2 | CIPRINOL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK                         | KRKA, d.d., Novo<br>mesto         | 100              | E84-E84                     | Pediaater,<br>Pulmonoloog |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                   | 50               |                             |                           |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                   | 100              | D60-D64                     | Hematoloog,<br>Pediaater  |        |              |               |          |
| 1223929         | tsiprofloksatsiin,<br>500mg         | J01MA0<br>2 | CIPROFLOXACIN<br>SANDOZ 500MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 50               |                             |                           |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                   | 100              | E84-E84                     | Pediaater,<br>Pulmonoloog |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                   | 100              | D60-D64                     | Hematoloog,<br>Pediaater  |        |              |               |          |
| 1500994         | tsiprofloksatsiin,<br>500mg         | J01MA0<br>2 | CIPROFLOXACIN<br>OLPHA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK           | Olpha AS                          | 50               |                             |                           |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                   | 100              | E84-E84                     | Pediaater,<br>Pulmonoloog |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                   | 100              | D60-D64                     | Pediaater,<br>Hematoloog  |        |              |               |          |
| 1218361         | tsitalopraam,<br>10mg               | N06AB0<br>4 | CITALOPRAM - TEVA<br>10MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK        | Teva Pharma B.V.                  | 50               |                             |                           |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                   | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater               | esmane |              |               |          |
| 1083563         | tsitalopraam,<br>20mg               | N06AB0<br>4 | CITALEC 20, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                       | Zentiva k.s.                      | 50               |                             |                           |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                   | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater               | esmane |              |               |          |
| 1112937         | tsitalopraam,<br>20mg               | N06AB0<br>4 | CIRAL 20 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                      | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 50               |                             |                           |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                   | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater               | esmane |              |               |          |
| 1185409         | tsitalopraam,<br>20mg               | N06AB0<br>4 | CITALOPRAM<br>ACTAVIS 20 MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK   | Actavis Group Ptc<br>ehf.         | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater               | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                   | 50               |                             |                           |        |              |               |          |
| 1218462         | tsitalopraam,<br>20mg               | N06AB0<br>4 | CITALOPRAM - TEVA<br>20MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK        | Teva Pharma B.V.                  | 50               |                             |                           |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                   | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater               | esmane |              |               |          |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja                 | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                  | Eriala                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                            |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|---------------------------------|------------------|---|---------------------------|--------|--------------|---------------|-------------------------------------|
| 1443631         | tsitalopraam,<br>20mg               | N06AB0<br>4 | CITALOPRAM<br>VITABALANS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK  | Vitabalans Oy                   | 50               |   |                           |        |              |               |                                     |
|                 |                                     |             |   |                                 | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3               | Psühhiaater               | esmane |              |               |                                     |
| 1218563         | tsitalopraam,<br>40mg               | N06AB0<br>4 | CITALOPRAM - TEVA<br>40MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Teva Pharma B.V.                | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3               | Psühhiaater               | esmane |              |               |                                     |
|                 |                                     |             |   |                                 | 50               |   |                           |        |              |               |                                     |
| 1021790         | tsüklofosfamiid,<br>50mg            | L01AA0<br>1 | ENDOXAN, kaetud<br>tablett, 50TK  | OÜ Baxter Estonia               | 100              | C00-D48                                   | Hematoloog,<br>Onkoloog   |        |              |               |                                     |
|                 |                                     |             |   |                                 | 50               |   |                           |        |              |               |                                     |
|                 |                                     |             |   |                                 | 75               | N00-N08                                   | Pediaater,<br>Nefroloog   |        |              |               |                                     |
|                 |                                     |             |   |                                 | 75               | M45-M46, M08-<br>M08, M30-M35,<br>M05-M06 | Pediaater,<br>Reumatoloog |        |              |               |                                     |
| 1123760         | tsüklopentolaat,<br>10mg 1ml        | S01FA0<br>4 | CYCLOGYL, silmatilgad,<br>lahus, 15ml 1TK                               | Alcon<br>Farmaceutika<br>d.o.o. | 50               |   |                           |        |              |               | silmahaiguste ambulatoorseks raviks |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood  | Ravim, pakendi suurus                  | Müügiloa hoidja         | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                    | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|--|--|-------------------------|------------------|-----------------------------|--|--------|--------------|---------------|----------|
| 1008559         | tsüklosporiin,<br>100mg             | L04AD0<br>1  | SANDIMMUN NEORAL,<br>pehmekapsel, 50TK | Novartis Baltics<br>SIA | 75               | N00-N08                     | Pediaater,<br>Pediaater –<br>hematoloog-<br>onkoloog,<br>Nefroloog                             |        |              |               |          |
|                 |                                     |  |  |                         | 50               |                             |  |        |              |               |          |
|                 |                                     |  |  |                         | 100              | Z94-Z94, T86-<br>T86        |  |        |              |               |          |
|                 |                                     |  |  |                         | 100              | D46-D46                     | Hematoloog   |        |              |               |          |
|                 |                                     |  |  |                         | 75               | L40-L40                     | Pediaater,<br>Pediaater –<br>hematoloog-<br>onkoloog,<br>Dermatovenerol<br>oog,<br>Reumatoloog |        |              |               |          |
|                 |                                     |  |  |                         | 75               | L50.8-L50.9,<br>L50.1-L50.5 |  |        |              |               |          |
|                 |                                     |  |  |                         | 75               | L43-L43                     | Dermatovenerol<br>oog, Pediaater –<br>hematoloog-<br>onkoloog,<br>Pediaater                    |        |              |               |          |
|                 |                                     |  |  |                         | 100              | D60-D64                     | Hematoloog,<br>Pediaater –<br>hematoloog-<br>onkoloog,<br>Pediaater                            |        |              |               |          |
|                 |                                     |  |  |                         | 75               | L20-L20                     | Dermatovenerol<br>oog  |        |              |               |          |
| 75              | M45-M46, M30-<br>M35, M05-M08       | Reumatoloog,<br>Pediaater,<br>Pediaater –<br>hematoloog-<br>onkoloog |  |                         |                  |                             |  |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood   | Ravim, pakendi suurus                | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|---|--------|--------------|---------------|----------|
| 1098840         | tsüklosporiin,<br>100mg             | L04AD0<br>1   | EQUORAL 100 MG,<br>pehmekapsel, 50TK | Teva B.V.       | 75               | L40-L40                       | Reumatoloog,<br>Pediaater –<br>hematoloog-<br>onkoloog,<br>Dermatovenerol<br>oog, Pediaater |        |              |               |          |
|                 |                                     |   |                                      |                 | 75               | L20-L20                       | Dermatovenerol<br>oog   |        |              |               |          |
|                 |                                     |   |                                      |                 | 100              | D46-D46                       | Hematoloog  |        |              |               |          |
|                 |                                     |   |                                      |                 | 75               | L43-L43                       | Dermatovenerol<br>oog, Pediaater –<br>hematoloog-<br>onkoloog,<br>Pediaater                 |        |              |               |          |
|                 |                                     |   |                                      |                 | 50               |                               |   |        |              |               |          |
|                 |                                     |   |                                      |                 | 75               | L50.8-L50.9,<br>L50.1-L50.5   |   |        |              |               |          |
|                 |                                     |   |                                      |                 | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46 | Pediaater,<br>Reumatoloog,<br>Pediaater –<br>hematoloog-<br>onkoloog                        |        |              |               |          |
|                 |                                     |   |                                      |                 | 100              | Z94-Z94, T86-<br>T86          |   |        |              |               |          |
|                 |                                     |   |                                      |                 | 75               | N00-N08                       | Pediaater –<br>hematoloog-<br>onkoloog,<br>Pediaater,<br>Nefroloog                          |        |              |               |          |
| 100             | D60-D64                             | Pediaater –<br>hematoloog-<br>onkoloog,<br>Hematoloog,<br>Pediaater |                                      |                 |                  |                               |   |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                          | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|-----------------|------------------|---|-------------|--------|--------------|---------------|---|
| 1683097         | tsüklosporiin, 1mg<br>1ml           | S01XA1<br>8 | IKERVIS, silmatilgad,<br>emulsioon, 0.3ml 30TK | Santen Oy       | 75               | M35.0-M35.0,<br>H19.3-H19.3,<br>H04.1-H04.1,<br>H11.1-H11.1 | Oftalmoloog |        |              |               | raske kuiva silma sündroomiga patsientidele, kellel on vaatamata vähemalt kolm kuud kestnud ravile niisutavate tilkadega punktkeratopaatia või konjunktivi punktitaoline värvumine. Ravivastust hinnatakse peale kolme ravikuud alates esimese soodusretsepti kirjutamist ning soodustusega väljakirjutamise õigus jätkub patsientidele, kellel raviarsti hinnangul on dokumenteeritult sarvkesta ja/või konjunktivi värvumine ravi mõjul oluliselt paranenud või subjektiivsed kaebused oluliselt vähenenud. |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                  | Müügiloa hoidja         | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|-------------------------|------------------|-------------------------------|--|--------|--------------|---------------|----------|
| 1008526         | tsüklosporiin,<br>25mg              | L04AD0<br>1 | SANDIMMUN NEORAL,<br>pehmekapsel, 50TK | Novartis Baltics<br>SIA | 75               | L40-L40                       | Pediaater –<br>hematoloog-<br>onkoloog,<br>Pediaater,<br>Reumatoloog,<br>Dermatovenerol<br>oog |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                         | 75               | N00-N08                       | Pediaater –<br>hematoloog-<br>onkoloog,<br>Pediaater,<br>Nefroloog                             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                         | 75               | L50.1-L50.5,<br>L50.8-L50.9   |  |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                         | 100              | D46-D46                       | Hematoloog   |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                         | 75               | L43-L43                       | Pediaater,<br>Pediaater –<br>hematoloog-<br>onkoloog,<br>Dermatovenerol<br>oog                 |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                         | 75               | L20-L20                       | Dermatovenerol<br>oog  |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                         | 100              | Z94-Z94, T86-<br>T86          |  |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                         | 75               | M45-M46, M05-<br>M08, M30-M35 | Reumatoloog,<br>Pediaater –<br>hematoloog-<br>onkoloog,<br>Pediaater                           |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                         | 100              | D60-D64                       | Pediaater,<br>Hematoloog,<br>Pediaater –<br>hematoloog-<br>onkoloog                            |        |              |               |          |
| 50              |                                     |             |  |                         |                  |                               |  |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                  | Müügiloa hoidja         | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|-------------------------|------------------|-------------------------------|---|--------|--------------|---------------|----------|
| 1008548         | tsüklosporin,<br>50mg               | L04AD0<br>1 | SANDIMMUN NEORAL,<br>pehmekapsel, 50TK | Novartis Baltics<br>SIA | 75               | L40-L40                       | Dermatovenerol<br>oog, Pediaater,<br>Pediaater –<br>hematoloog-<br>onkoloog,<br>Reumatoloog |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                         | 75               | L20-L20                       | Dermatovenerol<br>oog   |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                         | 50               |                               |   |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                         | 75               | N00-N08                       | Pediaater,<br>Nefroloog,<br>Pediaater –<br>hematoloog-<br>onkoloog                          |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                         | 100              | D46-D46                       | Hematoloog  |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                         | 75               | L50.1-L50.5,<br>L50.8-L50.9   |   |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                         | 75               | L43-L43                       | Pediaater,<br>Pediaater –<br>hematoloog-<br>onkoloog,<br>Dermatovenerol<br>oog              |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                         | 100              | D60-D64                       | Pediaater,<br>Hematoloog,<br>Pediaater –<br>hematoloog-<br>onkoloog                         |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                         | 75               | M05-M08, M30-<br>M35, M45-M46 | Pediaater –<br>hematoloog-<br>onkoloog,<br>Reumatoloog,<br>Pediaater                        |        |              |               |          |
| 100             | Z94-Z94, T86-<br>T86                |             |  |                         |                  |                               |   |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus        | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                      | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala               | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |
|-----------------|--|-------------|---|--------------------------------------|------------------|----------|----------------------|--------|--------------|---------------|--|
| 1064124         | tsüproteroon,<br>50mg                      | G03HA0<br>1 | ANDROCUR, tablett,<br>50TK  | Bayer AG                             | 100              | C61-C61  | Onkoloog,<br>Uroloog |        |              |               | juhul, kui haigus on pärast kirurgilist või medikamentooset kastratsiooni progresseerunud, metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravi alustamisel LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest või medikamentoosest kastratsioonist) |
|                 |  |             |   |                                      | 50               |          |                      |        |              |               |  |
| 1014488         | tsüproteroon+östro<br>geen,<br>2mg+0,035mg | G03HB0<br>1 | DIANE, kaetud tablett,<br>21TK  | Bayer AG                             | 50               |          |                      |        |              |               |  |
| 1818288         | tsüproteroon+östro<br>geen,<br>2mg+0,035mg | G03HB0<br>1 | DIANE, kaetud tablett,<br>21TK  | Ideal Trade Links<br>UAB             | 50               |          |                      |        |              |               |  |
| 1820179         | tsüproteroon+östro<br>geen,<br>2mg+0,035mg | G03HB0<br>1 | DIANE, kaetud tablett,<br>21TK  | Lex Ano UAB                          | 50               |          |                      |        |              |               |  |
| 1891391         | tsüproteroon+östro<br>geen,<br>2mg+0,035mg | G03HB0<br>1 | DIANE, kaetud tablett,<br>21TK  | Ideal Trade Links<br>UAB             | 50               |          |                      |        |              |               |  |
| 1891414         | tsüproteroon+östro<br>geen,<br>2mg+0,035mg | G03HB0<br>1 | DIANE, kaetud tablett,<br>63TK  | Ideal Trade Links<br>UAB             | 50               |          |                      |        |              |               |  |
| 1557435         | ulipristaal, 5mg                           | G03XB0<br>2 | ESMYA, tablett, 28TK  | Gedeon Richter<br>Plc.               | 75               | D25-D25  | Günekoloog           |        |              |               | patsientidele, kes soovivad rasestuda või kellele on kirurgiline ravi vastunäidustatud ning kirurgilise ravi eelselt fibroomi mõõtmete vähendamiseks   |
|                 |  |             |   |                                      | 50               |          |                      |        |              |               |  |
| 1646940         | umekliidiinium,<br>55mcg<br>1mõõtannus     | R03BB0<br>7 | INCRUSE ELLIPTA,<br>annustatud<br>inhalatsioonipulber,<br>30mõõtannus 1TK | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited | 75               | J43-J44  | Pulmonoloog          | esmane |              |               |  |
|                 |  |             |   |                                      | 50               |          |                      |        |              |               |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                    | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla   | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|--|------------------|-----------------------------|--|--------|--------------|---|---|
| 1808951         | upadatsitiniib,<br>15mg             | L04AF03     | RINVOQ, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 28TK | AbbVie<br>Deutschland<br>GmbH & Co. KG | 100              | K50-K51                     | Gastroenteroloog,<br>Pediaater,<br>Pediaater –<br>gastroenteroloog |        |              |   | ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt kahe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud |
|                 |                                     |             |   |  | 100              | L20.8-L20.8,<br>L20.9-L20.9 | Pediaater,<br>Allergoloog-<br>immunoloog,<br>Dermatovenerol<br>oog |        |              | mööduka või raske haigusega (EASI $\geq$ 16, DLQI $\geq$ 10) patsiendile, kes ei allu süsteemsele konventsionaalsele ravile tsüklosporiiniga 8–12 nädala jooksul või kellele see on vastunäidustatud või põhjustanud talumatuid kõrvaltoimeid   |   |
|                 |                                     |             |   |  | 100              | M07.0-M07.3,<br>M45-M46     | Pediaater,<br>Reumatoloog  |        |              | ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud  |   |
|                 |                                     |             |   |  | 100              | M05-M06                     | Pediaater,<br>Reumatoloog  |        |              | ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt kahe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud |   |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                    | Eriala  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla   | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|--|------------------|-----------------------------|---|--------|--------------|---|---|
| 1860588         | upadatsitiniib,<br>30mg             | L04AF03     | RINVOQ, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 28TK | AbbVie<br>Deutschland<br>GmbH & Co. KG | 100              | K50-K51                     | Gastroenteroloog,<br>Pediaater,<br>Pediaater –<br>gastroenteroloog  |        |              |   | ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad<br>Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral<br>kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning<br>kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt<br>kahe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis<br>on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi<br>katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-<br>alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud |
|                 |                                     |             |   |  | 100              | L20.8-L20.8,<br>L20.9-L20.9 | Pediaater,<br>Allergoloog-<br>immunoloog,<br>Dermatovenerol<br>oog  |        |              | mööduka või raske haigusega (EASI $\geq$ 16, DLQI $\geq$ 10)<br>patsiendile, kes ei allu süsteemsele konventsionaalsele<br>ravile tsüklosporiiniga 8–12 nädala jooksul või kellele see<br>on vastunäidustatud või põhjustanud talumatuid<br>kõrvaltoimeid |   |
| 1887857         | upadatsitiniib,<br>45mg             | L04AF03     | RINVOQ, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 28TK | AbbVie<br>Deutschland<br>GmbH & Co. KG | 100              | K50-K51                     | Gastroenteroloog,<br>Pediaater –<br>gastroenteroloog<br>, Pediaater |        |              |   | ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad<br>Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral<br>kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning<br>kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt<br>kahe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis<br>on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi<br>katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-<br>alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud |
| 1016985         | ursodeoksükoolha<br>pe, 250mg       | A05AA0<br>2 | URSOSAN, kõvakapsel,<br>50TK                                    | Pro.Med.Cs Praha<br>a.s.               | 50               |                             |   |        |              |   |   |
|                 |                                     |             |   |  | 75               | K74-K74, K73-<br>K73        | Gastroenteroloog,<br>Pediaater                                      | esmane |              |   |   |
| 1709401         | ursodeoksükoolha<br>pe, 250mg       | A05AA0<br>2 | URSOGRIX,<br>kõvakapsel, 50TK                                   | Grindeks AS                            | 50               |                             |   |        |              |   |   |
|                 |                                     |             |   |  | 75               | K74-K74, K73-<br>K73        | Gastroenteroloog,<br>Pediaater                                      | esmane |              |   |   |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                      | Müügiloa hoidja               | Soodus-tus % | Diagnoos    | Eriala                        | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused  |
|-------------|-------------------------------|----------|--|-------------------------------|--------------|-------------|-------------------------------|--------|-----------|---|---|
| 3040669     | ustekinumab, 45mg 0.5ml       | L04AC05  | STELARA, süstelahus pen-süstlis, 0.5ml 1TK | Janssen - Cilag International | 100          | L40-L40     | Pediaater, Dermatovenerol oog |        |           |   | patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus L40 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud. Lisaks laieneb soodustus patsientidele, kelle ravi ustekinumabiga on Tervisekassa rahastusel alustatud enne 01.01.2022. |
|             |                               |          |  |                               | 100          | M07.0-M07.3 | Reumatoloog, Pediaater        |        |           | ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus M07.0-3 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud   |   |
| 3062977     | ustekinumab, 45mg 0.5ml       | L04AC05  | UZPRUVO, süstelahus süstlis, 0.5ml 1TK     | Stada Arzneimittel AG         | 100          | M07.0-M07.3 | Reumatoloog, Pediaater        |        |           |   | ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus M07.0-3 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud.  |
|             |                               |          |  |                               | 100          | L40-L40     | Pediaater, Dermatovenerol oog |        |           | patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus L40 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud. Lisaks laieneb soodustus patsientidele, kelle ravi ustekinumabiga on Tervisekassa rahastusel alustatud enne 01.01.2022. |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                      | Müügiloa hoidja            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                              | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla  | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|----------------------------|------------------|-------------|-------------------------------------|--------|--------------|--|---|
| 3072923         | ustekinumab,<br>45mg 0.5ml          | L04AC0<br>5 | PYZCHIVA, süstelahus<br>süstlis, 0.5ml 1TK | Samsung Bioepis<br>NL B.V. | 100              | L40-L40     | Pediaater,<br>Dermatovenerol<br>oog |        |              |  | patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus L40 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud. Lisaks laieneb soodustus patsientidele, kelle ravi ustekinumabiga on Tervisekassa rahastusel alustatud enne 01.01.2022. |
|                 |                                     |             |  |                            | 100              | M07.0-M07.3 | Pediaater,<br>Reumatoloog           |        |              | ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus M07.0–3 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud. |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                       | Müügiloa hoidja                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                           | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla   | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|----------------------------------|------------------|-------------|----------------------------------|--------|--------------|---|---|
| 3040670         | ustekinumab,<br>90mg 1ml            | L04AC0<br>5 | STELARA, süstelahus<br>pen-süstlis, 1ml 1TK | Janssen - Cilag<br>International | 100              | L40-L40     | Dermatovenerol<br>oog, Pediaater |        |              |   | patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus L40 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud. Lisaks laieneb soodustus patsientidele, kelle ravi ustekinumabiga on Tervisekassa rahastusel alustatud enne 01.01.2022. |
|                 |                                     |             |   |                                  | 100              | K50-K50     | Gastroenteroloog                 |        |              | ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus K50 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa-inhibiitori kasutamine vastunäidustatud     |   |
|                 |                                     |             |   |                                  | 100              | M07.0-M07.3 | Pediaater,<br>Reumatoloog        |        |              | ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus M07.0-3 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                   | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                           | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|--------------------------|------------------|-------------|----------------------------------|--------|--------------|---------------|---|
| 3062988         | ustekinumab,<br>90mg 1ml            | L04AC0<br>5 | UZPRUVO, süstelahus<br>süstlis, 1ml 1TK | Stada Arzneimittel<br>AG | 100              | M07.0-M07.3 | Reumatoloog,<br>Pediaater        |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus M07.0–3 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud.  |
|                 |                                     |             |   |                          | 100              | L40-L40     | Dermatovenerol<br>oog, Pediaater |        |              |               | patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus L40 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud. Lisaks laieneb soodustus patsientidele, kelle ravi ustekinumabiga on Tervisekassa rahastusel alustatud enne 01.01.2022. |
|                 |                                     |             |   |                          | 100              | K50-K50     | Gastroenteroloog                 |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus K50 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa-inhibiitori kasutamine vastunäidustatud   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                      | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                              | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla  | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|--------------------------------------|------------------|-------------|-------------------------------------|--------|--------------|--|---|
| 3072934         | ustekinumab,<br>90mg 1ml            | L04AC0<br>5 | PYZCHIVA, süstelahus<br>süstlis, 1ml 1TK  | Samsung Bioepis<br>NL B.V.           | 100              | L40-L40     | Pediaater,<br>Dermatovenerol<br>oog |        |              |  | patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus L40 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud. Lisaks laieneb soodustus patsientidele, kelle ravi ustekinumabiga on Tervisekassa rahastusel alustatud enne 01.01.2022. |
|                 |                                     |             |   |                                      | 100              | M07.0-M07.3 | Reumatoloog,<br>Pediaater           |        |              | ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus M07.0–3 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud. |   |
|                 |                                     |             |   |                                      | 100              | K50-K50     | Gastroenteroloog                    |        |              | ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus K50 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa-inhibiitori kasutamine vastunäidustatud      |   |
| 1301094         | valatsikloviir,<br>1000mg           | J05AB11     | VALACICLOVIR<br>ACTAVIS 1000MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>21TK | Teva B.V.                            | 50               |             |                                     |        |              |  |   |
| 1016301         | valatsikloviir,<br>500mg            | J05AB11     | VALTREX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK                           | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited | 50               |             |                                     |        |              |  |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|------------------------------|------------------|--|-------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1300936         | valatsikloviir,<br>500mg            | J05AB11     | VALACICLOVIR<br>ACTAVIS 500MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK      | Teva B.V.                    | 50               |  |             |        |              |               |          |
| 1369593         | valatsikloviir,<br>500mg            | J05AB11     | VALACICLOVIR ELVIM,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK                 | SIA Elvim                    | 50               |  |             |        |              |               |          |
| 1831003         | valatsikloviir,<br>500mg            | J05AB11     | VALTREX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK                               | Ideal Trade Links<br>UAB     | 50               |  |             |        |              |               |          |
| 1888904         | valatsikloviir,<br>500mg            | J05AB11     | VALTREX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK                               | Lex Ano UAB                  | 50               |  |             |        |              |               |          |
| 3028025         | valatsikloviir,<br>500mg            | J05AB11     | VALTREX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK                               | Lex Ano UAB                  | 50               |  |             |        |              |               |          |
| 1076419         | valproehape,<br>150mg               | N03AG0<br>1 | ORFIRIL LONG 150<br>MG, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 100TK | Desitin<br>Arzneimittel GmbH | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                              | 100              | F32.2-F32.3,<br>F70-F79, F11.4-<br>F11.7, F18.4-<br>F18.7, F20-F29,<br>F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7,<br>F19.4-F19.7,<br>F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7,<br>F00-F09, F60.3-<br>F60.3, F13.4-<br>F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-<br>F17.7, F15.4-<br>F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                              | 50               |  |             |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                       | Müügiloa hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|------------------------------|------------------|--|-------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1108246         | valproehape,<br>150mg               | N03AG0<br>1 | ORFIRIL 150,<br>gastroresistentne tablett,<br>100TK         | Desitin<br>Arzneimittel GmbH | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                              | 100              | F32.2-F32.3,<br>F70-F79, F11.4-<br>F11.7, F18.4-<br>F18.7, F20-F29,<br>F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7,<br>F19.4-F19.7,<br>F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7,<br>F00-F09, F60.3-<br>F60.3, F13.4-<br>F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-<br>F17.7, F15.4-<br>F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                              | 50               |  |             |        |              |               |          |
| 1043604         | valproehape,<br>300mg               | N03AG0<br>1 | CONVULEX 300 MG,<br>gastroresistentne<br>pehmekapsel, 100TK | G.L. Pharma<br>GmbH          | 50               |  |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                              | 100              | F32.2-F32.3,<br>F70-F79, F11.4-<br>F11.7, F18.4-<br>F18.7, F20-F29,<br>F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7,<br>F19.4-F19.7,<br>F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7,<br>F00-F09, F60.3-<br>F60.3, F13.4-<br>F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-<br>F17.7, F15.4-<br>F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                              | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |              |               |          |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|------------------------------|------------------|--|-------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1077308         | valproehape,<br>300mg               | N03AG0<br>1 | ORFIRIL LONG 300<br>MG, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 100TK | Desitin<br>Arzneimittel GmbH | 50               |  |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                              | 100              | F32.2-F32.3,<br>F70-F79, F11.4-<br>F11.7, F18.4-<br>F18.7, F20-F29,<br>F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7,<br>F19.4-F19.7,<br>F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7,<br>F00-F09, F60.3-<br>F60.3, F13.4-<br>F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-<br>F17.7, F15.4-<br>F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                              | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |              |               |          |
| 1086555         | valproehape,<br>300mg               | N03AG0<br>1 | DEPAKINE CHRONO<br>300 mg, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 100TK | Sanofi Winthrop<br>Industrie | 100              | F32.2-F32.3,<br>F70-F79, F11.4-<br>F11.7, F18.4-<br>F18.7, F20-F29,<br>F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7,<br>F19.4-F19.7,<br>F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7,<br>F00-F09, F60.3-<br>F60.3, F13.4-<br>F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-<br>F17.7, F15.4-<br>F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                              | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                              | 50               |  |             |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|------------------------------|------------------|---|-------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1108257         | valproehape,<br>300mg               | N03AG0<br>1 | ORFIRIL 300,<br>gastroresistentne tablett,<br>100TK                                | Desitin<br>Arzneimittel GmbH | 50               |   |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                              | 100              | F32.2-F32.3,<br>F70-F79, F11.4-<br>F11.7, F18.4-<br>F18.7, F20-F29,<br>F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7,<br>F19.4-F19.7,<br>F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7,<br>F00-F09, F60.3-<br>F60.3, F13.4-<br>F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-<br>F17.7, F15.4-<br>F15.7, F30-F31          | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                              | 100              | G40-G40   | Neuroloog   | esmane |              |               |          |
| 1128934         | valproehape,<br>300mg               | N03AG0<br>1 | CONVULEX RETARD<br>300MG, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 100TK | G.L. Pharma<br>GmbH          | 100              | G40-G40   | Neuroloog   | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                              | 100              | F10.4-F10.7,<br>F20-F29, F17.4-<br>F17.7, F00-F09,<br>F30-F31, F70-<br>F79, F12.4-<br>F12.7, F15.4-<br>F15.7, F11.4-<br>F11.7, F18.4-<br>F18.7, F14.4-<br>F14.7, F19.4-<br>F19.7, F16.4-<br>F16.7, F60.3-<br>F60.3, F13.4-<br>F13.7, F32.2-<br>F32.3, F33.2-<br>F33.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                              | 50               |   |             |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|------------------------------|------------------|--|-------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1076341         | valproehape,<br>500mg               | N03AG0<br>1 | ORFIRIL LONG 500<br>MG, toimeainet<br>prolongeeritult<br>vabastavad graanulid,<br>100TK | Desitin<br>Arzneimittel GmbH | 50               |  |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                              | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                              | 100              | F32.2-F32.3,<br>F70-F79, F11.4-<br>F11.7, F18.4-<br>F18.7, F20-F29,<br>F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7,<br>F19.4-F19.7,<br>F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7,<br>F00-F09, F60.3-<br>F60.3, F13.4-<br>F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-<br>F17.7, F15.4-<br>F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
| 1086544         | valproehape,<br>500mg               | N03AG0<br>1 | DEPAKINE CHRONO<br>500 MG, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK      | Sanofi Winthrop<br>Industrie | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                              | 50               |  |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                              | 100              | F32.2-F32.3,<br>F70-F79, F11.4-<br>F11.7, F18.4-<br>F18.7, F20-F29,<br>F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7,<br>F19.4-F19.7,<br>F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7,<br>F00-F09, F60.3-<br>F60.3, F13.4-<br>F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-<br>F17.7, F15.4-<br>F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|-----------------------------------|------------------|---|-------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1128945         | valproehape,<br>500mg               | N03AG0<br>1 | CONVULEX RETARD<br>500MG, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 50TK             | G.L. Pharma<br>GmbH               | 50               |   |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                                   | 100              | F10.4-F10.7,<br>F20-F29, F17.4-<br>F17.7, F00-F09,<br>F30-F31, F70-<br>F79, F12.4-<br>F12.7, F15.4-<br>F15.7, F11.4-<br>F11.7, F18.4-<br>F18.7, F14.4-<br>F14.7, F19.4-<br>F19.7, F16.4-<br>F16.7, F60.3-<br>F60.3, F13.4-<br>F13.7, F32.2-<br>F32.3, F33.2-<br>F33.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                                   | 100              | G40-G40   | Neuroloog   | esmane |              |               |          |
| 1224672         | valproehape,<br>500mg               | N03AG0<br>1 | VALPROATE SODIUM<br>SANDOZ 500MG,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 100TK | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 50               |   |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                                   | 100              | G40-G40   | Neuroloog   | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |   |                                   | 100              | F32.2-F32.3,<br>F70-F79, F11.4-<br>F11.7, F18.4-<br>F18.7, F20-F29,<br>F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7,<br>F19.4-F19.7,<br>F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7,<br>F00-F09, F60.3-<br>F60.3, F13.4-<br>F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-<br>F17.7, F15.4-<br>F15.7, F30-F31          | Psühhiaater | esmane |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|--------------------------|------------------|--|-------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1836109         | valproehape,<br>500mg               | N03AG0<br>1 | DEPAKINE CHRONO<br>500 MG, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | Ideal Trade Links<br>UAB | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                          | 100              | F11.4-F11.7,<br>F60.3-F60.3,<br>F32.2-F32.3,<br>F15.4-F15.7,<br>F13.4-F13.7,<br>F12.4-F12.7,<br>F20-F29, F16.4-<br>F16.7, F00-F09,<br>F70-F79, F10.4-<br>F10.7, F19.4-<br>F19.7, F30-F31,<br>F18.4-F18.7,<br>F33.2-F33.3,<br>F17.4-F17.7,<br>F14.4-F14.7     | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                          | 50               |  |             |        |              |               |          |
| 1043581         | valproehape,<br>50mg 1ml            | N03AG0<br>1 | CONVULEX, siirup,<br>100ml 1TK   | G.L. Pharma<br>GmbH      | 100              | F32.2-F32.3,<br>F70-F79, F11.4-<br>F11.7, F18.4-<br>F18.7, F20-F29,<br>F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7,<br>F19.4-F19.7,<br>F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7,<br>F00-F09, F60.3-<br>F60.3, F13.4-<br>F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-<br>F17.7, F15.4-<br>F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                          | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                          | 50               |  |             |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                | Müügiloa hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|------------------------------|------------------|--|-------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1108268         | valproehape,<br>600mg               | N03AG0<br>1 | ORFIRIL 600,<br>gastroresistentne tablett,<br>50TK   | Desitin<br>Arzneimittel GmbH | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                              | 100              | F32.2-F32.3,<br>F70-F79, F11.4-<br>F11.7, F18.4-<br>F18.7, F20-F29,<br>F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7,<br>F19.4-F19.7,<br>F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7,<br>F00-F09, F60.3-<br>F60.3, F13.4-<br>F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-<br>F17.7, F15.4-<br>F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                              | 50               |  |             |        |              |               |          |
| 1025536         | valproehape,<br>60mg 1ml            | N03AG0<br>1 | ORFIRIL SAFT,<br>suukaudne lahus, 250ml<br>1TK       | Desitin<br>Arzneimittel GmbH | 50               |  |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                              | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                              | 100              | F32.2-F32.3,<br>F70-F79, F11.4-<br>F11.7, F18.4-<br>F18.7, F20-F29,<br>F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7,<br>F19.4-F19.7,<br>F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7,<br>F00-F09, F60.3-<br>F60.3, F13.4-<br>F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-<br>F17.7, F15.4-<br>F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
| 1092844         | valsartaan, 160mg                   | C09CA0<br>3 | DIOVAN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Novartis Baltics<br>SIA      | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13   |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                              | 50               |  |             |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                  | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|------------------------|------------------|---------------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1250378         | valsartaan, 160mg                   | C09CA03     | VALSACOR, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK             | KRKA, d.d., Novo mesto | 50               |                           |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                        | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |              |               |          |
| 1250389         | valsartaan, 160mg                   | C09CA03     | VALSACOR, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK             | KRKA, d.d., Novo mesto | 50               |                           |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                        | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |              |               |          |
| 1434495         | valsartaan, 160mg                   | C09CA03     | VALZAP, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK               | Zentiva k.s.           | 50               |                           |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                        | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |              |               |          |
| 1515057         | valsartaan, 160mg                   | C09CA03     | VALSARTAN MEDOCHEMIE, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Medochemie Limited     | 50               |                           |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                        | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |              |               |          |
| 1515079         | valsartaan, 160mg                   | C09CA03     | VALSARTAN MEDOCHEMIE, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK | Medochemie Limited     | 50               |                           |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                        | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |              |               |          |
| 1421233         | valsartaan, 320mg                   | C09CA03     | VALSACOR, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK             | KRKA, d.d., Novo mesto | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                        | 50               |                           |        |        |              |               |          |
| 1250323         | valsartaan, 80mg                    | C09CA03     | VALSACOR, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK             | KRKA d.d. Novo mesto   | 50               |                           |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                        | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |              |               |          |
| 1434473         | valsartaan, 80mg                    | C09CA03     | VALZAP, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK               | Zentiva k.s.           | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                        | 50               |                           |        |        |              |               |          |
| 1514854         | valsartaan, 80mg                    | C09CA03     | VALSARTAN MEDOCHEMIE, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Medochemie Limited     | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                        | 50               |                           |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus               | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                     | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|---|-------------|--|---------------------------|------------------|------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1514876         | valsartaan, 80mg                                  | C09CA03     | VALSARTAN<br>MEDOCHEMIE,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK | Medochemie<br>Limited     | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
|                 |   |             |  |                           | 50               |                              |        |        |              |               |          |
| 1675324         | valsartaan+amlodi<br>piin, 160mg+10mg             | C09DB01     | WAMLOX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                     | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 50               |                              |        |        |              |               |          |
|                 |   |             |  |                           | 75               | I10-I13, I15-I15             |        |        |              |               |          |
| 1675234         | valsartaan+amlodi<br>piin, 160mg+5mg              | C09DB01     | WAMLOX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                     | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 50               |                              |        |        |              |               |          |
|                 |   |             |  |                           | 75               | I10-I13, I15-I15             |        |        |              |               |          |
| 1324314         | valsartaan+hüdrok<br>lorotiasiid,<br>160mg+12,5mg | C09DA82     | VALSACOMBI, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                 | KRKA d.d. Novo<br>mesto   | 75               | I10-I13, I15-I15             |        |        |              |               |          |
|                 |   |             |  |                           | 50               |                              |        |        |              |               |          |
| 1434518         | valsartaan+hüdrok<br>lorotiasiid,<br>160mg+12,5mg | C09DA82     | VALZAP H, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                   | Zentiva k.s.              | 75               | I10-I13, I15-I15             |        |        |              |               |          |
|                 |   |             |  |                           | 50               |                              |        |        |              |               |          |
| 1324235         | valsartaan+hüdrok<br>lorotiasiid,<br>160mg+25mg   | C09DA82     | VALSACOMBI, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                 | KRKA d.d. Novo<br>mesto   | 75               | I10-I13, I15-I15             |        |        |              |               |          |
|                 |   |             |  |                           | 50               |                              |        |        |              |               |          |
| 1457557         | valsartaan+hüdrok<br>lorotiasiid,<br>320mg+12,5mg | C09DA82     | VALSACOMBI, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                 | KRKA d.d. Novo<br>mesto   | 75               | I10-I13, I15-I15             |        |        |              |               |          |
|                 |   |             |  |                           | 50               |                              |        |        |              |               |          |
| 1324156         | valsartaan+hüdrok<br>lorotiasiid,<br>80mg+12,5mg  | C09DA82     | VALSACOMBI, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                 | KRKA d.d. Novo<br>mesto   | 75               | I10-I13, I15-I15             |        |        |              |               |          |
|                 |   |             |  |                           | 50               |                              |        |        |              |               |          |
| 1434530         | valsartaan+hüdrok<br>lorotiasiid,<br>80mg+12,5mg  | C09DA82     | VALZAP H, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                   | Zentiva k.s.              | 50               |                              |        |        |              |               |          |
|                 |   |             |  |                           | 75               | I10-I13, I15-I15             |        |        |              |               |          |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                            | Müügiloa hoidja            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|----------------------------|------------------|----------|--------|--------|--------------|---------------|--|
| 1704181         | valsartaan+sakubitril, 103mg+97mg   | C09DX04     | ENTRESTO, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK | Novartis Europharm Limited | 75               | I50-I50  |        |        |              |               | ravimi väljakirjutamise õigus patsientidele, kes vastavad kõigile järgnevatele kriteeriumitele: kellel on vähenenud vasaku vatsakese väljutusfraktsioon (LVEF<=40%), kes kuuluvad NYHA II-IV funktsionaalklassi, kellel ravikoostöö on hea, keda on eelnevalt vähemalt 3 kuud püsivalt ravitud AKE-inhibiitori või ARB eesmärkannusega (selle dokumenteeritud talumatuse korral vähemalt keskmise annusega või maksimaalselt talutava annusega), kombinatsioonis maksimaalses talutavas annuses beetablokaatoriga ning kellel kaksikravile mineralokortikoidireseptori antagonisti lisamise järgselt südamepuudulikkuse sümptomid endiselt püsivad või süvenevad |
| 1704147         | valsartaan+sakubitril, 26mg+24mg    | C09DX04     | ENTRESTO, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Novartis Europharm Limited | 75               | I50-I50  |        |        |              |               | ravimi väljakirjutamise õigus patsientidele, kes vastavad kõigile järgnevatele kriteeriumitele: kellel on vähenenud vasaku vatsakese väljutusfraktsioon (LVEF<=40%), kes kuuluvad NYHA II-IV funktsionaalklassi, kellel ravikoostöö on hea, keda on eelnevalt vähemalt 3 kuud püsivalt ravitud AKE-inhibiitori või ARB eesmärkannusega (selle dokumenteeritud talumatuse korral vähemalt keskmise annusega või maksimaalselt talutava annusega), kombinatsioonis maksimaalses talutavas annuses beetablokaatoriga ning kellel kaksikravile mineralokortikoidireseptori antagonisti lisamise järgselt südamepuudulikkuse sümptomid endiselt püsivad või süvenevad |
| 1704169         | valsartaan+sakubitril, 51mg+49mg    | C09DX04     | ENTRESTO, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK | Novartis Europharm Limited | 75               | I50-I50  |        |        |              |               | ravimi väljakirjutamise õigus patsientidele, kes vastavad kõigile järgnevatele kriteeriumitele: kellel on vähenenud vasaku vatsakese väljutusfraktsioon (LVEF<=40%), kes kuuluvad NYHA II-IV funktsionaalklassi, kellel ravikoostöö on hea, keda on eelnevalt vähemalt 3 kuud püsivalt ravitud AKE-inhibiitori või ARB eesmärkannusega (selle dokumenteeritud talumatuse korral vähemalt keskmise annusega või maksimaalselt talutava annusega), kombinatsioonis maksimaalses talutavas annuses beetablokaatoriga ning kellel kaksikravile mineralokortikoidireseptori antagonisti lisamise järgselt südamepuudulikkuse sümptomid endiselt püsivad või süvenevad |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                             | Müügiloa hoidja                  | Soodustus % | Diagnoos   | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-------------|-------------------------------|----------|---|----------------------------------|-------------|--|------------|--------|-----------|------------|--|
| 1008335     | varfariin, 3mg                | B01AA03  | MAREVAN, tablett, 100TK                           | Orion Corporation                | 50          |  |            |        |           |            |  |
|             |                               |          |   |                                  | 100         | I80-I82, Z95.2-Z95.2, I26-I26, T82-T82, I67.6-I67.6, I27.0-I27.0 |            |        |           |            |  |
|             |                               |          |   |                                  | 75          | I47-I49  |            |        |           |            |  |
| 1847831     | varfariin, 3mg                | B01AA03  | MAREVAN, tablett, 100TK                           | Ideal Trade Links UAB            | 50          |  |            |        |           |            |  |
|             |                               |          |   |                                  | 100         | I80-I82, Z95.2-Z95.2, I26-I26, T82-T82, I67.6-I67.6, I27.0-I27.0 |            |        |           |            |  |
|             |                               |          |   |                                  | 75          | I47-I49  |            |        |           |            |  |
| 1008368     | varfariin, 5mg                | B01AA03  | MAREVAN FORTE, tablett, 100TK                     | Orion Corporation                | 75          | I47-I49  |            |        |           |            |  |
|             |                               |          |   |                                  | 100         | I80-I82, Z95.2-Z95.2, I26-I26, T82-T82, I67.6-I67.6, I27.0-I27.0 |            |        |           |            |  |
|             |                               |          |   |                                  | 50          |  |            |        |           |            |  |
| 1734421     | venetoklaks, 100mg            | L01XX52  | VENCLYXTO, õhukese polümeerikattega tablett, 7TK  | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | 100         | C91.1-C91.1  | Hematoloog |        |           |            | kombinatsioonis ibrutiniibiga patsientidele, kes ei ole eelnevalt ravi saanud. Kombinatsioonravi pikkus on 15 tsükli. Lisaks kombinatsioonis obinutuzumabiga eelnevalt ravimata patsientidele, kellele ravi fludarabiinil baseeruvate skeemidega on vastunäidustatud ning kombinatsioonis rituksimabiga patsientidele, kes on eelnevalt saanud vähemalt ühte ravi. Soodustus kehtib kõikidele kombinatsioonidele alates 5. ravinädalast. |
| 1734432     | venetoklaks, 100mg            | L01XX52  | VENCLYXTO, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | 100         | C91.1-C91.1  | Hematoloog |        |           |            | kombinatsioonis ibrutiniibiga patsientidele, kes ei ole eelnevalt ravi saanud. Kombinatsioonravi pikkus on 15 tsükli. Lisaks kombinatsioonis obinutuzumabiga eelnevalt ravimata patsientidele, kellele ravi fludarabiinil baseeruvate skeemidega on vastunäidustatud ning kombinatsioonis rituksimabiga patsientidele, kes on eelnevalt saanud vähemalt ühte ravi. Soodustus kehtib kõikidele kombinatsioonidele alates 5. ravinädalast. |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügi-<br>loa hoidja                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                    | Eriala                  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla   | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|--|------------------|-----------------------------|-------------------------|--------|--------------|---|---|
| 1734443         | venetoklaks,<br>100mg               | L01XX5<br>2 | VENCLYXTO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>112TK  | AbbVie<br>Deutschland<br>GmbH & Co. KG | 100              | C92-C92                     | Onkoloog,<br>Hematoloog |        |              |   | kombinatsioonis hüprometüüliva ainega äsja diagnoositud<br>ägeda müeloidleukeemiaga patsientidele, kellele ei sobi<br>intensiivne keemiaravi  |
|                 |                                     |             |   |  | 100              | C91.1-C91.1                 | Hematoloog              |        |              | kombinatsioonis ibrutiniibiga patsientidele, kes ei ole<br>eelnevalt ravi saanud. Kombinatsioonravi pikkus on 15<br>tsükli. Lisaks kombinatsioonis obinutuzumabiga eelnevalt<br>ravimata patsientidele, kellele ravi fludarabiinil<br>baseeruvate skeemidega on vastunäidustatud ning<br>kombinatsioonis rituksimabiga patsientidele, kes on<br>eelnevalt saanud vähemalt ühte ravi. Soodustus kehtib<br>kõikidele kombinatsioonidele alates 5. ravinädalast. |   |
| 1734397         | venetoklaks, 10mg                   | L01XX5<br>2 | VENCLYXTO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK   | AbbVie<br>Deutschland<br>GmbH & Co. KG | 100              | C91.1-C91.1                 | Hematoloog              |        |              |   | kombinatsioonis ibrutiniibiga patsientidele, kes ei ole<br>eelnevalt ravi saanud. Kombinatsioonravi pikkus on 15<br>tsükli. Lisaks kombinatsioonis obinutuzumabiga eelnevalt<br>ravimata patsientidele, kellele ravi fludarabiinil<br>baseeruvate skeemidega on vastunäidustatud ning<br>kombinatsioonis rituksimabiga patsientidele, kes on<br>eelnevalt saanud vähemalt ühte ravi. Soodustus kehtib<br>kõikidele kombinatsioonidele alates 5. ravinädalast. |
| 1734410         | venetoklaks, 50mg                   | L01XX5<br>2 | VENCLYXTO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>7TK  | AbbVie<br>Deutschland<br>GmbH & Co. KG | 100              | C91.1-C91.1                 | Hematoloog              |        |              |   | kombinatsioonis ibrutiniibiga patsientidele, kes ei ole<br>eelnevalt ravi saanud. Kombinatsioonravi pikkus on 15<br>tsükli. Lisaks kombinatsioonis obinutuzumabiga eelnevalt<br>ravimata patsientidele, kellele ravi fludarabiinil<br>baseeruvate skeemidega on vastunäidustatud ning<br>kombinatsioonis rituksimabiga patsientidele, kes on<br>eelnevalt saanud vähemalt ühte ravi. Soodustus kehtib<br>kõikidele kombinatsioonidele alates 5. ravinädalast. |
| 1232468         | venlafaksiin,<br>150mg              | N06AX1<br>6 | ALVENTA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 28TK                               | KRKA d.d. Novo<br>mesto                | 50               |                             |                         |        |              |   |   |
|                 |                                     |             |   |  | 75               | G43-G43                     |                         |        |              |   |   |
|                 |                                     |             |   |  | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater             | esmane |              |   |   |
| 1261741         | venlafaksiin,<br>150mg              | N06AX1<br>6 | VENLAFAXIN<br>MEDOCHEMIE XR 150<br>MG, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 28TK | Medochemie<br>Limited                  | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater             | esmane |              |   |   |
|                 |                                     |             |   |  | 50               |                             |                         |        |              |   |   |
|                 |                                     |             |   |  | 75               | G43-G43                     |                         |        |              |   |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                 | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                    | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1306325         | venlafaksiin,<br>150mg              | N06AX1<br>6 | VENLAGAMMA 150<br>MG, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 30TK | Woerwag Pharma<br>GmbH & Co. KG | 75               | G43-G43                     |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                 | 50               |                             |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                 | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
| 1316405         | venlafaksiin,<br>150mg              | N06AX1<br>6 | ARGOFAN 150 SR,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK       | Zentiva k.s.                    | 50               |                             |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                 | 75               | G43-G43                     |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                 | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
| 1435205         | venlafaksiin,<br>150mg              | N06AX1<br>6 | VENLAFAXINE ELVIM,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 28TK | SIA Elvim                       | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                 | 75               | G43-G43                     |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                 | 50               |                             |             |        |              |               |          |
| 1786833         | venlafaksiin,<br>150mg              | N06AX1<br>6 | ALVENTA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 30TK              | First Pharma OÜ                 | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                 | 50               |                             |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                 | 75               | G43-G43                     |             |        |              |               |          |
| 1839607         | venlafaksiin,<br>150mg              | N06AX1<br>6 | ALVENTA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 30TK              | Ideal Trade Links<br>UAB        | 50               |                             |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                 | 75               | G43-G43                     |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                 | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
| 1853805         | venlafaksiin,<br>150mg              | N06AX1<br>6 | ALVENTA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 30TK              | Ideal Trade Links<br>UAB        | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                 | 75               | G43-G43                     |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                 | 50               |                             |             |        |              |               |          |
| 1232266         | venlafaksiin,<br>37,5mg             | N06AX1<br>6 | ALVENTA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 28TK              | KRKA d.d. Novo<br>mesto         | 75               | G43-G43                     |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                 | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                 | 50               |                             |             |        |              |               |          |
| 1232367         | venlafaksiin, 75mg                  | N06AX1<br>6 | ALVENTA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 28TK              | KRKA d.d. Novo<br>mesto         | 75               | G43-G43                     |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                 | 50               |                             |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                 | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                 | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                    | Eriala                   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|---------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1261684         | venlafaksiin, 75mg                  | N06AX1<br>6 | VENLAFAXIN<br>MEDOCHEMIE XR 75<br>MG, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 28TK | Medochemie<br>Limited           | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater              | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                 | 50               |                             |                          |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                 | 75               | G43-G43                     |                          |        |              |               |          |
| 1306246         | venlafaksiin, 75mg                  | N06AX1<br>6 | VENLAGAMMA 75 MG,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 30TK                  | Woerwag Pharma<br>GmbH & Co. KG | 75               | G43-G43                     |                          |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                 | 50               |                             |                          |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                 | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater              | esmane |              |               |          |
| 1316371         | venlafaksiin, 75mg                  | N06AX1<br>6 | ARGOFAN 75 SR,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK                        | Zentiva k.s.                    | 75               | G43-G43                     |                          |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                 | 50               |                             |                          |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                 | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater              | esmane |              |               |          |
| 1435182         | venlafaksiin, 75mg                  | N06AX1<br>6 | VENLAFAXINE ELVIM,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 28TK                 | SIA Elvim                       | 75               | G43-G43                     |                          |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                 | 50               |                             |                          |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                 | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater              | esmane |              |               |          |
| 1839551         | venlafaksiin, 75mg                  | N06AX1<br>6 | ALVENTA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 30TK                              | Ideal Trade Links<br>UAB        | 50               |                             |                          |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                 | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater              | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                 | 75               | G43-G43                     |                          |        |              |               |          |
| 1853759         | venlafaksiin, 75mg                  | N06AX1<br>6 | ALVENTA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 30TK                              | Ideal Trade Links<br>UAB        | 75               | G43-G43                     |                          |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                 | 50               |                             |                          |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                 | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater              | esmane |              |               |          |
| 1073157         | verapamiil, 120mg                   | C08DA0<br>1 | ISOPTIN RETARD 120<br>MG, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 100TK               | Viartis SIA                     | 75               | I47-I49                     | Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                 | 50               |                             |                          |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                 | 75               | I10-I13, I15-I15            |                          |        |              |               |          |
| 1073405         | verapamiil, 80mg                    | C08DA0<br>1 | VERAPAMIL-<br>RATIOPHARM 80 MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>50TK                  | Ratiopharm GmbH                 | 50               |                             |                          |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                 | 75               | I10-I13, I15-I15            |                          |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |  |                                 | 75               | I47-I49                     | Pediaater,<br>Kardioloog | esmane |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloo hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|-----------------|------------------|----------|--------|--------|--------------|---------------|--|
| 1856044         | veritsiguaat, 10mg                  | C01DX2<br>2 | VERQUVO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Bayer AG        | 75               | I50-I50  |        |        |              |               | süмптоomaatilise kroonilise südamepuudulikkusega patsiendile, kellel on vähenenud vasaku vatsakese väljutusfraktsioon (LVEF<=40%), kes kuulub NYHA II-IV funktsionaalklassi, kes juba saab ravi eesmärkannuses või maksimaalses talutavas annuses AKE/ARB/ARNI ja beeta-blokaatori ja mineralokortikoidretseptori antagonistiga ja SGLT-2 inhibiitoriga ning kes on viimase 6 kuu jooksul vaatamata eelnevale optimaalsele südamepuudulikkuse ravile hospitaliseeritud südamepuudulikkuse dekompensatsiooni tõttu ja vajanud dekompensatsiooni tõttu intravenoosset ravi diureetikumi, vasodilataatori või inotroopse ravimiga |
| 1855919         | veritsiguaat,<br>2,5mg              | C01DX2<br>2 | VERQUVO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK | Bayer AG        | 75               | I50-I50  |        |        |              |               | süмптоomaatilise kroonilise südamepuudulikkusega patsiendile, kellel on vähenenud vasaku vatsakese väljutusfraktsioon (LVEF<=40%), kes kuulub NYHA II-IV funktsionaalklassi, kes juba saab ravi eesmärkannuses või maksimaalses talutavas annuses AKE/ARB/ARNI ja beeta-blokaatori ja mineralokortikoidretseptori antagonistiga ja SGLT-2 inhibiitoriga ning kes on viimase 6 kuu jooksul vaatamata eelnevale optimaalsele südamepuudulikkuse ravile hospitaliseeritud südamepuudulikkuse dekompensatsiooni tõttu ja vajanud dekompensatsiooni tõttu intravenoosset ravi diureetikumi, vasodilataatori või inotroopse ravimiga |
| 1855975         | veritsiguaat, 5mg                   | C01DX2<br>2 | VERQUVO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK | Bayer AG        | 75               | I50-I50  |        |        |              |               | süмптоomaatilise kroonilise südamepuudulikkusega patsiendile, kellel on vähenenud vasaku vatsakese väljutusfraktsioon (LVEF<=40%), kes kuulub NYHA II-IV funktsionaalklassi, kes juba saab ravi eesmärkannuses või maksimaalses talutavas annuses AKE/ARB/ARNI ja beeta-blokaatori ja mineralokortikoidretseptori antagonistiga ja SGLT-2 inhibiitoriga ning kes on viimase 6 kuu jooksul vaatamata eelnevale optimaalsele südamepuudulikkuse ravile hospitaliseeritud südamepuudulikkuse dekompensatsiooni tõttu ja vajanud dekompensatsiooni tõttu intravenoosset ravi diureetikumi, vasodilataatori või inotroopse ravimiga |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                         | Müügiloa hoidja                    | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---|------------------------------------|------------------|-------------|--|--------|--------------|---------------|---|
| 1780321         | vigabatriin, 100mg                  | N03AG04     | KIGABEQ, lahustuv tablett, 100TK              | Orphelia Pharma                    | 100              | G40.4-G40.4 | , Neuroloog, Pediaater – neuroloog                     |        |              |               | imikutele ja lastele vanuses 1 kuu kuni 7 aastat infantilsete spasmide (Westi sündroom) raviks või kombinatsioonis teiste epilepsiaravimitega raviresistentse partsiaalse epilepsia (fokaalne epileptiline hoog) raviks, kui kõik muud sobivad ravimikombinatsioonid on osutunud ebapiisavaks või ei ole olnud talutavad. |
| 1780332         | vigabatriin, 500mg                  | N03AG04     | KIGABEQ, lahustuv tablett, 50TK               | Orphelia Pharma                    | 100              | G40.4-G40.4 | Pediaater – neuroloog, Neuroloog                       |        |              |               | imikutele ja lastele vanuses 1 kuu kuni 7 aastat infantilsete spasmide (Westi sündroom) raviks või kombinatsioonis teiste epilepsiaravimitega raviresistentse partsiaalse epilepsia (fokaalne epileptiline hoog) raviks, kui kõik muud sobivad ravimikombinatsioonid on osutunud ebapiisavaks või ei ole olnud talutavad. |
| 1552856         | VIII hüübimisfaktor, 1000RÜ         | B02BD02     | ADVATE, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK    | Takeda Manufacturing Austria AG    | 100              | D66-D66     | Pediaater – hematoloog-onkoloog, Pediaater, Hematoloog |        |              |               |   |
| 1633508         | VIII hüübimisfaktor, 1000RÜ         | B02BD02     | NOVOEIGHT, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK | Novo Nordisk A/S                   | 100              | D66-D66     | Pediaater – hematoloog-onkoloog, Pediaater, Hematoloog |        |              |               |   |
| 1657593         | VIII hüübimisfaktor, 1000RÜ         | B02BD02     | NUWIQ, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK     | Octapharma AB                      | 100              | D66-D66     | Hematoloog, Pediaater, Pediaater – hematoloog-onkoloog |        |              |               |   |
| 1704260         | VIII hüübimisfaktor, 1000RÜ         | B02BD02     | ELOCTA, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK    | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) | 100              | D66-D66     | Hematoloog, Pediaater, Pediaater – hematoloog-onkoloog |        |              |               |   |
| 1762499         | VIII hüübimisfaktor, 1000RÜ         | B02BD02     | ADYNOVI, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK   | Baxalta Innovations GmbH           | 100              | D66-D66     | Hematoloog, Pediaater – hematoloog-onkoloog, Pediaater |        |              |               |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|--|------------------|----------|---|--------|--------------|---------------|----------|
| 1783100         | VIII<br>hüübimisfaktor,<br>1000RÜ   | B02BD0<br>2 | JIVI, süstelahuse pulber<br>ja lahusti, 1TK                    | Bayer AG                                 | 100              | D66-D66  | Pediaater,<br>Pediaater –<br>hematoloog-<br>onkoloog,<br>Hematoloog |        |              |               |          |
| 1798577         | VIII<br>hüübimisfaktor,<br>1000RÜ   | B02BD0<br>2 | ESPEROCT,<br>süstelahuse pulber ja<br>lahusti, 1TK             | Novo Nordisk A/S                         | 100              | D66-D66  | Hematoloog,<br>Pediaater –<br>hematoloog-<br>onkoloog,<br>Pediaater |        |              |               |          |
| 1799309         | VIII<br>hüübimisfaktor,<br>1000RÜ   | B02BD0<br>2 | BERIATE, süste-<br>/infusioonilahuse pulber<br>ja lahusti, 1TK | CSL Behring<br>GmbH                      | 100              | D66-D66  | Hematoloog,<br>Pediaater,<br>Pediaater –<br>hematoloog-<br>onkoloog |        |              |               |          |
| 3084320         | VIII<br>hüübimisfaktor,<br>1000RÜ   | B02BD0<br>2 | ALTUVOCT,<br>süstelahuse pulber ja<br>lahusti, 1TK             | Swedish Orphan<br>Biovitrum AB<br>(publ) | 100              | D66-D66  | Hematoloog,<br>Pediaater  |        |              |               |          |
| 1552867         | VIII<br>hüübimisfaktor,<br>1500RÜ   | B02BD0<br>2 | ADVATE, süstelahuse<br>pulber ja lahusti, 1TK                  | Takeda<br>Manufacturing<br>Austria AG    | 100              | D66-D66  | Pediaater –<br>hematoloog-<br>onkoloog,<br>Hematoloog,<br>Pediaater |        |              |               |          |
| 1704271         | VIII<br>hüübimisfaktor,<br>1500RÜ   | B02BD0<br>2 | ELOCTA, süstelahuse<br>pulber ja lahusti, 1TK                  | Swedish Orphan<br>Biovitrum AB<br>(publ) | 100              | D66-D66  | Pediaater,<br>Hematoloog,<br>Pediaater –<br>hematoloog-<br>onkoloog |        |              |               |          |
| 1704282         | VIII<br>hüübimisfaktor,<br>2000RÜ   | B02BD0<br>2 | ELOCTA, süstelahuse<br>pulber ja lahusti, 1TK                  | Swedish Orphan<br>Biovitrum AB<br>(publ) | 100              | D66-D66  | Hematoloog,<br>Pediaater –<br>hematoloog-<br>onkoloog,<br>Pediaater |        |              |               |          |
| 1762501         | VIII<br>hüübimisfaktor,<br>2000RÜ   | B02BD0<br>2 | ADYNOVI, süstelahuse<br>pulber ja lahusti, 1TK                 | Baxalta<br>Innovations GmbH              | 100              | D66-D66  | Hematoloog,<br>Pediaater –<br>hematoloog-<br>onkoloog,<br>Pediaater |        |              |               |          |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|--|------------------|----------|---|--------|--------------|---------------|----------|
| 1783111         | VIII<br>hüübimisfaktor,<br>2000RÜ   | B02BD0<br>2 | JIVI, süstelahuse pulber<br>ja lahusti, 1TK                    | Bayer AG                                 | 100              | D66-D66  | Hematoloog,<br>Pediaater,<br>Pediaater –<br>hematoloog-<br>onkoloog |        |              |               |          |
| 1798601         | VIII<br>hüübimisfaktor,<br>2000RÜ   | B02BD0<br>2 | ESPEROCT,<br>süstelahuse pulber ja<br>lahusti, 1TK             | Novo Nordisk A/S                         | 100              | D66-D66  | Hematoloog,<br>Pediaater –<br>hematoloog-<br>onkoloog,<br>Pediaater |        |              |               |          |
| 1799310         | VIII<br>hüübimisfaktor,<br>2000RÜ   | B02BD0<br>2 | BERIATE, süste-<br>/infusioonilahuse pulber<br>ja lahusti, 1TK | CSL Behring<br>GmbH                      | 100              | D66-D66  | Pediaater –<br>hematoloog-<br>onkoloog,<br>Hematoloog,<br>Pediaater |        |              |               |          |
| 3084331         | VIII<br>hüübimisfaktor,<br>2000RÜ   | B02BD0<br>2 | ALTUVOCT,<br>süstelahuse pulber ja<br>lahusti, 1TK             | Swedish Orphan<br>Biovitrum AB<br>(publ) | 100              | D66-D66  | Pediaater,<br>Hematoloog  |        |              |               |          |
| 1552834         | VIII<br>hüübimisfaktor,<br>250RÜ    | B02BD0<br>2 | ADVATE, süstelahuse<br>pulber ja lahusti, 1TK                  | Takeda<br>Manufacturing<br>Austria AG    | 100              | D66-D66  | Pediaater –<br>hematoloog-<br>onkoloog,<br>Pediaater,<br>Hematoloog |        |              |               |          |
| 1657571         | VIII<br>hüübimisfaktor,<br>250RÜ    | B02BD0<br>2 | NUWIQ, süstelahuse<br>pulber ja lahusti, 1TK                   | Octapharma AB                            | 100              | D66-D66  | Pediaater,<br>Hematoloog,<br>Pediaater –<br>hematoloog-<br>onkoloog |        |              |               |          |
| 1704237         | VIII<br>hüübimisfaktor,<br>250RÜ    | B02BD0<br>2 | ELOCTA, süstelahuse<br>pulber ja lahusti, 1TK                  | Swedish Orphan<br>Biovitrum AB<br>(publ) | 100              | D66-D66  | Hematoloog,<br>Pediaater –<br>hematoloog-<br>onkoloog,<br>Pediaater |        |              |               |          |
| 1799286         | VIII<br>hüübimisfaktor,<br>250RÜ    | B02BD0<br>2 | BERIATE, süste-<br>/infusioonilahuse pulber<br>ja lahusti, 1TK | CSL Behring<br>GmbH                      | 100              | D66-D66  | Pediaater,<br>Pediaater –<br>hematoloog-<br>onkoloog,<br>Hematoloog |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                              | Müügiloa hoidja                          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|--|------------------|----------|---|--------|--------------|---------------|----------|
| 3084230         | VIII<br>hüübimisfaktor,<br>250RÜ    | B02BD0<br>2 | ALTUVOCT,<br>süstelahuse pulber ja<br>lahusti, 1TK | Swedish Orphan<br>Biovitrum AB<br>(publ) | 100              | D66-D66  | Pediaater,<br>Hematoloog  |        |              |               |          |
| 1704293         | VIII<br>hüübimisfaktor,<br>3000RÜ   | B02BD0<br>2 | ELOCTA, süstelahuse<br>pulber ja lahusti, 1TK      | Swedish Orphan<br>Biovitrum AB<br>(publ) | 100              | D66-D66  | Pediaater –<br>hematoloog-<br>onkoloog,<br>Pediaater,<br>Hematoloog |        |              |               |          |
| 1783122         | VIII<br>hüübimisfaktor,<br>3000RÜ   | B02BD0<br>2 | JIVI, süstelahuse pulber<br>ja lahusti, 1TK        | Bayer AG                                 | 100              | D66-D66  | Pediaater,<br>Pediaater –<br>hematoloog-<br>onkoloog,<br>Hematoloog |        |              |               |          |
| 3084342         | VIII<br>hüübimisfaktor,<br>3000RÜ   | B02BD0<br>2 | ALTUVOCT,<br>süstelahuse pulber ja<br>lahusti, 1TK | Swedish Orphan<br>Biovitrum AB<br>(publ) | 100              | D66-D66  | Pediaater,<br>Hematoloog  |        |              |               |          |
| 3084353         | VIII<br>hüübimisfaktor,<br>4000RÜ   | B02BD0<br>2 | ALTUVOCT,<br>süstelahuse pulber ja<br>lahusti, 1TK | Swedish Orphan<br>Biovitrum AB<br>(publ) | 100              | D66-D66  | Hematoloog,<br>Pediaater  |        |              |               |          |
| 1552845         | VIII<br>hüübimisfaktor,<br>500RÜ    | B02BD0<br>2 | ADVATE, süstelahuse<br>pulber ja lahusti, 1TK      | Takeda<br>Manufacturing<br>Austria AG    | 100              | D66-D66  | Pediaater –<br>hematoloog-<br>onkoloog,<br>Hematoloog,<br>Pediaater |        |              |               |          |
| 1657582         | VIII<br>hüübimisfaktor,<br>500RÜ    | B02BD0<br>2 | NUWIQ, süstelahuse<br>pulber ja lahusti, 1TK       | Octapharma AB                            | 100              | D66-D66  | Pediaater –<br>hematoloog-<br>onkoloog,<br>Pediaater,<br>Hematoloog |        |              |               |          |
| 1704248         | VIII<br>hüübimisfaktor,<br>500RÜ    | B02BD0<br>2 | ELOCTA, süstelahuse<br>pulber ja lahusti, 1TK      | Swedish Orphan<br>Biovitrum AB<br>(publ) | 100              | D66-D66  | Hematoloog,<br>Pediaater,<br>Pediaater –<br>hematoloog-<br>onkoloog |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                                | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused   |
|-----------------|--|-------------|---|--|------------------|----------|---|--------|--------------|---------------|--|
| 1762477         | VIII<br>hüübimisfaktor,<br>500RÜ                                   | B02BD0<br>2 | ADYNOVI, süstelahuse<br>pulber ja lahusti, 1TK                            | Baxalta<br>Innovations GmbH              | 100              | D66-D66  | Pediaater –<br>hematoloog-<br>onkoloog,<br>Pediaater,<br>Hematoloog |        |              |               |  |
| 1783098         | VIII<br>hüübimisfaktor,<br>500RÜ                                   | B02BD0<br>2 | JIVI, süstelahuse pulber<br>ja lahusti, 1TK                               | Bayer AG                                 | 100              | D66-D66  | Pediaater –<br>hematoloog-<br>onkoloog,<br>Hematoloog,<br>Pediaater |        |              |               |  |
| 1798566         | VIII<br>hüübimisfaktor,<br>500RÜ                                   | B02BD0<br>2 | ESPEROCT,<br>süstelahuse pulber ja<br>lahusti, 1TK                        | Novo Nordisk A/S                         | 100              | D66-D66  | Hematoloog,<br>Pediaater,<br>Pediaater –<br>hematoloog-<br>onkoloog |        |              |               |  |
| 1799297         | VIII<br>hüübimisfaktor,<br>500RÜ                                   | B02BD0<br>2 | BERIATE, süste-<br>/infusioonilahuse pulber<br>ja lahusti, 1TK            | CSL Behring<br>GmbH                      | 100              | D66-D66  | Hematoloog,<br>Pediaater,<br>Pediaater –<br>hematoloog-<br>onkoloog |        |              |               |  |
| 3084241         | VIII<br>hüübimisfaktor,<br>500RÜ                                   | B02BD0<br>2 | ALTUVOCT,<br>süstelahuse pulber ja<br>lahusti, 1TK                        | Swedish Orphan<br>Biovitrum AB<br>(publ) | 100              | D66-D66  | Hematoloog,<br>Pediaater  |        |              |               |  |
| 1632361         | vilanterool+flutikas<br>oonfuroaat,<br>22mcg+184mcg<br>1mõõttannus | R03AK1<br>0 | RELVAR ELLIPTA,<br>annustatud<br>inhalatsioonipulber,<br>30mõõttannus 1TK | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited     | 75               | J45-J45  |   |        |              |               |  |
|                 |  |             |   |  | 50               |          |   |        |              |               |  |
| 1632338         | vilanterool+flutikas<br>oonfuroaat,<br>22mcg+92mcg<br>1mõõttannus  | R03AK1<br>0 | RELVAR ELLIPTA,<br>annustatud<br>inhalatsioonipulber,<br>30mõõttannus 1TK | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited     | 75               | J43-J44  | Pulmonoloog   | esmane |              |               | C-D staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel eosinofiilide arv perifeerses veres on $\geq 100$ raku/mikroliitris ning kellel on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasis ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga |
|                 |  |             |   |  | 75               | J45-J45  |   |        |              |               |  |
|                 |  |             |   |  | 50               |          |   |        |              |               |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus   | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|---|-------------|---|--|------------------|----------------------|-------------|--------|--------------|---------------|---|
| 1649224         | vilanterool+umekli<br>diinium,<br>22mcg+55mcg<br>1mõõtannus                               | R03AL0<br>3 | ANORO ELLIPTA,<br>annustatud<br>inhalatsioonipulber,<br>30mõõtannus 1TK   | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited           | 50               |                      |             |        |              |               |   |
|                 |   |             |   |  | 75               | J43-J44              | Pulmonoloog | esmane |              |               |   |
| 1756436         | vilanterool+umekli<br>diinium+flutikasoo<br>nfuroaat,<br>22mcg+55mcg+92<br>mcg 1mõõtannus | R03AL0<br>8 | TRELEGY ELLIPTA,<br>annustatud<br>inhalatsioonipulber,<br>30mõõtannus 1TK | GlaxoSmithKline<br>Trading Services<br>Limited | 50               |                      |             |        |              |               |   |
|                 |   |             |   |  | 75               | J43-J44              | Pulmonoloog | esmane |              |               | patsiendile, kelle eosinofiilide arv perifeerses veres on<br>>=100 rakku ning IKS/LABA või LAMA/LABA kaksikravil<br>on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud<br>ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2<br>mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu<br>jooksul, mis vajasis ravi antibiootikumide või suukaudse<br>glükokortikosteroidiga; või kroonilise obstruktiivse<br>kopsuhaigusega patsiendile, kes saab IKS+LAMA+LABA<br>toimeaineid avatud kombinatsioonis (e. kolmikravi<br>erinevatest inhalaatoritest); või kroonilise obstruktiivse<br>kopsuhaigusega patsiendile, kelle eosinofiilide arv<br>perifeerses veres on >=300 rakku ning LABA või LAMA<br>monoteraapial on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist<br>vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt<br>2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu<br>jooksul, mis vajasis ravi antibiootikumide või suukaudse<br>glükokortikosteroidiga |
| 1316326         | vildagliptiin, 50mg   | A10BH0<br>2 | GALVUS, tablett, 60TK   | Novartis<br>Europharm<br>Limited               | 75               | E11-E11, E14-<br>E14 |             |        |              |               |   |
|                 |   |             |   |  | 50               |                      |             |        |              |               |   |
| 1712438         | vildagliptiin, 50mg   | A10BH0<br>2 | SAXOTIN, tablett, 60TK  | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.              | 50               |                      |             |        |              |               |   |
|                 |   |             |   |  | 75               | E11-E11, E14-<br>E14 |             |        |              |               |   |
| 1714160         | vildagliptiin, 50mg   | A10BH0<br>2 | DALMEVIN, tablett,<br>60TK  | Medochemie<br>Limited                          | 75               | E11-E11, E14-<br>E14 |             |        |              |               |   |
|                 |   |             |   |  | 50               |                      |             |        |              |               |   |
| 1729436         | vildagliptiin, 50mg   | A10BH0<br>2 | GLYPVILO, tablett,<br>60TK  | KRKA d.d. Novo<br>mesto                        | 50               |                      |             |        |              |               |   |
|                 |   |             |   |  | 75               | E11-E11, E14-<br>E14 |             |        |              |               |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                               | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla  | Märkused   |
|-----------------|---|-------------|--|--|------------------|--|---|--------|--------------|--|--|
| 3040681         | voklosporiin,<br>7,9mg  | L04AD0<br>3 | LUPKYNIS,<br>pehmekapsel, 180TK                                    | Otsuka<br>Pharmaceutical<br>Netherlands B.V. | 100              | M32.1-M32.1  | Reumatoloog   |        |              |  | kombinatsioonis mükofenolaatmofetiiliga III, IV või V<br>klassi (sh III/V ja IV/V segaklassi) aktiivse luupusnefriidi<br>raviks täiskasvanud patsientidel, kellel<br>on UPCR >500 mg/g (>50 mg/mmol) või UACR >300<br>mg/g (>30 mg/mmol)   |
| 1038091         | von Willebrandi<br>faktor+VIII<br>hüübimisfaktor,<br>375RÜ+500RÜ  | B02BD0<br>6 | IMMUNATE 500 RÜ/375<br>RÜ, süstelahuse pulber<br>ja lahusti, 1TK   | Baxalta<br>Innovations GmbH                  | 100              | D66-D66,<br>D68.4-D68.4,<br>D68.0-D68.0            | Pediaater –<br>hematoloog-<br>onkoloog,<br>Pediaater,<br>Hematoloog |        |              |  |  |
| 1349232         | von Willebrandi<br>faktor+VIII<br>hüübimisfaktor,<br>750RÜ+1000RÜ | B02BD0<br>6 | IMMUNATE 1000<br>RÜ/750 RÜ, süstelahuse<br>pulber ja lahusti, 1TK  | Baxalta<br>Innovations GmbH                  | 100              | D68.0-D68.0,<br>D66-D66,<br>D68.4-D68.4            | Pediaater –<br>hematoloog-<br>onkoloog,<br>Pediaater,<br>Hematoloog |        |              |  |  |
| 1107975         | vorikonasool,<br>200mg  | J02AC0<br>3 | VFEND, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                | Pfizer Europe MA<br>EEIG                     | 100              | B44-B44  |   |        |              |  | patsientidele, kellel invasiivse seeninfektsiooni ravi on<br>alustatud haiglas   |
|                 |   |             |  |  | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B48.8-<br>B48.8, B37-B37 |   |        |              | väljakirjutamise õigus kaasasündinud või omandatud<br>immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga,<br>organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise<br>aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud<br>mükoosi raviks, kui muud suukaudsed seenevastased<br>ravimid on ebaefektiivsed või vastunäidustatud |  |
| 1561823         | vorikonasool,<br>200mg  | J02AC0<br>3 | VORICONAZOLE<br>TEVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK | Teva Pharma B.V.                             | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B48.8-<br>B48.8, B37-B37 |   |        |              |  | väljakirjutamise õigus kaasasündinud või omandatud<br>immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga,<br>organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise<br>aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud<br>mükoosi raviks, kui muud suukaudsed seenevastased<br>ravimid on ebaefektiivsed või vastunäidustatud |
|                 |   |             |  |  | 100              | B44-B44  |   |        |              | patsientidele, kellel invasiivse seeninfektsiooni ravi on<br>alustatud haiglas   |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla  | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|---|------------------|---|---|--------|--------------|--|--|
| 1615902         | vorikonasool,<br>200mg              | J02AC0<br>3 | VORICONAZOLE<br>ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Accord Healthcare<br>S.L.U.                       | 100              | B44-B44   |   |        |              |  | patsientidele, kellel invasiivse seeninfektsiooni ravi on<br>alustatud haiglas       |
|                 |                                     |             |  |   | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B48.8-<br>B48.8, B37-B37      |   |        |              | väljakirjutamise õigus kaasasündinud või omandatud<br>immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga,<br>organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise<br>aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud<br>mükoosi raviks, kui muud suukaudsed seenevastased<br>ravimid on ebaefektiivsed või vastunäidustatud |  |
| 1031746         | östradiol,<br>100mcg 1g             | G03CA0<br>3 | LINOLADIOL N, kreem,<br>25g 1TK                                      | Dr. August Wolff<br>GmbH & Co. KG<br>Arzneimittel | 50               |   |   |        |              |  |  |
| 3017393         | östradiol,<br>100mcg 1g             | G03CA0<br>3 | LINOLADIOL N, kreem,<br>25g 1TK                                      | Ideal Trade Links<br>UAB                          | 50               |   |   |        |              |  |  |
| 1380721         | östradiol, 10mcg                    | G03CA0<br>3 | VAGIFEM,<br>vaginaaltablett, 18TK                                    | Novo Nordisk A/S                                  | 50               |   |   |        |              |  |  |
| 1794113         | östradiol, 10mcg                    | G03CA0<br>3 | VAGIRUX,<br>vaginaaltablett, 18TK                                    | Gedeon Richter<br>Plc.                            | 50               |   |   |        |              |  |  |
| 1030442         | östradiol, 1mg                      | G03CA0<br>3 | ESTROFEM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK               | Novo Nordisk A/S                                  | 100              | E89.4-E89.4,<br>E28.3-E28.3,<br>E23.0-E23.0,<br>Q96-Q97 | Pediaater –<br>endokrinoloog,<br>Endokrinoloog,<br>Günekoloog | esmane |              | 50,00  | haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient<br>on alla 50. eluaasta vana |
|                 |                                     |             |  |   | 50               |   |   |        |              |  |  |
| 1063415         | östradiol, 1mg 1g                   | G03CA0<br>3 | DIVIGEL,<br>transdermaalne geel, 1g<br>28TK                          | Orion Corporation                                 | 50               |   |   |        |              |  |  |
| 1030431         | östradiol, 2mg                      | G03CA0<br>3 | ESTROFEM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK               | Novo Nordisk A/S                                  | 100              | E89.4-E89.4,<br>E28.3-E28.3,<br>E23.0-E23.0,<br>Q96-Q97 | Endokrinoloog,<br>Günekoloog,<br>Pediaater –<br>endokrinoloog | esmane |              | 50,00  | haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient<br>on alla 50. eluaasta vana |
|                 |                                     |             |  |   | 50               |   |   |        |              |  |  |
| 1684111         | östradiol, 2mg                      | G03CA0<br>3 | ESTROFEM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK               | First Pharma OÜ                                   | 50               |   |   |        |              |  |  |
|                 |                                     |             |  |   | 100              | E89.4-E89.4,<br>E28.3-E28.3,<br>E23.0-E23.0,<br>Q96-Q97 | Endokrinoloog,<br>Günekoloog,<br>Pediaater –<br>endokrinoloog | esmane |              | 50,00  | haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient<br>on alla 50. eluaasta vana |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus    | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                            | Müügiloa hoidja                             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                       | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused  |
|-----------------|--|-------------|--|---|------------------|--|--|--------|--------------|---------------|---|
| 1829752         | östradiool, 2mg                        | G03CA03     | ESTROFEM, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Lex Ano UAB                                 | 50               |  |  |        |              |               |   |
|                 |  |             |  |   | 100              | E89.4-E89.4, E28.3-E28.3, E23.0-E23.0, Q96-Q97 | Pediaater – endokrinoloog, Ginekoloog, Endokrinoloog | esmane |              | 50,00         | haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient on alla 50. eluaasta vana |
| 1848393         | östradiool, 2mg                        | G03CA03     | ESTROFEM, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK | Ideal Trade Links UAB                       | 50               |  |  |        |              |               |   |
|                 |  |             |  |   | 100              | E89.4-E89.4, E28.3-E28.3, E23.0-E23.0, Q96-Q97 | Endokrinoloog, Pediaater – endokrinoloog, Ginekoloog | esmane |              | 50,00         | haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient on alla 50. eluaasta vana |
| 1031735         | östradiool+prednisoloon, 0,05mg+4mg 1g | G03CA80     | LINOLADIOL-H N, kreem, 25g 1TK                   | Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel | 50               |  |  |        |              |               |   |
| 1022634         | östriool, 500mcg                       | G03CA04     | OVESTIN, vaginaalsuposiit, 15TK                  | Aspen Pharma Trading Limited                | 50               |  |  |        |              |               |   |