

Kiirabi brigaadi ja esmase abi brigaadi tegevuseks vajalike ravimite ja preparaatide loetelu

	Ravimi toimeaine või preparaadi nimetus	Ravim- või preparaadivorm ja tugevus	Miinimumkogus				Erikogus maapiirkonnas või maapiirkonda sõitvatel brigaadidel või teatud piirkondades	Märkused
			Õe brigaad	Arsti brigaad	Reanimobiilibrigaad ja arstlik toetusbrigaad	Esmase abi brigaad		
1.	Adrenergilised ained							
1.1.	Epinefriin	süstelahus, 1 mg/ml	20 mg	20 mg	20 mg	20 mg		
1.2.	Norepinefriin	süstelahus, 1 mg/ml või tartraat, 2 mg/ml	4 mg süstelahusena või 8 mg tartraadina	4 mg süste- lahusena või 8 mg tartraadina	8 mg süstelahusena või 16 mg tartraadina	4 mg süste-lahusena või 8 mg tartraadina		
1.3.	Isoproterinool	süstelahus, 0,2 mg/ml	0	0	0,4 mg	0	0,4 mg	
2.	Antidoodid							
2.1.	Naloksoon	süstelahus, 0,4 mg/ml, soovituslikult 0,4 mg ampullis	1,2 mg	1,2 mg	1,2 mg	1,2 mg	Põhja- ja Ida-Eesti kõikidel brigaadidel 2,4 mg	
2.2.	Etüülalkohol	lahus, 96%	0	0	100 ml	100 ml	Lõuna- ja Lääne- Eestis kõikidel brigaadidel 100 ml	
2.3.	Flumaseeniil	süstelahus, 0,5 mg/ml, soovituslikult 0,5 mg ampullis	0	0	1 mg	0		
2.4.	Glükagoon	süstelahuse pulber, soovituslikult 1 mg viaalis	1 mg	1 mg	1 mg	1 mg		
3.	Antipsühhootilised ained							
3.1.	Haloperidool	süstelahus, 5 mg/ml	10 mg	10 mg	10 mg	0		
3.2.	Haloperidool	suukaudsed tilgad, 2 mg/ml	10 mg	10 mg		10 mg	10 mg	
4.	Antiarütmikumid							
4.1.	Verapamiil	süstelahus, 2,5 mg/ml, soovituslikult 2 ml ampullis	0	0	15 mg	0		

4.2.	Metoprolol	süstelahus, 1 mg/ml	15 mg	15 mg	15 mg	15 mg		
4.3.	Metoprolol	tablett, soovituslikult 50 mg tabletis	500 mg	500 mg	500 mg	500 mg		
4.4.	Adenosiin	süstelahus, 3 mg/ml või 5 mg/ml	30 mg	30 mg	30 mg	30 mg		
4.5.	Amiodaroon	infusiooni-kontsentraat, 50 mg/ml	900 mg	900 mg	900 mg	900 mg		
4.6.	Propafenoon	süstelahus, 3,5 mg/ml	140 mg	140 mg	280 mg	140 mg	280 mg	
4.7.	Lidokaiin	süstelahus, 20 mg/ml	100 mg	100 mg	300 mg	100 mg	300 mg	
5.	Antihistamiinsed ained							
5.1.	Klemastiin	süstelahus, 1 mg/ml	4 mg	4 mg	4 mg	4 mg		
5.2.	Tsetirisiin	suukaudsed tilgad, lahus, 10 mg/ml	20 ml	20 ml	20 ml	20 ml		
6.	Astmavastased ained							
6.1.	Salbutamool	inhaleeritav lahus, soovituslikult 30 mg pudelis	30 mg	30 mg	30 mg	30 mg		
6.2.	Salbutamool	süstelahus, 0,5 mg/ml, soovituslikult 0,5 mg ampullis	0	0	1 mg	0		
6.3.	Fenoterool + ipratroopiumbromiid	inhaleeritav lahus, 1 annus 50 mcg + 20 mcg	1 pudel*	1 pudel*	1 pudel*	1 pudel*		*pudelis soovituslikult vähemalt 2 patsiendi annus
6.4.	Aminofülliin	süstelahus, 24 mg/ml või 25 mg/ml, soovituslikult 10 ml ampullis	480 mg või 500 mg	480 mg või 500 mg	480 mg või 500 mg	480 mg või 500 mg		
7.	Antikolinergilised ained							
7.1.	Atropiin	süstelahus, 1 g/ml	3 mg	3 mg	3 mg	3 mg		
8.	Ca-kanalite blokaatorid							
8.1.	Nifedipiin	tablett, soovituslikult 10 mg tabletis või tilgad, 20 mg/ml, soovituslikult 30 ml pudelis	100 mg tablettidena või 600 mg tilkadena	100 mg tablettidena või 600 mg tilkadena	100 mg tablettidena või 600 mg tilkadena	100 mg tablettidena või 600 mg tilkadena		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

23.1.	Opiaadid	süstelahus	2 toimeainet; iga toimeaine 2 täiskasvanu maksimaalset ühekordset annust	2 toimeainet; iga toimeaine 2 täiskasvanu maksimaalset ühekordset annust	2 toimeainet; iga toimeaine 2 täiskasvanu maksimaalset ühekordset annust	2 toimeainet; iga toimeaine 2 täiskasvanu maksimaalset ühekordset annust		Toimeained kiirabipidaja äranägemisel, võimaldades täita kiirabi tegevusjuhendi nõudeid, v.a tramadool
23.2.	Tramadool	süstelahus, 50 mg/ml	200 mg	200 mg	200 mg	200 mg		
23.3.	Tramadool	tablett, soovituslikult 50 mg tabletis					250 mg	
25.	Müorelaksandid							
25.1.	Rokuroonium	süstelahus, 10 mg/ml	0	200 mg	200 mg	0		
26.	Üldanesteetikumid							
26.1.	Ketamiin või S-ketamiin	süstelahus, 50 mg/ml	200 mg	200 mg	200 mg	0		
26.2.	Propofool	emulsioon süstimiseks, 10 mg/ml	0	200 mg	1 g	0	200 mg	
27.	Süsteemsed hormoonpreparaadid							
27.1.	Oksütotsiin	süstelahus, 5 RÜ/ml, soovituslikult 1 ml ampullis	4 ml	4 ml	4 ml	4 ml	4 ml	
28.	Muud preparaadid							
28.1.	Naatriumkloriid	infusioonilahus, 0,9%, soovituslikult 10 ml ampullis	200 ml	200 ml	200 ml	200 ml		
28.2.	Glükoos	süstelahus, 40%, või infusioonilahus, 10%	200 ml (40%) või 500 ml (10%)	200 ml (40%) või 500 ml (10%)	200 ml (40%) või 500 ml (10%)	200 ml (40%) või 500 ml (10%)		
28.3.	Glükoos	infusioonilahus, 5%, soovituslikult 250 ml ampullis	250 ml	250 ml	250 ml	250 ml		
28.4.	Aktiivsüsi	pulber	100 g	100 g	100 g	100 g		
28.5.	Tiamiin ehk vitamiin B1	süstelahus, 5%, soovituslikult 1 ml ampullis	5 ml	5 ml	5 ml	5 ml		
28.6.	Proksümetakaiin	silmatilgad, 5 mg/ml, soovituslikult 15 ml pudelis	0	0	0	15 ml	15 ml	
28.7.	Põletusgeel või hüdrogeeliga immutatud katematerjal		500 ml / 2 m2	500 ml / 2 m2	500 ml / 2 m2	500 ml / 2 m2		*võivad olla mõlemad, kokku 2 m2 pinna katmiseks
28.8.	Traneksaanhape	süstelahus, 100 mg/ml	2 g	2 g	5 g	2 g		

28.9.	Sorbitool + naatriumtsitraat + naatriumlaaurüül-sulfoatsetaat	rektaallahus, 625 mg/ml + 90 mg/ml + 9 mg/ml	10 ml	10 ml	10 ml	10 ml		*soovituslikult 5 ml tuubis
28.10.	Loperamiid	tablett, soovituslikult 2 mg tabletis	20 mg	20 mg	20 mg	20 mg		
18.11.	Ninaverejooksu peatamise vahend		1 pakend	1 pakend	1 pakend	1 pakend		

