

Laste immuniseerimiskava

Vanus	Vaktsiini tähis
12 tundi	HepB ¹
1–5 päeva	BCG
2 kuud	RV 1
3 kuud	DTaP-IPV-Hib-HepB 1 + RV 2
4,5 kuud	DTaP-IPV-Hib-HepB 2 + RV 3 ²
6 kuud	DTaP-IPV-Hib-HepB 3
6 kuud kuni 7 aastat (k.a)	Gripp
1 aasta	MMR 1
1,5–2 aastat	DTaP-IPV-Hib-HepB 4
6–7 aastat	DTaP-IPV 5
12–14 aastat	HPV ³
13 aastat	MMR 2
15–16 aastat	DTaP 6

Tähiste seletused:

HepB – B-virushepatiidi vaktsiin

BCG – tuberkuloosi vaktsiin

RV – rotaviirusnakkuse vaktsiin

DTaP-IPV-Hib-HepB – difteeria, teetanuse, atsellulaarse läkaköha, inaktiveeritud poliomüeliidi, *Haemophilus influenzae* tüüp b nakkuse ja B-virushepatiidi vaktsiin

MMR – leetrite, mumps ja punetiste vaktsiin

DTaP-IPV – difteeria, teetanuse, atsellulaarse läkaköha ja inaktiveeritud poliomüeliidi vaktsiin

HPV – inimese papilloomiviirusnakkuse vaktsiin

DTaP – difteeria, teetanuse ja atsellulaarse läkaköha vaktsiin

¹ Üksnes HbsAg-positiivsetel või raseduse ajal B-virushepatiidi suhtes analüüsimate emadel sündinud riskirühma kuuluvad imikud

² Üksnes rotaviirusnakkuse viievalentse vaktsiini korral

³ Immuniseerimist tagatakse ka 15–18-aastastele (k.a). Immuunpuudulikele lastele on immuniseerimiskava raames võimaldatud vaktsineerimiskuur kolm vaktsiinidoosi.