

..... a kütitud PÕDRA andmed

TUTVU JUHENDIGA materjali kogumiseks (www.keskkonnaagentuur.ee)

ALALÕUALUU LIPIK

Võta kütitud põdralt täispikkuses ja koos kõigi esihammastega alalõualuu parem pool.

Lisa lipik kütitud põdra andmetega, tähistades sobivad variandid või täites lüngad.

Loa nr Kuupäev

Jahiselts

Jahipiirkond

PULL: sarvetüüp: pulk sega kühvel harude arv sarvel: par/vas sarvede laius:cm tüvikute ümbermõõdud: par/vasmm sarvede seisund: terved, vigastatud, väärareng, asümmeetria heidetud Seljarasva.....mm	LEHM: looted: 0 1 2 ? Vasikaid 0 1 2 ? piim udaras: + - Seljarasva.....	VASIKAS: juv sugu ja eripära: lehmvasikas, üksik / kaksik pullvasikas, üksik / kaksik areng: normaalne, talikarvas väike, suvekarvas (helepruun) Seljarasva.....mm
--	--	--

ESINEB:

* varasemaid vigastusi (haavad, luumurrud,)

* karv tokerdunud või lapiti maas

* parasiite (põdrakärbes, ninakiin, vesipõied siseelunditel, maksa- või kopsuparasiite)

* tugev kõhnumine

UURIMISEKS VÕETUD:

alalõualuu, sigimisorganid, muu materjal

Eluslooduseosakond: Rõõmu tee 6, 50705 Tartu, tel +372 7 339 149

PÕDRALEHMA SIGIMISORGANITE LIPIK

Hoia proov üleandmiseni sügavkülmikus

Eluslooduseosakond: Rõõmu tee 6, 50705 Tartu

tel +372 7 339 149

Loa nr Kuupäev

Jahiselts

Jahipiirkond

Täidab jahimees:					Täidab uurija:			
Vasikaid					Piim udaras		vanus, a	II pikkus mm
0	1	2	3	?	Jah	Ei		

Sarvede laius – mõõdetakse kolju pikiteljega võimalikult risti, kõige kaugemale ulatuvate harude tipust või nende tagasi kaardumisel samade harude välisküljelt nn ukseavamõõduna.

Tüvikute ümbermõõt – mõõdetakse tüvikute kõige peenemast kohast, kuid mitte kaugemalt kui 6 cm sarve kannasest. Mõõt esitatakse võimalusel millimeetritäpsusega.