

3. LISAD



FOTO 1: Vaade Ninanuki maaüksusel vanale kordonihoonel vundamendile, planeeritud põhihoone.



FOTO 2: Vaade Ninanuki maaüksuse talukohale, taustal abihoone vundament, planeeritud hoonestusala.



FOTO 3: Vaade Ninanuki maaüksusel vanale maakeldri varemele.



FOTO 4: Vaade Ninanuki maaüksusele kagupoolsest nurgast loode suunal, olemasolev pinnastee.



FOTO 5: Vaade Ninanuki maaüksusel keskosas olevale lagendikule, planeeritud pumbamaja asukoht.



FOTO 6: Vaade Ninanuki maaüksuse keskosast põhja suunal, pinnastee planeeritud hoonestusalale.



Taimkatte kaardistamine ja kaitsealused liigid Ninanuki kinnistul Triigi poolsaarel, Saaremaal

Inventeerisin 27. juunil 2022 Ninanuki kinnistul, Triigi poolsaarel taimkatet ja kaitstavaid liike. Kaardistamise tulemused on näha käesoleva aruande kaardil. Lisan GIS programmiga loetava shp vormingus kaardikihi ka aruandele.

Kaitstavaid liike leidsin kinnistult nelja liiki: rohekas käokeel (*Platanthera chlorantha*), suur käopõll (*Listera ovata*), tumepunane neiuvaip (*Epipactis atrorubens*), pruunikas pesajuur (*Neottia nidus-avis*). Kõik neli liiki on Eestis III kaitsekategoorias ja vähemalt Lääne-Eestis ja saartel tavalised. Minu hinnangul üksikud ehitusalale jäävad III kaitsekategooria liikide isendid ehitustegevusele takistuseks olla ei tohiks.

Ehitustegevuse käigus tuleks säästa ümbritsevat loometsa ja piirduda olemasolevate ehitiste all oleva alaga. Maja-aselele ligipääsuks on kõige sobilikum olemasolev vana tee koht. Kinnistu kõige esinduslikumad kaitsealuse liigi kogumikud on tumepunase neiuvaiba kogumikud otse metsa ja rannaniidu piiril kinnistu lääneosas, neid tuleks ehitustegevuse käigus kindlasti säästa. Rohekat käokeelt leidub loometsas hajusalt peaaegu kõikjal ja juhul kui metsa lausaliselt maha ei võeta, ehitustegevus selle populatsiooni oluliselt ei mõjuta.

Rannikul on esmane rannaniit, kus esinevad mitmed tüüpilised rannaniidu liigid: tuderluga (*Juncus gerardii*), randaster (*Aster tripolium*), rand-õisluht (*Triglochin maritimum*), randmalts (*Atriplex littoralis*), roog-aruhein (*Festuca arundinacea*). Kaitsealuseid liike rannaniidu alalt ei leidnud.

Metsa-ala on Saaremaa paepealsetele aladele iseloomulik loomännik, kus leidub näiteks rohekat uibulehte (*Pyrola chlorantha*), lakklehte (*Orthilia secunda*) ja euroopa metsputke (*Sanicula europaea*). Hõredas loomännikus leidub hajusalt nelja liiki käpalisi: rohekas käokeel (*Platanthera chlorantha*), suur käopõll (*Listera ovata*), tumepunane neiuvaip (*Epipactis atrorubens*), pruunikas pesajuur (*Neottia nidus-avis*).

Maja varemed asuvad alal, kus on tuntav inimõju ja kasvab mitmeid inimkaaslejaid liike: nõges (*Urtica dioica*), võilill (*Taraxacum sect. ruderalia*), mets-harakputk (*Anthriscus sylvestris*). Otse maja asemel on väike kogumik (5 isendit) tumepunast neiuvaipa (*Epipactis atrorubens*) ja maja aseme vahetus läheduses üksikud roheka käokeele (*Platanthera chlorantha*) isendid.

Triin Reitalu

Taimeökoloog
OÜ Osiliensis
Tartu Ülikool



Kaitsealused liigid (arv)

- pruunikas pesajuur
- rohekas käokeel
- suur käopõll
- tumepunane neiuvaip

elupaigad

- Loomets
- Maja ase
- Rannaniit

0 10 20 m



Aluskaart maaameti põhikaart. Numbrid näitavad konkreetses punktis leitud isendite arvu.

