

VIIS FAKTI HPV kohta

1. Inimese papilloomiviirused (HPV) on laialt levinud.
2. HP-viirused võivad esile kutsuda teatud liiki vähki ja vähieelseid seisundeid.
3. Kõige sagedamad HPV-st tingitud vähiliigid: emakakaelavähk, pärakuvähk ning neelu või kurgumandli vähk.
4. HP-viirused levivad inimeselt inimesele naha ja limaskestade kokkupuute kaudu.
5. Vaktsineerimine võib teatud HPV põhjustatud haigusi ennetada.

HPV-vastane vaktsineerimine Tallinnas:

REGISTREERU SIIN

HPV-vastane vaktsineerimine Tartus:

REGISTREERU SIIN

HPV-vastane vaktsineerimine apteegis:

REGISTREERU SIIN

HP-viirused võivad esile kutsuda teatud liiki vähki ja vähieelseid seisundeid



50%

kõigist infektsiooni tõttu tekkinud vähihaigustest arenenud riikides on seotud HPV-ga¹.



+170-180

naist Eestis haigestub igal aastal emakakaelavähki ja selle tõttu sureb keskmiselt 65 naist².



80%

kõigist inimestest nakatub elu jooksul HPV-ga³.




35%

kõigist naistest vanuses 20–25 eluaastat on nakatunud mingi suure riskiga HPV tüübiga⁴.



150+

erinevat HPV tüüpi on juba teada⁵.




100%

HPV põhjustab peaaegu 100% kõikidest emakakaelavähkidest⁶.

Kaitse ennast kõige ohtlikumat tüüpi HP-viiruste eest

Kuidas ennast HPV-ga nakatumise eest kaitsta?



Jaga:



HP-viirused võivad esile kutsuda teatud liiki vähki ja vähieelseid seisundeid

Haldaja



Tervishoiualase teadlikkuse edendamist toetavad



Veebileht on mõeldud üldise teabe jagamiseks HPV, selle ennetamise ja ravi kohta ning ei pruugi sisaldada kõiki olulisi asjaolusid Teie personaalse tervise seisukohalt – individuaalse nõu saamiseks konsulteerige palun arstiga.

KONTAKT | ANDMEKAITSE | KASUTUSTINGIMUSED | KÜPSISED | KÕRVALTOIME TEATIS | JUURDEPÄASETAVUS | KÜPSISTE SEADED

EE-NON-00065 – COPYRIGHT © 2025 MERCK & CO., INC., RAHWAY, NJ, USA AND ITS AFFILIATES. KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD.

TEAVE ON AVALDATUD 01.07.2020. VIIMATI UUENDATUD 12.08.2025.

