Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määrus nr 112
„Tervisekassa ravimite loetelu“
Lisa
(muudetud sõnastuses)

TERVISEKASSA RAVIMITE LOETELU

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1804294	abematsikliib, 100mg	L01EF03	VERZENIOS, õhukese polümeerikattega tablett, 42TK	Eli Lilly Nederland B.V.	100	C50-C50	Onkoloog				hormoonretseptor (HR)-positiivse, inimese epidermaalse kasvufaktori retseptor 2 (HER2)-negatiivse, lokaalselt kaugelearenenud või metastaatilise rinnavähi I rea raviks kombinatsioonis aromataasi inhibiitoriga patsiendile kuni haiguse progresseerumiseni ning kombinatsioonis fulvestrandiga I rea raviks kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle haigus on adjuvantse või neoadjuvantse aromataasi inhibiitori foonil või 12 kuud pärast selle lõpetamist progresseerunud ning kombinatsioonis fulvestrandiga II rea raviks kuni haiguse progresseerumiseni patsientidele, kes ei ole varasemalt ravi CDK-4/6 inibiitoritega saanud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1804328	abematsikliib, 150mg	L01EF03	VERZENIOS, õhukese polümeerikattega tablett, 42TK	Eli Lilly Nederland B.V.	100	C50-C50	Onkoloog				hormoonretseptor (HR)-positiivse, inimese epidermaalse kasvufaktori retseptor 2 (HER2)-negatiivse, lokaalselt kaugelearenenud või metastaatilise rinnavähi I rea raviks kombinatsioonis aromataasi inhibiitoriga patsiendile kuni haiguse progresseerumiseni ning kombinatsioonis fulvestrandiga I rea raviks kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle haigus on adjuvantse või neoadjuvantse aromataasi inhibiitori foonil või 12 kuud pärast selle lõpetamist progresseerunud ning kombinatsioonis fulvestrandiga II rea raviks kuni haiguse progresseerumiseni patsientidele, kes ei ole varasemalt ravi CDK-4/6 inibiitoritega saanud
1804261	abematsikliib, 50mg	L01EF03	VERZENIOS, õhukese polümeerikattega tablett, 42TK	Eli Lilly Nederland B.V.	100	C50-C50	Onkoloog				hormoonretseptor (HR)-positiivse, inimese epidermaalse kasvufaktori retseptor 2 (HER2)-negatiivse, lokaalselt kaugelearenenud või metastaatilise rinnavähi I rea raviks kombinatsioonis aromataasi inhibiitoriga patsiendile kuni haiguse progresseerumiseni ning kombinatsioonis fulvestrandiga I rea raviks kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle haigus on adjuvantse või neoadjuvantse aromataasi inhibiitori foonil või 12 kuud pärast selle lõpetamist progresseerunud ning kombinatsioonis fulvestrandiga II rea raviks kuni haiguse progresseerumiseni patsientidele, kes ei ole varasemalt ravi CDK-4/6 inibiitoritega saanud
1734768	abirateroon, 500mg	L02BX03	ZYTIGA, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Janssen - Cilag International	100	C61-C61	Uroloog, Onkoloog				metastaatilise hormoonsensitiivse eesnäärmevähi raviks ning metastaatilise kastratsioonresistentse eesnäärmevähi raviks patsientidele, kes ei ole enne haiguse metastaseerumist saanud ravi teise põlvkonna androgeeniretseptori inhibiitoriga ja patsientidele, kelle haigus on dotsetakseelil põhineva kemoteraapia ajal või järgselt progresseerunud. Ravimi kasutamisele ei või eelneda metastaatilise haiguse ravi apalutamiidi, darolutamiidi, ensalutamiidi või abirateroniga varasemas ravireas, kuid lubatud on ravimi vahetus talumatute kõrvaltoimete ilmnemisel

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1801022	abirateroon, 500mg	L02BX03	ABIRATERONE NORAMEDA, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Norameda UAB	100	C61-C61	Onkoloog, Uroloog				metastaatilise hormoonsensitiivse eesnäärmevähi raviks ning metastaatilise kastratsioonresistentse eesnäärmevähi raviks patsientidele, kes ei ole enne haiguse metastaseerumist saanud ravi teise põlvkonna androgeeniretseptori inhibiitoriga ja patsientidele, kelle haigus on dotsetakseelil põhineva kemoteraapia ajal või järgselt progresseerunud. Ravimi kasutamisele ei või eelneda metastaatilise haiguse ravi apalutamiidi, darolutamiidi, ensalutamiidi või abirateroniga varasemas ravireas, kuid lubatud on ravimi vahetus talumatute kõrvaltoimete ilmnemisel
1801055	abirateroon, 500mg	L02BX03	ABIRATERONE G.L. PHARMA, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	G.L. Pharma GmbH	100	C61-C61	Onkoloog, Uroloog				metastaatilise hormoonsensitiivse eesnäärmevähi raviks ning metastaatilise kastratsioonresistentse eesnäärmevähi raviks patsientidele, kes ei ole enne haiguse metastaseerumist saanud ravi teise põlvkonna androgeeniretseptori inhibiitoriga ja patsientidele, kelle haigus on dotsetakseelil põhineva kemoteraapia ajal või järgselt progresseerunud. Ravimi kasutamisele ei või eelneda metastaatilise haiguse ravi apalutamiidi, darolutamiidi, ensalutamiidi või abirateroniga varasemas ravireas, kuid lubatud on ravimi vahetus talumatute kõrvaltoimete ilmnemisel
1827952	abirateroon, 500mg	L02BX03	ABIRATERONE VIASANA, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Viasana UAB	100	C61-C61	Onkoloog, Uroloog				metastaatilise hormoonsensitiivse eesnäärmevähi raviks ning metastaatilise kastratsioonresistentse eesnäärmevähi raviks patsientidele, kes ei ole enne haiguse metastaseerumist saanud ravi teise põlvkonna androgeeniretseptori inhibiitoriga ja patsientidele, kelle haigus on dotsetakseelil põhineva kemoteraapia ajal või järgselt progresseerunud. Ravimi kasutamisele ei või eelneda metastaatilise haiguse ravi apalutamiidi, darolutamiidi, ensalutamiidi või abirateroniga varasemas ravireas, kuid lubatud on ravimi vahetus talumatute kõrvaltoimete ilmnemisel

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1829998	abirateroon, 500mg	L02BX03	ABIRATERONE ZENTIVA, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Zentiva k.s.	100	C61-C61	Uroloog, Onkoloog				metastaatilise hormoonsensitiivse eesnäärmevähi raviks ning metastaatilise kastratsioonresistentse eesnäärmevähi raviks patsientidele, kes ei ole enne haiguse metastaseerumist saanud ravi teise põlvkonna androgeeniretseptori inhibiitoriga ja patsientidele, kelle haigus on dotsetakseelil põhineva kemoteraapia ajal või järgselt progresseerunud. Ravimi kasutamisele ei või eelneda metastaatilise haiguse ravi apalutamiidi, darolutamiidi, ensalutamiidi või abirateroniga varasemas ravireas, kuid lubatud on ravimi vahetus talumatute kõrvaltoimete ilmnemisel
1847426	abirateroon, 500mg	L02BX03	ABIRATERONE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	C61-C61	Uroloog, Onkoloog				metastaatilise hormoonsensitiivse eesnäärmevähi raviks ning metastaatilise kastratsioonresistentse eesnäärmevähi raviks patsientidele, kes ei ole enne haiguse metastaseerumist saanud ravi teise põlvkonna androgeeniretseptori inhibiitoriga ja patsientidele, kelle haigus on dotsetakseelil põhineva kemoteraapia ajal või järgselt progresseerunud. Ravimi kasutamisele ei või eelneda metastaatilise haiguse ravi apalutamiidi, darolutamiidi, ensalutamiidi või abirateroniga varasemas ravireas, kuid lubatud on ravimi vahetus talumatute kõrvaltoimete ilmnemisel
1880580	abirateroon, 500mg	L02BX03	ABIRATERONE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Teva B.V.	100	C61-C61	Uroloog, Onkoloog				metastaatilise hormoonsensitiivse eesnäärmevähi raviks ning metastaatilise kastratsioonresistentse eesnäärmevähi raviks patsientidele, kes ei ole enne haiguse metastaseerumist saanud ravi teise põlvkonna androgeeniretseptori inhibiitoriga ja patsientidele, kelle haigus on dotsetakseelil põhineva kemoteraapia ajal või järgselt progresseerunud. Ravimi kasutamisele ei või eelneda metastaatilise haiguse ravi apalutamiidi, darolutamiidi, ensalutamiidi või abirateroniga varasemas ravireas, kuid lubatud on ravimi vahetus talumatute kõrvaltoimete ilmnemisel

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1881514	abirateroon, 500mg	L02BX03	ABIRATERONE STADA, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Stada Arzneimittel AG	100	C61-C61	Uroloog, Onkoloog				metastaatilise hormoonsensitiivse eesnäärmevähi raviks ning metastaatilise kastratsioonresistentse eesnäärmevähi raviks patsientidele, kes ei ole enne haiguse metastaseerumist saanud ravi teise põlvkonna androgeeniretseptori inhibiitoriga ja patsientidele, kelle haigus on dotsetakseelil põhineva kemoteraapia ajal või järgselt progresseerunud. Ravimi kasutamisele ei või eelneda metastaatilise haiguse ravi apalutamiidi, darolutamiidi, ensalutamiidi või abirateroniga varasemas ravireas, kuid lubatud on ravimi vahetus talumatute kõrvaltoimete ilmnemisel
1887633	abirateroon, 500mg	L02BX03	ABIRATERONE MYLAN, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Mylan Pharmaceuticals Limited	100	C61-C61	Onkoloog, Uroloog				metastaatilise hormoonsensitiivse eesnäärmevähi raviks ning metastaatilise kastratsioonresistentse eesnäärmevähi raviks patsientidele, kes ei ole enne haiguse metastaseerumist saanud ravi teise põlvkonna androgeeniretseptori inhibiitoriga ja patsientidele, kelle haigus on dotsetakseelil põhineva kemoteraapia ajal või järgselt progresseerunud. Ravimi kasutamisele ei või eelneda metastaatilise haiguse ravi apalutamiidi, darolutamiidi, ensalutamiidi või abirateroniga varasemas ravireas, kuid lubatud on ravimi vahetus talumatute kõrvaltoimete ilmnemisel
3023154	abirateroon, 500mg	L02BX03	ABIRATERONE OLPHA, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Olpha AS	100	C61-C61	Onkoloog, Uroloog				metastaatilise hormoonsensitiivse eesnäärmevähi raviks ning metastaatilise kastratsioonresistentse eesnäärmevähi raviks patsientidele, kes ei ole enne haiguse metastaseerumist saanud ravi teise põlvkonna androgeeniretseptori inhibiitoriga ja patsientidele, kelle haigus on dotsetakseelil põhineva kemoteraapia ajal või järgselt progresseerunud. Ravimi kasutamisele ei või eelneda metastaatilise haiguse ravi apalutamiidi, darolutamiidi, ensalutamiidi või abirateroniga varasemas ravireas, kuid lubatud on ravimi vahetus talumatute kõrvaltoimete ilmnemisel

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1868474	abrotsitiniib, 100mg	D11AH08	CIBINQO, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	L20.8-L20.8, L20.9-L20.9	Pediaater allergoloogi lisapädevusega, Pediaater, Allergoloog-immunoloog, Dermatovenerol oog				mõõduka või raske haigusega (EASI>=16, DLQI>=10) patsiendile, kes ei allu süsteemsele konventsionaalsele ravile tsüklosporiiniga 8–12 nädala jooksul või kellele see on vastunäidustatud või põhjustanud talumatuid kõrvaltoimeid
1868520	abrotsitiniib, 200mg	D11AH08	CIBINQO, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	L20.8-L20.8, L20.9-L20.9	Dermatovenerol oog, Pediaater, Pediaater allergoloogi lisapädevusega, Allergoloog-immunoloog				mõõduka või raske haigusega (EASI>=16, DLQI>=10) patsiendile, kes ei allu süsteemsele konventsionaalsele ravile tsüklosporiiniga 8–12 nädala jooksul või kellele see on vastunäidustatud või põhjustanud talumatuid kõrvaltoimeid
1868429	abrotsitiniib, 50mg	D11AH08	CIBINQO, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	L20.8-L20.8, L20.9-L20.9	Pediaater, Dermatovenerol oog, Allergoloog-immunoloog, Pediaater allergoloogi lisapädevusega				mõõduka või raske haigusega (EASI>=16, DLQI>=10) patsiendile, kes ei allu süsteemsele konventsionaalsele ravile tsüklosporiiniga 8–12 nädala jooksul või kellele see on vastunäidustatud või põhjustanud talumatuid kõrvaltoimeid

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1766662	adalimumab, 20mg 0.2ml	L04AB04	HUMIRA, süstelahus süstlis, 0.2ml 2TK	AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG	100	M05-M05, M08-M08, M06-M06	Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	L73.2-L73.2	Dermatovenerol oog				ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimusel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamütsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitretiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	L40-L40	Dermatovenerol oog, Pediaater				haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor >=10 ja/või DLQI>=10 ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas)
					100	M46-M46, M45-M45, M07.0-M07.3	Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.
					100	K51-K51, K50-K50	Pediaater gastroenteroloog i lisapädevusega, Pediaater, Gastroenteroloo g				ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeta, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeta
					100	H20.1-H20.1, H44.1-H44.1, H20.0-H20.0, H35.0-H35.0, H30-H30	Oftalmoloog				ekspertkomisjoni otsusel mitteinfektsioosse intermediaalse, posterioorse ja panuveiidi raviks täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveiidi raviks lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav, kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus immunosupressantidel e (tsüklosporiin, asatiopriin, metotreksaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või on need vastunäidustatud
					100	M08-M08	Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1816398	adalimumab, 20mg 0.4ml	L04AB04	HYRIMOZ, süstelahus süstlis, 0.4ml 2TK	Sandoz GmbH	100	L40-L40	Pediaater, Dermatovenerloog				haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor >=10 ja/või DLQI>=10 ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas)

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	K51-K51, K50-K50	Gastroenteroloog, Pediaater gastroenteroloogi lisapädevusega, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeta, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeta

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M08-M08	Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav
					100	H20.1-H20.1, H44.1-H44.1, H20.0-H20.0, H35.0-H35.0, H30-H30	Oftalmoloog				ekspertkomisjoni otsusel mitteinfektsioosse intermediaalse, posterioorse ja panuveiidi raviks täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveiidi raviks lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav, kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus immunosupressantidel e (tsüklosporiin, asatiopriin, metotreksaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või on need vastunäidustatud
					100	L73.2-L73.2	Dermatovenerol oog				ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimusel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamütsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitretiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud
					100	M46-M46, M45-M45, M07.0-M07.3	Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.
					100	M05-M05, M08-M08, M06-M06	Pediaater, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1715251	adalimumab, 40mg 0.4ml	L04AB04	HUMIRA, süstelahus pen-süstlis, 0.4ml 2TK	AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG	100	H20.1-H20.1, H44.1-H44.1, H20.0-H20.0, H35.0-H35.0, H30-H30	Oftalmoloog				ekspertkomisjoni otsusel mitteinfektsioosse intermediaalse, posterioorse ja panuveiidi raviks täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveiidi raviks lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav, kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus immunosupressantidel e (tsüklosporiin, asatiopriin, metotreksaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või on need vastunäidustatud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M07.0-M07.3	Pediaater, Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M05-M05, M08-M08, M06-M06	Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M45-M45, M46-M46	Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.
					100	K51-K51, K50-K50	Pediaater, Gastroenteroloog, Pediaater gastroenteroloogi lisapädevusega				ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeta, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeta
					100	L73.2-L73.2	Dermatoveneroloog				ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimusel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamütsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitretiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud
					100	M08-M08	Pediaater, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav
					100	L40-L40	Pediaater, Dermatoveneroloog				haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor >=10 ja/või DLQI>=10 ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas)

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1841161	adalimumab, 40mg 0.4ml	L04AB04	YUFLYMA, süstelahus pen-süstlis, 0.4ml 2TK	Celltrion Healthcare Hungary Kft.	100	L73.2-L73.2	Dermatovenerology				ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimusel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamütsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitretiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	H20.1-H20.1, H44.1-H44.1, H20.0-H20.0, H35.0-H35.0, H30-H30	Oftalmoloog				ekspertkomisjoni otsusel mitteinfektsioosse intermediaalse, posterioorse ja panuveiidi raviks täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveiidi raviks lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav, kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus immunosupressantidel e (tsüklosporiin, asatiopriin, metotreksaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või on need vastunäidustatud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M07.0-M07.3	Pediaater, Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.
					100	K51-K51, K50-K50	Pediaater gastroenteroloogi lisapädevusega, Gastroenteroloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeta, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeta
					100	M05-M05, M08-M08, M06-M06	Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks
					100	M08-M08	Pediaater, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav
					100	M45-M45, M46-M46	Pediaater, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.
					100	L40-L40	Pediaater, Dermatovenerloog				haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor >=10 ja/või DLQI>=10 ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas)

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1867608	adalimumab, 40mg 0.4ml	L04AB04	HUKYNDRA, süstelahus süstlis, 0.4ml 2TK	Stada Arzneimittel AG	100	M07.0-M07.3	Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M08-M08	Pediaater, Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	L40-L40	Dermatovenerol oog, Pediaater				haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor >=10 ja/või DLQI>=10 ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas)

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	H20.1-H20.1, H44.1-H44.1, H20.0-H20.0, H35.0-H35.0, H30-H30	Oftalmoloog				ekspertkomisjoni otsusel mitteinfektsioosse intermediaalse, posterioorse ja panuveiidi raviks täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveiidi raviks lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav, kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus immunosupressantidel e (tsüklosporiin, asatiopriin, metotreksaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või on need vastunäidustatud
					100	K51-K51, K50-K50	Gastroenteroloog, Pediaater, Pediaater gastroenteroloogi lisapädevusega				ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeta, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeta
					100	M05-M05, M08-M08, M06-M06	Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks
					100	L73.2-L73.2	Dermatoveneroloog				ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimusel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamütsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitretiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud
					100	M45-M45, M46-M46	Reumatoloog, Pediaater, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1867631	adalimumab, 40mg 0.4ml	L04AB04	HUKYNDRA, süstelahus pen-süstlis, 0.4ml 2TK	Stada Arzneimittel AG	100	M08-M08	Reumatoloog, Pediaater, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	H44.1-H44.1, H30.0-H30.0, H35.0-H35.0, H20.1-H20.1, H20.0-H20.0	Oftalmoloog				ekspertkomisjoni otsusel mitteinfektsioosse intermediaalse, posterioorse ja panuveiidi raviks täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveiidi raviks lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav, kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus immunosupressantidel e (tsüklosporiin, asatiopriin, metotreksaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või on need vastunäidustatud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	K51-K51, K50-K50	Pediaater gastroenteroloogi lisapädevusega, Gastroenteroloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeta, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeta

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	L40-L40	Pediaater, Dermatovenerol oog				haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor >=10 ja/või DLQI>=10 ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas)
					100	M45-M45, M46-M46	Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.
					100	M07.0-M07.3	Pediaater, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.
					100	M05-M05, M08-M08, M06-M06	Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks
					100	L73.2-L73.2	Dermatovenerol oog				ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimusel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamütsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitretiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3044179	adalimumab, 40mg 0.4ml	L04AB04	HYRIMOZ, süstelahus süstlis, 0.4ml 2TK	Sandoz GmbH	100	M05-M05, M08-M08, M06-M06	Reumatoloog, Pediaater, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M08-M08	Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	L73.2-L73.2	Dermatovenerol oog				ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimusel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamütsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitretiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M07.0-M07.3	Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.
					100	L40-L40	Pediaater, Dermatovenerol oog				haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor >=10 ja/või DLQI>=10 ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas)
					100	M45-M45, M46-M46	Pediaater, Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.
					100	H20.1-H20.1, H44.1-H44.1, H20.0-H20.0, H35.0-H35.0, H30-H30	Oftalmoloog				ekspertkomisjoni otsusel mitteinfektsioosse intermediaalse, posterioorse ja panuveiidi raviks täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveiidi raviks lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav, kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus immunosupressantidel e (tsüklosporiin, asatiopriin, metotreksaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või on need vastunäidustatud
					100	K51-K51, K50-K50	Pediaater gastroenteroloog i lisapädevusega, Gastroenteroloo g, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeta, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeta

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3044214	adalimumab, 40mg 0.4ml	L04AB04	HYRIMOZ, süstelahus pen-süstlis, 0.4ml 2TK	Sandoz GmbH	100	L40-L40	Pediaater, Dermatovenerloog				haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor >=10 ja/või DLQI>=10 ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas)

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M07.0-M07.3	Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	K51-K51, K50-K50	Pediaater, Gastroenteroloog, Pediaater gastroenteroloogi lisapädevusega				ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeta, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeta

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M05-M05, M08-M08, M06-M06	Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks
					100	M08-M08	Reumatoloog, Pediaater, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav
					100	M45-M45, M46-M46	Pediaater, Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.
					100	L73.2-L73.2	Dermatovenerol oog				ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimusel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamütsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitretiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud
					100	H20.1-H20.1, H44.1-H44.1, H20.0-H20.0, H35.0-H35.0, H30-H30	Oftalmoloog				ekspertkomisjoni otsusel mitteinfektsioosse intermediaalse, posterioorse ja panuveiidi raviks täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveiidi raviks lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav, kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus immunosupressantidel e (tsüklosporiin, asatiopriin, metotreksaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või on need vastunäidustatud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3070921	adalimumab, 40mg 0.4ml	L04AB04	IMRALDI, süstelahus pen-süstlis, 0.4ml 2TK	Samsung Bioepis NL B.V.	100	H44.1-H44.1, H30.0-H30.0, H35.0-H35.0, H20.1-H20.1, H20.0-H20.0	Oftalmoloog				ekspertkomisjoni otsusel mitteinfektsioosse intermediaalse, posterioorse ja panuveiidi raviks täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveiidi raviks lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav, kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus immunosupressantidel e (tsüklosporiin, asatiopriin, metotreksaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või on need vastunäidustatud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M08-M08	Pediaater, Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M45-M45, M46-M46	Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	L40-L40	Dermatovenerol oog, Pediaater				haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor >=10 ja/või DLQI>=10 ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas)
					100	K51-K51, K50-K50	Pediaater gastroenteroloog i lisapädevusega, Pediaater, Gastroenteroloo g				ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeta, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeta
					100	M05-M05, M08-M08, M06-M06	Reumatoloog, Pediaater, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.
					100	M07.0-M07.3	Reumatoloog, Pediaater, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.
					100	L73.2-L73.2	Dermatovenerol oog				ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimusel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamütsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitretiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1742251	adalimumab, 40mg 0.8ml	L04AB04	AMGEVITA, süstelahus süstlis, 0.8ml 2TK	Amgen Europe B.V.	100	H20.1-H20.1, H44.1-H44.1, H20.0-H20.0, H35.0-H35.0, H30-H30	Oftalmoloog				ekspertkomisjoni otsusel mitteinfektsioosse intermediaalse, posterioorse ja panuveiidi raviks täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveiidi raviks lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav, kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus immunosupressantidel e (tsüklosporiin, asatiopriin, metotreksaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või on need vastunäidustatud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M45-M45, M46-M46	Pediaater, Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	K51-K51, K50-K50	Pediaater gastroenteroloogi lisapädevusega, Gastroenteroloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeta, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeta

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	L73.2-L73.2	Dermatovenerol oog				ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimusel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamütsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitretiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud
					100	M05-M05, M08-M08, M06-M06	Pediaater, Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks
					100	M07.0-M07.3	Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.
					100	L40-L40	Pediaater, Dermatovenerol oog				haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor >=10 ja/või DLQI>=10 ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas)
					100	M08-M08	Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1742295	adalimumab, 40mg 0.8ml	L04AB04	AMGEVITA, süstelahus pen-süstlis, 0.8ml 2TK	Amgen Europe B.V.	100	K51-K51, K50-K50	Gastroenteroloog, Pediaater gastroenteroloogi lisapädevusega, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeta, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeta

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	H20.1-H20.1, H44.1-H44.1, H20.0-H20.0, H35.0-H35.0, H30-H30	Oftalmoloog				ekspertkomisjoni otsusel mitteinfektsioosse intermediaalse, posterioorse ja panuveiidi raviks täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveiidi raviks lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav, kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus immunosupressantidel e (tsüklosporiin, asatiopriin, metotreksaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või on need vastunäidustatud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M08-M08	Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav
					100	M45-M45, M46-M46	Pediaater, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.
					100	L73.2-L73.2	Dermatovenerol oog				ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimusel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamütsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitretiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud
					100	L40-L40	Pediaater, Dermatovenerol oog				haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor >=10 ja/või DLQI>=10 ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas)
					100	M07.0-M07.3	Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.
					100	M05-M05, M08-M08, M06-M06	Pediaater, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1777305	adalimumab, 40mg 0.8ml	L04AB04	HYRIMOZ, süstelahus süstlis, 0.8ml 2TK	Sandoz GmbH	100	K51-K51, K50-K50	Gastroenteroloog, Pediaater gastroenteroloogi lisapädevusega, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeta, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeta

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	L40-L40	Pediaater, Dermatovenerol oog				haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor >=10 ja/või DLQI>=10 ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas)

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M07.0-M07.3, M45-M45, M46-M46	Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.
					100	L73.2-L73.2	Dermatovenerol oog				ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimusel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamütsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitretiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud
					100	H20.1-H20.1, H44.1-H44.1, H20.0-H20.0, H35.0-H35.0, H30-H30	Oftalmoloog				ekspertkomisjoni otsusel mitteinfektsioosse intermediaalse, posterioorse ja panuveiidi raviks täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveiidi raviks lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav, kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus immunosupressantidel e (tsüklosporiin, asatiopriin, metotreksaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või on need vastunäidustatud
					100	M05-M05, M08-M08, M06-M06	Pediaater, Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks
					100	M08-M08	Pediaater, Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1777338	adalimumab, 40mg 0.8ml	L04AB04	HYRIMOZ, süstelahus pen-süstlis, 0.8ml 2TK	Sandoz GmbH	100	L40-L40	Pediaater, Dermatovenerloog				haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor >=10 ja/või DLQI>=10 ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas)

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	K51-K51, K50-K50	Pediaater gastroenteroloogi lisapädevusega, Gastroenteroloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeta, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeta

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M05-M05, M08-M08, M06-M06	Pediaater, Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks
					100	M08-M08	Pediaater, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav
					100	H20.1-H20.1, H44.1-H44.1, H20.0-H20.0, H35.0-H35.0, H30-H30	Oftalmoloog				ekspertkomisjoni otsusel mitteinfektsioosse intermediaalse, posterioorse ja panuveiidi raviks täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveiidi raviks lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav, kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus immunosupressantidel e (tsüklosporiin, asatiopriin, metotreksaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või on need vastunäidustatud
					100	L73.2-L73.2	Dermatovenerol oog				ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimusel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamütsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitretiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud
					100	M45-M45, M07.0-M07.3, M46-M46	Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1792571	adalimumab, 40mg 0.8ml	L04AB04	IDACIO, süstelahus pen-süstlis, 0.8ml 2TK	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	100	M05-M05, M08-M08, M06-M06	Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	L40-L40	Pediaater, Dermatovenerol oog				haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor >=10 ja/või DLQI>=10 ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas)

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M45-M45, M46-M46	Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	L73.2-L73.2	Dermatovenerol oog				ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimusel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamütsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitretiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud
					100	M08-M08	Reumatoloog, Pediaater, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav
					100	M07.0-M07.3	Pediaater, Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.
					100	K51-K51, K50-K50	Gastroenteroloog, Pediaater, Pediaater gastroenteroloogi lisapädevusega				ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeta, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeta
					100	H20.1-H20.1, H44.1-H44.1, H20.0-H20.0, H35.0-H35.0, H30-H30	Oftalmoloog				ekspertkomisjoni otsusel mitteinfektsioosse intermediaalse, posterioorse ja panuveiidi raviks täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveiidi raviks lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav, kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus immunosupressantidel e (tsüklosporiin, asatiopriin, metotreksaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või on need vastunäidustatud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1867653	adalimumab, 80mg 0.8ml	L04AB04	HUKYNDRA, süstelahus süstlis, 0.8ml 1TK	Stada Arzneimittel AG	100	M05-M05, M08-M08, M06-M06	Reumatoloog, Pediaater, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	H20.1-H20.1, H44.1-H44.1, H20.0-H20.0, H35.0-H35.0, H30-H30	Oftalmoloog				ekspertkomisjoni otsusel mitteinfektsioosse intermediaalse, posterioorse ja panuveiidi raviks täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveiidi raviks lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav, kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus immunosupressantidel e (tsüklosporiin, asatiopriin, metotreksaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või on need vastunäidustatud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M45-M45, M46-M46	Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	K51-K51, K50-K50	Pediaater gastroenteroloogi lisapädevusega, Pediaater, Gastroenteroloog				ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeta, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeta
					100	L40-L40	Dermatovenerloog, Pediaater				haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor >=10 ja/või DLQI>=10 ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas)
					100	L73.2-L73.2	Dermatovenerloog				ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimusel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamütsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitretiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud
					100	M08-M08	Pediaater, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav
					100	M07.0-M07.3	Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3091542	adalimumab, 80mg 0.8ml	L04AB04	HUKYNDRA, süstelahus pen-süstlis, 0.8ml 1TK	Stada Arzneimittel AG	100	H20.1-H20.1, H44.1-H44.1, H20.0-H20.0, H35.0-H35.0, H30-H30	Oftalmoloog				ekspertkomisjoni otsusel mitteinfektsioosse intermediaalse, posterioorse ja panuveiidi raviks täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveiidi raviks lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav, kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus immunosupressantidel e (tsüklosporiin, asatiopriin, metotreksaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või on need vastunäidustatud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	L40-L40	Pediaater, Dermatovenerol oog				haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor >=10 ja/või DLQI>=10 ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas)

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M45-M45, M46-M46	Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.
					100	M08-M08	Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav
					100	K51-K51, K50-K50	Pediaater, Gastroenteroloog, Pediaater gastroenteroloogi lisapädevusega				ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeta, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeta
					100	L73.2-L73.2	Dermatoveneroloog				ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimusel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamütsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitretiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud
					100	M05-M05, M08-M08, M06-M06	Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks
					100	M07.0-M07.3	Pediaater, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.
1412334	agomelatiin, 25mg	N06AX22	VALDOXAN, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Les Laboratoires Servier	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1738469	agomelatiin, 25mg	N06AX22	ZILBEA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Zentiva k.s.	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
1763872	agomelatiin, 25mg	N06AX22	LAMEGOM, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
1831946	akalabrutiniib, 100mg	L01EL02	CALQUENCE, kõvakapsel, 60TK	AstraZeneca AB	100	C91.1-C91.1	Hematoloog				monoteraapiana patsientidele, kellel esineb 17p deletsioon või TP53 mutatsioon, kes ei ole eelnevalt ravi saanud või kes on eelnevalt saanud vähemalt ühe ravikuuri ja haigus ei ole ravile allunud või on taastekkinud lühema aja kui 36 kuu jooksul eelneva ravi alustamisest alates ning patsientidele, kellel esineb 11q deletsioon, kes ei ole eelnevalt ravi saanud või kes on eelnevalt saanud vähemalt ühe ravikuuri ja haigus ei ole ravile allunud või on taastekkinud. Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi akalabrutiniibiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 01.07.2022.
1891863	akalabrutiniib, 100mg	L01EL02	CALQUENCE, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	AstraZeneca AB	100	C91.1-C91.1	Hematoloog				monoteraapiana patsientidele, kellel esineb 17p deletsioon või TP53 mutatsioon, kes ei ole eelnevalt ravi saanud või kes on eelnevalt saanud vähemalt ühe ravikuuri ja haigus ei ole ravile allunud või on taastekkinud lühema aja kui 36 kuu jooksul eelneva ravi alustamisest alates ning patsientidele, kellel esineb 11q deletsioon, kes ei ole eelnevalt ravi saanud või kes on eelnevalt saanud vähemalt ühe ravikuuri ja haigus ei ole ravile allunud või on taastekkinud. Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi akalabrutiniibiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 01.07.2022.
1590106	aklidiinium, 322mcg 1mõõtannus	R03BB05	BRETARIS GENUAIR, inhalatsioonipulber, 60mõõtannus 1TK	Covis Pharma Europe B.V.	75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			
					50						
3107900	akoramidis, 356mg	C01EB25	BEYONTTRA, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Bayer AG	100	E85.0-E85.0, E85.4-E85.4	Kardioloog				ravi alustamine vähemalt kahest kardioloogist, kellest üks peab olema PERH-,TÜK-i või ITK kardioloog, koosneva konsiiliumi otsuse alusel patsiendile, kellel on dokumenteeritud kardiomüopaatia, mis on seotud transtüretiiniga amüloidoosiga ning kellel esineb NYHA I–III klassi südamepuudulikkus

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3090091	aksitiniib, 1mg	L01EK01	AXITINIB ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumis heledarakulise neeru kartsinoomi teise rea ravina pärast esimese rea sunitiniib- või pasopaniibravi patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine aksitiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1, haiguse prognoos Hengi kriteeriumide järgi hea või keskmine ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena
3090226	aksitiniib, 5mg	L01EK01	AXITINIB ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumis heledarakulise neeru kartsinoomi teise rea ravina pärast esimese rea sunitiniib- või pasopaniibravi patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine aksitiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1, haiguse prognoos Hengi kriteeriumide järgi hea või keskmine ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena
1739437	alektiniib, 150mg	L01ED03	ALECENSA, kõvakapsel, 224TK	Roche Registration GmbH	100	C34-C34	Onkoloog				anaplastilise lümfoomkinaas-positiivse varajases staadiumis IIA-IIIA varem ravimata mitteväikerakk-kopsuvähi adjuvantraviks heas üldseisundis (ECOG 0-1) patsiendile pärast kasvaja täielikku resektsiooni. Ravi alektiniibiga kestab kuni haiguse retsidiveerumiseni, vastuvõetamatu toksilisuse tekkimiseni või kuni 2 aastat (maksimaalselt 24 ravitsüklit)
					100	C34-C34	Onkoloog				anaplastilise lümfoomkinaas-positiivse kaugelearenenud varem ravimata mitteväikerakk-kopsuvähi raviks heas üldseisundis (ECOG 0-2) täiskasvanud patsientidele. Ravi alektiniibiga kestab kuni haiguse retsidiveerumiseni või vastuvõetamatu toksilisuse tekkimiseni
1339141	alendroonhape+kolekaltsiferool, 70mg+5600RÜ	M05BB03	FOSAVANCE, tablett, 4TK	Organon N.V.	75	M81-M81, M82-M82, M85.8-M85.8					suure luumurru riskiga patsientidele, kelle reieluu proksimaalse osa murrurisk >= 3% ja/või tõsise osteoporootilise murru risk >= 15% (ilma DEXA uuringuta >= 20%) vastavalt FRAX luumurru riskikalkulaatorile
					75	M80-M80					
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1695067	alendroonhape+kolekaltsiferool, 70mg+5600RÜ	M05BB03	ALENDRONIC ACID/COLECALCIFEROL ZENTIVA, tablett, 4TK	Zentiva k.s.	75	M85.8-M85.8, M82-M82, M81-M81					suure luumurru riskiga patsientidele, kelle reieluu proksimaalse osa murrurisk >= 3% ja/või tõsise osteoporootilise murru risk >= 15% (ilma DEXA uuringuta >= 20%) vastavalt FRAX luumurru riskikalkulaatorile
					75	M80-M80					
					50						
1789577	alfa-2b-ropeginterferoon, 250mcg 0.5ml	L03AB15	BESREMI, süstelahus pen-süstlis, 0.5ml 1TK	AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH	100	D45-D45	Hematoloog				monoteraapiana teise rea raviks hüdroksüuurea ebapiisavuse või talumatuse korral ja esimese rea ravina noorematele patsientidele, kellel puhul hematoloogide konsiilium otsustab, et pikaajaline hüdroksüuurea ravi ei ole kõrvaltoimete profiili tõttu sobiv
1207493	alfadarbepoetiin, 100mcg 0.5ml	B03XA02	ARANESP, süstelahus süstlis, 0.5ml 1TK	Amgen Europe B.V.	100	D46-D46, D47.1-D47.1	Hematoloog				
					100	D63-D63, T86-T86	Pediaater nefroloogi lisapädevusega, Nefroloog, Pediaater, Uroloog				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
					50						
1207527	alfadarbepoetiin, 150mcg 0.3ml	B03XA02	ARANESP, süstelahus süstlis, 0.3ml 1TK	Amgen Europe B.V.	100	D46-D46, D47.1-D47.1	Hematoloog				
					50						
					100	D63-D63, T86-T86	Uroloog, Pediaater nefroloogi lisapädevusega, Pediaater, Nefroloog				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1176218	alfadarbepoetiin, 20mcg 0.5ml	B03XA02	ARANESP, süstelahus süstlis, 0.5ml 1TK	Amgen Europe B.V.	100	D46-D46, D47.1-D47.1	Hematoloog				
					50						
					100	D63-D63, T86-T86	Pediaater nefroloogi lisapädevusega, Pediaater, Nefroloog, Uroloog				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
1207314	alfadarbepoetiin, 30mcg 0.3ml	B03XA02	ARANESP, süstelahus süstlis, 0.3ml 1TK	Amgen Europe B.V.	100	D63-D63, T86-T86	Pediaater, Nefroloog, Uroloog, Pediaater nefroloogi lisapädevusega				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
					100	D46-D46, D47.1-D47.1	Hematoloog				
					50						
1207370	alfadarbepoetiin, 40mcg 0.4ml	B03XA02	ARANESP, süstelahus süstlis, 0.4ml 1TK	Amgen Europe B.V.	50						
					100	D46-D46, D47.1-D47.1	Hematoloog				
					100	D63-D63, T86-T86	Uroloog, Nefroloog, Pediaater nefroloogi lisapädevusega, Pediaater				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
1207415	alfadarbepoetiin, 50mcg 0.5ml	B03XA02	ARANESP, süstelahus süstlis, 0.5ml 1TK	Amgen Europe B.V.	100	D63-D63, T86-T86	Pediaater nefroloogi lisapädevusega, Nefroloog, Uroloog, Pediaater				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
					100	D46-D46, D47.1-D47.1	Hematoloog				
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1207437	alfadarbepoetiin, 60mcg 0.3ml	B03XA02	ARANESP, süstelahus süstlis, 0.3ml 1TK	Amgen Europe B.V.	100	D46-D46, D47.1-D47.1	Hematoloog				
					50						
					100	D63-D63, T86-T86	Nefroloog, Pediaater, Pediaater nefroloogi lisapädevusega, Uroloog				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
1207471	alfadarbepoetiin, 80mcg 0.4ml	B03XA02	ARANESP, süstelahus süstlis, 0.4ml 1TK	Amgen Europe B.V.	100	D63-D63, T86-T86	Nefroloog, Pediaater nefroloogi lisapädevusega, Uroloog, Pediaater				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
					50						
					100	D46-D46, D47.1-D47.1	Hematoloog				
1022960	alfadornaas, 1mg 1ml	R05CB13	PULMOZYME, nebuliseeritav lahus, 2.5ml 6TK	Roche Eesti OÜ	100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater	esmane			
					50						
3059737	alfaefgartigimood, 1000mg 5.6ml	L04AL01	VYVGART, süstelahus, 5.6ml 1TK	Argenx	100	G70.0-G70.0	Neuroloog				atsetüülkoliini retseptori vastaste antikehade suhtes positiivsetele patsientidele, kellel on ravirefraktaarne MGFA IIB-IV klassi generaliseerunud müasteenia ning kellel eelnev standardravi maksimaalsetes annustes kolme erineva rühmaga 6-12 kuu jooksul ei ole olnud piisavalt efektiivne. Ravi alfaefgartigimoodiga alustamisel on vajalik MG-ADL skaala näitaja 5 ja QMG skaala näitaja >=10. Senise ravi ebatõhusus peab olema fikseeritud meditsiinilises dokumentatsioonis. Ravi lõpetatakse kui 4 järjestikuse nädala jooksul ei ole saavutatud MG-ADL skoori vähenemist võrreldes algväärtusega vähemalt 2 punkti võrra
1644904	alfafollitropiin, 150RÜ 0.25ml	G03GA05	BEMFOLA, süstelahus pen-süstlis, 0.25ml 1TK	Gedeon Richter Plc.	100	N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1644915	alfafollitropiin, 225RÜ 0.375ml	G03GA05	BEMFOLA, süstelahus pen-süstlis, 0.375ml 1TK	Gedeon Richter Plc.	50						
					100	N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks
1173855	alfafollitropiin, 300RÜ 0.48ml	G03GA05	GONAL-F, süstelahus pen-süstlis, 0.48ml 1TK	Merck Europe B.V.	100	N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks
					50						
1628636	alfafollitropiin, 300RÜ 0.5ml	G03GA05	OVALEAP, süstelahus, 0.5ml 1TK	Theramex Ireland Limited	100	N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks
					50						
1644926	alfafollitropiin, 300RÜ 0.5ml	G03GA05	BEMFOLA, süstelahus pen-süstlis, 0.5ml 1TK	Gedeon Richter Plc.	100	N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks
					50						
1213513	alfafollitropiin, 450RÜ 0.72ml	G03GA05	GONAL-F, süstelahus pen-süstlis, 0.72ml 1TK	Merck Europe B.V.	100	N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks
					50						
1628647	alfafollitropiin, 450RÜ 0.75ml	G03GA05	OVALEAP, süstelahus, 0.75ml 1TK	Theramex Ireland Limited	50						
					100	N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks
1644937	alfafollitropiin, 450RÜ 0.75ml	G03GA05	BEMFOLA, süstelahus pen-süstlis, 0.75ml 1TK	Gedeon Richter Plc.	100	N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks
					50						
1644892	alfafollitropiin, 75RÜ 0.125ml	G03GA05	BEMFOLA, süstelahus pen-süstlis, 0.125ml 1TK	Gedeon Richter Plc.	100	N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks
					50						
1173866	alfafollitropiin, 900RÜ 1.44ml	G03GA05	GONAL-F, süstelahus pen-süstlis, 1.44ml 1TK	Merck Europe B.V.	50						
					100	N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks
1628658	alfafollitropiin, 900RÜ 1.5ml	G03GA05	OVALEAP, süstelahus, 1.5ml 1TK	Theramex Ireland Limited	100	N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks
					50						
1745007	alfafollitropiin+alfalutropiin, 450RÜ+225RÜ 0.72ml	G03GA30	PERGOVERIS, süstelahus pen-süstlis, 0.72ml 1TK	Merck Europe B.V.	100	N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1745018	alfafollitropiin+alfalutropiin, 900RÜ+450RÜ 1.44ml	G03GA30	PERGOVERIS, süstelahus pen-süstlis, 1.44ml 1TK	Merck Europe B.V.	100	N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks
					50						
1879454	alfakaltsidool, 0,25mcg	A11CC03	ALFACALCIDOL STRIDES PHARMA, pehmekapsel, 100TK	Strides Pharma (Cyprus) Limited	100	N25-N25, N18-N18	Nefroloog, Pediaater nefroloogi lisapädevusega, Pediaater				
					50						
					100	E89.2-E89.2, E20-E20	Pediaater endokrinoloogi lisapädevusega, Pediaater, Endokrinoloog				
1214817	alfakooriongonadotropiin, 250mcg 0.5ml	G03GA08	OVITRELLE, süstelahus süstlis, 0.5ml 1TK	Merck Europe B.V.	50						
					100	N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks
1046810	alfalutropiin, 75RÜ	G03GA07	LUVERIS, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Merck Europe B.V.	100	N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks
					50						
1064247	alfusosiin, 10mg	G04CA01	XATRAL SR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Sanofi Winthrop Industrie	50						
1278176	alfusosiin, 10mg	G04CA01	ALFUZOSIN-TEVA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	50						
3055227	alfusosiin, 10mg	G04CA01	XATRAL SR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Ideal Trade Links UAB	50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1698127	alirokumab, 150mg 1ml	C10AX14	PRALUENT, süstelahus pen-süstlis, 1ml 2TK	Sanofi Winthrop Industrie	100	I25.2-I25.2, I21-I21, I22-I22	Kardioloog	esmane			ravi alustamine ägeda südamelihase infarkti järgselt (möödunud <=12 kuud) kombinatsioonis statiini ja esetimiibiga patsientidel, kellel vaatamata 1-3 kuud kestnud ravile maksimaalses talutavas annuses statiini ja esetimiibiga ei ole saavutatud LDL-kolesterooli eesmärkväärtust (<1,4mmol/L) ning patsiendi LDL-C väärtus on seejuures >=3,0 mmol/L või kellele statiin/esetimiib on vastunäidustatud ning patsiendi LDL-C väärtus on seejuures >=3,0 mmol
					100	E78.0-E78.0	Kardioloog	esmane			kroonilise perekondliku hüperkolesteroleemia raviks dokumenteeritud ateroskleroosiga patsientidele, kui varasem ravi maksimaalselt talutavas annuses statiini ja esetimiibiga on osutunud ebapiisavaks või on need ravimid olnud vastunäidustatud ning patsiendi LDL-C väärtus on >=3,0 mmol/L
1698150	alirokumab, 75mg 1ml	C10AX14	PRALUENT, süstelahus pen-süstlis, 1ml 2TK	Sanofi Winthrop Industrie	100	I25.2-I25.2, I21-I21, I22-I22	Kardioloog	esmane			ravi alustamine ägeda südamelihase infarkti järgselt (möödunud <=12 kuud) kombinatsioonis statiini ja esetimiibiga patsientidel, kellel vaatamata 1-3 kuud kestnud ravile maksimaalses talutavas annuses statiini ja esetimiibiga ei ole saavutatud LDL-kolesterooli eesmärkväärtust (<1,4mmol/L) ning patsiendi LDL-C väärtus on seejuures >=3,0 mmol/L või kellele statiin/esetimiib on vastunäidustatud ning patsiendi LDL-C väärtus on seejuures >=3,0 mmol
					100	E78.0-E78.0	Kardioloog	esmane			kroonilise perekondliku hüperkolesteroleemia raviks dokumenteeritud ateroskleroosiga patsientidele, kui varasem ravi maksimaalselt talutavas annuses statiini ja esetimiibiga on osutunud ebapiisavaks või on need ravimid olnud vastunäidustatud ning patsiendi LDL-C väärtus on >=3,0 mmol/L
1001619	allopurinool, 100mg	M04AA01	ALLOPURINOL ORIFARM, tablett, 50TK	Orifarm Healthcare A/S	50						
					75	M10-M10, N20-N23					
1685505	allopurinool, 100mg	M04AA01	ALLOPURINOL SANDOZ, tablett, 50TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	M10-M10, N20-N23					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1001686	allopurinool, 300mg	M04AA01	ALLOPURINOL ORIFARM, tablett, 50TK	Orifarm Healthcare A/S	75	M10-M10, N20-N23					
					50						
1685628	allopurinool, 300mg	M04AA01	ALLOPURINOL SANDOZ, tablett, 100TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	M10-M10, N20-N23					
1754131	allopurinool, 300mg	M04AA01	ALLOPURINOL ACCORD, tablett, 50TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					75	M10-M10, N20-N23					
1064517	amantadiin, 100mg	N04BB01	AMANTADIN-RATIOPHARM 100 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Ratiopharm GmbH	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						
1349872	ambrisentaan, 10mg	C02KX02	VOLIBRIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	GlaxoSmithKline Trading Services Limited	50						
					100	I27.0-I27.0	Kardioloog, Pulmonoloog, Pediaater, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog, Pediaater kardioloogi lisapädevusega				NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafiil ja bosentaan on vastunäidustatud, osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid
1775011	ambrisentaan, 10mg	C02KX02	AMBRISENTAN NORAMEDA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Norameda UAB	100	I27.0-I27.0	Pediaater kardioloogi lisapädevusega, Reumatoloog, Pulmonoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater, Kardioloog				NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafiil ja bosentaan on vastunäidustatud, osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1797071	ambrisentaan, 10mg	C02KX02	AMBRISENTAN ZENTIVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Zentiva k.s.	50						
					100	I27.0-I27.0	Pediaater, Pediaater kardioloogi lisapädevusega, Kardioloog, Pulmonoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog				NYHA III-IV kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafiil on vastunäidustatud, ostunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid
1798555	ambrisentaan, 10mg	C02KX02	AMBRISENTAN VIATRIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Viatris Limited	100	I27.0-I27.0	Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog, Pediaater, Kardioloog, Pulmonoloog, Pediaater kardioloogi lisapädevusega				NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafiil ja bosentaan on vastunäidustatud, osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid
					50						
1349850	ambrisentaan, 5mg	C02KX02	VOLIBRIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	GlaxoSmithKline Trading Services Limited	50						
					100	I27.0-I27.0	Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater, Kardioloog, Pediaater kardioloogi lisapädevusega, Reumatoloog, Pulmonoloog				NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafiil ja bosentaan on vastunäidustatud, osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1774975	ambrisentaan, 5mg	C02KX02	AMBRISENTAN NORAMEDA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Norameda UAB	100	I27.0-I27.0	Pediaater kardioloogi lisapädevusega, Pulmonoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog, Kardioloog, Pediaater				NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafiil ja bosentaan on vastunäidustatud, osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid
					50						
1797060	ambrisentaan, 5mg	C02KX02	AMBRISENTAN ZENTIVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Zentiva k.s.	50						
					100	I27.0-I27.0	Pediaater kardioloogi lisapädevusega, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Kardioloog, Pulmonoloog, Pediaater, Reumatoloog				NYHA III-IV kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafiil on vastunäidustatud, ostunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid
1798533	ambrisentaan, 5mg	C02KX02	AMBRISENTAN VIATRIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Viatris Limited	100	I27.0-I27.0	Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater kardioloogi lisapädevusega, Kardioloog, Pulmonoloog, Pediaater, Reumatoloog				NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafiil ja bosentaan on vastunäidustatud, osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
7017959	aminohapped,		Neocate Junior, pulber, 400g N6	Nutrimedical OÜ	75	K52.2-K52.2, L27.2-L27.2, L50-L50, T78.1-T78.1, K22.8-K22.8, K90.4-K90.4, T78.2-T78.2, L20.8-L20.8, T78.0-T78.0	Pediaater		1,00	2,00	lehmapiimavalgu talumatusega 1-2- aastastele lastele, kes on esimesel eluaastal tarvitanud aminohapete segu ning kes täielikult hüdrolüüsitud piimasegu ei talu. Jätkuv vajadus aminohapete segule peab olema tõestatud preparaadi esmasel määramisel ja 6 kuu möödudes
1044616	amiodaroon, 200mg	C01BD01	AMIOKORDIN, tablett, 60TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	50						
					75	I47-I49	Kardioloog, Pediaater, Pediaater kardioloogi lisapädevusega	esmane			
3112704	amiodaroon, 200mg	C01BD01	CORDARONE 200 MG, tablett, 60TK	Ideal Trade Links UAB	75	I47-I49	Kardioloog, Pediaater, Pediaater kardioloogi lisapädevusega	esmane			
					50						
1041141	amisulpriid, 200mg	N05AL05	SOLIAN, tablett, 30TK	Sanofi Winthrop Industrie	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
1342213	amisulpriid, 200mg	N05AL05	AMISAN 200 MG, tablett, 30TK	Pro.Med.Cs Praha a.s.	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
1343438	amisulpriid, 400mg	N05AL05	AMISAN 400 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Pro.Med.Cs Praha a.s.	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1107391	amitriptüliin, 10mg	N06AA09	AMITRIPTYLINE-GRINDEKS, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	Grindeks AS	75	G63-G63, G43-G43, G62.0-G62.0					
					50						
					100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
1012475	amitriptüliin, 25mg	N06AA09	AMITRIPTYLINE-GRINDEKS, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	Grindeks AS	100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
					50						
					75	G63-G63, G43-G43, G62.0-G62.0					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1109900	amlodipiin, 10mg	C08CA01	AGEN 10MG, tablett, 30TK	Zentiva k.s.	75	I15-I15, I10-I13, I20-I20					
					50						
1122972	amlodipiin, 10mg	C08CA01	HIPRES, tablett, 30TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	75	I15-I15, I10-I13, I20-I20					
					50						
1147003	amlodipiin, 10mg	C08CA01	AMLODIPIN-RATIOPHARM 10 MG, tablett, 30TK	Ratiopharm GmbH	75	I15-I15, I10-I13, I20-I20					
					50						
1243088	amlodipiin, 10mg	C08CA01	AMLOCARD 10MG, tablett, 60TK	Hexal AG	75	I15-I15, I10-I13, I20-I20					
					50						
1445419	amlodipiin, 10mg	C08CA01	AMLODIPINE VITABALANS, tablett, 100TK	Vitabalans Oy	50						
					75	I15-I15, I10-I13, I20-I20					
1551406	amlodipiin, 10mg	C08CA01	HIPRES, tablett, 60TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	50						
					75	I15-I15, I10-I13, I20-I20					
1865718	amlodipiin, 10mg	C08CA01	AMLODIPINE VITABALANS, tablett, 90TK	Vitabalans Oy	75	I15-I15, I10-I13, I20-I20					
					50						
1087871	amlodipiin, 5mg	C08CA01	AMLOCARD 5 MG, tablett, 30TK	Hexal AG	50						
					75	I15-I15, I10-I13, I20-I20					
1109775	amlodipiin, 5mg	C08CA01	AMLODIPIN-RATIOPHARM 5 MG, tablett, 30TK	Ratiopharm GmbH	75	I15-I15, I10-I13, I20-I20					
					50						
1109887	amlodipiin, 5mg	C08CA01	AGEN 5MG, tablett, 30TK	Zentiva k.s.	50						
					75	I15-I15, I10-I13, I20-I20					
1122961	amlodipiin, 5mg	C08CA01	HIPRES, tablett, 30TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	50						
					75	I15-I15, I10-I13, I20-I20					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1242863	amlodipiin, 5mg	C08CA01	AMLOCARD 5 MG, tablett, 60TK	Hexal AG	75	I15-I15, I10-I13, I20-I20					
					50						
1445307	amlodipiin, 5mg	C08CA01	AMLODIPINE VITABALANS, tablett, 100TK	Vitabalans Oy	50						
					75	I15-I15, I10-I13, I20-I20					
1551383	amlodipiin, 5mg	C08CA01	HIPRES, tablett, 60TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	75	I15-I15, I10-I13, I20-I20					
					50						
1865707	amlodipiin, 5mg	C08CA01	AMLODIPINE VITABALANS, tablett, 90TK	Vitabalans Oy	75	I15-I15, I20-I20, I10-I13					
					50						
1008919	amoksitsilliin, 1000mg	J01CA04	AMOXICILLIN-RATIOPHARM 1000 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Ratiopharm GmbH	50						
					75	H65-H67, J13-J18				16,00	
1066463	amoksitsilliin, 1000mg	J01CA04	AMOXICILLIN-RATIOPHARM 1000 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	Ratiopharm GmbH	50						
					75	H65-H67, J13-J18				16,00	
1306921	amoksitsilliin, 1000mg	J01CA04	OSPAMOX, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	H65-H67, J13-J18				16,00	
1000382	amoksitsilliin, 50mg 1ml	J01CA04	AMOXICILLIN-RATIOPHARM TS, suukaudse suspensiooni pulber, 100ml 1TK	Ratiopharm GmbH	75	H65-H67, J13-J18				16,00	
					50						
3066948	amoksitsilliin, 50mg 1ml	J01CA04	OSPAMOX 250 MG/5 ML, suukaudse suspensiooni pulber, 60ml 1TK	Ideal Trade Links UAB	50						
					75	H65-H67, J13-J18				16,00	

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3119992	amoksitsilliin, 50mg 1ml	J01CA04	OSPAMOX 250 MG/5 ML, suukaudse suspensiooni pulber, 60ml 1TK	Lex Ano UAB	75	H65-H67, J13-J18				16,00	
					50						
1000450	amoksitsilliin, 750mg	J01CA04	AMOXICILLIN-RATIOPHARM 750 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Ratiopharm GmbH	75	H65-H67, J13-J18				16,00	
					50						
1066722	amoksitsilliin+klavulaanhape, 500mg+125mg	J01CR02	AMOKSIKLAV, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	H65-H67, J13-J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliiniga
1066711	amoksitsilliin+klavulaanhape, 80mg+11,4mg 1ml	J01CR02	AMOKSIKLAV, suukaudse suspensiooni pulber, 70ml 1TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	H65-H67, J13-J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliiniga
					50						
1701155	amoksitsilliin+klavulaanhape, 80mg+11,4mg 1ml	J01CR02	MEDOCLAV, suukaudse suspensiooni pulber, 70ml 1TK	Medochemie Limited	75	H65-H67, J13-J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliiniga
					50						
1718333	amoksitsilliin+klavulaanhape, 80mg+11,4mg 1ml	J01CR02	AUGMENTIN FRUIT, suukaudse suspensiooni pulber, 70ml 1TK	GlaxoSmithKline Trading Services Limited	75	H65-H67, J13-J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliiniga
					50						
1822700	amoksitsilliin+klavulaanhape, 80mg+11,4mg 1ml	J01CR02	AUGMENTIN FRUIT, suukaudse suspensiooni pulber, 70ml 1TK	First Pharma OÜ	50						
					75	H65-H67, J13-J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliiniga
1840722	amoksitsilliin+klavulaanhape, 80mg+11,4mg 1ml	J01CR02	AUGMENTIN FRUIT, suukaudse suspensiooni pulber, 70ml 1TK	Ideal Trade Links UAB	50						
					75	H65-H67, J13-J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliiniga
1066700	amoksitsilliin+klavulaanhape, 875mg+125mg	J01CR02	AMOKSIKLAV, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	H65-H67, J13-J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliiniga
					50						
1066733	amoksitsilliin+klavulaanhape, 875mg+125mg	J01CR02	AUGMENTIN, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	GlaxoSmithKline Trading Services Limited	50						
					75	H65-H67, J13-J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliiniga

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1175431	amoksitsilliin+klavulaanhape, 875mg+125mg	J01CR02	AMOKSIKLAV, dispergeeruv tablett, 14TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	H65-H67, J13-J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliiniga
					50						
1635230	amoksitsilliin+klavulaanhape, 875mg+125mg	J01CR02	BETAKLAV, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	50						
					75	H65-H67, J13-J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliiniga
1660474	amoksitsilliin+klavulaanhape, 875mg+125mg	J01CR02	AMOXICILLIN/CLAVULANIC ACID ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Teva B.V.	75	H65-H67, J13-J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliiniga
					50						
1723092	amoksitsilliin+klavulaanhape, 875mg+125mg	J01CR02	AUGMENTIN, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	First Pharma OÜ	50						
					75	H65-H67, J13-J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliiniga
1743971	amoksitsilliin+klavulaanhape, 875mg+125mg	J01CR02	MEDOCLAV, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Medochemie Limited	50						
					75	H65-H67, J13-J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliiniga
1009572	amorolfiin, 50mg 1ml	D01AE16	LOCERYL, ravimküünelakk, 2.5ml 1TK	Galderma International	50						
1736580	amorolfiin, 50mg 1ml	D01AE16	EXOLORFIN, ravimküünelakk, 2.5ml 1TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
1860555	amorolfiin, 50mg 1ml	D01AE16	LOCERYL, ravimküünelakk, 2.5ml 1TK	Ideal Trade Links UAB	50						
3117248	amorolfiin, 50mg 1ml	D01AE16	LOCERYL, ravimküünelakk, 5ml 1TK	Lex Ano UAB	50						
1765649	anagreliid, 0,5mg	L01XX35	ANAGRELIDE VIATRIS, kõvakapsel, 100TK	Viatris Limited	100	D47.3-D47.3	Hematoloog				patsientidele, kellel ravi alustamine on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: esmavaliku ravi (hüdroksüuurea annuses vähemalt 2 g päevas vähemalt 3 kuu jooksul või alfa-interferoon) on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks ning esineb trombotsütoos 1000x109/l või on ilmnenud trombohemorraagilised juhud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1033546	anastrosool, 1mg	L02BG03	ARIMIDEX, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Laboratoires Juvise Pharmaceuticals	50						
					100	C50-C50	Onkoloog, Üldkirurg, Günekoloog				günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks
1240490	anastrosool, 1mg	L02BG03	ANASTROZOLE SANOSWISS 1 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Sanoswiss UAB	100	C50-C50	Onkoloog, Günekoloog, Üldkirurg				günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks
					50						
1244438	anastrosool, 1mg	L02BG03	ANASTROZOLE-TEVA 1MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Teva Pharma B.V.	100	C50-C50	Günekoloog, Üldkirurg, Onkoloog				günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks
					50						
1293870	anastrosool, 1mg	L02BG03	ANASTROZOLE ACCORD 1MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					100	C50-C50	Onkoloog, Üldkirurg, Günekoloog				günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks
1825365	anastrosool, 1mg	L02BG03	ANASTROZOLE ELVIM, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	SIA Elvim	50						
					100	C50-C50	Onkoloog, Günekoloog, Üldkirurg				günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks
3043235	apalutamiid, 240mg	L02BB05	ERLEADA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Janssen - Cilag International	100	C61-C61	Uroloog, Onkoloog				metastaatilise hormoonsensitiivse eesnäärmevähi raviks, kõrge riskiga haiguse korral võib apalutamiidi määrata patsientidele, kellel abirateroon on vastunäidustatud või abirateroon kasutamisel esinevad talumatud kõrvaltoimeid. Patsient ei tohi olla varasemalt saanud ravi teise põlvkonna androgeeniretseptori inhibiitoriga, v.a. juhul, kui ravi on katkestatud kõrvaltoimete tõttu. Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi apalutamiidiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 01.01.2023

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1787441	apalutamiid, 60mg	L02BB05	ERLEADA, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Janssen - Cilag International	100	C61-C61	Uroloog, Onkoloog				metastaatilise hormoonsensitiivse eesnäärmevähi raviks, kõrge riskiga haiguse korral võib apalutamiidi määrata patsientidele, kellel abirateroon on vastunäidustatud või abiraterooni kasutamisel esinevad talumatud kõrvaltoimeid. Patsient ei tohi olla varasemalt saanud ravi teise põlvkonna androgeeniretseptori inhibiitoriga, v.a. juhul, kui ravi on katkestatud kõrvaltoimete tõttu. Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi apalutamiidiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 01.01.2023
1531448	apiksabaan, 2,5mg	B01AF02	ELIQUIS, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG	75	I48-I48					
					100	I67.6-I67.6, I80-I82, I26-I26					kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
					50						
					75	M16-M17, S72.0-S72.2, S72.7-S72.7					kuni 30 päevaks
1603741	apiksabaan, 5mg	B01AF02	ELIQUIS, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG	50						
					75	I48-I48					
					100	I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6					kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
1504808	apomorfiin, 10mg 1ml	N04BC07	APO-GO, süstelahus pen-süstlis, 3ml 5TK	Stada Arzneimittel AG	100	G20-G20	Neuroloog				konsiiliumi (vähemalt 3 neuroloogi) otsuse alusel patsientidele, kellel esineb vaatamata optimaalsele suukaudsele ravile raskekujuline motoorikahäire kestvate või sagedaste motoorsete fluktuatsioonidega (MDS-UPDRS III skoor off-perioodis on >40 punkti, off-perioodi kestus >25% ärkvelolekuajast) ning ravivastus apomorfiinile on hea (MDS-UPDRS III skoor paraneb >40%)
1649796	aripiprasool, 10mg	N05AX12	ZYKALOR, tablett, 30TK	Medochemie Limited	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					100	F32.3-F32.3, F33.3-F33.3	Psühhiaater	esmane			

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1649819	aripiprasool, 10mg	N05AX12	ZYKALOR, tablett, 60TK	Medochemie Limited	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					100	F32.3-F32.3, F33.3-F33.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1203578	aripiprasool, 15mg	N05AX12	ABILIFY, tablett, 28TK	Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.	100	F32.3-F32.3, F33.3-F33.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
1649853	aripiprasool, 15mg	N05AX12	ZYKALOR, tablett, 30TK	Medochemie Limited	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					50						
					100	F32.3-F32.3, F33.3-F33.3	Psühhiaater	esmane			
1650271	aripiprasool, 15mg	N05AX12	ARISPPA, tablett, 60TK	KRKA, d.d., Novo mesto	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					50						
					100	F32.3-F32.3, F33.3-F33.3	Psühhiaater	esmane			
1703630	aripiprasool, 15mg	N05AX12	ARIPIPRAZOLE ACCORD, tablett, 28TK	Accord Healthcare S.L.U.	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					100	F32.3-F32.3, F33.3-F33.3	Psühhiaater	esmane			
1650349	aripiprasool, 30mg	N05AX12	ARISPPA, tablett, 30TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					100	F32.3-F32.3, F33.3-F33.3	Psühhiaater	esmane			

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1004500	asatiopriin, 50mg	L04AX01	IMURAN, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Aspen Pharma Trading Limited	75	L40-L40	Dermatovenerloog, Pediaater				

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	Z94-Z94, T86-T86					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					75	L10-L10, L13.0-L13.0, L12-L12	Allergoloog-immunoloog, Pediaater, Dermatovenerol oog, Pediaater allergoloogi lisapädevusega				

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					75	H30.2-H30.2, H20.0-H20.0, H30.0-H30.0, H30.8-H30.8, H20.1-H20.1, H30.9-H30.9, H30.1-H30.1	Oftalmoloog				
					100	G70-G70	Pediaater, Pediaater neuroloogi lisapädevusega, Neuroloog	esmane			
					75	L93-L93	Dermatovenerol oog				
					50						
					75	L20-L20	Dermatovenerol oog				
					75	N00-N08	Pediaater nefroloogi lisapädevusega, Nefroloog, Pediaater	esmane			
					75	K50-K51, K73-K74	Pediaater, Gastroenteroloo g, Pediaater gastroenteroloog i lisapädevusega				
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46	Pediaater, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog	esmane			

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1667325	asatiopriin, 50mg	L04AX01	ATSIMUTIN, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Bausch Health Ireland Limited	50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					75	H30.2-H30.2, H20.0-H20.0, H30.0-H30.0, H30.8-H30.8, H20.1-H20.1, H30.9-H30.9, H30.1-H30.1	Oftalmoloog				

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					75	N00-N08	Nefroloog, Pediaater nefroloogi lisapädevusega, Pediaater	esmane			
					75	L20-L20	Dermatovenerol oog				
					75	L10-L10, L12-L12, L13.0-L13.0	Pediaater, Dermatovenerol oog, Pediaater allergoloogi lisapädevusega, Allergoloog-immunoloog				
					75	L40-L40	Pediaater, Dermatovenerol oog				
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46	Pediaater, Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega	esmane			
					75	K50-K51, K73-K74	Gastroenteroloo g, Pediaater gastroenteroloog i lisapädevusega, Pediaater				
					75	L93-L93	Dermatovenerol oog				
					100	Z94-Z94, T86-T86					
					100	G70-G70	Pediaater neuroloogi lisapädevusega, Neuroloog, Pediaater	esmane			

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1865099	asatiopriin, 50mg	L04AX01	IMURAN, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Ideal Trade Links UAB	75	L20-L20	Dermatovenerology				

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	Z94-Z94, T86-T86					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	G70-G70	Neuroloog, Pediaater, Pediaater neuroloogi lisapädevusega	esmane			

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					75	L10-L10, L13.0-L13.0, L12-L12	Pediaater allergoloogi lisapädevusega, Allergoloog-immunoloog, Pediaater, Dermatovenerol oog				
					75	H30.2-H30.2, H20.0-H20.0, H30.0-H30.0, H30.8-H30.8, H20.1-H20.1, H30.9-H30.9, H30.1-H30.1	Oftalmoloog				
					75	K50-K51, K73-K74	Gastroenteroloo g, Pediaater gastroenteroloog i lisapädevusega, Pediaater				
					75	L40-L40	Dermatovenerol oog, Pediaater				
					75	M05-M08, M30-M35, M45-M46	Reumatoloog, Pediaater, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega	esmane			
					75	L93-L93	Dermatovenerol oog				
					75	N00-N08	Pediaater, Nefroloog, Pediaater nefroloogi lisapädevusega	esmane			

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3081024	asatiopriin, 50mg	L04AX01	IMURAN, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Lex Ano UAB	75	M30-M35, M05-M08, M45-M46	Reumatoloog, Pediaater, Pediaater allergoloogi lisapädevusega	esmane			

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	G70-G70	Neuroloog, Pediaater, Pediaater neuroloogi lisapädevusega	esmane			

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					75	K50-K51, K73-K74	Pediaater gastroenteroloogi lisapädevusega, Pediaater, Gastroenteroloog				
					50						
					75	N00-N08	Pediaater, Pediaater nefroloogi lisapädevusega, Nefroloog	esmane			
					75	L40-L40	Pediaater, Dermatovenerloog				
					75	H30.2-H30.2, H20.0-H20.0, H30.0-H30.0, H30.8-H30.8, H20.1-H20.1, H30.9-H30.9, H30.1-H30.1	Oftalmoloog				
					100	Z94-Z94, T86-T86					
					75	L13.0-L13.0, L10-L10, L12-L12	Pediaater, Pediaater allergoloogi lisapädevusega, Dermatovenerloog, Allergoloog-immunoloog				
					75	L20-L20	Dermatovenerloog				
					75	L93-L93	Dermatovenerloog				

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1005736	aselaiinhape, 200mg 1g	D10AX03	SKINOREN, kreem, 30g 1TK	LEO Pharma A/S	50						
1831979	aselaiinhape, 200mg 1g	D10AX03	SKINOREN, kreem, 30g 1TK	Lex Ano UAB	50						
1019775	asitromütsiin, 250mg	J01FA10	SUMAMED, kõvakapsel, 6TK	Teva Pharma B.V.	100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater	esmane			
					50						
1614439	asitromütsiin, 250mg	J01FA10	AZITHROMYCIN KRKA, õhukese polümeerikattega tablett, 6TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater	esmane			
					50						
1267309	asitromütsiin, 40mg 1ml	J01FA10	SUMAMED FORTE, suukaudse suspensiooni pulber, 30ml 1TK	Teva Pharma B.V.	100	E84-E84	Pediaater, Pulmonoloog	esmane			
					50						
1019797	asitromütsiin, 500mg	J01FA10	SUMAMED, õhukese polümeerikattega tablett, 3TK	Teva Pharma B.V.	50						
					100	E84-E84	Pediaater, Pulmonoloog	esmane			
1113398	asitromütsiin, 500mg	J01FA10	AZITROX 500 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 3TK	Zentiva k.s.	100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater	esmane			
					50						
1184992	asitromütsiin, 500mg	J01FA10	AZITHROMYCIN SANDOZ 500MG, õhukese polümeerikattega tablett, 3TK	Sandoz GmbH	50						
					100	E84-E84	Pediaater, Pulmonoloog	esmane			
1614451	asitromütsiin, 500mg	J01FA10	AZITHROMYCIN KRKA, õhukese polümeerikattega tablett, 3TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	50						
					100	E84-E84	Pediaater, Pulmonoloog	esmane			
1045796	aspart-insuliin, 100ühik 1ml	A10AB05	NOVORAPID PENFILL, süstelahus kolbampullis, 3ml 5TK	Novo Nordisk A/S	50						
					100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1092541	aspart-insuliin, 100ühik 1ml	A10AB05	NOVORAPID FLEXPEN, süstelahus pen-süstlis, 3ml 5TK	Novo Nordisk A/S	50						
					100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1					
1736917	aspart-insuliin, 100ühik 1ml	A10AB05	FIASP, süstelahus pen-süstlis, 3ml 5TK	Novo Nordisk A/S	50						
					100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1					
1736940	aspart-insuliin, 100ühik 1ml	A10AB05	FIASP, süstelahus kolbampullis, 3ml 5TK	Novo Nordisk A/S	50						
					100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1					
1888735	astsiminiib, 20mg	L01EA06	SCEMBLIX, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Novartis Europharm Limited	100	C92.1-C92.1	Hematoloog				konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi ja kelle eelnev ravi kahe või enama türosiinikinaasi inhibiitoriga on ebaõnnestunud
1888757	astsiminiib, 40mg	L01EA06	SCEMBLIX, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Novartis Europharm Limited	100	C92.1-C92.1	Hematoloog				konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi ja kelle eelnev ravi kahe või enama türosiinikinaasi inhibiitoriga on ebaõnnestunud
1007851	atenolool, 100mg	C07AB03	ATENOLOL-RATIOPHARM 100MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Ratiopharm GmbH	50						
					75	I10-I13, I15-I15, I20-I20, I47-I49					
1007895	atenolool, 25mg	C07AB03	ATENOLOL-RATIOPHARM 25MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Ratiopharm GmbH	75	I10-I13, I15-I15, I20-I20, I47-I49					
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1007873	atenolool, 50mg	C07AB03	ATENOLOL-RATIOPHARM 50MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Ratiopharm GmbH	50						
					75	I10-I13, I15-I15, I20-I20, I47-I49					
3041738	atogepant, 10mg	N02CD07	AQUIPTA, tablett, 28TK	AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG	75	G43-G43	Neuroloog	esmane			kroonilise migreeni profülaktiliseks raviks täiskasvanutel, kellel esinevad peavalud >=15 päeval kuus, millest vähemalt 8 päeval on tegemist migreeni kriteeriume täitvate hoogudega ja kellel on vähemalt 3 eelnevat Eesti või rahvusvahelistes ravijuhistes mainitud profülaktilist ravi dokumenteeritult ebaõnnestunud. Ravivastust hinnatakse 6 ravikuu möödumisel ning soodustusega väljakirjutamise õigus jätkub patsientidele, kellel raviarsti hinnangul on dokumenteeritult >=50% vähenemine peavalupäevade arvus kuus. Edaspidi tuleb ravi jätkamise vajadust hinnata regulaarselt 6-12 kuu järel, ravi jätkamise eelduseks on püsiv ravivastus. Ravi lõpetatakse, kui peavalupäevade arv on alla 4 päeva kuus vähemalt 6 järjestikuse kuu vältel. Botulismitoksiini või eptinezumabi samaaegne rakendamine patsiendi ravis ei ole lubatud.
3041750	atogepant, 60mg	N02CD07	AQUIPTA, tablett, 28TK	AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG	75	G43-G43	Neuroloog	esmane			kroonilise migreeni profülaktiliseks raviks täiskasvanutel, kellel esinevad peavalud >=15 päeval kuus, millest vähemalt 8 päeval on tegemist migreeni kriteeriume täitvate hoogudega ja kellel on vähemalt 3 eelnevat Eesti või rahvusvahelistes ravijuhistes mainitud profülaktilist ravi dokumenteeritult ebaõnnestunud. Ravivastust hinnatakse 6 ravikuu möödumisel ning soodustusega väljakirjutamise õigus jätkub patsientidele, kellel raviarsti hinnangul on dokumenteeritult >=50% vähenemine peavalupäevade arvus kuus. Edaspidi tuleb ravi jätkamise vajadust hinnata regulaarselt 6-12 kuu järel, ravi jätkamise eelduseks on püsiv ravivastus. Ravi lõpetatakse, kui peavalupäevade arv on alla 4 päeva kuus vähemalt 6 järjestikuse kuu vältel. Botulismitoksiini või eptinezumabi samaaegne rakendamine patsiendi ravis ei ole lubatud.

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1610536	atomoksetiin, 10mg	N06BA09	ATOMINEX 10MG, kõvakapsel, 56TK	Zentiva k.s.	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater – laste- ja noorukitepsühhiaater, Psühhiaater	esmane	20,00		esineb mõõdukas kuni raske funktsionaalne kahjustus vähemalt kahes olukorras (sotsiaalne, akadeemiline ja/või tööalane tegevus), haigus mõjutab konkreetse inimese elu mitmeid aspekte ning viide haiguse esinemisele on tõendatult tuvastatav lapseeast
					75	F90.0-F90.1	Psühhiaater – laste- ja noorukitepsühhiaater	esmane	6,00	20,00	ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (2 Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti 2 erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, CGAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega;
1610615	atomoksetiin, 18mg	N06BA09	ATOMINEX 18MG, kõvakapsel, 56TK	Zentiva k.s.	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater, Psühhiaater – laste- ja noorukitepsühhiaater	esmane	20,00		esineb mõõdukas kuni raske funktsionaalne kahjustus vähemalt kahes olukorras (sotsiaalne, akadeemiline ja/või tööalane tegevus), haigus mõjutab konkreetse inimese elu mitmeid aspekte ning viide haiguse esinemisele on tõendatult tuvastatav lapseeast
					75	F90.0-F90.1	Psühhiaater – laste- ja noorukitepsühhiaater	esmane	6,00	20,00	ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (2 Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti 2 erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, CGAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega;

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1610693	atomoksetiin, 25mg	N06BA09	ATOMINEX 25 MG, kõvakapsel, 56TK	Zentiva k.s.	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater, Psühhiaater – laste- ja noorukitepsühhiaater	esmane	20,00		esineb mõõdukas kuni raske funktsionaalne kahjustus vähemalt kahes olukorras (sotsiaalne, akadeemiline ja/või tööalane tegevus), haigus mõjutab konkreetse inimese elu mitmeid aspekte ning viide haiguse esinemisele on tõendatult tuvastatav lapseeast
					75	F90.0-F90.1	Psühhiaater – laste- ja noorukitepsühhiaater	esmane	6,00	20,00	ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (2 Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti 2 erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, CGAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega;
1610772	atomoksetiin, 40mg	N06BA09	ATOMINEX 40 MG, kõvakapsel, 56TK	Zentiva k.s.	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater – laste- ja noorukitepsühhiaater	esmane	6,00	20,00	ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (2 Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti 2 erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, CGAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega;
					75	F90.0-F90.1	Psühhiaater – laste- ja noorukitepsühhiaater, Psühhiaater	esmane	20,00		esineb mõõdukas kuni raske funktsionaalne kahjustus vähemalt kahes olukorras (sotsiaalne, akadeemiline ja/või tööalane tegevus), haigus mõjutab konkreetse inimese elu mitmeid aspekte ning viide haiguse esinemisele on tõendatult tuvastatav lapseeast

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1610851	atomoksetiin, 60mg	N06BA09	ATOMINEX 60 MG, kõvakapsel, 56TK	Zentiva k.s.	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater, Psühhiaater – laste- ja noorukitepsühhiaater	esmane	20,00		esineb mõõdukas kuni raske funktsionaalne kahjustus vähemalt kahes olukorras (sotsiaalne, akadeemiline ja/või tööalane tegevus), haigus mõjutab konkreetse inimese elu mitmeid aspekte ning viide haiguse esinemisele on tõendatult tuvastatav lapseeast
					75	F90.0-F90.1	Psühhiaater – laste- ja noorukitepsühhiaater	esmane	6,00	20,00	ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (2 Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti 2 erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, CGAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega;
1138047	atorvastatiin, 10mg	C10AA05	ATORIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	50						
					100	N18-N18					
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
1397741	atorvastatiin, 10mg	C10AA05	TULIP 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	100	N18-N18					
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1410657	atorvastatiin, 10mg	C10AA05	ATORVASTATIN TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	50						
					100	N18-N18					
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
1541911	atorvastatiin, 10mg	C10AA05	ATORVASTATIN TAD, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	TAD Pharma GmbH	50						
					100	N18-N18					
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
1883875	atorvastatiin, 10mg	C10AA05	ATORVASTATIN TEVAPHARM, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva B.V.	50						
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
					100	N18-N18					
1138058	atorvastatiin, 20mg	C10AA05	ATORIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	100	N18-N18					
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1397909	atorvastatiin, 20mg	C10AA05	TULIP 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	100	N18-N18					
					50						
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
1397921	atorvastatiin, 20mg	C10AA05	TULIP 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	100	N18-N18					
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
					50						
1397932	atorvastatiin, 20mg	C10AA05	TULIP 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	100	N18-N18					
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
					50						
1410792	atorvastatiin, 20mg	C10AA05	ATORVASTATIN TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	50						
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
					100	N18-N18					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1542057	atorvastatiin, 20mg	C10AA05	ATORVASTATIN TAD, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	TAD Pharma GmbH	100	N18-N18					
					50						
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
1884315	atorvastatiin, 20mg	C10AA05	ATORVASTATIN TEVAPHARM, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva B.V.	75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
					100	N18-N18					
					50						
1220993	atorvastatiin, 40mg	C10AA05	ATORIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	50						
					100	N18-N18					
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
1410927	atorvastatiin, 40mg	C10AA05	ATORVASTATIN TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
					100	N18-N18					
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1542192	atorvastatiin, 40mg	C10AA05	ATORVASTATIN TAD, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	TAD Pharma GmbH	100	N18-N18					
					50						
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
1585784	atorvastatiin, 40mg	C10AA05	TULIP 40 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	100	N18-N18					
					50						
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
1884663	atorvastatiin, 40mg	C10AA05	ATORVASTATIN TEVAPHARM, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva B.V.	75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
					50						
					100	N18-N18					
1124996	atorvastatiin, 80mg	C10AA05	SORTIS 80 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Viatris SIA	50						
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
					100	N18-N18					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1768316	atorvastatiin+ezetimiib, 10mg+10mg	C10BA05	TORZELIP, tablett, 30TK	Zentiva k.s.	75	I70.2-I70.2, Z45-Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95					
					50						
					75	E13-E14, E10-E11					kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					100	N18-N18					patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
3006560	atorvastatiin+ezetimiib, 10mg+10mg	C10BA05	ATORVASTATIN/EZETIMIBE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva B.V.	75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					50						
					75	I70.2-I70.2, Z45-Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95					
					75	E13-E14					kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					100	N18-N18					patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1768349	atorvastatiin+eseti miib, 20mg+10mg	C10BA05	TORZELIP, tablett, 30TK	Zentiva k.s.	75	I70.2-I70.2, Z45-Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95					
					100	N18-N18					patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	E13-E14, E10-E11					kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					50						
					75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
3003994	atorvastatiin+eseti miib, 20mg+10mg	C10BA05	EZETIMIBE/ATORVASTATIN OLPHA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Olpha AS	75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	E13-E14, E10-E11					kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					50						
					100	N18-N18					patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	I70.2-I70.2, Z45-Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3006122	atorvastatiin+eseti miib, 20mg+10mg	C10BA05	EZETIMIBE/ATORVASTATIN STADA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Stada Arzneimittel AG	50						
					75	I70.2-I70.2, Z45-Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95					
					100	N18-N18					patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	E13-E14, E10-E11					kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
3006638	atorvastatiin+eseti miib, 20mg+10mg	C10BA05	ATORVASTATIN/EZETIMIBE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva B.V.	50						
					75	E13-E14					kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					100	N18-N18					patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	I70.2-I70.2, Z45-Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3029486	atorvastatiin+ezetimiib, 20mg+10mg	C10BA05	TORZELIP, tablett, 30TK	Ideal Trade Links UAB	75	E10-E11, E13-E14					kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	I70.2-I70.2, Z45-Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95					
					100	N18-N18					patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					50						
3050299	atorvastatiin+ezetimiib, 20mg+10mg	C10BA05	ATORITIMB, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	75	E13-E14, E10-E11					kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	I70.2-I70.2, Z45-Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95					
					50						
					75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					100	N18-N18					patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1768372	atorvastatiin+eseti miib, 40mg+10mg	C10BA05	TORZELIP, tablett, 30TK	Zentiva k.s.	100	N18-N18					patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	E13-E14, E10-E11					kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					50						
					75	I70.2-I70.2, Z45-Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95					
					75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
3004030	atorvastatiin+eseti miib, 40mg+10mg	C10BA05	EZETIMIBE/ATORVASTATIN OLPHA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Olpha AS	100	N18-N18					patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	I70.2-I70.2, Z45-Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95					
					75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					50						
					75	E13-E14, E10-E11					kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3006245	atorvastatiin+eseti miib, 40mg+10mg	C10BA05	EZETIMIBE/ATORVASTATIN STADA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Stada Arzneimittel AG	100	N18-N18					patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	E10-E11, E13-E14					kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					50						
					75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	I70.2-I70.2, Z45-Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95					
3006706	atorvastatiin+eseti miib, 40mg+10mg	C10BA05	ATORVASTATIN/EZETIMIBE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva B.V.	50						
					75	I70.2-I70.2, Z45-Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95					
					75	E13-E14					kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					100	N18-N18					patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3029587	atorvastatiin+ezetimiib, 40mg+10mg	C10BA05	TORZELIP, tablett, 30TK	Ideal Trade Links UAB	75	I70.2-I70.2, Z45-Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95					
					50						
					100	N18-N18					patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	E10-E11, E13-E14					kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
3050389	atorvastatiin+ezetimiib, 40mg+10mg	C10BA05	ATORITIMB, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	50						
					100	N18-N18					patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	I70.2-I70.2, Z45-Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95					
					75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	E13-E14, E10-E11					kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1768406	atorvastatiin+ezetimiib, 80mg+10mg	C10BA05	TORZELIP, tablett, 30TK	Zentiva k.s.	75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					100	N18-N18					patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					50						
					75	E10-E11, E13-E14					kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	I70.2-I70.2, Z45-Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95					
3004074	atorvastatiin+ezetimiib, 80mg+10mg	C10BA05	EZETIMIBE/ATORVASTATIN OLPHA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Olpha AS	75	E13-E14, E10-E11					kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	I70.2-I70.2, Z45-Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95					
					75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					100	N18-N18					patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3006368	atorvastatiin+eseti miib, 80mg+10mg	C10BA05	EZETIMIBE/ATORVASTATIN STADA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Stada Arzneimittel AG	50						
					75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	I70.2-I70.2, Z45-Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95					
					100	N18-N18					patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	E10-E11, E13-E14					kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
3006818	atorvastatiin+eseti miib, 80mg+10mg	C10BA05	ATORVASTATIN/EZETIMIBE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva B.V.	75	E13-E14					kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					100	N18-N18					patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	I70.2-I70.2, Z45-Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95					
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3029598	atorvastatiin+ezetimiib, 80mg+10mg	C10BA05	TORZELIP, tablett, 30TK	Ideal Trade Links UAB	100	N18-N18					patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					50						
					75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	E13-E14, E10-E11					kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	I70.2-I70.2, Z45-Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95					
3050446	atorvastatiin+ezetimiib, 80mg+10mg	C10BA05	ATORITIMB, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					50						
					75	I70.2-I70.2, Z45-Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95					
					100	N18-N18					patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	E13-E14, E10-E11					kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3118902	atropiin, 0,1mg 1ml	S01FA01	RYJUNEA, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK	Santen Oy	100	H52.1-H52.1, H44.2-H44.2	Oftalmoloog, Oftalmoloog silmakirurgia lisapädevusega				müoopia progresseerumise aeglustamiseks lastel, kelle silma pikimõõt paikneb kasvugraafikul => 75. protsentiilil ja/või kellel on dokumenteeritud müoopia progresseerumine => 0,5 dioptrit ühe aasta jooksul. Ravi määramine ning ravi tulemuslikkuse jälgimine toimub silmaarsti pädevuses
1039250	atsetüültsüsteiin, 600mg	R05CB01	ACC LONG, kihisev tablett, 10TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50	J84-J84					
					100	E84-E84	Pediaater, Pulmonoloog	esmane			
1515248	atsetüültsüsteiin, 600mg	R05CB01	MUCOVIT, kihisev tablett, 12TK	PharmaEstica Manufacturing OÜ	100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater	esmane			
					50	J84-J84					
1778542	atsikloviir, 30mg 1g	S01AD03	ACICLOVIR AGEPHA, silmasalv, 4.5g 1TK	AGEPHA Pharma s.r.o.	50						
1165384	atsikloviir, 400mg	J05AB01	ACIC 400 MG, tablett, 35TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	100	Z94-Z94, T86-T86					
					100	D60-D64	Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega, Pediaater, Hematoloog				
					50						
1836413	atsikloviir, 400mg	J05AB01	ACIC 400 MG, tablett, 35TK	Lex Ano UAB	100	D60-D64	Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega, Pediaater, Hematoloog				
					50						
					100	Z94-Z94, T86-T86					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1889196	atsikloviir, 400mg	J05AB01	ACIC 400 MG, tablett, 35TK	Ideal Trade Links UAB	100	Z94-Z94, T86-T86					
					50						
					100	D60-D64	Hematoloog, Pediaater, Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega				
1000731	atsitretiin, 10mg	D05BB02	NEOTIGASON, kõvakapsel, 30TK	Teva B.V.	50						
					75	L40-L40, Q82.8-Q82.8, L86-L86, M07-M07, Q80-Q80, L43-L43	Pediaater, Dermatovenerol oog				
1834365	atsitretiin, 10mg	D05BB02	NEOTIGASON, kõvakapsel, 30TK	First Pharma OÜ	75	L40-L40, Q82.8-Q82.8, L86-L86, M07-M07, Q80-Q80, L43-L43	Pediaater, Dermatovenerol oog				
					50						
1828201	avapritiniib, 100mg	L01EX18	AYVAKYT, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Blueprint Medicines (Netherlands) B.V.	100	C96.2-C96.2, C94.3-C94.3	Onkoloog, Hematoloog				monoteraapiana täiskasvanud patsientide raviks, kellel on agressiivne süsteemne mastotsütoos, süsteemne mastotsütoos koos kaasneva hematoloogilise kasvajaga või nuumrakkleukeemia, pärast vähemalt ühte süsteemset ravi. Ravi jätkatakse kuni haiguse progresseerumiseni või vastuvõetamatu toksilisuse tekkimiseni
1828212	avapritiniib, 200mg	L01EX18	AYVAKYT, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Blueprint Medicines (Netherlands) B.V.	100	C96.2-C96.2, C94.3-C94.3	Onkoloog, Hematoloog				monoteraapiana täiskasvanud patsientide raviks, kellel on agressiivne süsteemne mastotsütoos, süsteemne mastotsütoos koos kaasneva hematoloogilise kasvajaga või nuumrakkleukeemia, pärast vähemalt ühte süsteemset ravi. Ravi jätkatakse kuni haiguse progresseerumiseni või vastuvõetamatu toksilisuse tekkimiseni

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1878509	avapritiniib, 25mg	L01EX18	AYVAKYT, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Blueprint Medicines (Netherlands) B.V.	100	C96.2-C96.2, C94.3-C94.3	Hematoloog, Onkoloog				monoteraapiana täiskasvanud patsientide raviks, kellel on agressiivne süsteemne mastotsütoos, süsteemne mastotsütoos koos kaasneva hematoloogilise kasvajaga või nuumrakkleukeemia, pärast vähemalt ühte süsteemset ravi. Ravi jätkatakse kuni haiguse progresseerumiseni või vastuvõetamatu toksilisuse tekkimiseni
1878510	avapritiniib, 50mg	L01EX18	AYVAKYT, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Blueprint Medicines (Netherlands) B.V.	100	C96.2-C96.2, C94.3-C94.3	Hematoloog, Onkoloog				monoteraapiana täiskasvanud patsientide raviks, kellel on agressiivne süsteemne mastotsütoos, süsteemne mastotsütoos koos kaasneva hematoloogilise kasvajaga või nuumrakkleukeemia, pärast vähemalt ühte süsteemset ravi. Ravi jätkatakse kuni haiguse progresseerumiseni või vastuvõetamatu toksilisuse tekkimiseni
1798678	avatrombopaag, 20mg	B02BX08	DOPTELET, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)	100	D69.4-D69.4					patsientidele, kelle ravi alustamine on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele - muu suukaudne ravi (kortikosteroidi, immuunsupressandiga) on osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud, splenektoomia on osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud (sh splenektoomia ettevalmistamiseks, kui intravenoosne immuunglobuliin ei ole piisavalt tõhus) ning esineb trombotsütopeenia <20 000/µl
1798689	avatrombopaag, 20mg	B02BX08	DOPTELET, õhukese polümeerikattega tablett, 15TK	Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)	100	D69.4-D69.4					patsientidele, kelle ravi alustamine on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele - muu suukaudne ravi (kortikosteroidi, immuunsupressandiga) on osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud, splenektoomia on osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud (sh splenektoomia ettevalmistamiseks, kui intravenoosne immuunglobuliin ei ole piisavalt tõhus) ning esineb trombotsütopeenia <20 000/µl

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1888533	avatrombopaag, 20mg	B02BX08	DOPTELET, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)	100	D69.4-D69.4					patsientidele, kelle ravi alustamine on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele - muu suukaudne ravi (kortikosteroidi, immuunsupressandiga) on osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud, splenektoomia on osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud (sh splenektoomia ettevalmistamiseks, kui intravenoosne immuunglobuliin ei ole piisavalt tõhus) ning esineb trombotsütopeenia <20 000/µl
1739190	baritsitiniib, 2mg	L04AF02	OLUMIANT, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Eli Lilly Nederland B.V.	100	L20.8-L20.8, L20.9-L20.9	Allergoloog-immunoloog, Pediaater allergoloogi lisapädevusega, Pediaater, Dermatovenerol oog				mõõduka või raske haigusega (EASI>=16, DLQI>=10) patsiendile, kes ei allu süsteemsele konventsionaalsele ravile tsüklosporiiniga 8–12 nädala jooksul või kellele see on vastunäidustatud või põhjustanud talumatuid kõrvaltoimeid
					100	M05-M06	Pediaater, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt kahe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1739257	baritsitiniib, 4mg	L04AF02	OLUMIANT, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Eli Lilly Nederland B.V.	100	M05-M06	Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt kahe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud
					100	L20.8-L20.8, L20.9-L20.9	Dermatovenerol oog, Pediaater, Allergoloog-immunoloog, Pediaater allergoloogi lisapädevusega				mõõduka või raske haigusega (EASI>=16, DLQI>=10) patsiendile, kes ei allu süsteemsele konventsionaalsele ravile tsüklosporiiniga 8–12 nädala jooksul või kellele see on vastunäidustatud või põhjustanud talumatuid kõrvaltoimeid
1019483	batsitratsiin+neomütsiin, 250RÜ+5000RÜ 1g	D06AX80	BANEOCIN, salv, 20g 1TK	Sandoz GmbH	50						
1591286	beeta-1a-interferoon, 30mcg 0.5ml	L03AB07	AVONEX, süstelahus pen-süstlis, 0.5ml 4TK	Biogen Netherlands B.V.	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel hulgiskleroosi raviks
1117640	beeta-1a-interferoon, 44mcg 0.5ml	L03AB07	REBIF, süstelahus süstlis, 0.5ml 12TK	Merck Europe B.V.	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel hulgiskleroosi raviks
1430671	beeta-1a-interferoon, 44mcg 0.5ml	L03AB07	REBIF, süstelahus kolbampullis, 1.5ml 4TK	Merck Europe B.V.	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel hulgiskleroosi raviks
1657953	beeta-1a-peginterferoon, 125mcg 0.5ml	L03AB13	PLEGRIDY, süstelahus, 0.5ml 2TK	Biogen Netherlands B.V.	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel (ägenemiste ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks
1657975	beeta-1a-peginterferoon, 63mcg/94mcg 0.5ml	L03AB13	PLEGRIDY, süstelahus, 1TK / 1TK	Biogen Netherlands B.V.	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel (ägenemiste ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks
1071245	beeta-1b-interferoon, 250mcg 1ml	L03AB08	BETAFERON, süstelahuse pulber ja lahusti, 1.2ml 15TK	Bayer AG	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel hulgiskleroosi raviks

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1236912	beetahistiin, 16mg	N07CA01	BETAHISTINE ACTAVIS, tablett, 60TK	Teva B.V.	50	H81-H81					
1480878	beetahistiin, 16mg	N07CA01	VERTIMED 16MG, tablett, 60TK	Medochemie Limited	50	H81-H81					
1115738	beetahistiin, 24mg	N07CA01	BETASERC, tablett, 50TK	Viatris SIA	50	H81-H81					
1480957	beetahistiin, 24mg	N07CA01	VERTIMED 24MG, tablett, 50TK	Medochemie Limited	50	H81-H81					
1515833	beetahistiin, 24mg	N07CA01	BETAHISTINE ACTAVIS, tablett, 50TK	Teva B.V.	50	H81-H81					
1620245	beetahistiin, 24mg	N07CA01	BETASERC, suus dispergeeruv tablett, 60TK	VIATRIS HEALTHCARE Limited	50	H81-H81					
1741834	beetahistiin, 24mg	N07CA01	BETAHISTINE ACCORD, tablett, 50TK	Accord Healthcare B.V.	50	H81-H81					
1827064	beetahistiin, 24mg	N07CA01	BETASERC, tablett, 60TK	Lex Ano UAB	50	H81-H81					
1861781	beetahistiin, 24mg	N07CA01	BETASERC, tablett, 60TK	Ideal Trade Links UAB	50	H81-H81					
1004870	beetametasoon, 1mg 1g	D07AC01	BETNOVATE CREAM, kreem, 15g 1TK	GlaxoSmithKline Trading Services Limited	50						
1862861	beetametasoon, 1mg 1g	D07AC01	BETNOVATE, kreem, 30g 1TK	Lex Ano UAB	50						
3076679	beetametasoon, 1mg 1g	D07AC01	BETNOVATE CREAM, kreem, 30g 1TK	Ideal Trade Links UAB	50						
1007514	beetametasoon+fusidiinhape, 1mg+20mg 1g	D07CC80	FUCICORT, kreem, 15g 1TK	LEO Pharma A/S	50						
3030905	beetametasoon+fusidiinhape, 1mg+20mg 1g	D07CC80	FUCICORT, kreem, 20g 1TK	Ideal Trade Links UAB	50						
1006041	beetametasoon+salitsüülhape, 0,5mg+20mg 1g	D07BC80	DIPROSALIC, nahalahus, 30ml 1TK	Organon N.V.	50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1865123	beetametasoon+salitsüülhape, 0,5mg+20mg 1g	D07BC80	DIPROSALIC, nahalahus, 30ml 1TK	Lex Ano UAB	50						
1880816	beetametasoon+salitsüülhape, 0,5mg+20mg 1g	D07BC80	DIPROSALIC, nahalahus, 30ml 2TK	Ideal Trade Links UAB	50						
1810549	benralizumab, 30mg 1ml	R03DX10	FASENRA, süstelahus pen-süstlis, 1ml 1TK	Astrazeneca AB	100	M30.1-M30.1	Pulmonoloog, Reumatoloog				vähemalt kolmeliikmelise ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kellel on retsidiveeruv või refraktaarne eosinofiilne granulomatoos polüangiidiga ning kes saavad glükokortikosteroide >=7,5 mg/päevas, koos või ilma immunosupressiivse raviga. Ravi tuleb katkestada, kui vähemalt 26 nädala jooksul ei ole võimalik olnud vähendada glükokortikosteroidi annust >=50% või alla 7,5mg/ päevas või esineb korduv vajadus glükokortikosteroidide kasutamise annust tõsta
					100	J45-J45	Pulmonoloog				vähemalt kolmest pulmonoloogist või allergoloog-immunoloogist koosneva eksperdikomisjoni otsusel 2. tüüpi põletikust juhitud astmaga patsiendile, kelle astma on vaatamata eelnevale pikaajalisele kolmikravile (inhaleeritav glükokortikosteroid ja pikatoimeline beeta-2-agonist koos antileukotrieeni või pikatoimelise teofülliinpreparaadi või pikatoimelise antikoliinergilise ainega) puudulikult kontrollitud. Kui 3 kuu möödumisel ravi alustamisest ei ole ekspertkomisjoni hinnangul astma ravi tulemused kliiniliselt oluliselt paranenud, lõpetatakse ravi selle preparaadiga
1847437	berotralstaat, 150mg	B06AC06	ORLADEYO, kõvakapsel, 28TK	BioCryst Ireland Limited	100	D84.1-D84.1	Allergoloog-immunoloog				eksperdikomisjoni (kuhu kuulub vähemalt 3 HAE-ravi kogemusega spetsialisti, kellest 2 on allergoloog-immunoloogid) otsuse alusel päriliku angioödeemi korduvate hoogude rutiinseks ennetamiseks täiskasvanutel ja vähemalt 12-aastastel noorukitel, kellel on >=2 kliiniliselt olulist akuutset ravi vajavat haigushoogu kuus. Ravivastust hinnatakse 3 kuud peale ravi alustamist, seejärel iga kuue kuu tagant ning ravi lõpetatakse, kui ravi on ebaefektiivne (akuutsete atakkide arv ei vähene või suureneb võrreldes patsiendi ravieelsete atakkide arvuga).

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1286197	betaiin, 1g 1g	A16AA06	CYSTADANE, suukaudne pulber, 180g 1TK	Recordati Rare Diseases	100	E72.1-E72.1	Pediaater, Endokrinoloog, Pediaater endokrinoloogi lisapädevusega, Sisearst, Kardioloog, Pediaater neuroloogi lisapädevusega, Neuroloog, Pediaater kardioloogi lisapädevusega	esmane			lisaraviks tsüstationiini beetasüntaasi, 5,10-metüleentetrahüdrofolaadi reduktaasi, kobalamiini kofaktori metabolismi puudulikkuse korral patsientidele, kelle ravi vitamiin B6, foolhappe, vitamiin B12 ja eridieediga pole piisav
1034042	betaksolool, 2,5mg 1ml	S01ED02	BETOPTIC S, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK	Immedica Pharma AB	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
1012194	bikalutamiid, 150mg	L02BB03	CASODEX, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Laboratoires Juvise Pharmaceuticals	50						
					100	C61-C61	Onkoloog, Uroloog				juhul, kui haigus on pärast kirurgilist või medikamentoosset kastratsiooni progresseerunud, metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravi alustamisel LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest või medikamentoossest kastratsioonist)
1258017	bikalutamiid, 150mg	L02BB03	BICALUTAMIDE-TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Teva Pharma B.V.	100	C61-C61	Uroloog, Onkoloog				juhul, kui haigus on pärast kirurgilist või medikamentoosset kastratsiooni progresseerunud, metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravi alustamisel LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest või medikamentoossest kastratsioonist)
					50						
1266173	bikalutamiid, 150mg	L02BB03	BICALUTAMID ACTAVIS 150MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Actavis Group Ptc ehf.	100	C61-C61	Onkoloog, Uroloog				juhul, kui haigus on pärast kirurgilist või medikamentoosset kastratsiooni progresseerunud, metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravi alustamisel LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest või medikamentoossest kastratsioonist)
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1776900	bikalutamiid, 150mg	L02BB03	BICALUTAMIDE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					100	C61-C61	Onkoloog, Uroloog				juhul, kui haigus on pärast kirurgilist või medikamentoosset kastratsiooni progresseerunud, metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravi alustamisel LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest või medikamentoossest kastratsioonist)
3076691	bikalutamiid, 150mg	L02BB03	BICALUTAMIDE - TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Ideal Trade Links UAB	100	C61-C61	Onkoloog, Uroloog				juhul, kui haigus on pärast kirurgilist või medikamentoosset kastratsiooni progresseerunud, metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravi alustamisel LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest või medikamentoossest kastratsioonist)
					50						
3097571	bikalutamiid, 150mg	L02BB03	BICALUTAMIDE-TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	First Pharma OÜ	100	C61-C61	Onkoloog, Uroloog				juhul, kui haigus on pärast kirurgilist või medikamentoosset kastratsiooni progresseerunud, metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravi alustamisel LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest või medikamentoossest kastratsioonist)
					50						
1026560	bikalutamiid, 50mg	L02BB03	CASODEX, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Laboratoires Juvise Pharmaceuticals	100	C61-C61	Onkoloog, Uroloog				juhul, kui haigus on pärast kirurgilist või medikamentoosset kastratsiooni progresseerunud, metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravi alustamisel LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest või medikamentoossest kastratsioonist)
					50						
1257803	bikalutamiid, 50mg	L02BB03	BICALUTAMIDE-TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Teva Pharma B.V.	100	C61-C61	Uroloog, Onkoloog				juhul, kui haigus on pärast kirurgilist või medikamentoosset kastratsiooni progresseerunud, metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravi alustamisel LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest või medikamentoossest kastratsioonist)
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1265891	bikalutamiid, 50mg	L02BB03	BICALUTAMID ACTAVIS 50MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Actavis Group Ptc ehf.	50						
					100	C61-C61	Uroloog, Onkoloog				juhul, kui haigus on pärast kirurgilist või medikamentoosset kastratsiooni progresseerunud, metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravi alustamisel LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest või medikamentoossest kastratsioonist)
1293791	bikalutamiid, 50mg	L02BB03	BICALUTAMIDE ACCORD 50MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					100	C61-C61	Uroloog, Onkoloog				juhul, kui haigus on pärast kirurgilist või medikamentoosset kastratsiooni progresseerunud, metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravi alustamisel LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest või medikamentoossest kastratsioonist)
1860904	bimekizumab, 160mg 1ml	L04AC21	BIMZELX, süstelahus pen-süstlis, 1ml 2TK	UCB Pharma	100	L40-L40	Pediaater, Dermatovenerol oog				patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus L40 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori ja ustekinumabi kasutamine vastunäidustatud
1780286	binimetiniib, 15mg	L01EE03	MEKTOVI, õhukese polümeerikattega tablett, 84TK	Pierre Fabre Medicament	100	C43-C43	Onkoloog				konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) otsuse alusel BRAF V600 mutatsiooniga kaugelearenenud mitteresetseeritava või metastaatilise (IIIc-IVst) melanoomi raviks juhul, kui patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1 ja 3- kuulise intervalliga hinnatuna püsib haigus vähemalt stabiilsena (KT- või/ja muu asjakohase uuringu alusel hinnatuna haiguse progressiooni ei esine) ning kes ei ole saanud varasemalt ravi BRAF/MEK inhibiitoriga, välja arvatud patsiendid, kellel on esinenud ravi katkestamiseni viivad kõrvaltoimed ning samal ajal puudub haiguse radioloogiline progressioon
1258983	bisoprolool, 10mg	C07AB07	BISOPROLOL VITABALANS, tablett, 30TK	Vitabalans Oy	50						
					75	I10-I13, I15-I15, I20-I20, I47-I49					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1596427	bisoprolool, 10mg	C07AB07	SOBYCOR, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15, I20-I20, I47-I49					
					50						
1683952	bisoprolool, 10mg	C07AB07	BISOPROLOL ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare B.V.	75	I10-I13, I15-I15, I20-I20, I47-I49					
					50						
1804115	bisoprolool, 10mg	C07AB07	BISOPROLOL ZENTIVA, tablett, 30TK	Zentiva k.s.	75	I10-I13, I15-I15, I20-I20, I47-I49					
					50						
1865606	bisoprolool, 10mg	C07AB07	BISOPROLOL VITABALANS, tablett, 90TK	Vitabalans Oy	50						
					75	I10-I13, I15-I15, I20-I20, I47-I49					
1258905	bisoprolool, 5mg	C07AB07	BISOPROLOL VITABALANS, tablett, 30TK	Vitabalans Oy	50						
					75	I10-I13, I15-I15, I20-I20, I47-I49					
1258949	bisoprolool, 5mg	C07AB07	BISOPROLOL VITABALANS, tablett, 100TK	Vitabalans Oy	50						
					75	I10-I13, I15-I15, I20-I20, I47-I49					
1596326	bisoprolool, 5mg	C07AB07	SOBYCOR, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	50						
					75	I10-I13, I15-I15, I20-I20, I47-I49					
1804058	bisoprolool, 5mg	C07AB07	BISOPROLOL ZENTIVA, tablett, 30TK	Zentiva k.s.	75	I10-I13, I15-I15, I20-I20, I47-I49					
					50						
1865594	bisoprolool, 5mg	C07AB07	BISOPROLOL VITABALANS, tablett, 90TK	Vitabalans Oy	50						
					75	I10-I13, I15-I15, I20-I20, I47-I49					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1586718	bosentaan, 125mg	C02KX01	BOSENTAN NORAMEDA 125 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Norameda UAB	100	I27.0-I27.0	Pediaater, Pulmonoloog, Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater kardioloogi lisapädevusega, Kardioloog				NYHA III-IV kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafiil on vastunäidustatud, ostunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid
					50						
1628759	bosentaan, 125mg	C02KX01	BOSENTAN ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					100	I27.0-I27.0	Pediaater kardioloogi lisapädevusega, Kardioloog, Reumatoloog, Pediaater, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pulmonoloog				NYHA III-IV kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafiil on vastunäidustatud, ostunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid
1586684	bosentaan, 62,5mg	C02KX01	BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Norameda UAB	100	I27.0-I27.0	Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pulmonoloog, Pediaater, Pediaater kardioloogi lisapädevusega, Kardioloog				NYHA III-IV kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafiil on vastunäidustatud, ostunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1628737	bosentaan, 62,5mg	C02KX01	BOSENTAN ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					100	I27.0-I27.0	Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog, Kardioloog, Pulmonoloog, Pediaater, Pediaater kardioloogi lisapädevusega				NYHA III-IV kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafiil on vastunäidustatud, ostunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid
1612055	bosutiniib, 100mg	L01EA04	BOSULIF, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	C92.1-C92.1	Hematoloog				konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi, eelnev ravi imatiniibiga annuses 600mg on ebaõnnestunud või osutunud talumatuks (imatiniibravi on põhjustanud III või IV astme kõrvaltoime või üle 3 kuu püsinud II astme kõrvaltoime CTC klassifikatsiooni järgi) ning ravi alustatakse kuni 3. rea ravina; ravi võib jätkata kuni hematoloogilise ravivastuse püsimiseni (haigus ei progresseeru bosutiniibravi foonil). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi bosutiniibiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1.07.2016. a.
1612077	bosutiniib, 500mg	L01EA04	BOSULIF, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	C92.1-C92.1	Hematoloog				konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi, eelnev ravi imatiniibiga annuses 600mg on ebaõnnestunud või osutunud talumatuks (imatiniibravi on põhjustanud III või IV astme kõrvaltoime või üle 3 kuu püsinud II astme kõrvaltoime CTC klassifikatsiooni järgi) ning ravi alustatakse kuni 3. rea ravina; ravi võib jätkata kuni hematoloogilise ravivastuse püsimiseni (haigus ei progresseeru bosutiniibravi foonil). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi bosutiniibiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1.07.2016. a.

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1783289	brigatiniib, 180mg	L01ED04	ALUNBRIG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Takeda Pharma A/S	100	C34-C34	Onkoloog				anaplastilise lümfoomkinaas-positiivse kaugelearenenud varem ravimata mitteväikerakk-kopsuvähi raviks heas üldseisundis (ECOG 0-2) täiskasvanud patsientidele. Ravi alektiniibiga kestab kuni haiguse retsidiveerumiseni või vastuvõetamatu toksilisuse tekkimiseni
1806870	brigatiniib, 30mg	L01ED04	ALUNBRIG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Takeda Pharma A/S	100	C34-C34	Onkoloog				anaplastilise lümfoomkinaas-positiivse kaugelearenenud varem ravimata mitteväikerakk-kopsuvähi raviks heas üldseisundis (ECOG 0-2) täiskasvanud patsientidele. Ravi alektiniibiga kestab kuni haiguse retsidiveerumiseni või vastuvõetamatu toksilisuse tekkimiseni
1783256	brigatiniib, 90mg	L01ED04	ALUNBRIG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Takeda Pharma A/S	100	C34-C34	Onkoloog				anaplastilise lümfoomkinaas-positiivse kaugelearenenud varem ravimata mitteväikerakk-kopsuvähi raviks heas üldseisundis (ECOG 0-2) täiskasvanud patsientidele. Ravi alektiniibiga kestab kuni haiguse retsidiveerumiseni või vastuvõetamatu toksilisuse tekkimiseni
1042782	brinsolamiid, 10mg 1ml	S01EC04	AZOPT, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK	Novartis Europharm Limited	100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
					50						
1581230	brinsolamiid, 10mg 1ml	S01EC04	BRINZOLAMIDE ELVIM, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK	SIA Elvim	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
1723047	brinsolamiid, 10mg 1ml	S01EC04	BRINZOLAMIDE SANDOZ, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
					50						
1657694	brinsolamiid+brimonidiin, 10mg+2mg 1ml	S01EC80	SIMBRINZA, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK	Novartis Europharm Limited	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
3139567	bromofenak, 0,9mg 1ml	S01BC11	YELLOX, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK	Bausch + Lomb Ireland Limited	50						
1008098	bromokriptiin, 2,5mg	G02CB01	BROMOCRIPTIN-RICHTER, tablett, 30TK	Gedeon Richter Plc.	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					100	E22-E22, E24-E24	Pediaater endokrinoloogi lisapädevusega, Endokrinoloog, Pediaater	esmane			
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1038316	budesoniid, 0,25mg 1ml	R03BA02	PULMICORT, nebuliseeritav suspensioon, 2ml 20TK	AstraZeneca AB	75	J45-J45					
					50						
1875078	budesoniid, 0,5mg 2ml	R03BA02	BUDESONIDE TEVA, nebuliseeritav suspensioon, 2ml 20TK	Teva B.V.	75	J45-J45					
					50						
1174160	budesoniid, 200mcg 1annus	R03BA02	GIONA EASYHALER, inhalatsioonipulber, 200annus 1TK	Orion Corporation	75	J45-J45					
					50						
1174182	budesoniid, 400mcg 1annus	R03BA02	GIONA EASYHALER, inhalatsioonipulber, 100annus 1TK	Orion Corporation	75	J45-J45					
					50						
1896521	budesoniid, 4mg	A07EA06	KINPEYGO, toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel, 120TK	Stada Arzneimittel AG	100	N03.3-N03.3	Nefroloog				patsientidele, kellel on biopsiaga tõestatud IgA nefropaatia, UPCR väärtus =>1,5 g/g ja eGFR => 35 ml/min/1,73 m2 ning maksimaalses talutavas doosis AKEI või ARB ei ole andnud efektiivsust kolm kuud kestva ravi korral
1643655	budesoniid, 9mg	A07EA06	BUDESONIDE FERRING, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Ferring GmbH	75	K52.8-K52.8	Gastroenteroloog, Pediaater gastroenteroloogi lisapädevusega, Pediaater				remissiooni induktsiooniks aktiivse mikroskoopilise koliidiga patsiendile
					75	K51-K51	Pediaater gastroenteroloogi lisapädevusega, Gastroenteroloog, Pediaater				remissiooni induktsiooniks kerge kuni mõõduka raskusega haavandilise koliidi korral, kui ravivastus 5-aminosalitsüülhappega ei ole piisav või on vastunäidustatud. Ravi kestab maksimaalselt 8 nädalat ning ravi võib korrata mitte vähem kui aasta pärast
1232660	bupropioon, 150mg	N06AX12	ELONTRIL, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 30TK	GlaxoSmithKline Trading Services Limited	50	F33-F33, F32-F32					
1232693	bupropioon, 300mg	N06AX12	ELONTRIL, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 30TK	GlaxoSmithKline Trading Services Limited	50	F33-F33, F32-F32					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1005006	busulfaan, 2mg	L01AB01	MYLERAN, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Aspen Pharma Trading Limited	50						
					100	C00-D48	Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega, Hematoloog, Onkoloog, Pediaater				
1343382	dabigatraaneteksilaat, 110mg	B01AE07	PRADAXA, kõvakapsel, 10TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	100	I80-I82, I26-I26, I67.6-I67.6					kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
					50						
					75	S72.7-S72.7, I26-I26, S72.0-S72.2, I80-I82, I48-I48, I67.6-I67.6, M16-M17					
1343405	dabigatraaneteksilaat, 110mg	B01AE07	PRADAXA, kõvakapsel, 60TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	75	S72.7-S72.7, I26-I26, S72.0-S72.2, I80-I82, I48-I48, I67.6-I67.6, M16-M17					
					50						
					100	I26-I26, I67.6-I67.6, I80-I82					kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
1826737	dabigatraaneteksilaat, 110mg	B01AE07	GRIBERO, kõvakapsel, 60TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	100	I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6					kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
					50						
					75	S72.7-S72.7, I26-I26, S72.0-S72.2, I80-I82, I48-I48, I67.6-I67.6, M16-M17					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1850813	dabigatraaneteksilaat, 110mg	B01AE07	TELEXER, kõvakapsel, 60TK	Gedeon Richter Plc.	75	S72.7-S72.7, I26-I26, S72.0-S72.2, I80-I82, I48-I48, I67.6-I67.6, M16-M17					
					50						
					100	I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6					kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
1869330	dabigatraaneteksilaat, 110mg	B01AE07	DANENGO, kõvakapsel, 60TK	TAD Pharma GmbH	75	S72.7-S72.7, I26-I26, S72.0-S72.2, I80-I82, I48-I48, I67.6-I67.6, M16-M17					
					50						
					100	I26-I26, I67.6-I67.6, I80-I82					kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
1898523	dabigatraaneteksilaat, 110mg	B01AE07	DABIGATRAN ETEXILATE ACCORD, kõvakapsel, 30TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	I26-I26, I67.6-I67.6, I80-I82					kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
					50						
					75	S72.7-S72.7, I26-I26, S72.0-S72.2, I80-I82, I48-I48, I67.6-I67.6, M16-M17					
1898534	dabigatraaneteksilaat, 110mg	B01AE07	DABIGATRAN ETEXILATE ACCORD, kõvakapsel, 60TK	Accord Healthcare S.L.U.	50						
					100	I80-I82, I26-I26, I67.6-I67.6					kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
					75	S72.7-S72.7, I26-I26, S72.0-S72.2, I80-I82, I48-I48, I67.6-I67.6, M16-M17					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3005671	dabigatraaneteksilaat, 110mg	B01AE07	DABIGATRAN ETEXILATE VIATRIS, kõvakapsel, 60TK	Viatris Limited	75	S72.7-S72.7, I26-I26, S72.0-S72.2, I80-I82, I48-I48, I67.6-I67.6, M16-M17					
					50						
					100	I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6					kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
3008719	dabigatraaneteksilaat, 110mg	B01AE07	DABIGATRAN ETEXILATE STADA, kõvakapsel, 60TK	Stada Arzneimittel AG	75	S72.7-S72.7, I26-I26, S72.0-S72.2, I80-I82, I48-I48, I67.6-I67.6, M16-M17					
					100	I26-I26, I67.6-I67.6, I80-I82					kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
					50						
1538759	dabigatraaneteksilaat, 150mg	B01AE07	PRADAXA, kõvakapsel, 60TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	100	I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6					kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
					75	I48-I48, I67.6-I67.6, I80-I82, I26-I26					
					50						
1826939	dabigatraaneteksilaat, 150mg	B01AE07	GRIBERO, kõvakapsel, 60TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	100	I26-I26, I67.6-I67.6, I80-I82					kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
					50						
					75	I48-I48, I67.6-I67.6, I80-I82, I26-I26					
1850891	dabigatraaneteksilaat, 150mg	B01AE07	TELEXER, kõvakapsel, 60TK	Gedeon Richter Plc.	50						
					75	I48-I48, I67.6-I67.6, I80-I82, I26-I26					
					100	I26-I26, I67.6-I67.6, I80-I82					kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1869396	dabigatraaneteksilaat, 150mg	B01AE07	DANENGO, kõvakapsel, 60TK	TAD Pharma GmbH	75	I48-I48, I67.6-I67.6, I80-I82, I26-I26					
					50						
					100	I26-I26, I67.6-I67.6, I80-I82					kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
1898635	dabigatraaneteksilaat, 150mg	B01AE07	DABIGATRAN ETEXILATE ACCORD, kõvakapsel, 60TK	Accord Healthcare S.L.U.	50						
					100	I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6					kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
					75	I48-I48, I67.6-I67.6, I80-I82, I26-I26					
3005772	dabigatraaneteksilaat, 150mg	B01AE07	DABIGATRAN ETEXILATE VIATRIS, kõvakapsel, 60TK	Viatris Limited	50						
					75	I48-I48, I67.6-I67.6, I80-I82, I26-I26					
					100	I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6					kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
3008742	dabigatraaneteksilaat, 150mg	B01AE07	DABIGATRAN ETEXILATE STADA, kõvakapsel, 60TK	Stada Arzneimittel AG	100	I80-I82, I26-I26, I67.6-I67.6					kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
					50						
					75	I48-I48, I67.6-I67.6, I80-I82, I26-I26					
1898444	dabigatraaneteksilaat, 75mg	B01AE07	DABIGATRAN ETEXILATE ACCORD, kõvakapsel, 30TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	I80-I82, I26-I26, I67.6-I67.6					kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
					75	I80-I82, M16-M17, S72.7-S72.7, S72.0-S72.2, I67.6-I67.6, I26-I26					
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1624160	dabrafeniib, 75mg	L01EC02	TAFINLAR, kõvakapsel, 120TK	Novartis Europharm Limited	100	C43-C43	Onkoloog				konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) otsuse alusel BRAF V600 mutatsiooniga kaugelearenenud mitteresetseeritava või metastaatilise (IIIc-IV st) melanoomi raviks juhul, kui patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1 ja 3-kuulise intervalliga hinnatuna püsib haigus vähemalt stabiilsena (KT- või/ja muu asjakohase uuringu alusel hinnatuna haiguse progressiooni ei esine)
3073047	danikopaan, 100mg	L04AJ09	VOYDEYA, õhukese polümeerikattega tablett, 180TK	Alexion Europe	100	D59.5-D59.5	Hematoloog				hematoloogidest koosneva ekspertkomisjoni otsuse alusel koos ravulizumabi või ekulizumabiga paroksüsmaalse öise hemoglobinuuria raviks täiskasvanud patsientidele, kellel on hemolüütiline aneemia
3072990	danikopaan, 50mg/100mg	L04AJ09	VOYDEYA, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK / 90TK	Alexion Europe	100	D59.5-D59.5	Hematoloog				hematoloogidest koosneva ekspertkomisjoni otsuse alusel koos ravulizumabi või ekulizumabiga paroksüsmaalse öise hemoglobinuuria raviks täiskasvanud patsientidele, kellel on hemolüütiline aneemia
1598654	dapagliflosiin, 10mg	A10BK01	FORXIGA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Astrazeneca AB	50						
					75	N18-N18					lisatuna standardravile (AKE- inhibiitor või ARB) või standardravi vastunäidustuse korral monoteraapiana
					75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks või monoraviks, kui metformiin on vastunäidustatud või kaasuvana esineb sümptomaatiline südamepuudulikkus või krooniline neeruhaigus
					75	I50-I50					patsiendile, kes kuulub NYHA II-IV funktsionaalklassi, kellel ravikoostöö on hea ning kellel AKE-inhibiitor või ARB ja beetablokaatori kaksikravil südamepuudulikkuse sümptomid endiselt püsivad või süvenevad
1598609	dapagliflosiin, 5mg	A10BK01	FORXIGA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Astrazeneca AB	75	I50-I50					patsiendile, kes kuulub NYHA II-IV funktsionaalklassi, kellel ravikoostöö on hea ning kellel AKE-inhibiitor või ARB ja beetablokaatori kaksikravil südamepuudulikkuse sümptomid endiselt püsivad või süvenevad
					75	E11-E11, E14-E14					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks või monoraviks, kui metformiin on vastunäidustatud või kaasuvana esineb sümptomaatiline südamepuudulikkus või krooniline neeruhaigus
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1814699	darolutamiid, 300mg	L02BB06	NUBEQA, õhukese polümeerikattega tablett, 112TK	Bayer AG	100	C61-C61	Onkoloog, Uroloog				mittemetastaatilise kastratsioonresistentse eesnäärmevähi raviks heas üldseisundis (ECOG 0-1) patsientidele, kellel on kõrge risk (PSADT<=10 kuud) metastaatilise haiguse tekkeks. Metastaatilise hormoonsensitiivse eesnäärmevähi raviks, kõrge riskiga haiguse korral võib ravi määrata patsientidele, kellel abirateroon on vastunäidustatud või abirateroon kasutamisel esinevad talumatud kõrvaltoimeid. Kummagi näidustuse korral ei tohi patsient olla varasemalt saanud ravi teise põlvkonna androgeeniretseptori inhibiitoriga, v.a. juhul, kui ravi on katkestatud kõrvaltoimete tõttu
1755569	dasatiniib, 50mg	L01EA02	DASATINIB TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Teva B.V.	100	C92.1-C92.1	Hematoloog				konsiiliumi(vähemalt 3 hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele,kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi, eelnev ravi imatiniibiga annuses 600mg on ebaõnnestunud või osutunud talumatuks (imatiniibravi on põhjustanud III või IV astme kõrvaltoime või üle 3 kuu püsinud II astme kõrvaltoime CTC klassifikatsiooni järgi) ning ravi alustatakse kuni kolmanda rea ravina; ravi võib jätkata kuni hematoloogilise ravivastuse püsimiseni (haigus ei progresseeru dasatiniibravi foonil).
1781467	dasatiniib, 50mg	L01EA02	DASATINIB ZENTIVA, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Zentiva k.s.	100	C92.1-C92.1	Hematoloog				konsiiliumi(vähemalt 3 hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele,kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi, eelnev ravi imatiniibiga annuses 600mg on ebaõnnestunud või osutunud talumatuks (imatiniibravi on põhjustanud III või IV astme kõrvaltoime või üle 3 kuu püsinud II astme kõrvaltoime CTC klassifikatsiooni järgi) ning ravi alustatakse kuni kolmanda rea ravina; ravi võib jätkata kuni hematoloogilise ravivastuse püsimiseni (haigus ei progresseeru dasatiniibravi foonil).

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1781478	dasatiniib, 50mg	L01EA02	DASATINIB VIATRIS, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Viatris Limited	100	C92.1-C92.1	Hematoloog				konsiiliumi(vähemalt 3 hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele,kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi, eelnev ravi imatiniibiga annuses 600mg on ebaõnnestunud või osutunud talumatuks (imatiniibravi on põhjustanud III või IV astme kõrvaltoime või üle 3 kuu püsinud II astme kõrvaltoime CTC klassifikatsiooni järgi) ning ravi alustatakse kuni kolmanda rea ravina; ravi võib jätkata kuni hematoloogilise ravivastuse püsimiseni (haigus ei progresseeru dasatiniibravi foonil).
1809570	deferasiroks, 180mg	V03AC03	DEFERASIROX ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	D57-D57, D47.1-D47.1, D56-D56, D60-D61, C81-C96, D46-D46	Hematoloog				konsiiliumi (vähemasti 3 hematoloogi) otsuse alusel järgmistele kriteeriumidele vastavate patsientide raviks: seerumi ferritiinitase on >1000mcg/l; esineb jätkuv regulaarne vereülekannete vajadus (vähemasti 1 aasta jooksul on manustatud vähemasti 2 erütrotsüütide doosi kuu kohta ning sarnane vereülekannete vajadus püsib) või plaanitakse vereloome tüvirakkude siirdamist; müelodüsplastilise sündroomi või müelofibroosiga (D46, D47.1) patsientide riskiskoor on madal või madal-mõõdukas (IPSS 0-1)
1713989	deferasiroks, 360mg	V03AC03	EXJADE, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Novartis Europharm Limited	100	D57-D57, D47.1-D47.1, D56-D56, D60-D61, C81-C96, D46-D46	Hematoloog				konsiiliumi (vähemasti 3 hematoloogi) otsuse alusel järgmistele kriteeriumidele vastavate patsientide raviks: seerumi ferritiinitase on >1000mcg/l; esineb jätkuv regulaarne vereülekannete vajadus (vähemasti 1 aasta jooksul on manustatud vähemasti 2 erütrotsüütide doosi kuu kohta ning sarnane vereülekannete vajadus püsib) või plaanitakse vereloome tüvirakkude siirdamist; müelodüsplastilise sündroomi või müelofibroosiga (D46, D47.1) patsientide riskiskoor on madal või madal-mõõdukas (IPSS 0-1)

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1809615	deferasiroks, 360mg	V03AC03	DEFERASIROX ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	D57-D57, D47.1-D47.1, D56-D56, D60-D61, C81-C96, D46-D46	Hematoloog				konsiiliumi (vähemasti 3 hematoloogi) otsuse alusel järgmistele kriteeriumidele vastavate patsientide raviks: seerumi ferritiinitase on >1000mcg/l; esineb jätkuv regulaarne vereülekannete vajadus (vähemasti 1 aasta jooksul on manustatud vähemasti 2 erütrotsüütide doosi kuu kohta ning sarnane vereülekannete vajadus püsib) või plaanitakse vereloome tüvirakkude siirdamist; müelodüsplastilise sündroomi või müelofibroosiga (D46, D47.1) patsientide riskiskoor on madal või madal-mõõdukas (IPSS 0-1)
1605574	degludek-insuliin, 100ühik 1ml	A10AE06	TRESIBA 100 ühikut/ml FLEXTOUCH, süstelahus pen-süstlis, 3ml 5TK	Novo Nordisk A/S	100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1					
1605619	degludek-insuliin, 200ühik 1ml	A10AE06	TRESIBA 200 ühikut/ml FLEXTOUCH, süstelahus pen-süstlis, 3ml 3TK	Novo Nordisk A/S	100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1					
1607295	degludek-insuliin+aspart-insuliin, 70ühik+30ühik 1ml	A10AD06	RYZODEG 100 ühikut/ml FLEXTOUCH, süstelahus pen-süstlis, 3ml 5TK	Novo Nordisk A/S	100	E10-E11, E13-E14					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1014972	deksametasoon, 0,5mg	H02AB02	DEXAMETHASON KRKA, tablett, 10TK	KRKA d.d. Novo mesto	75	L12-L12, L23-L23, L13.0-L13.0, L10-L10, L20-L20	Pediaater allergoloogi lisapädevusega, Pediaater, Dermatovenerol oog, Allergoloog-immunoloog				
					100	E89.6-E89.6, E27-E27, E89.3-E89.3, E23-E23, E25-E25	Pediaater, Endokrinoloog, Pediaater endokrinoloogi lisapädevusega	esmane			
					100	C00-D48					
					50						
					100	Z94-Z94, T86-T86					
1647143	deksametasoon, 0,985mg 1g	S01BA01	DEXAGEL, silmageel, 5g 1TK	Bausch + Lomb Ireland Limited	50						
1007479	deksametasoon, 1mg 1ml	S01BA01	OFTAN DEXA, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK	Santen Oy	50						
1124288	deksametasoon, 1mg 1ml	S01BA01	MAXIDEX, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK	Novartis Baltics SIA	50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1671780	deksametasoon, 20mg	H02AB02	DEXAMETHASON KRKA, tablett, 20TK	KRKA, d.d., Novo mesto	100	E89.6-E89.6, E27-E27, E89.3-E89.3, E23-E23, E25-E25	Pediaater, Pediaater endokrinoloogi lisapädevusega, Endokrinoloog	esmane			
					100	C00-D48					
					100	Z94-Z94, T86-T86					
					50						
					75	L12-L12, L23-L23, L13.0-L13.0, L10-L10, L20-L20	Dermatovenerol oog, Pediaater allergoloogi lisapädevusega, Pediaater, Allergoloog-immunoloog				
1792874	deksametasoon, 20mg	H02AB02	DEXAMETHASON KRKA, tablett, 20TK	First Pharma OÜ	50						
					75	L12-L12, L23-L23, L13.0-L13.0, L10-L10, L20-L20	Pediaater, Allergoloog-immunoloog, Dermatovenerol oog, Pediaater allergoloogi lisapädevusega				
					100	C00-D48					
					100	E89.6-E89.6, E27-E27, E89.3-E89.3, E23-E23, E25-E25	Endokrinoloog, Pediaater endokrinoloogi lisapädevusega, Pediaater	esmane			
					100	Z94-Z94, T86-T86					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1808748	deksametasoon, 20mg	H02AB02	NODEXON, tablett, 20TK	Norameda UAB	50						
					100	E89.6-E89.6, E27-E27, E89.3-E89.3, E23-E23, E25-E25	Endokrinoloog, Pediaater, Pediaater endokrinoloogi lisapädevusega	esmane			
					100	C00-D48, Z94-Z94, T86-T86					
					75	L12-L12, L23-L23, L13.0-L13.0, L10-L10, L20-L20	Pediaater allergoloogi lisapädevusega, Pediaater, Dermatovenerol oog, Allergoloog-immunoloog				
1889231	deksametasoon, 20mg	H02AB02	DEXAMETHASON KRKA, tablett, 20TK	Ideal Trade Links UAB	100	C00-D48					
					75	L12-L12, L23-L23, L13.0-L13.0, L10-L10, L20-L20	Pediaater allergoloogi lisapädevusega, Pediaater, Dermatovenerol oog, Allergoloog-immunoloog				
					100	Z94-Z94, T86-T86					
					100	E89.6-E89.6, E27-E27, E89.3-E89.3, E23-E23, E25-E25	Pediaater endokrinoloogi lisapädevusega, Pediaater, Endokrinoloog	esmane			
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1671667	deksametasoon, 4mg	H02AB02	DEXAMETHASON KRKA, tablett, 20TK	KRKA, d.d., Novo mesto	75	L12-L12, L23-L23, L13.0-L13.0, L10-L10, L20-L20	Pediaater, Allergoloog-immunoloog, Dermatovenerol oog, Pediaater allergoloogi lisapädevusega				
					100	E89.6-E89.6, E27-E27, E89.3-E89.3, E23-E23, E25-E25	Pediaater, Pediaater endokrinoloogi lisapädevusega, Endokrinoloog	esmane			
					50						
					100	C00-D48					
					100	Z94-Z94, T86-T86					
1792773	deksametasoon, 4mg	H02AB02	DEXAMETHASON KRKA, tablett, 20TK	First Pharma OÜ	50						
					100	Z94-Z94, T86-T86					
					75	L12-L12, L23-L23, L13.0-L13.0, L10-L10, L20-L20	Allergoloog-immunoloog, Dermatovenerol oog, Pediaater allergoloogi lisapädevusega, Pediaater				
					100	C00-D48					
					100	E89.6-E89.6, E27-E27, E89.3-E89.3, E23-E23, E25-E25	Pediaater endokrinoloogi lisapädevusega, Endokrinoloog, Pediaater	esmane			

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1808669	deksametasoon, 4mg	H02AB02	NODEXON, tablett, 20TK	Norameda UAB	75	L12-L12, L23-L23, L13.0-L13.0, L10-L10, L20-L20	Allergoloog-immunoloog, Dermatovenerol oog, Pediaater, Pediaater allergoloogi lisapädevusega				
					50						
					100	E89.6-E89.6, E27-E27, E89.3-E89.3, E23-E23, E25-E25	Endokrinoloog, Pediaater endokrinoloogi lisapädevusega, Pediaater	esmane			
					100	C00-D48, Z94-Z94, T86-T86					
1862669	deksametasoon, 4mg	H02AB02	DEXAMETHASON KRKA, tablett, 20TK	Lex Ano UAB	100	E89.6-E89.6, E27-E27, E89.3-E89.3, E23-E23, E25-E25	Pediaater, Pediaater endokrinoloogi lisapädevusega, Endokrinoloog	esmane			
					75	L12-L12, L23-L23, L13.0-L13.0, L10-L10, L20-L20	Pediaater allergoloogi lisapädevusega, Allergoloog-immunoloog, Pediaater, Dermatovenerol oog				
					50						
					100	C00-D48, Z94-Z94, T86-T86					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1889376	deksametasoon, 4mg	H02AB02	DEXAMETHASON KRKA, tablett, 20TK	Ideal Trade Links UAB	75	L12-L12, L23-L23, L13.0-L13.0, L10-L10, L20-L20	Pediaater allergoloogi lisapädevusega, Allergoloog-immunoloog, Pediaater, Dermatovenerol oog				
					50						
					100	E89.6-E89.6, E27-E27, E89.3-E89.3, E23-E23, E25-E25	Endokrinoloog, Pediaater, Pediaater endokrinoloogi lisapädevusega	esmane			
					100	Z94-Z94, T86-T86					
					100	C00-D48					
1008414	deksametasoon, 4mg 1ml	H02AB02	DEXAMETHASON KRKA, süstelahus, 1ml 25TK	KRKA d.d. Novo mesto	50						
					100	C00-D48					
1044379	deksametasoon+klooramfenikool, 1mg+2mg 1g	S01CA82	OFTAN DEXA-CHLORA, silmasalv, 3.5g 1TK	Santen Oy	50						
1044368	deksametasoon+klooramfenikool, 1mg+2mg 1ml	S01CA82	OFTAN DEXA-CHLORA, silmatilgad, lahus, 10ml 1TK	Santen Oy	50						
1124301	deksametasoon+neomütsiin+polümüksiin B, 1mg+3500RÜ+6000RÜ 1ml	S01CA80	MAXITROL, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK	Novartis Baltics SIA	50						
1150276	deksametasoon+tobramütsiin, 1mg+3mg 1g	S01CA81	TOBRADEX, silmasalv, 3.5g 1TK	Novartis Baltics SIA	50						
1124266	deksametasoon+tobramütsiin, 1mg+3mg 1ml	S01CA81	TOBRADEX, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK	Novartis Baltics SIA	50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1834961	deksametasoon+tobramütsiin, 1mg+3mg 1ml	S01CA81	TOBRAMYCIN/DEXAMETHASONE ELVIM, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK	SIA Elvim	50						
3048971	deksamfetamiin, 10mg	N06BA02	TENTIN, tablett, 30TK	Medice Arzneimittel Puetter GmbH & Co. KG	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater – laste- ja noorukitepsühhiaater, Psühhiaater	esmane			patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus kehtivatele metüülfenidaadi hüvitamistingimustele, kuid kellel on adekvaatne ravi metüülfenidaadiga osutunud ebaefektiivseks, põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele see ravim on dokumenteeritult meditsiiniliselt vastunäidustatud. Metüülfenidaadi efektiivsus on hinnatav 6-nädalase perioodi jooksul kasutamisel adekvaatses annuses
3049039	deksamfetamiin, 20mg	N06BA02	TENTIN, tablett, 30TK	Medice Arzneimittel Puetter GmbH & Co. KG	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater – laste- ja noorukitepsühhiaater, Psühhiaater	esmane			patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus kehtivatele metüülfenidaadi hüvitamistingimustele, kuid kellel on adekvaatne ravi metüülfenidaadiga osutunud ebaefektiivseks, põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele see ravim on dokumenteeritult meditsiiniliselt vastunäidustatud. Metüülfenidaadi efektiivsus on hinnatav 6-nädalase perioodi jooksul kasutamisel adekvaatses annuses
3048926	deksamfetamiin, 5mg	N06BA02	TENTIN, tablett, 30TK	Medice Arzneimittel Puetter GmbH & Co. KG	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater, Psühhiaater – laste- ja noorukitepsühhiaater	esmane			patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus kehtivatele metüülfenidaadi hüvitamistingimustele, kuid kellel on adekvaatne ravi metüülfenidaadiga osutunud ebaefektiivseks, põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele see ravim on dokumenteeritult meditsiiniliselt vastunäidustatud. Metüülfenidaadi efektiivsus on hinnatav 6-nädalase perioodi jooksul kasutamisel adekvaatses annuses
1772018	deltafollitropiin, 36mcg 1.08ml	G03GA10	REKOVELLE, süstelahus pen-süstlis, 1.08ml 1TK	Ferring Pharmaceuticals A/S	100	N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks
					50						
1772029	deltafollitropiin, 72mcg 2.16ml	G03GA10	REKOVELLE, süstelahus pen-süstlis, 2.16ml 1TK	Ferring Pharmaceuticals A/S	100	N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1481857	denosumab, 60mg 1ml	M05BX04	PROLIA, süstelahus süstlis, 1ml 1TK	Amgen Europe B.V.	50						
					75	M80-M80					patsientidele, kellel esineb kaasuvalt raske neerupuudulikkus või söögitoru akalaasia, striktuur, düskineesia või põletik (N17-19; K22.0; K22.2; K22.4; K20)
					75	M81-M81, M82-M82, M85.8-M85.8					suure luumurru riskiga patsientidele, kelle reieluu proksimaalse osa murrurisk >=3% ja/või tõsise osteoporootilise murru risk >=15% (ilma DEXA uuringuta >=20%) vastavalt FRAX luumurru riskikalkulaatorile ja kellel esineb kaasuvalt raske neerupuudulikkus või söögitoru akalaasia, striktuur, düskineesia või põletik (N17-19; K22.0; K22.2; K22.4; K20)
3083048	denosumab, 60mg 1ml	M05BX04	JUBBONTI, süstelahus süstlis, 1ml 1TK	Sandoz GmbH	75	M81-M81, M82-M82, M85.8-M85.8					suure luumurru riskiga patsientidele, kelle reieluu proksimaalse osa murrurisk >=3% ja/või tõsise osteoporootilise murru risk >=15% (ilma DEXA uuringuta >=20%) vastavalt FRAX luumurru riskikalkulaatorile ja kellel esineb kaasuvalt raske neerupuudulikkus või söögitoru akalaasia, striktuur, düskineesia või põletik (N17-19; K22.0; K22.2; K22.4; K20)
					50						
					75	M80-M80					patsientidele, kellel esineb kaasuvalt raske neerupuudulikkus või söögitoru akalaasia, striktuur, düskineesia või põletik (N17-19; K22.0; K22.2; K22.4; K20)
3115549	denosumab, 60mg 1ml	M05BX04	OSVYRTI, süstelahus süstlis, 1ml 1TK	Accord Healthcare S.L.U.	75	M81-M81, M82-M82, M85.8-M85.8					suure luumurru riskiga patsientidele, kelle reieluu proksimaalse osa murrurisk >=3% ja/või tõsise osteoporootilise murru risk >=15% (ilma DEXA uuringuta >=20%) vastavalt FRAX luumurru riskikalkulaatorile ja kellel esineb kaasuvalt raske neerupuudulikkus või söögitoru akalaasia, striktuur, düskineesia või põletik (N17-19; K22.0; K22.2; K22.4; K20)
					50						
					75	M80-M80					patsientidele, kellel esineb kaasuvalt raske neerupuudulikkus või söögitoru akalaasia, striktuur, düskineesia või põletik (N17-19; K22.0; K22.2; K22.4; K20)

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3119868	denosumab, 60mg 1ml	M05BX04	JUNOD, süstelahus süstlis, 1ml 1TK	Gedeon Richter Plc.	75	M80-M80					patsientidele, kellel esineb kaasuvalt raske neerupuudulikkus või söögitoru akalaasia, striktuur, düskineesia või põletik (N17-19; K22.0; K22.2; K22.4; K20)
					75	M81-M81, M82-M82, M85.8-M85.8					suure luumurru riskiga patsientidele, kelle reieluu proksimaalse osa murrurisk >=3% ja/või tõsise osteoporootilise murru risk >=15% (ilma DEXA uuringuta >=20%) vastavalt FRAX luumurru riskikalkulaatorile ja kellel esineb kaasuvalt raske neerupuudulikkus või söögitoru akalaasia, striktuur, düskineesia või põletik (N17-19; K22.0; K22.2; K22.4; K20)
					50						
3124077	denosumab, 60mg 1ml	M05BX04	ZADENVI, süstelahus süstlis, 1ml 1TK	Zentiva k.s.	75	M80-M80					patsientidele, kellel esineb kaasuvalt raske neerupuudulikkus või söögitoru akalaasia, striktuur, düskineesia või põletik (N17-19; K22.0; K22.2; K22.4; K20)
					75	M81-M81, M82-M82, M85.8-M85.8					suure luumurru riskiga patsientidele, kelle reieluu proksimaalse osa murrurisk >=3% ja/või tõsise osteoporootilise murru risk >=15% (ilma DEXA uuringuta >=20%) vastavalt FRAX luumurru riskikalkulaatorile ja kellel esineb kaasuvalt raske neerupuudulikkus või söögitoru akalaasia, striktuur, düskineesia või põletik (N17-19; K22.0; K22.2; K22.4; K20)
					50						
3124763	denosumab, 60mg 1ml	M05BX04	CONEXXENCE, süstelahus süstlis, 1ml 1TK	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	75	M80-M80					patsientidele, kellel esineb kaasuvalt raske neerupuudulikkus või söögitoru akalaasia, striktuur, düskineesia või põletik (N17-19; K22.0; K22.2; K22.4; K20)
					50						
					75	M81-M81, M82-M82, M85.8-M85.8					suure luumurru riskiga patsientidele, kelle reieluu proksimaalse osa murrurisk >=3% ja/või tõsise osteoporootilise murru risk >=15% (ilma DEXA uuringuta >=20%) vastavalt FRAX luumurru riskikalkulaatorile ja kellel esineb kaasuvalt raske neerupuudulikkus või söögitoru akalaasia, striktuur, düskineesia või põletik (N17-19; K22.0; K22.2; K22.4; K20)

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3135181	denosumab, 60mg 1ml	M05BX04	KEFDENSIS, süstelahus süstlis, 1ml 1TK	Stada Arzneimittel AG	75	M81-M81, M82-M82, M85.8-M85.8					suure luumurru riskiga patsientidele, kelle reieluu proksimaalse osa murrurisk >=3% ja/või tõsise osteoporootilise murru risk >=15% (ilma DEXA uuringuta >=20%) vastavalt FRAX luumurru riskikalkulaatorile ja kellel esineb kaasuvalt raske neerupuudulikkus või söögitoru akalaasia, striktuur, düskineesia või põletik (N17-19; K22.0; K22.2; K22.4; K20)
					75	M80-M80					patsientidele, kellel esineb kaasuvalt raske neerupuudulikkus või söögitoru akalaasia, striktuur, düskineesia või põletik (N17-19; K22.0; K22.2; K22.4; K20)
					50						
1653937	desloratadiin, 0,5mg 1ml	R06AX27	DESLORATADINE SOPHARMA, suukaudne lahus, 120ml 1TK	Sopharma AD	50						
1550797	desloratadiin, 5mg	R06AX27	DASSELTA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	KRKA d.d. Novo mesto	50						
1064348	desmopressiin, 0,1mg 1ml	H01BA02	MINIRIN, ninasprei, lahus, 2.5ml 1TK	Ferring GmbH	100	E23.2-E23.2	Pediaater endokrinoloogi lisapädevusega, Endokrinoloog, Pediaater	esmane			
					50						
1225594	desmopressiin, 120mcg	H01BA02	MINIRIN, suukaudne lüofilisaat, 30TK	Ferring GmbH	100	E23.2-E23.2	Endokrinoloog, Pediaater, Pediaater endokrinoloogi lisapädevusega	esmane			
					50						
3035832	desmopressiin, 120mcg	H01BA02	MITACLAU, keelealune tablett, 30TK	Norameda UAB	50						
					100	E23.2-E23.2	Pediaater endokrinoloogi lisapädevusega, Endokrinoloog, Pediaater	esmane			

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1225561	desmopressiin, 60mcg	H01BA02	MINIRIN, suukaudne lüofilisaat, 30TK	Ferring GmbH	100	E23.2-E23.2	Pediaater, Pediaater endokrinoloogi lisapädevusega, Endokrinoloog	esmane			
					50						
3035685	desmopressiin, 60mcg	H01BA02	MITACLAU, keelealune tablett, 30TK	Norameda UAB	100	E23.2-E23.2	Pediaater endokrinoloogi lisapädevusega, Pediaater, Endokrinoloog	esmane			
					50						
1063303	desogestreel, 75mcg	G03AC09	CERAZETTE, õhukese polümeerikattega tablett, 84TK	Organon N.V.	75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
					50						
1505450	desogestreel, 75mcg	G03AC09	DESIRETT 75 MCG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Exeltis Baltics UAB	75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
					50						
1656143	desogestreel, 75mcg	G03AC09	DELAMONIE, õhukese polümeerikattega tablett, 84TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
					50						
1062920	desogestreel+etünüülöstradiool, 0,15mg+0,02mg	G03AA09	NOVYNETTE, õhukese polümeerikattega tablett, 63TK	Gedeon Richter Plc.	50						
					75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
1867574	desogestreel+etünüülöstradiool, 0,15mg+0,02mg	G03AA09	NOVYNETTE, õhukese polümeerikattega tablett, 63TK	Lex Ano UAB	75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
					50						
3131749	desogestreel+etünüülöstradiool, 0,15mg+0,02mg	G03AA09	NOVYNETTE, õhukese polümeerikattega tablett, 63TK	Lex Ano UAB	50						
					75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
1062931	desogestreel+etünüülöstradiool, 0,15mg+0,03mg	G03AA09	REGULON, õhukese polümeerikattega tablett, 63TK	Gedeon Richter Plc.	75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
					50						
3113772	desogestreel+etünüülöstradiool, 0,15mg+0,03mg	G03AA09	REGULON, õhukese polümeerikattega tablett, 63TK	Lex Ano UAB	50						
					75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1208045	detemir-insuliin, 100ühik 1ml	A10AE05	LEVEMIR FLEXPEN, süstelahus pen-süstlis, 3ml 5TK	Novo Nordisk A/S	50						
					100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1					
1007659	diasepaam, 10mg 2.5ml	N05BA01	DIAZEPAM DESITIN, rektaallahus, 2.5ml 5TK	Desitin Arzneimittel GmbH	50						
1007682	diasepaam, 5mg 2.5ml	N05BA01	DIAZEPAM DESITIN, rektaallahus, 2.5ml 5TK	Desitin Arzneimittel GmbH	50						
1385276	dienogest, 2mg	G03DB08	VISANNETTE, tablett, 28TK	Bayer AG	50						
					75	N80-N80	Günekoloog				
3050143	dienogest, 2mg	G03DB08	VISANNETTE, tablett, 28TK	Lex Ano UAB	75	N80-N80	Günekoloog				
					50						
3063631	dienogest, 2mg	G03DB08	VISANNETTE, tablett, 28TK	Ideal Trade Links UAB	75	N80-N80	Günekoloog				
					50						
3108439	dienogest, 2mg	G03DB08	VISANNETTE, tablett, 28TK	First Pharma OÜ	50						
					75	N80-N80	Günekoloog				
1587146	dienogest+etünüül östradiool, 0+0/2mg+0,03mg	G03AA16	SIBILLA PLUS, õhukese polümeerikattega tablett, 7TK / 21TK	Gedeon Richter Plc.	75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
					50						
1066834	dienogest+etünüül östradiool, 2mg+0,03mg	G03AA16	JEANINE, kaetud tablett, 21TK	Bayer AG	50						
					75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
1305818	dienogest+etünüül östradiool, 2mg+0,03mg	G03AA16	AMMILY 2 MG / 0,03 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 21TK	Orivas UAB	75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
					50						
1070592	digoksiin, 0,25mg	C01AA05	DIGOXIN-GRINDEKS, tablett, 50TK	Grindeks AS	50						
					75	I50-I50					
1222209	digoksiin, 0,25mg	C01AA05	DIGOXIN ORIFARM 0,25 MG, tablett, 60TK	Orifarm Healthcare A/S	50						
					75	I50-I50					
1222197	digoksiin, 62,5mcg	C01AA05	DIGOXIN ORIFARM 62,5 MCG, tablett, 60TK	Orifarm Generics A/S	75	I50-I50					
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1361786	dihüdrokodeiin, 60mg	N02AA08	DHC ENNOGEN, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 10TK	Ennogen Healthcare (Europe) Limited	50						
1016109	diklofenak, 100mg	M01AB05	DICLOBERL RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 50TK	Berlin-Chemie AG	75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					100	C00-D48					
					75	M15-M19			63,00		
					50						
1017133	diklofenak, 100mg	M01AB05	DICLOFENAC-RATIOPHARM 100 MG, rektaalsuposiit, 10TK	Ratiopharm GmbH	75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					100	C00-D48					
					75	M15-M19			63,00		
					50						
1032589	diklofenak, 100mg	M01AB05	DICLOMELAN RETARD 100 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	G.L. Pharma GmbH	50						
					75	M15-M19			63,00		
					100	C00-D48					
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
1039632	diklofenak, 100mg	M01AB05	OLFEN DEPOCAPS, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 20TK	Teva B.V.	100	C00-D48					
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					75	M15-M19			63,00		
					50						
1078163	diklofenak, 100mg	M01AB05	DICLAC 100 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 50TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	M15-M19			63,00		
					100	C00-D48					
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
1071920	diklofenak, 150mg	M01AB05	DICLAC ID 150 MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 20TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					100	C00-D48					
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					75	M15-M19			63,00		

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1071942	diklofenak, 150mg	M01AB05	DICLAC ID 150 MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 100TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	100	C00-D48					
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					50						
					75	M15-M19			63,00		
1012048	diklofenak, 75mg	M01AB05	OLFEN DEPOTABS, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Teva B.V.	75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					50						
					75	M15-M19			63,00		
					100	C00-D48					
1071986	diklofenak, 75mg	M01AB05	DICLAC ID 75 MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 100TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	M15-M19			63,00		
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					100	C00-D48					
					50						
1031634	diltiaseem, 180mg	C08DB01	DILTIAZEM LANNACHER, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	G.L. Pharma GmbH	100	I27.0-I27.0					
					75	I47-I49	Pediaater, Kardioloog, Pediaater kardioloogi lisapädevusega	esmane			
					50						
1031645	diltiaseem, 90mg	C08DB01	DILTIAZEM LANNACHER, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 20TK	G.L. Pharma GmbH	75	I47-I49	Pediaater, Kardioloog, Pediaater kardioloogi lisapädevusega	esmane			
					50						
					100	I27.0-I27.0					
1638693	dimetüülfumaraat, 120mg	L04AX07	TECFIDERA, gastroresistentne kõvakapsel, 14TK	Biogen Netherlands B.V.	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel (ägenemiste ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1865954	dimetüülfumaraat, 120mg	L04AX07	DIMETHYL FUMARATE STADA, gastroresistentne kõvakapsel, 14TK	Stada Arzneimittel AG	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel (ägenemiste ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks
1882571	dimetüülfumaraat, 120mg	L04AX07	DIMETHYL FUMARATE ZENTIVA, gastroresistentne kõvakapsel, 14TK	Zentiva k.s.	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel (ägenemiste ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks
3078255	dimetüülfumaraat, 120mg	L04AX07	DIMETHYL FUMARATE MYLAN, gastroresistentne kõvakapsel, 14TK	Mylan Ireland Limited	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel (ägenemiste ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks
3078367	dimetüülfumaraat, 120mg	L04AX07	DIMETHYL FUMARATE ACCORD, gastroresistentne kõvakapsel, 14TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel (ägenemiste ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks
1638705	dimetüülfumaraat, 240mg	L04AX07	TECFIDERA, gastroresistentne kõvakapsel, 56TK	Biogen Netherlands B.V.	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel (ägenemiste ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks
1866067	dimetüülfumaraat, 240mg	L04AX07	DIMETHYL FUMARATE STADA, gastroresistentne kõvakapsel, 56TK	Stada Arzneimittel AG	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel (ägenemiste ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks
1882593	dimetüülfumaraat, 240mg	L04AX07	DIMETHYL FUMARATE ZENTIVA, gastroresistentne kõvakapsel, 56TK	Zentiva k.s.	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel (ägenemiste ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks
1895407	dimetüülfumaraat, 240mg	L04AX07	DIMETHYL FUMARATE TEVAPHARM, gastroresistentne kõvakapsel, 56TK	Teva GmbH	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel (ägenemiste ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks
3009608	dimetüülfumaraat, 240mg	L04AX07	DIMETHYL FUMARATE MSN, gastroresistentne kõvakapsel, 56TK	MSN Labs Europe Limited	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel (ägenemiste ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3078299	dimetüülfumaraat, 240mg	L04AX07	DIMETHYL FUMARATE MYLAN, gastroresistentne kõvakapsel, 56TK	Mylan Ireland Limited	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel (ägenemiste ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks
3078389	dimetüülfumaraat, 240mg	L04AX07	DIMETHYL FUMARATE ACCORD, gastroresistentne kõvakapsel, 56TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel (ägenemiste ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks
1866607	diroksimeelfumaraat, 231mg	L04AX09	VUMERITY, gastroresistentne kõvakapsel, 120TK	Biogen Netherlands B.V.	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel (ägenemiste ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks
1028214	doksasosiin, 2mg	C02CA04	CARDURA, tablett, 30TK	Upjohn EESV	50						
1071391	doksasosiin, 2mg	C02CA04	KAMIREN, tablett, 30TK	KRKA d.d. Novo mesto	50						
3027248	doksasosiin, 2mg	C02CA04	CARDURA, tablett, 30TK	Ideal Trade Links UAB	50						
1028225	doksasosiin, 4mg	C02CA04	CARDURA, tablett, 30TK	Upjohn EESV	50						
1071379	doksasosiin, 4mg	C02CA04	KAMIREN, tablett, 30TK	KRKA d.d. Novo mesto	50						
1129799	doksasosiin, 4mg	C02CA04	CARDURA XL 4MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Upjohn EESV	50						
1205895	doksasosiin, 4mg	C02CA04	DOXALFA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK	Stada Arzneimittel AG	50						
3027260	doksasosiin, 4mg	C02CA04	CARDURA, tablett, 30TK	Ideal Trade Links UAB	50						
3028744	doksasosiin, 4mg	C02CA04	CARDURA XL 4MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK	Ideal Trade Links UAB	50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1018303	doksütsükliin, 100mg	J01AA02	DOXYCYCLIN STADA, tablett, 10TK	Stada Arzneimittel AG	50						
					100	A50-A53	Dermatovenerol oog				
1065899	doksütsükliin, 100mg	J01AA02	DOXYLAN, tablett, 10TK	G.L. Pharma GmbH	100	A50-A53	Dermatovenerol oog				
					50						
1144976	doksütsükliin, 100mg	J01AA02	DOXY-M-RATIOPHARM 100 MG, tablett, 10TK	Ratiopharm GmbH	100	A50-A53	Dermatovenerol oog				
					50						
1292206	donepesiil, 10mg	N06DA02	DONEPEZIL ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Teva B.V.	50						
1391217	donepesiil, 10mg	N06DA02	DONEPEZIL ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	50						
1754827	donepesiil, 10mg	N06DA02	DONERION, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Orion Corporation	50						
1873560	donepesiil, 10mg	N06DA02	DONEPEZIL ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	First Pharma OÜ	50						
3092004	donepesiil, 10mg	N06DA02	DONEPEZIL ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Ideal Trade Links UAB	50						
1292105	donepesiil, 5mg	N06DA02	DONEPEZIL ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Teva B.V.	50						
1391116	donepesiil, 5mg	N06DA02	DONEPEZIL ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1754748	donepesiil, 5mg	N06DA02	DONERION, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Orion Corporation	50						
1014961	dorsolamiid, 2%	S01EC03	TRUSOPT, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK	Santen Oy	100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
					50						
1420108	dorsolamiid, 20mg 1ml	S01EC03	DORZOLAMIDE ELVIM, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK	SIA Elvim	100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
					50						
1755480	dorsolamiid, 20mg 1ml	S01EC03	VIZIDOR, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK	Bausch + Lomb Ireland Limited	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
1454093	dronedaroon, 400mg	C01BD07	MULTAQ, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Sanofi Winthrop Industrie	50		Kardioloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus kardioloogil siinusrütmi säilitamiseks kodade virvendusarütmia puhul pärast kardioversiooni, kui teised antiarütmikumid on ebasobivad (IC klassi antiarütmikumid ja sotalool on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks ning amiodaroon on vastunäidustatud) ning patsiendil ei esine südamepuudulikkust ega vasaku vatsakese düsfunktsiooni
3139400	dronedaroon, 400mg	C01BD07	MULTAQ, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Sanofi Winthrop Industrie	50		Kardioloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus kardioloogil siinusrütmi säilitamiseks kodade virvendusarütmia puhul pärast kardioversiooni, kui teised antiarütmikumid on ebasobivad (IC klassi antiarütmikumid ja sotalool on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks ning amiodaroon on vastunäidustatud) ning patsiendil ei esine südamepuudulikkust ega vasaku vatsakese düsfunktsiooni
1316090	drospirenoon+etünüülöstradiool, 0+0/3mg+0,02mg	G03AA12	YAZ, õhukese polümeerikattega tablett, 4TK / 24TK	Bayer AG	50						
1453766	drospirenoon+etünüülöstradiool, 0+0/3mg+0,02mg	G03AA12	DAYLETTE, õhukese polümeerikattega tablett, 4TK / 24TK	Gedeon Richter Plc.	75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
					50						
1220487	drospirenoon+etünüülöstradiool, 3mg+0,02mg	G03AA12	YASMINELLE, õhukese polümeerikattega tablett, 21TK	Bayer AG	50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1330759	drospirenoon+etünüülöstradiool, 3mg+0,02mg	G03AA12	MADELEINE, õhukese polümeerikattega tablett, 21TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
1331019	drospirenoon+etünüülöstradiool, 3mg+0,02mg	G03AA12	JANGEE 0,02 MG/3 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 21TK	Exeltis Baltics UAB	50						
					75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
1043536	drospirenoon+etünüülöstradiool, 3mg+0,03mg	G03AA12	YARINA, õhukese polümeerikattega tablett, 21TK	Bayer AG	50						
					75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
1331053	drospirenoon+etünüülöstradiool, 3mg+0,03mg	G03AA12	JANGEE 0,03 MG/3 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 21TK	Exeltis Baltics UAB	50						
					75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
1165711	drospirenoon+östradiool, 2mg+1mg	G03FA17	ANGELIQ, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Bayer AG	50						
1670745	dulaglutiid, 1,5mg 0.5ml	A10BJ05	TRULICITY, süstelahus pen-süstlis, 0.5ml 4TK	Eli Lilly Nederland B.V.	75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi raviks rasvumusega patsientidel(KMI>=35kg/m2), kellel suukaudsed diabeediravimid (metformiin, sulfonüüluurea preparaat, PPAR agonist, DPP-4 inhibiitor) maksimaalsetes talutavates annustes ei ole andnud rahuldavat efekti või on vastunäidustatud
					50	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi raviks juhul, kui ravi suukaudsete diabeediravimitega ei ole efektiivne või on vastunäidustatud
1195624	duloksetiin, 30mg	N06AX21	CYMBALTA, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK	Eli Lilly Nederland B.V.	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
					75	G43-G43					
1660643	duloksetiin, 30mg	N06AX21	DULSEVIA, gastroresistentne kõvakapsel, 30TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	50						
					75	G43-G43					
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1661701	duloksetiin, 30mg	N06AX21	DULOXGAMMA, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK	Woerwag Pharma GmbH & Co. KG	75	G43-G43					
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1670419	duloksetiin, 30mg	N06AX21	ONELAR, gastroresistentne kõvakapsel, 30TK	Medochemie Limited	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					75	G43-G43					
1694921	duloksetiin, 30mg	N06AX21	DULOXETINE ZENTIVA, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK	Zentiva k.s.	75	G43-G43					
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1195635	duloksetiin, 60mg	N06AX21	CYMBALTA, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK	Eli Lilly Nederland B.V.	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					75	G43-G43					
					50						
1660733	duloksetiin, 60mg	N06AX21	DULSEVIA, gastroresistentne kõvakapsel, 30TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	75	G43-G43					
					75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1661745	duloksetiin, 60mg	N06AX21	DULOXGAMMA, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK	Woerwag Pharma GmbH & Co. KG	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					75	G43-G43					
					50						
					75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
1670510	duloksetiin, 60mg	N06AX21	ONELAR, gastroresistentne kõvakapsel, 30TK	Medochemie Limited	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					75	G43-G43					
					75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
1694954	duloksetiin, 60mg	N06AX21	DULOXETINE ZENTIVA, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK	Zentiva k.s.	50						
					75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					75	G43-G43					
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1796182	dupilumab, 200mg 1.14ml	D11AH05	DUPIXENT, süstelahus süstlis, 1.14ml 2TK	Sanofi Winthrop Industrie	100	J45-J45	Allergoloog-immunoloog, Pulmonoloog				vähemalt kolmest pulmonoloogist või allergoloog-immunoloogist koosneva eksperdikomisjoni otsusel 2. tüüpi põletikust juhitud astmaga patsiendile, kelle astma on vaatamata eelnevale pikaajalisele kolmikravile (inhaleeritav glükokortikosteroid ja pikatoimeline beeta-2-agonist koos antileukotrieeni või pikatoimelise teofülliinpreparaadi või pikatoimelise antikoliinergilise ainega) puudulikult kontrollitud. Kui 3 kuu möödumisel ravi alustamisest ei ole ekspertkomisjoni hinnangul astma ravi tulemused kliiniliselt oluliselt paranenud, lõpetatakse ravi selle preparaadiga
					100	J32-J33	Allergoloog-immunoloog, Otorinolarüngoloog				vähemalt kolmeliikmelise kõrva-nina-kurguarstidest koosneva eksperdikomisjoni otsuse alusel patsiendile, kellel on raske krooniline rinosinusiit ning ninapolüpooside raviks on viimase 2 aasta jooksul teostatud vähemalt 2 endoskoopilist siinuse operatsiooni või üle kolme endoskoopilise siinuse operatsiooni elu jooksul. Kui 16 nädala möödudes ravi alustamisest ei ole patsiendi NPS skoor vähenenud vähemalt ühe ühiku võrra, siis ravi katkestatakse
					100	L20.8-L20.9	Pediaater, Pediaater allergoloogi lisapädevusega, Allergoloog-immunoloog, Dermatoveneroloog				mõõduka või raske haigusega (EASI>=16, DLQI>=10) patsiendile, kes ei allu süsteemsele konventsionaalsele ravile tsüklosporiiniga 8–12 nädala jooksul või kellele see on vastunäidustatud või põhjustanud talumatuid kõrvaltoimeid

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1796227	dupilumab, 200mg 1.14ml	D11AH05	DUPIXENT, süstelahus pen-süstlis, 1.14ml 2TK	Sanofi Winthrop Industrie	100	J32-J33	Otorinolarüngoloog, Allergoloog-immunoloog				vähemalt kolmeliikmelise kõrva-nina-kurguarstidest koosneva eksperdikomisjoni otsuse alusel patsiendile, kellel on raske krooniline rinosinusiit ning ninapolüpooside raviks on viimase 2 aasta jooksul teostatud vähemalt 2 endoskoopilist siinuse operatsiooni või üle kolme endoskoopilise siinuse operatsiooni elu jooksul. Kui 16 nädala möödudes ravi alustamisest ei ole patsiendi NPS skoor vähenenud vähemalt ühe ühiku võrra, siis ravi katkestatakse
					100	L20.8-L20.9	Pediaater, Pediaater allergoloogi lisapädevusega, Dermatoveneroloog, Allergoloog-immunoloog				mõõduka või raske haigusega (EASI>=16, DLQI>=10) patsiendile, kes ei allu süsteemsele konventsionaalsele ravile tsüklosporiiniga 8–12 nädala jooksul või kellele see on vastunäidustatud või põhjustanud talumatuid kõrvaltoimeid
					100	J45-J45	Pulmonoloog, Allergoloog-immunoloog				vähemalt kolmest pulmonoloogist või allergoloog-immunoloogist koosneva eksperdikomisjoni otsusel 2. tüüpi põletikust juhitud astmaga patsiendile, kelle astma on vaatamata eelnevale pikaajalisele kolmikravile (inhaleeritav glükokortikosteroid ja pikatoimeline beeta-2-agonist koos antileukotrieeni või pikatoimelise teofülliinpreparaadi või pikatoimelise antikoliinergilise ainega) puudulikult kontrollitud. Kui 3 kuu möödumisel ravi alustamisest ei ole ekspertkomisjoni hinnangul astma ravi tulemused kliiniliselt oluliselt paranenud, lõpetatakse ravi selle preparaadiga

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1753938	dupilumab, 300mg 2ml	D11AH05	DUPIXENT, süstelahus süstlis, 2ml 2TK	Sanofi Winthrop Industrie	100	J45-J45	Allergoloog-immunoloog, Pulmonoloog				vähemalt kolmest pulmonoloogist või allergoloog-immunoloogist koosneva eksperdikomisjoni otsusel 2. tüüpi põletikust juhitud astmaga patsiendile, kelle astma on vaatamata eelnevale pikaajalisele kolmikravile (inhaleeritav glükokortikosteroid ja pikatoimeline beeta-2-agonist koos antileukotrieeni või pikatoimelise teofülliinpreparaadi või pikatoimelise antikoliinergilise ainega) puudulikult kontrollitud. Kui 3 kuu möödumisel ravi alustamisest ei ole ekspertkomisjoni hinnangul astma ravi tulemused kliiniliselt oluliselt paranenud, lõpetatakse ravi selle preparaadiga
					100	J32-J33	Allergoloog-immunoloog, Otorinolarüngoloog				vähemalt kolmeliikmelise kõrva-nina-kurguarstidest koosneva eksperdikomisjoni otsuse alusel patsiendile, kellel on raske krooniline rinosinusiit ning ninapolüpooside raviks on viimase 2 aasta jooksul teostatud vähemalt 2 endoskoopilist siinuse operatsiooni või üle kolme endoskoopilise siinuse operatsiooni elu jooksul. Kui 16 nädala möödudes ravi alustamisest ei ole patsiendi NPS skoor vähenenud vähemalt ühe ühiku võrra, siis ravi katkestatakse
					100	L20.8-L20.9	Allergoloog-immunoloog, Dermatoveneroloog, Pediaater allergoloogi lisapädevusega, Pediaater				mõõduka või raske haigusega (EASI>=16, DLQI>=10) patsiendile, kes ei allu süsteemsele konventsionaalsele ravile tsüklosporiiniga 8–12 nädala jooksul või kellele see on vastunäidustatud või põhjustanud talumatuid kõrvaltoimeid

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1818479	dupilumab, 300mg 2ml	D11AH05	DUPIXENT, süstelahus pen-süstlis, 2ml 2TK	Sanofi Winthrop Industrie	100	J45-J45	Pulmonoloog, Allergoloog-immunoloog				vähemalt kolmest pulmonoloogist või allergoloog-immunoloogist koosneva eksperdikomisjoni otsusel 2. tüüpi põletikust juhitud astmaga patsiendile, kelle astma on vaatamata eelnevale pikaajalisele kolmikravile (inhaleeritav glükokortikosteroid ja pikatoimeline beeta-2-agonist koos antileukotrieeni või pikatoimelise teofülliinpreparaadi või pikatoimelise antikoliinergilise ainega) puudulikult kontrollitud. Kui 3 kuu möödumisel ravi alustamisest ei ole ekspertkomisjoni hinnangul astma ravi tulemused kliiniliselt oluliselt paranenud, lõpetatakse ravi selle preparaadiga
					100	J32-J33	Otorinolarüngoloog, Allergoloog-immunoloog				vähemalt kolmeliikmelise kõrva-nina-kurguarstidest koosneva eksperdikomisjoni otsuse alusel patsiendile, kellel on raske krooniline rinosinusiit ning ninapolüpooside raviks on viimase 2 aasta jooksul teostatud vähemalt 2 endoskoopilist siinuse operatsiooni või üle kolme endoskoopilise siinuse operatsiooni elu jooksul. Kui 16 nädala möödudes ravi alustamisest ei ole patsiendi NPS skoor vähenenud vähemalt ühe ühiku võrra, siis ravi katkestatakse
					100	L20.8-L20.9	Pediaater, Pediaater allergoloogi lisapädevusega, Dermatovenerloog, Allergoloog-immunoloog				mõõduka või raske haigusega (EASI>=16, DLQI>=10) patsiendile, kes ei allu süsteemsele konventsionaalsele ravile tsüklosporiiniga 8–12 nädala jooksul või kellele see on vastunäidustatud või põhjustanud talumatuid kõrvaltoimeid
1155440	dutasteriid, 0,5mg	G04CB02	AVODART, pehmekapsel, 30TK	GlaxoSmithKline Trading Services Limited	50						
1539929	dutasteriid, 0,5mg	G04CB02	DUTASTERIDE TEVA, pehmekapsel, 30TK	Teva Pharma B.V.	50						
1787137	dutasteriid, 0,5mg	G04CB02	DUTASTERIDE ELVIM, pehmekapsel, 30TK	SIA Elvim	50						
1886339	dutasteriid, 0,5mg	G04CB02	AVODART, pehmekapsel, 30TK	First Pharma OÜ	50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3017562	dutasteriid, 0,5mg	G04CB02	AVODART, pehmekapsel, 30TK	Ideal Trade Links UAB	50						
1054752	düdrogesteroon, 10mg	G03DB01	DUPHASTON, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	MagnaPharm SK s.r.o.	50						
					100	E89.4-E89.4, E28.3-E28.3, E23.0-E23.0, Q96-Q97	Endokrinoloog, Günekoloog, Pediaater endokrinoloogi lisapädevusega	esmane		50,00	haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient on alla 50. eluaasta vana
1013803	düdrogesteroon+östradiool, 0+1mg/10mg+1mg	G03FB08	FEMOSTON, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK / 14TK	MagnaPharm SK s.r.o.	50						
					100	E89.4-E89.4, E28.3-E28.3, E23.0-E23.0, Q96-Q97	Günekoloog, Pediaater endokrinoloogi lisapädevusega, Endokrinoloog	esmane		50,00	haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient on alla 50. eluaasta vana
1375332	düdrogesteroon+östradiool, 2,5mg+0,5mg	G03FA14	FEMOSTON CONTI 0,5 MG/2,5 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	MagnaPharm SK s.r.o.	50						
					100	E89.4-E89.4, E28.3-E28.3, E23.0-E23.0, Q96-Q97	Pediaater endokrinoloogi lisapädevusega, Günekoloog, Endokrinoloog	esmane		50,00	haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient on alla 50. eluaasta vana
1082528	düdrogesteroon+östradiool, 5mg+1mg	G03FA14	FEMOSTON CONTI, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	MagnaPharm SK s.r.o.	100	E89.4-E89.4, E28.3-E28.3, E23.0-E23.0, Q96-Q97	Günekoloog, Pediaater endokrinoloogi lisapädevusega, Endokrinoloog	esmane		50,00	haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient on alla 50. eluaasta vana
					50						
1077937	ebastiin, 20mg	R06AX22	KESTINE, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Almirall S.A.	50						
1691546	edoksabaan, 30mg	B01AF03	LIXIANA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Daiichi Sankyo Europe GmbH	100	I26-I26, I67.6-I67.6, I80-I82					kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
					75	I48-I48, I67.6-I67.6, I80-I82, I26-I26					
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3031085	edoksabaan, 30mg	B01AF03	EDOXABAN STADA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Stada Arzneimittel AG	100	I80-I82, I26-I26, I67.6-I67.6					kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
					75	I48-I48, I67.6-I67.6, I80-I82, I26-I26					
					50						
3032222	edoksabaan, 30mg	B01AF03	EDOXABAN OLPHA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Olpha AS	50						
					100	I26-I26, I67.6-I67.6, I80-I82					kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
					75	I48-I48, I67.6-I67.6, I80-I82, I26-I26					
3034695	edoksabaan, 30mg	B01AF03	EDOFLUSIO, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	I48-I48, I67.6-I67.6, I80-I82, I26-I26					
					50						
					100	I26-I26, I67.6-I67.6, I80-I82					kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
3046430	edoksabaan, 30mg	B01AF03	EDOXABAN ZENTIVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Zentiva k.s.	50						
					100	I80-I82, I26-I26, I67.6-I67.6					kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
					75	I48-I48, I67.6-I67.6, I80-I82, I26-I26					
3054541	edoksabaan, 30mg	B01AF03	EDOXABAN TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva GmbH	50						
					75	I48-I48, I67.6-I67.6, I80-I82, I26-I26					
					100	I80-I82, I26-I26, I67.6-I67.6					kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3063765	edoksabaan, 30mg	B01AF03	EDOXABAN TAD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	TAD Pharma GmbH	75	I48-I48, I67.6-I67.6, I80-I82, I26-I26					
					50						
					100	I80-I82, I26-I26, I67.6-I67.6					kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
1691658	edoksabaan, 60mg	B01AF03	LIXIANA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Daiichi Sankyo Europe GmbH	75	I48-I48, I67.6-I67.6, I80-I82, I26-I26					
					100	I80-I82, I26-I26, I67.6-I67.6					kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
					50						
3031209	edoksabaan, 60mg	B01AF03	EDOXABAN STADA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Stada Arzneimittel AG	75	I48-I48, I67.6-I67.6, I80-I82, I26-I26					
					100	I80-I82, I26-I26, I67.6-I67.6					kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
					50						
3032389	edoksabaan, 60mg	B01AF03	EDOXABAN OLPHA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Olpha AS	75	I48-I48, I67.6-I67.6, I80-I82, I26-I26					
					100	I80-I82, I26-I26, I67.6-I67.6					kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
					50						
3034550	edoksabaan, 60mg	B01AF03	EDOFLUSIO, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	100	I26-I26, I67.6-I67.6, I80-I82					kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
					75	I48-I48, I67.6-I67.6, I80-I82, I26-I26					
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3046485	edoksabaan, 60mg	B01AF03	EDOXABAN ZENTIVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Zentiva k.s.	75	I48-I48, I67.6-I67.6, I80-I82, I26-I26					
					100	I80-I82, I26-I26, I67.6-I67.6					kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
					50						
3054675	edoksabaan, 60mg	B01AF03	EDOXABAN TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva GmbH	100	I80-I82, I26-I26, I67.6-I67.6					kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
					75	I48-I48, I67.6-I67.6, I80-I82, I26-I26					
					50						
3064069	edoksabaan, 60mg	B01AF03	EDOXABAN TAD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	TAD Pharma GmbH	50						
					75	I48-I48, I67.6-I67.6, I80-I82, I26-I26					
					100	I80-I82, I26-I26, I67.6-I67.6					kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
1020373	ekonasool, 150mg	G01AF05	GYNO-PEVARYL, vaginaalsuposiit, 3TK	Karo Pharma AB	50						
1039036	ekonasool, 50mg	G01AF05	GYNO-PEVARYL, vaginaalsuposiit, 15TK	Karo Pharma AB	50						
1011148	eksemestaan, 25mg	L02BG06	AROMASIN, kaetud tablett, 30TK	Pfizer Europe MA EEIG	50						
					100	C50-C50	Üldkirurg, Onkoloog, Günekoloog				günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks
1392780	eksemestaan, 25mg	L02BG06	ESCEPRAN, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	KRKA d.d. Novo mesto	50						
					100	C50-C50	Üldkirurg, Günekoloog, Onkoloog				günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks
1392960	eksemestaan, 25mg	L02BG06	EXEMESTANE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					100	C50-C50	Günekoloog, Üldkirurg, Onkoloog				günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1423134	eksemestaan, 25mg	L02BG06	EXEMESTANE ZENTIVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Zentiva k.s.	100	C50-C50	Üldkirurg, Günekoloog, Onkoloog				günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks
					50						
1453632	eksemestaan, 25mg	L02BG06	EXEMESTANE SANOSWISS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Sanoswiss UAB	50						
					100	C50-C50	Günekoloog, Onkoloog, Üldkirurg				günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks
1725870	elbasviir+grasoprevir, 50mg+100mg	J05AP54	ZEPATIER, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Merck Sharp & Dohme B.V.	100	B18.2-B18.2	Gastroenteroloog, Infektsionist				1. ja 4. genotüübi kroonilise progresseeruva C-viirushepatiidi raviks
1462003	eltrombopaag, 25mg	B02BX05	REVOLADE, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Novartis Europharm Limited	100	D69.4-D69.4					patsientidele, kelle ravi alustamine on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele - muu suukaudne ravi (kortikosteroidi, immuunsupressandiga) on osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud, splenektoomia on osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud (sh splenektoomia ettevalmistamiseks, kui intravenoosne immuunglobuliin ei ole piisavalt tõhus) ning esineb trombotsütopeenia <20 000/µl
3011386	eltrombopaag, 25mg	B02BX05	ELTROMBOPAG ZENTIVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Zentiva k.s.	100	D69.4-D69.4					patsientidele, kelle ravi alustamine on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele - muu suukaudne ravi (kortikosteroidi, immuunsupressandiga) on osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud, splenektoomia on osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud (sh splenektoomia ettevalmistamiseks, kui intravenoosne immuunglobuliin ei ole piisavalt tõhus) ning esineb trombotsütopeenia <20 000/µl
3011601	eltrombopaag, 25mg	B02BX05	ELTROMBOPAG OLPHA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Olpha AS	100	D69.4-D69.4					patsientidele, kelle ravi alustamine on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele - muu suukaudne ravi (kortikosteroidi, immuunsupressandiga) on osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud, splenektoomia on osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud (sh splenektoomia ettevalmistamiseks, kui intravenoosne immuunglobuliin ei ole piisavalt tõhus) ning esineb trombotsütopeenia <20 000/µl

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3018990	eltrombopaag, 25mg	B02BX05	ELTROMBOPAG KRKA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	100	D69.4-D69.4					patsientidele, kelle ravi alustamine on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele - muu suukaudne ravi (kortikosteroidi, immuunsupressandiga) on osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud, splenektoomia on osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud (sh splenektoomia ettevalmistamiseks, kui intravenoosne immuunglobuliin ei ole piisavalt tõhus) ning esineb trombotsütopeenia <20 000/µl
3031782	eltrombopaag, 25mg	B02BX05	ELTROMBOPAG STADA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Stada Arzneimittel AG	100	D69.4-D69.4					patsientidele, kelle ravi alustamine on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele - muu suukaudne ravi (kortikosteroidi, immuunsupressandiga) on osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud, splenektoomia on osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud (sh splenektoomia ettevalmistamiseks, kui intravenoosne immuunglobuliin ei ole piisavalt tõhus) ning esineb trombotsütopeenia <20 000/µl
3040513	eltrombopaag, 25mg	B02BX05	ELTROMBOPAG TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Teva GmbH	100	D69.4-D69.4					patsientidele, kelle ravi alustamine on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele - muu suukaudne ravi (kortikosteroidi, immuunsupressandiga) on osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud, splenektoomia on osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud (sh splenektoomia ettevalmistamiseks, kui intravenoosne immuunglobuliin ei ole piisavalt tõhus) ning esineb trombotsütopeenia <20 000/µl
3116966	eltrombopaag, 25mg	B02BX05	ELTROMBOPAG ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	D69.4-D69.4					patsientidele, kelle ravi alustamine on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele - muu suukaudne ravi (kortikosteroidi, immuunsupressandiga) on osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud, splenektoomia on osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud (sh splenektoomia ettevalmistamiseks, kui intravenoosne immuunglobuliin ei ole piisavalt tõhus) ning esineb trombotsütopeenia <20 000/µl

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1765795	emitsizumab, 105mg 0.7ml	B02BX06	HEMLIBRA, süstelahus, 0.7ml 1TK	Roche Registration GmbH	100	D66-D66	Pediaater, Hematoloog, Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega				hüübimisfaktori inhibiitorite esinemise korral
					100	D66-D66	Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega, Hematoloog, Pediaater				verejooksu episoodide ennetamiseks raske ja mõõduka A-hemofiiliaga patsientide (VIII faktori tase <5% normiväärtusest) järgnevatele rühmadele, kui neil eelneva parima võimaliku profülaktilise raviga ei ole saavutatud piisavalt head kontrolli veritsuste osas (ABR>=3): lapsed ja alla 19-aastased noorukid kellel on raskendatud veenisiseste süstete teostamine ja probleemse veeniteega täiskasvanud (kellel veenisisene ravi on võimalik vaid meditsiinipersonali poolt teostatult)
1765807	emitsizumab, 150mg 1ml	B02BX06	HEMLIBRA, süstelahus, 1ml 1TK	Roche Registration GmbH	100	D66-D66	Hematoloog, Pediaater, Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega				hüübimisfaktori inhibiitorite esinemise korral
					100	D66-D66	Pediaater, Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega, Hematoloog				verejooksu episoodide ennetamiseks raske ja mõõduka A-hemofiiliaga patsientide (VIII faktori tase <5% normiväärtusest) järgnevatele rühmadele, kui neil eelneva parima võimaliku profülaktilise raviga ei ole saavutatud piisavalt head kontrolli veritsuste osas (ABR>=3): lapsed ja alla 19-aastased noorukid kellel on raskendatud veenisiseste süstete teostamine ja probleemse veeniteega täiskasvanud (kellel veenisisene ravi on võimalik vaid meditsiinipersonali poolt teostatult)
1765773	emitsizumab, 30mg 1ml	B02BX06	HEMLIBRA, süstelahus, 1ml 1TK	Roche Registration GmbH	100	D66-D66	Hematoloog, Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega, Pediaater				verejooksu episoodide ennetamiseks raske ja mõõduka A-hemofiiliaga patsientide (VIII faktori tase <5% normiväärtusest) järgnevatele rühmadele, kui neil eelneva parima võimaliku profülaktilise raviga ei ole saavutatud piisavalt head kontrolli veritsuste osas (ABR>=3): lapsed ja alla 19-aastased noorukid kellel on raskendatud veenisiseste süstete teostamine ja probleemse veeniteega täiskasvanud (kellel veenisisene ravi on võimalik vaid meditsiinipersonali poolt teostatult)

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1765784	emitsizumab, 60mg 0.4ml	B02BX06	HEMLIBRA, süstelahus, 0.4ml 1TK	Roche Registration GmbH	100	D66-D66	Hematoloog, Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega, Pediaater				hüübimisfaktori inhibiitorite esinemise korral
					100	D66-D66	Hematoloog, Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega, Pediaater				verejooksu episoodide ennetamiseks raske ja mõõduka A-hemofiiliaga patsientide (VIII faktori tase <5% normiväärtusest) järgnevatele rühmadele, kui neil eelneva parima võimaliku profülaktilise raviga ei ole saavutatud piisavalt head kontrolli veritsuste osas (ABR>=3): lapsed ja alla 19-aastased noorukid kellel on raskendatud veenisiseste süstete teostamine ja probleemse veeniteega täiskasvanud (kellel veenisisene ravi on võimalik vaid meditsiinipersonali poolt teostatult)
1649000	empagliflosiin, 10mg	A10BK03	JARDIANCE, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks või monoraviks, kui metformiin on vastunäidustatud või kaasuvana esineb sümptomaatiline südamepuudulikkus või krooniline neeruhaigus
					75	N18-N18					lisatuna standardravile (AKE- inhibiitor või ARB) või standardravi vastunäidustuse korral monoteraapiana
					75	I50-I50					patsiendile, kes kuulub NYHA II-IV funktsionaalklassi, kellel ravikoostöö on hea ning kellel AKE-inhibiitor või ARB ja beetablokaatori kaksikravil südamepuudulikkuse sümptomid endiselt püsivad või süvenevad
					50						
1649134	empagliflosiin, 25mg	A10BK03	JARDIANCE, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	75	I50-I50					patsiendile, kes kuulub NYHA II-IV funktsionaalklassi, kellel ravikoostöö on hea ning kellel AKE-inhibiitor või ARB ja beetablokaatori kaksikravil südamepuudulikkuse sümptomid endiselt püsivad või süvenevad
					50						
					75	N18-N18					lisatuna standardravile (AKE- inhibiitor või ARB) või standardravi vastunäidustuse korral monoteraapiana
					75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks või monoraviks, kui metformiin on vastunäidustatud või kaasuvana esineb sümptomaatiline südamepuudulikkus või krooniline neeruhaigus

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1010620	enalapriil, 10mg	C09AA02	ENAHEXAL 10 MG, tablett, 30TK	Hexal AG	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1013599	enalapriil, 10mg	C09AA02	BERLIPRIL 10 MG, tablett, 30TK	Berlin-Chemie AG	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1133929	enalapriil, 10mg	C09AA02	ENAP, tablett, 60TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1359974	enalapriil, 10mg	C09AA02	ENALAPRIL VITABALANS, tablett, 30TK	Vitabalans Oy	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1360011	enalapriil, 10mg	C09AA02	ENALAPRIL VITABALANS, tablett, 100TK	Vitabalans Oy	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1010631	enalapriil, 20mg	C09AA02	ENAHEXAL 20 MG, tablett, 30TK	Hexal AG	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1013601	enalapriil, 20mg	C09AA02	BERLIPRIL 20 MG, tablett, 30TK	Berlin-Chemie AG	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1133952	enalapriil, 20mg	C09AA02	ENAP, tablett, 60TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1360033	enalapriil, 20mg	C09AA02	ENALAPRIL VITABALANS, tablett, 30TK	Vitabalans Oy	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1360077	enalapriil, 20mg	C09AA02	ENALAPRIL VITABALANS, tablett, 100TK	Vitabalans Oy	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
3022119	enalapriil, 20mg	C09AA02	ENAP, tablett, 60TK	Ideal Trade Links UAB	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1074080	enalapriil, 5mg	C09AA02	BERLIPRIL 5 MG, tablett, 50TK	Berlin-Chemie AG	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1133895	enalapriil, 5mg	C09AA02	ENAP, tablett, 60TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1359918	enalapriil, 5mg	C09AA02	ENALAPRIL VITABALANS, tablett, 30TK	Vitabalans Oy	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1359952	enalapriil, 5mg	C09AA02	ENALAPRIL VITABALANS, tablett, 100TK	Vitabalans Oy	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
3022041	enalapriil, 5mg	C09AA02	ENAP, tablett, 60TK	Ideal Trade Links UAB	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1147564	enalapriil+hüdroklorotiasiid, 10mg+12,5mg	C09BA81	ENAP-HL, tablett, 30TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1147575	enalapriil+hüdroklorotiasiid, 10mg+12,5mg	C09BA81	ENAP-HL, tablett, 60TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1147597	enalapriil+hüdroklorotiasiid, 10mg+25mg	C09BA81	ENAP-H, tablett, 30TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1147609	enalapriil+hüdroklorotiasiid, 10mg+25mg	C09BA81	ENAP-H, tablett, 60TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1074888	enalapriil+hüdroklorotiasiid, 20mg+12,5mg	C09BA81	CO-RENITEC, tablett, 28TK	Organon N.V.	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1129159	enalapriil+hüdroklorotiasiid, 20mg+12,5mg	C09BA81	ENAHEXAL COMP 20 MG/12,5 MG, tablett, 30TK	Hexal AG	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1151389	enalapriil+hüdroklorotiasiid, 20mg+12,5mg	C09BA81	ENAP-HL, tablett, 30TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1780253	enkorafeniib, 50mg	L01EC03	BRAFTOVI, kõvakapsel, 28TK	Pierre Fabre Medicament	100	C43-C43	Onkoloog				konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) otsuse alusel BRAF V600 mutatsiooniga kaugelearenenud mitteresetseeritava või metastaatilise (IIIc-IVst) melanoomi raviks juhul, kui patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1 ja 3- kuulise intervalliga hinnatuna püsib haigus vähemalt stabiilsena (KT- või/ja muu asjakohase uuringu alusel hinnatuna haiguse progressiooni ei esine) ning kes ei ole saanud varasemalt ravi BRAF/MEK inhibiitoriga, välja arvatud patsiendid, kellel on esinenud ravi katkestamiseni viivad kõrvaltoimed ning samal ajal puudub haiguse radioloogiline progressioon
1780275	enkorafeniib, 75mg	L01EC03	BRAFTOVI, kõvakapsel, 42TK	Pierre Fabre Medicament	100	C18-C20	Onkoloog				II ravireas kombinatsioonis tsetuksimabiga metastaatilise kolorektaalvähiga patsientidele, kellel on kindlaks määratud BRAF-V600E mutatsioon ning kes on varasemalt saanud ühte süsteemset ravi. Ravi kestab kuni haiguse progresseerumiseni ja/või vastuvõetamatu toksilisuse tekkimiseni ning ravi lõpetamisel enkorafeniibiga, tuleb ravi tsetuksimabiga lõpetada
					100	C43-C43	Onkoloog				konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) otsuse alusel BRAF V600 mutatsiooniga kaugelearenenud mitteresetseeritava või metastaatilise (IIIc-IVst) melanoomi raviks juhul, kui patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1 ja 3- kuulise intervalliga hinnatuna püsib haigus vähemalt stabiilsena (KT- või/ja muu asjakohase uuringu alusel hinnatuna haiguse progressiooni ei esine) ning kes ei ole saanud varasemalt ravi BRAF/MEK inhibiitoriga, välja arvatud patsiendid, kellel on esinenud ravi katkestamiseni viivad kõrvaltoimed ning samal ajal puudub haiguse radioloogiline progressioon

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1619175	ensalutamiid, 40mg	L02BB04	XTANDI, pehmekapsel, 112TK	Astellas Pharma Europe B.V.	100	C61-C61	Onkoloog, Uroloog				metastaatilise kastratsioonresistentse eesnäärmevähi raviks patsientidele, kes ei ole enne haiguse metastaseerumist saanud ravi teise põlvkonna androgeeniretseptori inhibiitoriga, kes on asümptomaatilised või kergelt sümptomaatilised peale ebaõnnestunud androgeenide deprivatsioonravi, ning kellel kemoteraapia ei ole veel kliiniliselt näidustatud või heas üldseisundis (ECOG 0-1 või valusündroomist tingitud ECOG 2) patsientidele, kelle haigus on eelneva dotsetakseeli sisaldava kemoteraapia vältel või pärast seda progresseerunud. Ravimi kasutamisele ei või eelneda metastaatilise haiguse ravi apalutamiidi, ensalutamiidiga või abirateroniga varasemas ravireas, kuid lubatud on ravimi vahetus talumatute kõrvaltoimete ilmnemisel. Soodustus kehtib patsientidele, kelle ravi ensalutamiidi sisaldava ravimpreparaadiga on välja kirjutatud enne 01.04.2023
1247509	entekaviir, 0,5mg	J05AF10	BARACLUDE, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG	100	B18.0-B18.1	Infektsionist, Gastroenteroloog				kroonilise progresseeruva kuluga B-viirushepatiidi raviks
1753882	entekaviir, 0,5mg	J05AF10	ENTECAVIR ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	B18.0-B18.1	Gastroenteroloog, Infektsionist				kroonilise progresseeruva kuluga B-viirushepatiidi raviks
1247510	entekaviir, 1mg	J05AF10	BARACLUDE, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG	100	B18.0-B18.1	Infektsionist, Gastroenteroloog				kroonilise progresseeruva kuluga B-viirushepatiidi raviks
1753905	entekaviir, 1mg	J05AF10	ENTECAVIR ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	B18.0-B18.1	Infektsionist, Gastroenteroloog				kroonilise progresseeruva kuluga B-viirushepatiidi raviks
1588844	epinefriin (adrenaliin), 150mcg 0.3ml	C01CA24	EPIPEN, süstelahus pen-süstlis, 2ml 1TK	VIATRIS HEALTHCARE Limited	100	T88.6-T88.6, T78.0-T78.0, T88.2-T88.2, T80.5-T80.6, T78.2-T78.3, L50.0-L50.0					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1588866	epinefriin (adrenaliin), 300mcg 0.3ml	C01CA24	EPIPEN, süstelahus pen-süstlis, 2ml 1TK	VIATRIS HEALTHCARE Limited	100	T88.6-T88.6, T78.0-T78.0, T88.2-T88.2, T80.5-T80.6, T78.2-T78.3, L50.0-L50.0					
7017667	eritoitesegu,		COMIDA PKU C Formula, pulber, 500g N1	Vitaflo International Ltd.	50						
					100	E70.0-E70.1					
7017656	eritoitesegu,		COMIDA PKU C Formula Orange, pulber, 500g N1	Vitaflo International Ltd.	100	E70.0-E70.1					
					50						
7004911	eritoitesegu,		Lipistart , suukaudse lahuse pulber, 400 g	Vitaflo	100	E71.3-E71.3					ravimi väljakirjutamise õigus pika ahelaga rasvhapete beetaoksüdatsiooni defektide korral
7004955	eritoitesegu,		MONOGEN, pulber, 400g	Nutricia Ltd	100	E71.3-E71.3					ravimi väljakirjutamise õigus pika ahelaga rasvhapete beetaoksüdatsiooni defektide korral
7017960	eritoitesegu,		Neocate Syneo, pulber, 400g N6	Nutrimedical OÜ	75	K52.2-K52.2, L27.2-L27.2, L50-L50, T78.1-T78.1, K22.8-K22.8, K90.4-K90.4, T78.2-T78.2, L20.8-L20.8, T78.0-T78.0				1,00	
1205435	erütropoetiin, 10000RÜ 0.6ml	B03XA01	NEORECORMON, süstelahus süstlis, 0.6ml 6TK	Roche Registration GmbH	100	D46-D46, D47.1-D47.1	Hematoloog				
					100	D63-D63, T86-T86	Uroloog, Pediaater, Nefroloog, Pediaater nefroloogi lisapädevusega				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3133707	erütropoetiin, 10000RÜ 0.6ml	B03XA01	NEORECORMON, süstelahus süstlis, 0.6ml 6TK	Roche Registration GmbH	100	D46-D46, D47.1-D47.1	Hematoloog				
					50						
					100	D63-D63, T86-T86	Pediaater, Pediaater nefroloogi lisapädevusega, Nefroloog, Uroloog				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
1422335	esetimiib, 10mg	C10AX09	EZOLETA, tablett, 28TK	KRKA, d.d., Novo mesto	100	N18-N18					alates III staadiumist kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	I11-I12					raske südame või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					50						
					75	I70.2-I70.2, Z45-Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95					
					75	E13-E14, E10-E11					kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust;

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1681174	esetimiib, 10mg	C10AX09	EZETIMIBE ACCORD, tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	75	I70.2-I70.2, Z45-Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95					
					75	I11-I12					raske südame või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					50						
					75	E13-E14, E10-E11					kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust;
					100	N18-N18					alates III staadiumist kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
1815926	esetimiib, 10mg	C10AX09	EZETIMIBE ELVIM, tablett, 28TK	SIA Elvim	75	I11-I12					raske südame või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					50						
					100	N18-N18					alates III staadiumist kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	E13-E14, E10-E11					kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust;
					75	I70.2-I70.2, Z45-Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1818323	esetimiib, 10mg	C10AX09	EZOLETA, tablett, 30TK	First Pharma OÜ	75	I70.2-I70.2, Z45-Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95					
					75	E13-E14, E10-E11					kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust;
					50						
					100	N18-N18					alates III staadiumist kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	I11-I12					raske südame või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
1818356	esetimiib, 10mg	C10AX09	EZOLETA, tablett, 60TK	First Pharma OÜ	50						
					75	E13-E14, E10-E11					kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust;
					75	I25-I25, I70.2-I70.2, I65-I65, Z95-Z95, I63-I63, I21-I22, Z45-Z45					
					75	I11-I12					raske südame või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					100	N18-N18					alates III staadiumist kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1861714	esetimiib, 10mg	C10AX09	EZOLETA, tablett, 30TK	Ideal Trade Links UAB	75	I11-I12					raske südame või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					50						
					75	E13-E14, E10-E11					kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust;
					75	I70.2-I70.2, Z45-Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95					
					100	N18-N18					alates III staadiumist kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
1861747	esetimiib, 10mg	C10AX09	EZOLETA, tablett, 60TK	Ideal Trade Links UAB	50						
					75	I11-I12					raske südame või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	I70.2-I70.2, Z45-Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95					
					100	N18-N18					alates III staadiumist kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	E13-E14, E10-E11					kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust;

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1862704	esetimiib, 10mg	C10AX09	EZOLETA, tablett, 30TK	Lex Ano UAB	75	I70.2-I70.2, Z45-Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95					
					75	E13-E14, E10-E11					kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust;
					75	I11-I12					raske südame või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					100	N18-N18					alates III staadiumist kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					50						
1087949	esomeprasool, 20mg	A02BC05	NEXIUM, gastroresistentne tablett, 14TK	Gruenenthal GmbH	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1087950	esomeprasool, 20mg	A02BC05	NEXIUM, gastroresistentne tablett, 28TK	Gruenenthal GmbH	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1337891	esomeprasool, 20mg	A02BC05	NEXMEZOL 20 MG, gastroresistentne tablett, 28TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1337914	esomeprasool, 20mg	A02BC05	NEXMEZOL 20 MG, gastroresistentne tablett, 56TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
1396009	esomeprasool, 20mg	A02BC05	ESCADRA, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1396032	esomeprasool, 20mg	A02BC05	ESCADRA, gastroresistentne kõvakapsel, 56TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1542338	esomeprasool, 20mg	A02BC05	ESOMEPRAZOLE ACTAVIS, gastroresistentne tablett, 28TK	Teva B.V.	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1830574	esomeprasool, 20mg	A02BC05	NEXIUM, gastroresistentne tablett, 28TK	Lex Ano UAB	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
1892268	esomeprasool, 20mg	A02BC05	NEXIUM, gastroresistentne tablett, 28TK	Ideal Trade Links UAB	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
3077210	esomeprasool, 20mg	A02BC05	ESOMEPRAZOLE SANDOZ, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
3077232	esomeprasool, 20mg	A02BC05	ESOMEPRAZOLE SANDOZ, gastroresistentne kõvakapsel, 56TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1087972	esomeprasool, 40mg	A02BC05	NEXIUM, gastroresistentne tablett, 14TK	Gruenenthal GmbH	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1087983	esomeprasool, 40mg	A02BC05	NEXIUM, gastroresistentne tablett, 28TK	Gruenenthal GmbH	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
1337981	esomeprasool, 40mg	A02BC05	NEXMEZOL 40 MG, gastroresistentne tablett, 14TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
1338005	esomeprasool, 40mg	A02BC05	NEXMEZOL 40 MG, gastroresistentne tablett, 28TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
1338027	esomeprasool, 40mg	A02BC05	NEXMEZOL 40 MG, gastroresistentne tablett, 56TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1396111	esomeprasool, 40mg	A02BC05	ESCADRA, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1396144	esomeprasool, 40mg	A02BC05	ESCADRA, gastroresistentne kõvakapsel, 56TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
1542462	esomeprasool, 40mg	A02BC05	ESOMEPRAZOLE ACTAVIS, gastroresistentne tablett, 28TK	Teva B.V.	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1885215	esomeprasool, 40mg	A02BC05	NEXIUM, gastroresistentne tablett, 28TK	Lex Ano UAB	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1888049	esomeprasool, 40mg	A02BC05	ESCADRA, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK	Lex Ano UAB	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1892303	esomeprasool, 40mg	A02BC05	NEXIUM, gastroresistentne tablett, 28TK	Ideal Trade Links UAB	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
3077445	esomeprasool, 40mg	A02BC05	ESOMEPRAZOLE SANDOZ, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
3077467	esomeprasool, 40mg	A02BC05	ESOMEPRAZOLE SANDOZ, gastroresistentne kõvakapsel, 56TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1325023	estsitalopraam, 10mg	N06AB10	ESCITALOPRAM ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Teva B.V.	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
1331648	estsitalopraam, 10mg	N06AB10	ESCITALOPRAM TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Teva Pharma B.V.	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1400218	estsitalopraam, 10mg	N06AB10	ELICEA 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1484018	estsitalopraam, 10mg	N06AB10	CIRASET 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
1488540	estsitalopraam, 10mg	N06AB10	ESCITALOPRAM ACCORD 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
1543137	estsitalopraam, 10mg	N06AB10	ESTAN, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Medochemie Limited	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1559987	estsitalopraam, 10mg	N06AB10	ELICEA Q-TAB 10MG, suus dispergeeruv tablett, 28TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1869644	estsitalopraam, 10mg	N06AB10	ESCITALOPRAM GRINDEKS, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Grindeks AS	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
1325225	estsitalopraam, 20mg	N06AB10	ESCITALOPRAM ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Teva B.V.	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
1331907	estsitalopraam, 20mg	N06AB10	ESCITALOPRAM TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Teva Pharma B.V.	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
1400320	estsitalopraam, 20mg	N06AB10	ELICEA 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1488595	estsitalopraam, 20mg	N06AB10	ESCITALOPRAM ACCORD 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1560046	estsitalopraam, 20mg	N06AB10	ELICEA Q-TAB 20MG, suus dispergeeruv tablett, 28TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1869699	estsitalopraam, 20mg	N06AB10	ESCITALOPRAM GRINDEKS, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Grindeks AS	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1011665	etanertsept, 25mg	L04AB01	ENBREL, süstelahuse pulber ja lahusti, 4TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	M05-M05, M08-M08, M06-M06	Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks
					100	M08-M08	Pediaater, Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav
					100	M45-M45, M46-M46	Pediaater, Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.
					100	M07.0-M07.3	Pediaater, Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.
					100	L40-L40	Dermatovenerol oog, Pediaater				haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor >=10 ja/või DLQI>=10 ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas)

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1265600	etanertsept, 25mg	L04AB01	ENBREL, süstelahus süstlis, 4TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	L40-L40	Dermatovenerloog, Pediaater				haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor >=10 ja/või DLQI>=10 ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas)
					100	M07.0-M07.3	Reumatoloog, Pediaater, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.
					100	M05-M05, M08-M08, M06-M06	Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks
					100	M45-M45, M46-M46	Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.
					100	M08-M08	Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1748482	etanertsept, 25mg	L04AB01	ERELZI, süstelahus süstlis, 4TK	Sandoz GmbH	100	M45-M45, M07.0-M07.3, M46-M46	Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.
					100	L40-L40	Pediaater, Dermatovenerol oog				haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor >=10 ja/või DLQI>=10 ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas)
					100	M05-M05, M08-M08, M06-M06	Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks
					100	M08-M08	Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1265644	etanertsept, 50mg	L04AB01	ENBREL, süstelahus süstlis, 4TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	M07.0-M07.3, M45-M45, M46-M46	Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.
					100	L40-L40	Pediaater, Dermatovenerol oog				haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor >=10 ja/või DLQI>=10 ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas)
					100	M05-M05, M08-M08, M06-M06	Pediaater, Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks
					100	M08-M08	Pediaater, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1460191	etanertsept, 50mg	L04AB01	ENBREL, süstelahus pen-süstlis, 4TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	M05-M05, M08-M08, M06-M06	Pediaater, Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks
					100	M08-M08	Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav
					100	M07.0-M07.3, M45-M45, M46-M46	Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.
					100	L40-L40	Pediaater, Dermatovenerol oog				haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor >=10 ja/või DLQI>=10 ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas)

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1708680	etanertsept, 50mg	L04AB01	BENEPALI, süstelahus pen-süstlis, 4TK	Samsung Bioepis NL B.V.	100	M05-M05, M08-M08, M06-M06	Pediaater, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks
					100	M07.0-M07.3, M45-M45, M46-M46	Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.
					100	L40-L40	Pediaater, Dermatovenerol oog				haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor >=10 ja/või DLQI>=10 ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas)
					100	M08-M08	Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1748527	etanertsept, 50mg	L04AB01	ERELZI, süstelahus süstlis, 4TK	Sandoz GmbH	100	M08-M08	Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav
					100	M45-M45, M07.0-M07.3, M46-M46	Pediaater, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.
					100	M05-M05, M08-M08, M06-M06	Pediaater, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks
					100	L40-L40	Pediaater, Dermatovenerol oog				haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor >=10 ja/või DLQI>=10 ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas)

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1748561	etanertsept, 50mg	L04AB01	ERELZI, süstelahus pen-süstlis, 4TK	Sandoz GmbH	100	M05-M05, M08-M08, M06-M06	Pediaater, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks
					100	L40-L40	Dermatovenerol oog, Pediaater				haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor >=10 ja/või DLQI>=10 ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas)
					100	M08-M08	Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav
					100	M07.0-M07.3, M45-M45, M46-M46	Pediaater, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.
1589171	etonogestreel, 68mg	G03AC08	NEXPLANON, implantaat, 1TK	Organon N.V.	50						
1138621	etonogestreel+etünüülöstradiool, 120mcg+15mcg 24h	G02BB01	NUVARING, vaginaalravivahend, 1TK	Organon N.V.	50						
1712584	etonogestreel+etünüülöstradiool, 120mcg+15mcg 24h	G02BB01	SETLONA, vaginaalravivahend, 1TK	Exeltis Baltics UAB	50						
3103793	etoposiid, 100mg	L01CB01	VEPESID, pehmekapsel, 10TK	Ideal Trade Links UAB	100	C00-D48	Onkoloog, Hematoloog				
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1085352	etorikoksiib, 120mg	M01AH05	ARCOXIA, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Organon N.V.	50						
1653252	etorikoksiib, 120mg	M01AH05	ETORICOXIB ZENTIVA 120 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Zentiva k.s.	50						
1658369	etorikoksiib, 120mg	M01AH05	ETORICOXIB TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Teva B.V.	50						
1699577	etorikoksiib, 120mg	M01AH05	ETOXIB, õhukese polümeerikattega tablett, 7TK	KRKA d.d. Novo mesto	50						
1699588	etorikoksiib, 120mg	M01AH05	ETOXIB, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	KRKA d.d. Novo mesto	50						
1751385	etorikoksiib, 120mg	M01AH05	ETIDYLAN, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	G.L. Pharma GmbH	50						
1085318	etorikoksiib, 60mg	M01AH05	ARCOXIA, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Organon N.V.	50						
1652824	etorikoksiib, 60mg	M01AH05	ETORICOXIB ZENTIVA 60 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Zentiva k.s.	50						
1699342	etorikoksiib, 60mg	M01AH05	ETOXIB, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	KRKA d.d. Novo mesto	50						
1085330	etorikoksiib, 90mg	M01AH05	ARCOXIA, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Organon N.V.	50						
1653184	etorikoksiib, 90mg	M01AH05	ETORICOXIB ZENTIVA 90 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Zentiva k.s.	50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1658279	etorikoksiib, 90mg	M01AH05	ETORICOXIB TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Teva B.V.	50						
1699454	etorikoksiib, 90mg	M01AH05	ETOXIB, õhukese polümeerikattega tablett, 7TK	KRKA d.d. Novo mesto	50						
1699465	etorikoksiib, 90mg	M01AH05	ETOXIB, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	KRKA d.d. Novo mesto	50						
1751251	etorikoksiib, 90mg	M01AH05	ETIDYLAN, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	G.L. Pharma GmbH	50						
1433315	everoliimus, 10mg	L01EG02	AFINITOR, tablett, 30TK	Novartis Europharm Limited	100	C78-C78, C25-C25, C34-C34, C16-C20	Onkoloog				patsientidele, kellel ravi alustamise näidustatus everoliimusega on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud kaugelearenenud kõrgelt diferentseerunud (täielikult) mitteresetseeritav progresseeruva kuluga seedetraktist, kopsust või pankreasest lähtunud neuroendokriinne kasvaja ning süsteemne keemiaravi ja/või ravi somatostatiini analoogiga on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks
1787632	everoliimus, 10mg	L01EG02	EVEROLIMUS NORAMEDA, tablett, 30TK	Norameda UAB	100	C78-C78, C25-C25, C34-C34, C16-C20	Onkoloog				patsientidele, kellel ravi alustamise näidustatus everoliimusega on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud kaugelearenenud kõrgelt diferentseerunud (täielikult) mitteresetseeritav progresseeruva kuluga seedetraktist, kopsust või pankreasest lähtunud neuroendokriinne kasvaja ning süsteemne keemiaravi ja/või ravi somatostatiini analoogiga on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1433281	everoliimus, 5mg	L01EG02	AFINITOR, tablett, 30TK	Novartis Europharm Limited	100	C78-C78, C25-C25, C34-C34, C16-C20	Onkoloog				patsientidele, kellel ravi alustamise näidustatus everoliimusega on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud kaugelearenenud kõrgelt diferentseerunud (täielikult) mitteresetseeritav progresseeruva kuluga seedetraktist, kopsust või pankreasest lähtunud neuroendokriinne kasvaja ning süsteemne keemiaravi ja/või ravi somatostatiini analoogiga on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks
1787609	everoliimus, 5mg	L01EG02	EVEROLIMUS NORAMEDA, tablett, 30TK	Norameda UAB	100	C78-C78, C25-C25, C34-C34, C16-C20	Onkoloog				patsientidele, kellel ravi alustamise näidustatus everoliimusega on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud kaugelearenenud kõrgelt diferentseerunud (täielikult) mitteresetseeritav progresseeruva kuluga seedetraktist, kopsust või pankreasest lähtunud neuroendokriinne kasvaja ning süsteemne keemiaravi ja/või ravi somatostatiini analoogiga on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks
1693256	evolokumab, 140mg 1ml	C10AX13	REPATHA, süstelahus pen-süstlis, 1ml 1TK	Amgen Europe B.V.	100	E78.0-E78.0	Kardioloog	esmane			kroonilise perekondliku hüperkolesteroleemia raviks dokumenteeritud ateroskleroosiga patsientidele, kui varasem 1-3 kuud ravi maksimaalses talutavas annuses statiini ja esetimiibiga on osutunud ebapiisavaks või on statiin ja/või esetimiib vastunäidustatud ning patsiendi LDL-C väärtus on >=2,6 mmol/l
					100	I22-I22, Z95-Z95, I66-I66, I69-I69, I25-I25, I63-I63, I21-I21, I70.2-I70.2, I65-I65, I20.0-I20.0	Kardioloog, Neuroloog, vaskulaarkirurg	esmane			patsientidele, kellel on olnud äge koronaarsündroom (ÄKS, sh STEMI, NSTEMI, ebastabiilne stenokardia: I21, I22, I20.0), krooniline südame isheemiatõbi (I25), ajuinfarkt (I63), pretserebraalsete või peaajuarterite stenoos või oklusioon ilma peaajuinfarktita (I65, I66), jäsemete ateroskleroos (I70.2), insuldi jääknähud (I69) või kellele on tehtud revaskulariseeriv protseduur (koronaar-, karotiid- või perifeersete arterite osas) (Z95), ning kelle LDL-C väärtus on >=2,6 mmol/l vaatamata 1–3 kuud kestnud ravile maksimaalses talutavas annuses statiini ja esetimiibiga või kellele statiin/esetimiib on vastunäidustatud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3027710	faktor VIII inhibiitorist möödamineva aktiivsusega hüübimisfaktorid, 100ühik 1ml	B02BD03	FEIBA 100 Ü/ML, infusioonilahuse pulber ja lahusti, 10ml 1TK	Baxalta Innovations GmbH	100	D66-D66, D68.4-D68.4	Pediaater, Hematoloog, Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega				
1349300	febuksostaat, 120mg	M04AA03	ADENURIC, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	75	M10-M10					juhul, kui allopurinool on vastunäidustatud või talumatu (põhjustab ravi katkestama sundivaid või annuse tõstmist takistavaid kõrvaltoimeid)
					50						
1716207	febuksostaat, 120mg	M04AA03	FEBUXOSTAT TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Teva B.V.	50						
					75	M10-M10					juhul, kui allopurinool on vastunäidustatud või talumatu (põhjustab ravi katkestama sundivaid või annuse tõstmist takistavaid kõrvaltoimeid)
1721753	febuksostaat, 120mg	M04AA03	DRUNILER, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	M10-M10					juhul, kui allopurinool on vastunäidustatud või talumatu (põhjustab ravi katkestama sundivaid või annuse tõstmist takistavaid kõrvaltoimeid)
1748325	febuksostaat, 120mg	M04AA03	FEBUXOSTAT VIATRIS, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Viatris Limited	50						
					75	M10-M10					juhul, kui allopurinool on vastunäidustatud või talumatu (põhjustab ravi katkestama sundivaid või annuse tõstmist takistavaid kõrvaltoimeid)
1791581	febuksostaat, 120mg	M04AA03	FEBUXOSTAT KRKA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
					75	M10-M10					juhul, kui allopurinool on vastunäidustatud või talumatu (põhjustab ravi katkestama sundivaid või annuse tõstmist takistavaid kõrvaltoimeid)
1349287	febuksostaat, 80mg	M04AA03	ADENURIC, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	50						
					75	M10-M10					juhul, kui allopurinool on vastunäidustatud või talumatu (põhjustab ravi katkestama sundivaid või annuse tõstmist takistavaid kõrvaltoimeid)
1716140	febuksostaat, 80mg	M04AA03	FEBUXOSTAT TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Teva B.V.	50						
					75	M10-M10					juhul, kui allopurinool on vastunäidustatud või talumatu (põhjustab ravi katkestama sundivaid või annuse tõstmist takistavaid kõrvaltoimeid)

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1721696	febuksostaat, 80mg	M04AA03	DRUNILER, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	M10-M10					juhul, kui allopurinool on vastunäidustatud või talumatu (põhjustab ravi katkestama sundivaid või annuse tõstmist takistavaid kõrvaltoimeid)
1748291	febuksostaat, 80mg	M04AA03	FEBUXOSTAT VIATRIS, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Viatris Limited	75	M10-M10					juhul, kui allopurinool on vastunäidustatud või talumatu (põhjustab ravi katkestama sundivaid või annuse tõstmist takistavaid kõrvaltoimeid)
					50						
1791547	febuksostaat, 80mg	M04AA03	FEBUXOSTAT KRKA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
					75	M10-M10					juhul, kui allopurinool on vastunäidustatud või talumatu (põhjustab ravi katkestama sundivaid või annuse tõstmist takistavaid kõrvaltoimeid)
1840799	fedratiniib, 100mg	L01EJ02	INREBIC, kõvakapsel, 120TK	Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG	100	D47.1-D47.1	Hematoloog				konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi) otsuse alusel müelofibroosi raviks keskmise-2 või kõrge riskiga (IPSS>=2) patsientidele, kellel eelnev ravi ruksolitiniibiga on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks
1012330	felodipiin, 10mg	C08CA02	PRESID, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Teva B.V.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1174474	felodipiin, 10mg	C08CA02	FELODIPIN HEXAL, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Hexal AG	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1012318	felodipiin, 2,5mg	C08CA02	PRESID, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Teva B.V.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1012329	felodipiin, 5mg	C08CA02	PRESID, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Teva B.V.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1174373	felodipiin, 5mg	C08CA02	FELODIPIN HEXAL, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Hexal AG	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1029495	fenobarbitaal, 100mg	N03AA02	PHENAEMAL, tablett, 50TK	Desitin Arzneimittel GmbH	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1026593	fenofibraat, 200mg	C10AB05	LIPANTHYL, kõvakapsel, 30TK	Viatris SIA	50						
3131727	fenofibraat, 200mg	C10AB05	LIPANTHYL, kõvakapsel, 30TK	Ideal Trade Links UAB	50						
1020340	fenoksümetüülpenitsilliin, 1000000RÜ	J01CE02	OSPEN, õhukese polümeerikattega tablett, 12TK	Sandoz GmbH	75	J13-J18, J03-J03, H65-H67				16,00	
					50						
3075702	fenoksümetüülpenitsilliin, 1000000RÜ	J01CE02	OSPEN, õhukese polümeerikattega tablett, 12TK	Ideal Trade Links UAB	50						
					75	H65-H67, J13-J18, J03-J03				16,00	
3080720	fenoksümetüülpenitsilliin, 1000000RÜ	J01CE02	OSPEN, õhukese polümeerikattega tablett, 12TK	Lex Ano UAB	75	H65-H67, J13-J18, J03-J03				16,00	
					50						
1105951	fenoksümetüülpenitsilliin, 400000RÜ 5ml	J01CE02	OSPEN, suukaudne suspensioon, 60ml 1TK	Sandoz GmbH	75	J13-J18, J03-J03, H65-H67				16,00	
					50						
3078244	fenoksümetüülpenitsilliin, 400000RÜ 5ml	J01CE02	OSPEN, suukaudne suspensioon, 60ml 1TK	Lex Ano UAB	50						
					75	H65-H67, J13-J18, J03-J03				16,00	
3101500	fenoksümetüülpenitsilliin, 400000RÜ 5ml	J01CE02	OSPEN, suukaudne suspensioon, 60ml 1TK	Ideal Trade Links UAB	75	J13-J18, J03-J03, H65-H67				16,00	
					50						
1044223	fenoterool, 100mcg 1annus	R03AC04	BEROTEC N, inhalatsiooniaerosool, lahus, 200annus 1TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	50						
					75	J44-J44, J43-J43	Pulmonoloog	esmane			
					75	J45-J45					
1009651	fenoterool+ipratroopiumbromiid, 50mcg+20mcg 1annus	R03AL01	BERODUAL N, inhalatsiooniaerosool, lahus, 200annus 1TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			
					50						
					75	J45-J45					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1346958	fentanüül, 100mcg	N02AB03	EFFENTORA, bukaaltablett, 28TK	Phoenix Labs Unlimited Company	50						
					100	C00-D48	Hematoloog, Anestesioloog, Neuroloog, Onkoloog, Reumatoloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil(vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvianalgeetilist annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu
1400948	fentanüül, 100mcg	N02AB03	LUNALDIN, keelealune tablett, 10TK	Gruenenthal GmbH	50						
					100	C00-D48	Reumatoloog, Neuroloog, Onkoloog, Hematoloog, Anestesioloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil(vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvianalgeetilist annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu
1223165	fentanüül, 100mcg 1h	N02AB03	MATRIFEN, transdermaalne plaaster, 5TK	Istituto Gentili S.r.l.	50						
					100	R52.1-R52.1	Reumatoloog, Anestesioloog, Neuroloog	esmane			esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist
					100	C00-D48					patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1223121	fentanüül, 12mcg 1h	N02AB03	MATRIFEN, transdermaalne plaaster, 5TK	Istituto Gentili S.r.l.	50						
					100	R52.1-R52.1	Anestesioloog, Neuroloog, Reumatoloog	esmane			esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist
					100	C00-D48					patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist
1346970	fentanüül, 200mcg	N02AB03	EFFENTORA, bukaaltablett, 28TK	Phoenix Labs Unlimited Company	50						
					100	C00-D48	Anestesioloog, Neuroloog, Onkoloog, Reumatoloog, Hematoloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil(vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvianalgeetilist annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu
1400959	fentanüül, 200mcg	N02AB03	LUNALDIN, keelealune tablett, 10TK	Gruenenthal GmbH	100	C00-D48	Anestesioloog, Hematoloog, Reumatoloog, Neuroloog, Onkoloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil(vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvianalgeetilist annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1223132	fentanüül, 25mcg 1h	N02AB03	MATRIFEN, transdermaalne plaaster, 5TK	Istituto Gentili S.r.l.	50						
					100	R52.1-R52.1	Anestesioloog, Neuroloog, Reumatoloog	esmane			esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist
					100	C00-D48					patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist
1400960	fentanüül, 300mcg	N02AB03	LUNALDIN, keelealune tablett, 10TK	Gruenenthal GmbH	100	C00-D48	Onkoloog, Reumatoloog, Anestesioloog, Neuroloog, Hematoloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil(vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvianalgeetilist annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu
					50						
1346992	fentanüül, 400mcg	N02AB03	EFFENTORA, bukaaltablett, 28TK	Phoenix Labs Unlimited Company	50						
					100	C00-D48	Hematoloog, Anestesioloog, Reumatoloog, Onkoloog, Neuroloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil(vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvianalgeetilist annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1400971	fentanüül, 400mcg	N02AB03	LUNALDIN, keelealune tablett, 10TK	Gruenenthal GmbH	100	C00-D48	Reumatoloog, Hematoloog, Neuroloog, Onkoloog, Anestesioloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil(vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvianalgeetilist annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu
					50						
1223143	fentanüül, 50mcg 1h	N02AB03	MATRIFEN, transdermaalne plaaster, 5TK	Istituto Gentili S.r.l.	100	R52.1-R52.1	Anestesioloog, Neuroloog, Reumatoloog	esmane			esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist
					100	C00-D48					patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist
					50						
1347038	fentanüül, 600mcg	N02AB03	EFFENTORA, bukaaltablett, 28TK	Phoenix Labs Unlimited Company	100	C00-D48	Anestesioloog, Hematoloog, Neuroloog, Onkoloog, Reumatoloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil(vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvianalgeetilist annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1400982	fentanüül, 600mcg	N02AB03	LUNALDIN, keelealune tablett, 10TK	Gruenenthal GmbH	50						
					100	C00-D48	Anestesioloog, Reumatoloog, Hematoloog, Neuroloog, Onkoloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil(vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvianalgeetilist annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu
1223154	fentanüül, 75mcg 1h	N02AB03	MATRIFEN, transdermaalne plaaster, 5TK	Istituto Gentili S.r.l.	100	C00-D48					patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist
					100	R52.1-R52.1	Neuroloog, Reumatoloog, Anestesioloog	esmane			esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist
					50						
1347016	fentanüül, 800mcg	N02AB03	EFFENTORA, bukaaltablett, 28TK	Phoenix Labs Unlimited Company	50						
					100	C00-D48	Neuroloog, Hematoloog, Anestesioloog, Onkoloog, Reumatoloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil(vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvianalgeetilist annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1400993	fentanüül, 800mcg	N02AB03	LUNALDIN, keelealune tablett, 10TK	Gruenenthal GmbH	50						
					100	C00-D48	Reumatoloog, Neuroloog, Onkoloog, Anestesioloog, Hematoloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil(vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvianalgeetilist annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu
1077050	fenütoiin, 100mg	N03AB02	PHENHYDAN, tablett, 100TK	Desitin Arzneimittel GmbH	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
1828649	filgotiniib, 100mg	L04AF04	JYSELECA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Alfasigma S.p.A.	100	M05-M06	Pediaater, Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega				ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt kahe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud
					100	K51-K51	Gastroenteroloog, Pediaater, Pediaater gastroenteroloogi lisapädevusega				ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt kahe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1828661	filgotiniib, 200mg	L04AF04	JYSELECA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Alfasigma S.p.A.	100	K51-K51	Pediaater gastroenteroloogi lisapädevusega, Pediaater, Gastroenteroloog				ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt kahe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud
					100	M05-M06	Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt kahe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud
1338724	finasteriid, 5mg	G04CB01	FINASTERIDE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	50						
1876181	finerenoon, 10mg	C03DA05	KERENDIA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Bayer AG	75	N18-N18					2. tüübi diabeediga patsientidele, kellel säilib albuminuuria, hoolimata maksimaalsest talutavast AKEi või ARB-i annusest ja SGLT-2 inhibiitori kasutamisest, juhul kui need ravimid ei ole vastunäidustatud
1876248	finerenoon, 20mg	C03DA05	KERENDIA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Bayer AG	75	N18-N18					2. tüübi diabeediga patsientidele, kellel säilib albuminuuria, hoolimata maksimaalsest talutavast AKEi või ARB-i annusest ja SGLT-2 inhibiitori kasutamisest, juhul kui need ravimid ei ole vastunäidustatud
1523731	fingolimood, 0,5mg	L04AE01	GILENYA, kõvakapsel, 28TK	Novartis Europharm Limited	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel väga aktiivse, ägenemiste ja remissioonidega kulgeva hulgiskleroosi raviks
1791693	fingolimood, 0,5mg	L04AE01	FINGOLIMOD NORAMEDA, kõvakapsel, 28TK	Norameda UAB	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel väga aktiivse, ägenemiste ja remissioonidega kulgeva hulgiskleroosi raviks
1800199	fingolimood, 0,5mg	L04AE01	FINGOLIMOD ZENTIVA, kõvakapsel, 28TK	Zentiva k.s.	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel väga aktiivse, ägenemiste ja remissioonidega kulgeva hulgiskleroosi raviks

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1860982	fingolimood, 0,5mg	L04AE01	FINGOLIMOD STADA, kõvakapsel, 28TK	Stada Arzneimittel AG	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel väga aktiivse, ägenemiste ja remissioonidega kulgeva hulgiskleroosi raviks
3052280	fingolimood, 0,5mg	L04AE01	FINGOLIMOD OLPHA, kõvakapsel, 28TK	Olpha AS	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel väga aktiivse, ägenemiste ja remissioonidega kulgeva hulgiskleroosi raviks
3092969	fingolimood, 0,5mg	L04AE01	CHANTICO, kõvakapsel, 28TK	G.L. Pharma GmbH	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel väga aktiivse, ägenemiste ja remissioonidega kulgeva hulgiskleroosi raviks
1144842	flukonasool, 150mg	J02AC01	FLUNOC, kõvakapsel, 2TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					100	B45-B45, B48.2-B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44-B44					kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks
1395165	flukonasool, 150mg	J02AC01	FLUCONAZOLE ELVIM, kõvakapsel, 1TK	SIA Elvim	50						
					100	B45-B45, B48.2-B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44-B44					kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks
1395176	flukonasool, 150mg	J02AC01	FLUCONAZOLE ELVIM, kõvakapsel, 2TK	SIA Elvim	50						
					100	B45-B45, B48.2-B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44-B44					kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks
1395187	flukonasool, 150mg	J02AC01	FLUCONAZOLE ELVIM, kõvakapsel, 4TK	SIA Elvim	50						
					100	B45-B45, B48.2-B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44-B44					kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1490688	flukonasool, 150mg	J02AC01	FLUCONAZOLE ACTAVIS, kõvakapsel, 1TK	Teva B.V.	50						
					100	B45-B45, B48.2-B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44-B44					kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks
1490699	flukonasool, 150mg	J02AC01	FLUCONAZOLE ACTAVIS, kõvakapsel, 2TK	Teva B.V.	100	B45-B45, B48.2-B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44-B44					kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks
					50						
1531279	flukonasool, 150mg	J02AC01	FLUCONAZOLE MEDOCHEMIE, kõvakapsel, 2TK	Medochemie Limited	100	B45-B45, B48.2-B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44-B44					kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks
					50						
1821237	flukonasool, 150mg	J02AC01	FLUCONAZOLE VITABALANS, tablett, 2TK	Vitabalans Oy	50						
					100	B45-B45, B48.2-B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44-B44					kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks
1821248	flukonasool, 150mg	J02AC01	FLUCONAZOLE VITABALANS, tablett, 4TK	Vitabalans Oy	50						
					100	B45-B45, B48.2-B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44-B44					kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks
1833498	flukonasool, 150mg	J02AC01	FLUCONAZOLE TEVA, kõvakapsel, 2TK	Teva B.V.	50						
					100	B45-B45, B48.2-B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44-B44					kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1140691	flukonasool, 50mg	J02AC01	FLUCONAZOLE MEDOCHEMIE, kõvakapsel, 7TK	Medochemie Limited	100	B45-B45, B48.2-B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44-B44					kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks
					50						
1395660	flukonasool, 50mg	J02AC01	FLUCONAZOLE ELVIM, kõvakapsel, 7TK	SIA Elvim	50						
					100	B45-B45, B48.2-B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44-B44					kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks
1167971	fluokortoloon+lidokaiin, 1mg+20mg 1g	C05AA84	DOLOPROCT 1MG/20MG/G REKTAALKREEM, rektaalkreem, 15g 1TK	Karo Healthcare AB	50						
1167948	fluokortoloon+lidokaiin, 1mg+40mg	C05AA84	DOLOPROCT 1MG/40MG REKTAALSUPOSIIDID, rektaalsuposiit, 10TK	Karo Pharma AB	50						
1107122	fluoksetiin, 20mg	N06AB03	FLUX, kõvakapsel, 28TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1456691	fluoksetiin, 20mg	N06AB03	FLUOXETINE VITABALANS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Vitabalans Oy	50						
					100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
1456703	fluoksetiin, 20mg	N06AB03	FLUOXETINE VITABALANS, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Vitabalans Oy	50						
					100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3084229	fluoksetiin, 20mg	N06AB03	FLUX, kõvakapsel, 28TK	Ideal Trade Links UAB	100	F11.4-F11.7, F60.3-F60.3, F32.2-F32.3, F15.4-F15.7, F13.4-F13.7, F12.4-F12.7, F20-F29, F16.4-F16.7, F00-F09, F70-F79, F10.4-F10.7, F19.4-F19.7, F30-F31, F18.4-F18.7, F33.2-F33.3, F17.4-F17.7, F14.4-F14.7	Psühhiaater	esmane			
					50						
1489765	flupentiksool, 1mg	N05AF01	FLUANXOL, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	H. Lundbeck A/S	100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1006175	flupentiksool, 20mg 1ml	N05AF01	FLUANXOL DEPOT, süstelahus, 1ml 1TK	H. Lundbeck A/S	50						
					100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
1007840	flutikasoon, 100mcg 1annus	R03BA05	FLIXOTIDE DISKUS 100 MCG, inhalatsioonipulber, 60annus 1TK	GlaxoSmithKline Trading Services Limited	50						
					75	J45-J45					
1007884	flutikasoon, 250mcg 1annus	R03BA05	FLIXOTIDE DISKUS 250 MCG, inhalatsioonipulber, 60annus 1TK	GlaxoSmithKline Trading Services Limited	75	J45-J45					
					50						
1006344	flutikasoon, 500mcg 1g	D07AC17	CUTIVATE CREAM, kreem, 15g 1TK	GlaxoSmithKline Trading Services Limited	50						
					75	L20-L20, L40-L40, L23-L23					
1007233	flutikasoon, 50mcg 1annus	R01AD08	FLIXONASE AQUEOUS NASAL SPRAY 50 MCG, ninasprei, suspensioon, 120annus 1TK	GlaxoSmithKline Trading Services Limited	50						
1130690	flutikasoon, 50mcg 1annus	R03BA05	FLIXOTIDE INHALER, inhalatsiooniaerosool, suspensioon, 120annus 1TK	GlaxoSmithKline Trading Services Limited	75	J45-J45					
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1343034	flutikasoonfuroaat, 27,5mcg 1annus	R01AD12	AVAMYS, ninasprei, suspensioon, 120annus 1TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50						
3013096	flutikasoonfuroaat, 27,5mcg 1mõõtannus	R01AD12	FLUTICASONE TEVA, ninasprei, suspensioon, 120mõõtannus 1TK	Teva B.V.	50						
1287187	fluvastatiin, 80mg	C10AA04	FLUVASTATIN ACTAVIS, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK	Teva B.V.	100	N18-N18					
					50						
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
1678057	fluvastatiin, 80mg	C10AA04	LESCOL XL, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK	First Pharma OÜ	100	N18-N18					
					50						
					75	I65-I66, E78-E78, I21-I22, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, Z95-Z95, E13-E14, Z45-Z45, E11-I12					
1881042	fluvastatiin, 80mg	C10AA04	LESCOL XL, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK	Ideal Trade Links UAB	100	N18-N18					
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
					50						
1039564	fluvoksamiin, 100mg	N06AB08	FEVARIN, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Viatris SIA	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1087152	formoterool, 12mcg	R03AC13	FORADIL AEROLIZER, inhalatsioonipulber kõvakapslis, 60TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	J45-J45					
					50						
					75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			
1178939	formoterool, 12mcg 1annus	R03AC13	FOMEDA EASYHALER, inhalatsioonipulber, 120annus 1TK	Orion Corporation	75	J45-J45					
					50						
					75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			
1669697	formoterool+aklidiinium, 11,8mcg+340mcg 1mõõtannus	R03AL05	BRIMICA GENUAIR, inhalatsioonipulber, 60mõõtannus 1TK	Covis Pharma Europe B.V.	75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			
					50						
1314256	formoterool+beklometasoon, 6mcg+100mcg 1annus	R03AK08	FOSTER, inhalatsiooniaerosool, lahus, 180annus 1TK	CHIESI Pharmaceuticals GmbH	50						
					75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			C-D staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel eosinofiilide arv perifeerses veres on >=100 rakku/mikroliitris ning kellel on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasid ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga
					75	J45-J45					
1796991	formoterool+beklometasoon, 6mcg+100mcg 1annus	R03AK08	FOSTER NEXTHALER, inhalatsioonipulber, 180annus 1TK	CHIESI Pharmaceuticals GmbH	50						
					75	J45-J45					
					75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			C-D staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel eosinofiilide arv perifeerses veres on >=100 rakku/mikroliitris ning kellel on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasid ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3002959	formoterool+beklometasoon, 6mcg+100mcg 1mõõtannus	R03AK08	BEDUFORA, inhalatsiooniaerosool, lahus, 180mõõtannus 1TK	Stada Arzneimittel AG	50						
					75	J45-J45					
					75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			C-D staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel eosinofiilide arv perifeerses veres on >=100 rakku/mikroliitris ning kellel on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasid ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga
3068018	formoterool+beklometasoon, 6mcg+100mcg 1mõõtannus	R03AK08	BRELIVIO, inhalatsiooniaerosool, lahus, 180mõõtannus 1TK	Teva B.V.	75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			C-D staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel eosinofiilide arv perifeerses veres on >=100 rakku/mikroliitris ning kellel on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasid ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga
					50						
					75	J45-J45					
1653410	formoterool+beklometasoon, 6mcg+200mcg 1annus	R03AK08	FOSTER, inhalatsiooniaerosool, lahus, 180annus 1TK	CHIESI Pharmaceuticals GmbH	75	J45-J45					
					75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			C-D staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel eosinofiilide arv perifeerses veres on >=100 rakku/mikroliitris ning kellel on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasid ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga
					50						
3003747	formoterool+beklometasoon, 6mcg+200mcg 1mõõtannus	R03AK08	BEDUFORA, inhalatsiooniaerosool, lahus, 180mõõtannus 1TK	Stada Arzneimittel AG	75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			C-D staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel eosinofiilide arv perifeerses veres on >=100 rakku/mikroliitris ning kellel on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasid ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga
					50						
					75	J45-J45					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3110027	formoterool+beklometasoon, 6mcg+200mcg 1mõõtannus	R03AK08	FOSTER, inhalatsiooniaerosool, lahus, 180mõõtannus 1TK	Lex Ano UAB	75	J45-J45	Pulmonoloog	esmane			C-D staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel eosinofiilide arv perifeerses veres on >=100 rakku/mikroliitris ning kellel on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasid ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga
					75	J43-J44					
					50						
1611470	formoterool+budesoniid, 4,5mcg+160mcg 1annus	R03AK07	BUFOMIX EASYHALER, inhalatsioonipulber, 120annus 1TK	Orion Corporation	50						
					75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			C-D staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel eosinofiilide arv perifeerses veres on >=100 rakku/mikroliitris ning kellel on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasid ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga
					75	J45-J45					
1068443	formoterool+budesoniid, 4,5mcg+160mcg 1mõõtannus	R03AK07	SYMBICORT TURBUHALER, inhalatsioonipulber, 120mõõtannus 1TK	AstraZeneca AB	50						
					75	J45-J45					
					75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			C-D staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel eosinofiilide arv perifeerses veres on >=100 rakku/mikroliitris ning kellel on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasid ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga
1742789	formoterool+budesoniid, 4,5mcg+160mcg 1mõõtannus	R03AK07	AIRBUFO FORSPIRO, annustatud inhalatsioonipulber, 60mõõtannus 2TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			C-D staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel eosinofiilide arv perifeerses veres on >=100 rakku/mikroliitris ning kellel on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasid ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga
					75	J45-J45					
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1611481	formoterool+budesoniid, 9mcg+320mcg 1annus	R03AK07	BUFOMIX EASYHALER, inhalatsioonipulber, 60annus 1TK	Orion Corporation	75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			C-D staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel eosinofiilide arv perifeerses veres on >=100 rakku/mikroliitris ning kellel on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasid ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga
					50						
					75	J45-J45					
1156250	formoterool+budesoniid, 9mcg+320mcg 1mõõtannus	R03AK07	SYMBICORT TURBUHALER, inhalatsioonipulber, 60mõõtannus 1TK	AstraZeneca AB	75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			C-D staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel eosinofiilide arv perifeerses veres on >=100 rakku/mikroliitris ning kellel on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasid ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga
					75	J45-J45					
					50						
1808603	formoterool+budesoniid, 9mcg+320mcg 1mõõtannus	R03AK07	AIRBUFO FORSPIRO, annustatud inhalatsioonipulber, 60mõõtannus 1TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	J45-J45					
					75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			C-D staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel eosinofiilide arv perifeerses veres on >=100 rakku/mikroliitris ning kellel on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasid ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga
					50						
1786596	formoterool+glükopürroonium, 5mcg+7,2mcg 1mõõtannus	R03AL07	BEVESPI AEROSPHERE, inhalatsiooniaerosool, suspensioon, 120mõõtannus 1TK	Astrazeneca AB	75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1750227	formoterool+glükopürroonium+beklometasoon, 5mcg+9mcg+87mcg 1mõõtannus	R03AL09	TRIMBOW, inhalatsiooniaerosool, lahus, 120mõõtannus 1TK	Chiesi Farmaceutici S.p.A.	75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			patsiendile, kelle eosinofiilide arv perifeerses veres on >=100 rakku ning IKS/LABA või LAMA/LABA kaksikravil on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasid ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga; või kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsiendile, kes saab IKS+LAMA+LABA toimeaineid avatud kombinatsioonis (e. kolmikravi erinevatest inhalaatoritest); või kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsiendile, kelle eosinofiilide arv perifeerses veres on >=300 rakku ning LABA või LAMA monoteraapial on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasid ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga
					50						
1845468	formoterool+glükopürroonium+beklometasoon, 5mcg+9mcg+88mcg 1mõõtannus	R03AL09	TRIMBOW, inhalatsioonipulber, 120mõõtannus 1TK	Chiesi Farmaceutici S.p.A.	50						
					75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			patsiendile, kelle eosinofiilide arv perifeerses veres on >=100 rakku ning IKS/LABA või LAMA/LABA kaksikravil on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasid ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga; või kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsiendile, kes saab IKS+LAMA+LABA toimeaineid avatud kombinatsioonis (e. kolmikravi erinevatest inhalaatoritest); või kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsiendile, kelle eosinofiilide arv perifeerses veres on >=300 rakku ning LABA või LAMA monoteraapial on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasid ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1834905	formoterool+glükopürroonium+budesoniid, 5mcg+7,2mcg+160mcg 1mõõtannus	R03AL11	TRIXEO AEROSPHERE, inhalatsiooniaerosool, suspensioon, 120mõõtannus 1TK	AstraZeneca AB	75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			patsiendile, kelle eosinofiilide arv perifeerses veres on >=100 rakku ning IKS/LABA või LAMA/LABA kaksikravil on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasid ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga; või kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsiendile, kes saab IKS+LAMA+LABA toimeaineid avatud kombinatsioonis (e. kolmikravi erinevatest inhalaatoritest); või kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsiendile, kelle eosinofiilide arv perifeerses veres on >=300 rakku ning LABA või LAMA monoteraapial on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasid ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga
					50						
1027145	fosinopriil, 10mg	C09AA09	MONOPRIL, tablett, 28TK	PharmaSwiss Ceska republika s.r.o.	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1193767	fosinopriil, 10mg	C09AA09	FOSINOPRIL ACTAVIS, tablett, 28TK	Teva B.V.	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1027336	fosinopriil, 20mg	C09AA09	MONOPRIL, tablett, 28TK	PharmaSwiss Ceska republika s.r.o.	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1193891	fosinopriil, 20mg	C09AA09	FOSINOPRIL ACTAVIS, tablett, 28TK	Teva B.V.	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1250581	fosinopriil+hüdroklorotiasiid, 20mg+12,5mg	C09BA87	FOSINOPRIL HCT ACTAVIS, tablett, 30TK	Teva B.V.	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1791615	fremanezumab, 225mg	N02CD03	AJOVY, süstelahus pen-süstlis, 1TK	Teva GmbH	75	G43-G43	Neuroloog	esmane			kroonilise migreeni profülaktiliseks raviks täiskasvanutel, kellel esinevad peavalud >=15 päeval kuus, millest vähemalt 8 päeval on tegemist migreeni kriteeriume täitvate hoogudega ja kellel on vähemalt 3 eelnevat Eesti või rahvusvahelistes ravijuhistes mainitud profülaktilist ravi dokumenteeritult ebaõnnestunud. Ravivastust hinnatakse 6 ravikuu möödumisel ning soodustusega väljakirjutamise õigus jätkub patsientidele, kellel raviarsti hinnangul on dokumenteeritult >=50% vähenemine peavalupäevade arvus kuus. Edaspidi tuleb ravi jätkamise vajadust hinnata regulaarselt 6-12 kuu järel, ravi jätkamise eelduseks on püsiv ravivastus. Ravi lõpetatakse, kui peavalupäevade arv on alla 4 päeva kuus vähemalt 6 järjestikuse kuu vältel. Botulismitoksiini või eptinezumabi samaaegne rakendamine patsiendi ravis ei ole lubatud.
1161548	frovatriptaan, 2,5mg	N02CC07	MIGARD, õhukese polümeerikattega tablett, 2TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	75	G43-G43					
					50						
1039362	furosemiid, 60mg	C03CA01	LASIX RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	Sanofi Winthrop Industrie	50						
					75	I50-I50					
					100	I27.0-I27.0					
1018606	fusidiinhape, 10mg 1g	S01AA13	FUCITHALMIC, silmatilgad, suspensioon, 5g 1TK	Amdipharm Limited	50						
1007727	fusidiinhape, 20mg 1g	D06AX01	FUCIDIN 20 mg/g salv, salv, 15g 1TK	LEO Pharma A/S	50						
1007750	fusidiinhape, 20mg 1g	D06AX01	FUCIDIN 20 mg/g kreem, kreem, 15g 1TK	LEO Pharma A/S	50						
1032815	gabapentiin, 300mg	N02BF01	NEURONTIN, kõvakapsel, 50TK	Viatris SIA	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1126055	gabapentiin, 300mg	N02BF01	GABAGAMMA 300MG, kõvakapsel, 50TK	Woerwag Pharma GmbH & Co. KG	50						
					75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
1696417	gabapentiin, 300mg	N02BF01	GABAPENTIN ACCORD, kõvakapsel, 50TK	Accord Healthcare B.V.	75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50						
1826355	gabapentiin, 300mg	N02BF01	NEURONTIN, kõvakapsel, 90TK	Lex Ano UAB	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
1845547	gabapentiin, 300mg	N02BF01	NEURONTIN, kõvakapsel, 100TK	Ideal Trade Links UAB	75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
1893012	gabapentiin, 300mg	N02BF01	NEURONTIN, kõvakapsel, 100TK	Ideal Trade Links UAB	50						
					75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1897331	gabapentiin, 300mg	N02BF01	NEURONTIN, kõvakapsel, 50TK	Lex Ano UAB	75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
3043471	gabapentiin, 300mg	N02BF01	GABAPENTIN TEVA, kõvakapsel, 50TK	Teva B.V.	75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50						
1125953	gabapentiin, 400mg	N02BF01	GABAGAMMA 400MG, kõvakapsel, 50TK	Woerwag Pharma GmbH & Co. KG	75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50						
1696529	gabapentiin, 400mg	N02BF01	GABAPENTIN ACCORD, kõvakapsel, 50TK	Accord Healthcare B.V.	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50						
					75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
3043279	gabapentiin, 400mg	N02BF01	GABAPENTIN TEVA, kõvakapsel, 50TK	Teva B.V.	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
1888173	ganireliks, 0,25mg 0.5ml	H01CC01	GANIRELIX GEDEON RICHTER, süstelahus süstlis, 0.5ml 1TK	Gedeon Richter Plc.	50						
					100	N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1115716	gestodeen+etünüü löstradiool, 0,075mg+0,02mg	G03AA10	LINDYNETTE 20, kaetud tablett, 63TK	Gedeon Richter Plc.	50						
					75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
1828548	gestodeen+etünüü löstradiool, 0,075mg+0,02mg	G03AA10	LINDYNETTE 20, kaetud tablett, 63TK	Ideal Trade Links UAB	50						
					75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
1115693	gestodeen+etünüü löstradiool, 0,075mg+0,03mg	G03AA10	LINDYNETTE 30, kaetud tablett, 63TK	Gedeon Richter Plc.	50						
					75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
1828559	gestodeen+etünüü löstradiool, 0,075mg+0,03mg	G03AA10	LINDYNETTE 30, kaetud tablett, 63TK	Ideal Trade Links UAB	50						
					75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
1364105	gestodeen+etünüü löstradiool, 75mcg+20mcg	G03AA10	GESYTIL 75/20 MIKROGRAMMI, kaetud tablett, 63TK	Ratiopharm GmbH	50						
					75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
3068782	gestodeen+etünüü löstradiool, 75mcg+20mcg	G03AA10	HARMONET, kaetud tablett, 63TK	Ideal Trade Links UAB	50						
					75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
3113480	gestodeen+etünüü löstradiool, 75mcg+20mcg	G03AA10	HARMONET, kaetud tablett, 63TK	Lex Ano UAB	75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
					50						
1364138	gestodeen+etünüü löstradiool, 75mcg+30mcg	G03AA10	GESYTIL 75/30 MIKROGRAMMI, kaetud tablett, 63TK	Ratiopharm GmbH	50						
					75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
1061334	glargiin-insuliin, 100ühik 1ml	A10AE04	LANTUS, süstelahus kolbampullis, 3ml 5TK	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	50						
					100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1					
1265790	glargiin-insuliin, 100ühik 1ml	A10AE04	LANTUS SOLOSTAR, süstelahus pen-süstlis, 3ml 5TK	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	50						
					100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1665053	glargiin-insuliin, 100ühik 1ml	A10AE04	ABASAGLAR KWIKPEN, süstelahus pen-süstlis, 3ml 5TK	Eli Lilly Nederland B.V.	100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1					
					50						
1684043	glargiin-insuliin, 300ühik 1ml	A10AE04	TOUJEO, süstelahus pen-süstlis, 1.5ml 5TK	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	50						
					100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1					
1737042	glargiin-insuliin+liksisenatiid, 100ühik+33mcg 1ml	A10AE54	SULIQUA, süstelahus pen-süstlis, 3ml 5TK	Sanofi Winthrop Industrie	75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi raviks kombinatsioonis metformiiniga rasvumusega patsientidele (KMI>=35kg/m2), kellel suukaudsed diabeediravimid (metformiin, sulfonüüluurea preparaat, PPAR agonist, DPP-4 inhibiitor) maksimaalsetes talutavates annustes ei ole andnud rahuldavat efekti või on vastunäidustatud
					50	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi raviks kombinatsioonis metformiiniga juhul, kui ravi suukaudsete diabeediravimitega ei ole efektiivne või on vastunäidustatud
1737020	glargiin-insuliin+liksisenatiid, 100ühik+50mcg 1ml	A10AE54	SULIQUA, süstelahus pen-süstlis, 3ml 5TK	Sanofi Winthrop Industrie	75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi raviks kombinatsioonis metformiiniga rasvumusega patsientidele (KMI>=35kg/m2), kellel suukaudsed diabeediravimid (metformiin, sulfonüüluurea preparaat, PPAR agonist, DPP-4 inhibiitor) maksimaalsetes talutavates annustes ei ole andnud rahuldavat efekti või on vastunäidustatud
					50	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi raviks kombinatsioonis metformiiniga juhul, kui ravi suukaudsete diabeediravimitega ei ole efektiivne või on vastunäidustatud
1241244	glatirameeratsetaat, 20mg 1ml	L03AX13	COPAXONE, süstelahus süstlis, 1ml 28TK	Teva GmbH	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel (ägenemiste ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks
1618196	glatirameeratsetaat, 40mg 1ml	L03AX13	COPAXONE, süstelahus süstlis, 1ml 12TK	Teva GmbH	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel (ägenemiste ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks
1751037	glekapreviir+pibrentasviir, 100mg+40mg	J05AP57	MAVIRET, õhukese polümeerikattega tablett, 84TK	AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG	100	B18.2-B18.2	Gastroenteroloog, Infektsionist				kroonilise progresseeruva C-viirushepatiidi raviks

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1860016	glekapreviir+pibrentasviir, 50mg+20mg	J05AP57	MAVIRET, kaetud graanulid kotikeses, 28TK	AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG	100	B18.2-B18.2	Gastroenteroloog, Infektsionist				kroonilise progresseeruva C-viirushepatiidi raviks
1261066	gliklasiid, 30mg	A10BB09	GLICLADA 30 MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 60TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	75	E14-E14, E11-E11					
					50						
1261101	gliklasiid, 30mg	A10BB09	GLICLADA 30 MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 120TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1603145	gliklasiid, 30mg	A10BB09	GLICLAZIDE KRKA, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 60TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	75	E14-E14, E11-E11					
					50						
1350054	gliklasiid, 60mg	A10BB09	DIAPREL MR 60MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 60TK	Les Laboratoires Servier	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1551822	gliklasiid, 60mg	A10BB09	GLICLADA 60 MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 60TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	75	E14-E14, E11-E11					
					50						
1551855	gliklasiid, 60mg	A10BB09	GLICLADA 60 MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 120TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1551945	gliklasiid, 60mg	A10BB09	GLICLAZIDE KRKA 60 MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 60TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1644601	gliklasiid, 60mg	A10BB09	GLICLAZIDE ACTAVIS, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 60TK	Teva B.V.	75	E14-E14, E11-E11					
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1847246	gliklasiid, 60mg	A10BB09	DIAPREL MR 60MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 60TK	Ideal Trade Links UAB	75	E11-E11, E14-E14					
					50						
3059377	gliklasiid, 60mg	A10BB09	DIAPREL MR 60MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 60TK	Ideal Trade Links UAB	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1046405	gliklasiid, 80mg	A10BB09	DIAPREL, tablett, 60TK	Les Laboratoires Servier	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1176948	glimepiriid, 1mg	A10BB12	OLTAR 1MG, tablett, 30TK	Berlin-Chemie AG	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1110328	glimepiriid, 2mg	A10BB12	AMARYL, tablett, 30TK	Sanofi Winthrop Industrie	75	E14-E14, E11-E11					
					50						
1177039	glimepiriid, 2mg	A10BB12	OLTAR 2 MG, tablett, 30TK	Berlin-Chemie AG	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1671195	glimepiriid, 2mg	A10BB12	AMARYL, tablett, 30TK	First Pharma OÜ	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1110339	glimepiriid, 3mg	A10BB12	AMARYL, tablett, 30TK	Sanofi Winthrop Industrie	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1177129	glimepiriid, 3mg	A10BB12	OLTAR 3 MG, tablett, 30TK	Berlin-Chemie AG	75	E14-E14, E11-E11					
					50						
1670992	glimepiriid, 3mg	A10BB12	AMARYL, tablett, 30TK	First Pharma OÜ	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
3055407	glimepiriid, 3mg	A10BB12	AMARYL, tablett, 30TK	Ideal Trade Links UAB	50						
					75	E14-E14, E11-E11					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1125391	glimepiriid, 4mg	A10BB12	AMARYL, tablett, 30TK	Sanofi Winthrop Industrie	75	E14-E14, E11-E11					
					50						
3055542	glimepiriid, 4mg	A10BB12	AMARYL, tablett, 30TK	Ideal Trade Links UAB	75	E14-E14, E11-E11					
					50						
1201396	glulisiin-insuliin, 100ühik 1ml	A10AB06	APIDRA, süstelahus kolbampullis, 3ml 5TK	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1					
					50						
1294398	glulisiin-insuliin, 100ühik 1ml	A10AB06	APIDRA SOLOSTAR, süstelahus pen-süstlis, 3ml 5TK	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1					
					50						
1165878	glükagoon, 1mg	H04AA01	GLUCAGEN 1MG HYPOKIT, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Novo Nordisk A/S	50						
1326653	glükoosamiin, 1178mg	M01AX05	GLUCOSAMIN-RATIOPHARM 1178 MG, suukaudse lahuse pulber, 20TK	Ratiopharm GmbH	50						
1183687	glükoosamiin, 400mg	M01AX05	GLUCOSAMINE PHARMA NORD, kõvakapsel, 90TK	Pharma Nord ApS	50						
1183698	glükoosamiin, 400mg	M01AX05	GLUCOSAMINE PHARMA NORD, kõvakapsel, 270TK	Pharma Nord ApS	50						
1595954	glükopürroonium, 44mcg	R03BB06	SEEBRI BREEZHALER, inhalatsioonipulber kõvakapslis, 30TK	Novartis Europharm Limited	50						
					75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1648403	goserelii n, 10,8mg	L02AE03	RESELIGO, implantaat süstlis, 1TK	Zentiva k.s.	50						
					100	N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks
					75	N80-N80					III-IV astme endometrioosi põdevatele patsientidele
					75	D25-D25	Günekoloog	esmane			mõõdukate kuni raskete sümptomitega patsientidele, kellel esmavaliku ravimid (traneksaamhape, hormonaalsed kontratseptiivid, emakasisesed rasestumisvastased vahendid) on ebaefektiivsed või talumatud.
					100	C61-C61	Onkoloog, Uroloog				lokaalse või lokaalselt levinud kõrge riskiga (kliiniline staadium >=T2c või Gleasoni skoor 8-10 või PSA >=20 ng/ml või regionaalsete lümfisõlmede haaratus või positiivne resektsioonipiir) multimodaalse ravi osana kuni 2 aasta vältel ning metastaseerunud eesnäärmevähiga patsientidele
1002621	goserelii n, 3,6mg	L02AE03	ZOLADEX, implantaat, 1TK	AstraZeneca AB	75	D25-D25	Günekoloog	esmane			mõõdukate kuni raskete sümptomitega patsientidele, kellel esmavaliku ravimid (traneksaamhape, hormonaalsed kontratseptiivid, emakasisesed rasestumisvastased vahendid) on ebaefektiivsed või talumatud.
					75	N80-N80					III-IV astme endometrioosi põdevatele patsientidele
					100	C61-C61	Uroloog, Onkoloog				lokaalse või lokaalselt levinud kõrge riskiga (kliiniline staadium >=T2c või Gleasoni skoor 8-10 või PSA >=20 ng/ml või regionaalsete lümfisõlmede haaratus või positiivne resektsioonipiir) multimodaalse ravi osana kuni 2 aasta vältel ning metastaseerunud eesnäärmevähiga patsientidele
					50						
					100	N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1648425	goserelii n, 3,6mg	L02AE03	RESELIGO, implantaat süstlis, 1TK	Zentiva k.s.	75	D25-D25	Günekoloog	esmane			mõõdukate kuni raskete sümptomitega patsientidele, kellel esmavaliku ravimid (traneksaamhape, hormonaalsed kontratseptiivid, emakasisesed rasestumisvastased vahendid) on ebaefektiivsed või talumatud.
					100	C61-C61	Onkoloog, Uroloog				lokaalse või lokaalselt levinud kõrge riskiga (kliiniline staadium >=T2c või Gleasoni skoor 8-10 või PSA >=20 ng/ml või regionaalsete lümfisõlmede haaratus või positiivne resektsioonipiir) multimodaalse ravi osana kuni 2 aasta vältel ning metastaseerunud eesnäärmevähiga patsientidele
					50						
					100	N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks
					75	N80-N80					III-IV astme endometrioosi põdevatele patsientidele
1023950	granisetroon, 1mg	A04AA02	KYTRIL, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Atnahs Pharma Netherlands B.V.	100	C00-D48					suukaudsest keemiaravist põhjustatud iivelduse ja oksendamise profülaktikaks ja raviks juhul, kui metoklopramiid ei ole esmase valikuna soovitatud või on osutunud ebaefektiivseks
					50						
1800470	guselkumab, 100mg 1ml	L04AC16	TREMFYA, süstelahus pen-süstlis, 1ml 1TK	Janssen - Cilag International	100	L40-L40	Pediaater, Dermatovenerloog				patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus L40 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori ja ustekinumabi kasutamine vastunäidustatud
					100	M07.0-M07.3	Pediaater, Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega				ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus M07.0-3 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori ja ustekinumabi kasutamine vastunäidustatud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1014680	haloperidool, 1,5mg	N05AD01	HALOPERIDOL-RICHTER, tablett, 50TK	Gedeon Richter Plc.	100	F33.2-F33.3, F18.4-F18.7, F60.3-F60.3, F11.4-F11.7, F13.4-F13.7, F14.4-F14.7, F17.4-F17.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F70-F79, F00-F09, F20-F29, F32.2-F33.2, F15.4-F15.7, F30-F31, F12.4-F12.7, F10.4-F10.7	Psühhiaater	esmane			
					50						
1014691	haloperidool, 2mg 1ml	N05AD01	HALOPERIDOL-RICHTER, suukaudsed tilgad, lahus, 10ml 1TK	Gedeon Richter Plc.	50						
					100	F33.2-F33.3, F18.4-F18.7, F60.3-F60.3, F11.4-F11.7, F13.4-F13.7, F14.4-F14.7, F17.4-F17.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F70-F79, F00-F09, F20-F29, F32.2-F33.2, F15.4-F15.7, F30-F31, F12.4-F12.7, F10.4-F10.7	Psühhiaater	esmane			

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1014679	haloperidool, 5mg	N05AD01	HALOPERIDOL-RICHTER, tablett, 50TK	Gedeon Richter Plc.	100	F33.2-F33.3, F18.4-F18.7, F60.3-F60.3, F11.4-F11.7, F13.4-F13.7, F14.4-F14.7, F17.4-F17.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F70-F79, F00-F09, F20-F29, F32.2-F33.2, F15.4-F15.7, F30-F31, F12.4-F12.7, F10.4-F10.7	Psühhiaater	esmane			
					50						
1054055	hõbesulfadiasiin, 10mg 1g	D06BA01	SULFARGIN, salv, 50g 1TK	Grindeks AS	50						
1015478	hüdroklorotiasiid, 25mg	C03AA03	HYPOTHIAZID, tablett, 20TK	Sanofi Winthrop Industrie	100	I27.0-I27.0					
					50						
					75	I15-I15, I10-I13, O10-O16, I50-I50					
1137013	hüdrokortisoon, 10mg 1g	D07AA02	HYDROCORTISONE DAK, salv, 30g 1TK	Orifarm Healthcare A/S	50						
1018594	hüdrokortisoon+fusidiinhape, 10mg+20mg 1g	D07CA83	FUCIDIN H, kreem, 15g 1TK	LEO Pharma A/S	50						
1035403	hüdrokortisoon+kloorheksidiin, 10mg+10mg 1g	D07BA80	SIBICORT, kreem, 20g 1TK	Orion Corporation	50						
1045145	hüdrokortisoon+tsiprofloksatsiin, 10mg+2mg 1ml	S02CA82	CIPROBAY HC, kõrvatilgad, suspensioon, 10ml 1TK	Novartis Baltics SIA	50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1036022	hüdroksükarbamiid, 500mg	L01XX05	HYDREA, kõvakapsel, 100TK	Cheplapharm Arzneimittel GmbH	50						
					100	D57-D57	Hematoloog, Onkoloog				
					100	C00-D48	Hematoloog, Onkoloog				
1615698	hüdroksükarbamiid, 500mg	L01XX05	HYDREA, kõvakapsel, 100TK	First Pharma OÜ	100	D57-D57	Onkoloog, Hematoloog				
					50						
					100	C00-D48	Onkoloog, Hematoloog				
1878251	hüdroksükarbamiid, 500mg	L01XX05	HYDREA, kõvakapsel, 100TK	Lex Ano UAB	100	C00-D48	Onkoloog, Hematoloog				
					100	D57-D57	Hematoloog, Onkoloog				
					50						
1027291	hüdroksüklorokviin, 200mg	P01BA02	PLAQUENIL, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Sanofi Winthrop Industrie	50						
					75	M45-M46, M08-M08, M30-M35, M05-M06	Pediaater, Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega	esmane			
					75	L66-L66, L93-L93, L92-L92	Dermatovenerloog				
1566086	hüdroksüklorokviin, 200mg	P01BA02	PLAQUENIL, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	First Pharma OÜ	75	M45-M46, M08-M08, M30-M35, M05-M06	Reumatoloog, Pediaater, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega	esmane			
					75	L66-L66, L93-L93, L92-L92	Dermatovenerloog				
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1830529	hüdroksüklorokviin, 200mg	P01BA02	PLAQUENIL, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Lex Ano UAB	75	L66-L66, L93-L93, L92-L92	Dermatovenerol oog				
					75	M45-M46, M08-M08, M30-M35, M05-M06	Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater	esmane			
					50						
1891290	hüdroksüklorokviin, 200mg	P01BA02	PLAQUENIL, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Ideal Trade Links UAB	75	M45-M46, M08-M08, M30-M35, M05-M06	Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater, Reumatoloog	esmane			
					75	L66-L66, L93-L93, L92-L92	Dermatovenerol oog				
					50						
1893551	hüdroksüklorokviin, 200mg	P01BA02	PLAQUENIL, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Lex Ano UAB	75	L66-L66, L93-L93, L92-L92	Dermatovenerol oog				
					50						
					75	M45-M46, M08-M08, M30-M35, M05-M06	Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater	esmane			
3131985	hüdroksüklorokviin, 200mg	P01BA02	PLAQUENIL, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Ideal Trade Links UAB	75	M45-M46, M08-M08, M30-M35, M05-M06	Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater	esmane			
					75	L66-L66, L93-L93, L92-L92	Dermatovenerol oog				
					50						
1498978	ibandroonhape, 150mg	M05BA06	IBANDRONIC ACID TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 1TK	Teva B.V.	75	M80-M80					patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1498989	ibandroonhape, 150mg	M05BA06	IBANDRONIC ACID TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 3TK	Teva B.V.	75	M80-M80					patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna
					50						
1798825	ibrutiniib, 140mg	L01EL01	IMBRUVICA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Janssen - Cilag International	100	C91.1-C91.1	Hematoloog				monoteraapiana patsientidele, kellel esineb 17p deletsioon või TP53 mutatsioon, kes ei ole eelnevalt ravi saanud või kes on eelnevalt saanud vähemalt ühe ravikuuri ja haigus ei ole ravile allunud või on taastekkinud lühema aja kui 36 kuu jooksul eelneva ravi alustamisest alates ning patsientidele, kellel esineb 11q deletsioon, kes ei ole eelnevalt ravi saanud või kes on eelnevalt saanud vähemalt ühe ravikuuri ja haigus ei ole ravile allunud või on taastekkinud ning kombinatsioonis venetoklaksiga patsientidele, kes ei ole eelnevalt ravi saanud. Kombinatsioonravi pikkus maksimaalselt 15 tsüklit.
					100	C83.1-C83.1	Hematoloog				monoteraapiana heas üldseisundis (ECOG 0-1) ravirefraktaarsele mantelrakulise lümfoomiga patsiendile (dokumenteeritud suutmatus saavutada vähemalt osalist ravivastust) või teise rea ravina patsiendile, kellel on tekkinud haiguse varajane ägenemine (<24 kuud). Ravi ibrutiniibiga teostatakse kuni haiguse progressioonini
1775156	ibrutiniib, 420mg	L01EL01	IMBRUVICA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Janssen - Cilag International	100	C91.1-C91.1	Hematoloog				monoteraapiana patsientidele, kellel esineb 17p deletsioon või TP53 mutatsioon, kes ei ole eelnevalt ravi saanud või kes on eelnevalt saanud vähemalt ühe ravikuuri ja haigus ei ole ravile allunud või on taastekkinud lühema aja kui 36 kuu jooksul eelneva ravi alustamisest alates ning patsientidele, kellel esineb 11q deletsioon, kes ei ole eelnevalt ravi saanud või kes on eelnevalt saanud vähemalt ühe ravikuuri ja haigus ei ole ravile allunud või on taastekkinud ning kombinatsioonis venetoklaksiga patsientidele, kes ei ole eelnevalt ravi saanud. Kombinatsioonravi pikkus maksimaalselt 15 tsüklit.
1775167	ibrutiniib, 560mg	L01EL01	IMBRUVICA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Janssen - Cilag International	100	C83.1-C83.1	Hematoloog				monoteraapiana heas üldseisundis (ECOG 0-1) ravirefraktaarsele mantelrakulise lümfoomiga patsiendile (dokumenteeritud suutmatus saavutada vähemalt osalist ravivastust) või teise rea ravina patsiendile, kellel on tekkinud haiguse varajane ägenemine (<24 kuud). Ravi ibrutiniibiga teostatakse kuni haiguse progressioonini

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1073012	ibuprofeen, 400mg	M01AE01	IBUMAX, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Vitabalans Oy	50						
					100	C00-D48					
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					75	M15-M19			63,00		
1073089	ibuprofeen, 400mg	M01AE01	IBUMETIN, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Orifarm Healthcare A/S	50						
					100	C00-D48					
					75	M15-M19			63,00		
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
1473588	ibuprofeen, 400mg	M01AE01	IBUPROFEN LANNACHER, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	G.L. Pharma GmbH	75	M15-M19			63,00		
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					100	C00-D48					
					50						
1032714	ibuprofeen, 600mg	M01AE01	IBUPROFEN LANNACHER, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	G.L. Pharma GmbH	100	C00-D48					
					75	M15-M19			63,00		
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					50						
1073113	ibuprofeen, 600mg	M01AE01	IBUMETIN, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Orifarm Healthcare A/S	75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					75	M15-M19			63,00		
					100	C00-D48					
					50						
1085194	ibuprofeen, 600mg	M01AE01	IBUMAX, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Vitabalans Oy	100	C00-D48					
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					50						
					75	M15-M19			63,00		

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1085206	ibuprofeen, 600mg	M01AE01	IBUMAX, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Vitabalans Oy	100	C00-D48					
					50						
					75	M15-M19			63,00		
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
1473599	ibuprofeen, 600mg	M01AE01	IBUPROFEN LANNACHER, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	G.L. Pharma GmbH	75	M15-M19			63,00		
					50						
					100	C00-D48					
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
1673692	ibuprofeen, 600mg	M01AE01	IBUPROFEN ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Accord Healthcare B.V.	100	C00-D48					
					75	M15-M19			63,00		
					50						
					75	M05-M08, M30-M35, M45-M46					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1697126	idebenoon, 150mg	N06BX13	RAXONE, õhukese polümeerikattega tablett, 180TK	Chiesi Farmaceutici S.p.A.	100	H47.2-H47.2	Oftalmoloog				ravi jätkamiseks kliiniliselt olulise paranemise (clinically relevant recovery, CRR) saavutamisel võrreldes idebenoon-ravi alustamisega geneetilise testiga kinnitatud Leberi päriliku optilise neuropaatia näidustusel. Ravi jätkamisel toimub ravivastuse hindamine iga 6 kuu tagant. Ravi lõpetatakse, kui pärast CRR saavutamist ei ole kahel järjestikusel mõõtmisel enam toimunud täiendavat nägemisteravuse paranemist. Off-chart patsiendil, kes enne ravi alustamist ei näe ühtegi tähte logMAR lugemistabelil, tähendab CRR võimet lugeda lugemistabelilt vähemalt 5 tähte (võrdne ühe rea lugemisega) ning on-chart patsiendil, kes suutis lugeda tähti lugemistabelilt enne ravi alustamist, tähendab CRR võimet lugeda täiendavalt vähemalt 10 tähte (võrdne 2 rea lugemisega lugemistabelil)
					100	H47.2-H47.2	Oftalmoloog				ravi alustamiseks geneetilise testiga kinnitatud Leberi päriliku optilise neuropaatia näidustusel ning jätkamiseks patsientidel, kellel ei ole iga 3 kuu järgsel ravivastuse hindamisel saavutatud olulist kliinilist paranemist (clinically relevant recovery, CRR) pärast 3. 6. ja 9. ravikuud. Ravi lõpetatakse kui 12. kuu järel ei ole CRR saavutatud. Off-chart patsiendil, kes enne ravi alustamist ei näe ühtegi tähte logMAR lugemistabelil, tähendab CRR võimet lugeda lugemistabelilt vähemalt 5 tähte (võrdne ühe rea lugemisega) ning on-chart patsiendil, kes suutis lugeda tähti lugemistabelilt enne ravi alustamist, tähendab CRR võimet lugeda täiendavalt vähemalt 10 tähte (võrdne 2 rea lugemisega lugemistabelil)

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1717107	iksekizumab, 80mg 1ml	L04AC13	TALTZ, süstelahus pen-süstlis, 1ml 1TK	Eli Lilly And Co (Ireland) Limited	100	L40-L40	Pediaater, Dermatovenerol oog				patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus L40 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori ja ustekinumabi kasutamine vastunäidustatud
					100	M45-M45, M46-M46	Pediaater, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus M45 ja M46 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud.
					100	M07.0-M07.3	Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus M07.0-3 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori ja ustekinumabi kasutamine vastunäidustatud
1291890	iloprost, 10mcg 1ml	B01AC11	VENTAVIS, nebuliseeritav lahus, 1ml 30TK	Bayer AG	50						
					100	I27.0-I27.0	Pediaater, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pulmonoloog, Pediaater kardioloogi lisapädevusega, Reumatoloog, Kardioloog				NYHA III-IV kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafiil on vastunäidustatud, ostunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1291902	iloprost, 10mcg 1ml	B01AC11	VENTAVIS, nebuliseeritav lahus, 1ml 168TK	Bayer AG	100	I27.0-I27.0	Pediaater, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater kardioloogi lisapädevusega, Reumatoloog, Pulmonoloog, Kardioloog				NYHA III-IV kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafiil on vastunäidustatud, ostunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid
					50						
1566413	imatiniib, 100mg	L01EA01	MEAXIN, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	100	C92.1-C92.1	Hematoloog				konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi ning imatiniibravi foonil püsib hematoloogiline ravivastus (haigus ei progresseeru)
					100	C49.9-C49.9, C16-C20	Onkoloog				patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: KITpositiivse kõrge retsidiiviriskiga pahaloomulise gastrointestinaalse stromaaltuumori adjuvantraviks kuni 3 aasta vältel ja KITpositiivse mitteopereeritava või metastaseerunud pahaloomulise gastrointestinaalse stromaaltuumori raviks, kui mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena
					100	C83.5-C83.5, C91.0-C91.0	Hematoloog				patsiendile, kelle ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: Ph-positiivse B-rakulise lümfoblastleukeemia või -lümfoomi raviks kuni 3 aasta vältel või haiguse progresseerumiseni

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1588417	imatiniib, 100mg	L01EA01	IMATINIB GRINDEKS, kõvakapsel, 120TK	Grindeks AS	100	C83.5-C83.5, C91.0-C91.0	Hematoloog				patsiendile, kelle ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: Ph-positiivse B-rakulise lümfoblastleukeemia või -lümfoomi raviks kuni 3 aasta vältel või haiguse progresseerumiseni
					100	C92.1-C92.1	Hematoloog				konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi ning imatiniibravi foonil püsib hematoloogiline ravivastus (haigus ei progresseeru)
					100	C49.9-C49.9, C16-C20	Onkoloog				patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: KITpositiivse kõrge retsidiiviriskiga pahaloomulise gastrointestinaalse stromaaltuumori adjuvantraviks kuni 3 aasta vältel ja KITpositiivse mitteopereeritava või metastaseerunud pahaloomulise gastrointestinaalse stromaaltuumori raviks, kui mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena
1604900	imatiniib, 100mg	L01EA01	IMATINIB TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Teva B.V.	100	C83.5-C83.5, C91.0-C91.0	Hematoloog				patsiendile, kelle ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: Ph-positiivse B-rakulise lümfoblastleukeemia või -lümfoomi raviks kuni 3 aasta vältel või haiguse progresseerumiseni
					100	C92.1-C92.1	Hematoloog				konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi ning imatiniibravi foonil püsib hematoloogiline ravivastus (haigus ei progresseeru)
					100	C49.9-C49.9, C16-C20	Onkoloog				patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: KITpositiivse kõrge retsidiiviriskiga pahaloomulise gastrointestinaalse stromaaltuumori adjuvantraviks kuni 3 aasta vältel ja KITpositiivse mitteopereeritava või metastaseerunud pahaloomulise gastrointestinaalse stromaaltuumori raviks, kui mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1619726	imatiniib, 100mg	L01EA01	IMATINIB ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	C92.1-C92.1	Hematoloog				konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi ning imatiniibravi foonil püsib hematoloogiline ravivastus (haigus ei progresseeru)
					100	C83.5-C83.5, C91.0-C91.0	Hematoloog				patsiendile, kelle ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: Ph-positiivse B-rakulise lümfoblastleukeemia või -lümfoomi raviks kuni 3 aasta vältel või haiguse progresseerumiseni
					100	C49.9-C49.9, C16-C20	Onkoloog				patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: KITpositiivse kõrge retsidiiviriskiga pahaloomulise gastrointestinaalse stromaaltuumori adjuvantraviks kuni 3 aasta vältel ja KITpositiivse mitteopereeritava või metastaseerunud pahaloomulise gastrointestinaalse stromaaltuumori raviks, kui mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena
1619759	imatiniib, 400mg	L01EA01	IMATINIB ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	C49.9-C49.9, C16-C20	Onkoloog				patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: KITpositiivse kõrge retsidiiviriskiga pahaloomulise gastrointestinaalse stromaaltuumori adjuvantraviks kuni 3 aasta vältel ja KITpositiivse mitteopereeritava või metastaseerunud pahaloomulise gastrointestinaalse stromaaltuumori raviks, kui mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena
					100	C83.5-C83.5, C91.0-C91.0	Hematoloog				patsiendile, kelle ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: Ph-positiivse B-rakulise lümfoblastleukeemia või -lümfoomi raviks kuni 3 aasta vältel või haiguse progresseerumiseni
					100	C92.1-C92.1	Hematoloog				konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi ning imatiniibravi foonil püsib hematoloogiline ravivastus (haigus ei progresseeru)

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1658471	imatiniib, 400mg	L01EA01	GLIPOX, kõvakapsel, 30TK	Norameda UAB	100	C49.9-C49.9, C16-C20	Onkoloog				patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: KITpositiivse kõrge retsidiiviriskiga pahaloomulise gastrointestinaalse stromaaltuumori adjuvantraviks kuni 3 aasta vältel ja KITpositiivse mitteopereeritava või metastaseerunud pahaloomulise gastrointestinaalse stromaaltuumori raviks, kui mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena
					100	C92.1-C92.1	Hematoloog				konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi ning imatiniibravi foonil püsib hematoloogiline ravivastus (haigus ei progresseeru)
					100	C83.5-C83.5, C91.0-C91.0	Hematoloog				patsiendile, kelle ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: Ph-positiivse B-rakulise lümfoblastleukeemia või -lümfoomi raviks kuni 3 aasta vältel või haiguse progresseerumiseni
7000085	imikute toitesegu,		APTAMIL Pepti MCT (APTAMIL DIGESTIVE CARE), pulber, 400 g 12TK	N.V. Nutricia	75	K52.2-K52.2, L27.2-L27.2, L50-L50, T78.1-T78.1, K22.8-K22.8, K90.4-K90.4, T78.2-T78.2, L20.8-L20.8, T78.0-T78.0				1,00	
7002863	imikute toitesegu,		FRISOLAC GOLD PEP AC, pulber, 400g	Friesland Foods BV	75	K52.2-K52.2, L27.2-L27.2, L50-L50, T78.1-T78.1, K22.8-K22.8, K90.4-K90.4, T78.2-T78.2, L20.8-L20.8, T78.0-T78.0				1,00	

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
7002874	imikute toitesegu,		FRISOLAC GOLD PREMATURE, pulber, 400g	Friesland Foods BV	75	P05-P05, E42-E42, P07-P07, P27.1-P27.1				0,58	
7002885	imikute toitesegu,		FRISOLAC GOLD PEP, pulber, 400g	Friesland Foods BV	75	K52.2-K52.2, L27.2-L27.2, L50-L50, T78.1-T78.1, K22.8-K22.8, K90.4-K90.4, T78.2-T78.2, L20.8-L20.8, T78.0-T78.0				1,00	
7017971	imikute toitesegu,		Neocate (aminohapete segu), pulber, 400g N6	Nutrimedical OÜ	75	K52.2-K52.2, L27.2-L27.2, L50-L50, T78.1-T78.1, K22.8-K22.8, K90.4-K90.4, T78.2-T78.2, L20.8-L20.8, T78.0-T78.0				1,00	
7018095	imikute toitesegu,		APTAMIL FMS (HMF), pulber, 200g	Nutricia Cuijk bv	75	P05-P05, E42-E42, P07-P07, P27.1-P27.1				0,58	
7004933	imikute toitesegu,		APTAMIL PREMATIL, pulber, 400 g	Nutricia Cuijk BV.	75	P05-P05, E42-E42, P07-P07, P27.1-P27.1				0,58	
7018130	imikute toitesegu,		BLEMIL PLUS ELEMENTAL, pulber, 400g N1	Laboratorios Ordesa, S.L	75	K52.2-K52.2, L27.2-L27.2, L50-L50, T78.1-T78.1, K22.8-K22.8, K90.4-K90.4, T78.2-T78.2, L20.8-L20.8, T78.0-T78.0				1,00	
7017432	imikute toitesegu,		INFATRINI, suspensioon, 125ml N24	Nutricia	75	E42-E42				1,00	lastele, kellele on paigaldatud gastrostoom või jejunostoom

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
7018017	imikute toitesegu,		Aptamil Pepti Syneo, pulber, 400g N12	Nutricia Cuijk bv	75	K52.2-K52.2, L27.2-L27.2, L50-L50, T78.1-T78.1, K22.8-K22.8, K90.4-K90.4, T78.2-T78.2, L20.8-L20.8, T78.0-T78.0				1,00	
1060322	imikvimood, 5%	D06BB10	ALDARA, kreem, 250mg 12TK	VIATRIS HEALTHCARE Limited	50						
1615968	immunoglobuliin, ekstravaskulaarseks kasutamiseks, 100mg 1ml	J06BA01	HYQVIA, infusioonilahus, 50ml 1TK	Baxalta Innovations GmbH	100	G61.8-G61.8, D80-D83	Hematoloog, Allergoloog-immunoloog, Infektsionist, Neuroloog				
					100	D84-D84	Hematoloog, Infektsionist, Neuroloog, Allergoloog-immunoloog, Reumatoloog				patsiendil esinevad rasked või korduvad infektsioonid, antimikroobne ravi on ebaefektiivne ja esineb kas tõestatud spetsiifilise antikeha puudulikkus või seerumi IgG <= 4 g/l
1615979	immunoglobuliin, ekstravaskulaarseks kasutamiseks, 100mg 1ml	J06BA01	HYQVIA, infusioonilahus, 100ml 1TK	Baxalta Innovations GmbH	100	G61.8-G61.8, D80-D83	Infektsionist, Allergoloog-immunoloog, Neuroloog, Hematoloog				
					100	D84-D84	Reumatoloog, Neuroloog, Infektsionist, Hematoloog, Allergoloog-immunoloog				patsiendil esinevad rasked või korduvad infektsioonid, antimikroobne ravi on ebaefektiivne ja esineb kas tõestatud spetsiifilise antikeha puudulikkus või seerumi IgG <= 4 g/l

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1615980	immunoglobuliin, ekstravaskulaarseks kasutamiseks, 100mg 1ml	J06BA01	HYQVIA, infusioonilahus, 200ml 1TK	Baxalta Innovations GmbH	100	G61.8-G61.8, D80-D83	Infektsionist, Neuroloog, Hematoloog, Allergoloog-immunoloog				
					100	D84-D84	Reumatoloog, Hematoloog, Neuroloog, Allergoloog-immunoloog, Infektsionist				patsiendil esinevad rasked või korduvad infektsioonid, antimikroobne ravi on ebaefektiivne ja esineb kas tõestatud spetsiifilise antikeha puudulikkus või seerumi IgG <= 4 g/l
1615991	immunoglobuliin, ekstravaskulaarseks kasutamiseks, 100mg 1ml	J06BA01	HYQVIA, infusioonilahus, 300ml 1TK	Baxalta Innovations GmbH	100	G61.8-G61.8, D80-D83	Hematoloog, Allergoloog-immunoloog, Infektsionist, Neuroloog				
					100	D84-D84	Neuroloog, Hematoloog, Reumatoloog, Allergoloog-immunoloog, Infektsionist				patsiendil esinevad rasked või korduvad infektsioonid, antimikroobne ravi on ebaefektiivne ja esineb kas tõestatud spetsiifilise antikeha puudulikkus või seerumi IgG <= 4 g/l
1452169	indakaterool, 150mcg	R03AC18	ONBREZ BREEZHALER, inhalatsioonipulber kõvakapslis, 30TK	Novartis Europharm Limited	75	J44-J44, J43-J43	Pulmonoloog	esmane			
					50						
1452215	indakaterool, 300mcg	R03AC18	ONBREZ BREEZHALER, inhalatsioonipulber kõvakapslis, 30TK	Novartis Europharm Limited	50						
					75	J44-J44, J43-J43	Pulmonoloog	esmane			
1626555	indakaterool+glükopürroonium, 85mcg+43mcg	R03AL04	ULTIBRO BREEZHALER, inhalatsioonipulber kõvakapslis, 30TK	Novartis Europharm Limited	75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1167780	indapamiid, 1,5mg	C03BA11	TERTENSIF SR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Les Laboratoires Servier	75	I15-I15, I10-I13, O10-O16, I50-I50					
					50						
					100	I27.0-I27.0					
1185230	indapamiid, 1,5mg	C03BA11	RAWEL SR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	100	I27.0-I27.0					
					75	I15-I15, I10-I13, O10-O16, I50-I50					
					50						
1379741	indapamiid, 1,5mg	C03BA11	INDAMAX, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	100	I27.0-I27.0					
					50						
					75	I15-I15, I10-I13, O10-O16, I50-I50					
1860746	indapamiid, 1,5mg	C03BA11	TERTENSIF SR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Ideal Trade Links UAB	50						
					100	I27.0-I27.0					
					75	I15-I15, I10-I13, O10-O16, I50-I50					
1019416	indapamiid, 2,5mg	C03BA11	TERTENSIF, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Les Laboratoires Servier	50						
					100	I27.0-I27.0					
					75	I15-I15, I10-I13, O10-O16, I50-I50					
1038383	indapamiid, 2,5mg	C03BA11	PROINDAP, kõvakapsel, 30TK	Pro.Med.Cs Praha a.s.	100	I27.0-I27.0					
					50						
					75	I15-I15, I10-I13, O10-O16, I50-I50					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1886261	inklisiraan, 284mg 1.5ml	C10AX16	LEQVIO, süstelahus süstlis, 1.5ml 1TK	Novartis Europharm Limited	100	I22-I22, Z95-Z95, I66-I66, I69-I69, I25-I25, I63-I63, I21-I21, I70.2-I70.2, I65-I65, I20.0-I20.0	Neuroloog, vaskulaarkirurg, Kardioloog	esmane			patsientidele, kellel on olnud äge koronaarsündroom (ÄKS, sh STEMI, NSTEMI, ebastabiilne stenokardia: I21, I22, I20.0), krooniline südame isheemiatõbi (I25), ajuinfarkt (I63), pretserebraalsete või peaajuarterite stenoos või oklusioon ilma peaajuinfarktita (I65, I66), jäsemete ateroskleroos (I70.2), insuldi jääknähud (I69) või kellele on tehtud revaskulariseeriv protseduur (koronaar-, karotiid- või perifeersete arterite osas) (Z95), ning kelle LDL-C väärtus on >=1,8 mmol/l vaatamata 1–3 kuud kestnud ravile maksimaalses talutavas annuses statiini ja esetimiibiga või kellele statiin/esetimiib on vastunäidustatud
					100	E78.0-E78.0	Kardioloog	esmane			kroonilise perekondliku hüperkolesteroleemia raviks dokumenteeritud ateroskleroosiga patsientidele, kui varasem 1-3 kuud ravi maksimaalses talutavas annuses statiini ja esetimiibiga on osutunud ebapiisavaks või on statiin ja/või esetimiib vastunäidustatud ning patsiendi LDL-C väärtus on >=1,8 mmol/l
1105940	ipratroopiumbromiid, 20mcg 1annus	R03BB01	ATROVENT N, inhalatsiooniaerosool, lahus, 200annus 1TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	50						
					75	J45-J45					
					75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			
3095164	ipratroopiumbromiid, 20mcg 1mõõtannus	R03BB01	ATROVENT N, inhalatsiooniaerosool, lahus, 200mõõtannus 1TK	Ideal Trade Links UAB	75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			
					50						
					75	J45-J45					
3083060	iptakopaan, 200mg	L04AJ08	FABHALTA, kõvakapsel, 56TK	Novartis Europharm Limited	100	D59.5-D59.5	Hematoloog				hematoloogidest koosneva ekspertkomisjoni otsuse alusel paroksüsmaalse öise hemoglobinuuria raviks täiskasvanud patsientidele, kellel on hemolüütiline aneemia
1699724	isavukonasool, 100mg	J02AC05	CRESEMBA, kõvakapsel, 14TK	Basilea Pharmaceutica Deutschland GmbH	100	B44-B44					kui ravi vorikonasooliga on olnud ebaefektiivne või vastunäidustatud ning ravi on alustatud haiglas
					100	B46-B46					kui ravi on alustatud haiglas
1000348	isokonasool, 10mg 1g	D01AC05	TRAVOGEN, kreem, 20g 1TK	LEO Pharma A/S	50						
1820191	isokonasool, 10mg 1g	D01AC05	TRAVOGEN, kreem, 30g 1TK	First Pharma OÜ	50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1865156	isokonasool, 10mg 1g	D01AC05	TRAVOGEN, kreem, 30g 1TK	Ideal Trade Links UAB	50						
1000416	isokonasool+difluk ortoloon, 10mg+1mg 1g	D01AC80	TRAVOCORT, kreem, 15g 1TK	LEO Pharma A/S	50						
1783830	isokonasool+difluk ortoloon, 10mg+1mg 1g	D01AC80	TRAVOCORT, kreem, 30g 1TK	First Pharma OÜ	50						
1827659	isokonasool+difluk ortoloon, 10mg+1mg 1g	D01AC80	TRAVOCORT, kreem, 30g 1TK	Ideal Trade Links UAB	50						
1891380	isokonasool+difluk ortoloon, 10mg+1mg 1g	D01AC80	TRAVOCORT, kreem, 30g 1TK	Lex Ano UAB	50						
3083374	isokonasool+difluk ortoloon, 10mg+1mg 1g	D01AC80	TRAVOCORT, kreem, 30g 1TK	Lex Ano UAB	50						
1043547	isosorbiitmononitraat, 20mg	C01DA14	MONOSAN 20 MG, tablett, 30TK	Pro.Med.Cs Praha a.s.	75	I20-I20					
					50						
1017010	isosorbiitmononitraat, 40mg	C01DA14	MONOSAN 40 MG, tablett, 30TK	Pro.Med.Cs Praha a.s.	75	I20-I20					
					50						
1046786	isosorbiitmononitraat, 60mg	C01DA14	IMDUR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	TopRidge Pharma (Ireland) Limited	75	I20-I20					
					50						
1127584	isosorbiitmononitraat, 60mg	C01DA14	ISOMONIT 60 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Hexal AG	75	I20-I20					
					50						
1004364	isotretinoiin, 10mg	D10BA01	ROACCUTANE 10 MG, pehmekapsel, 30TK	Cheplapharm Registration GmbH	75	L43-L43	Dermatovenerol oog, Pediaater				
					50						
					75	L70.0-L70.0, L71.8-L71.8, L70.1-L70.2	Dermatovenerol oog				

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1790007	isotretinoiin, 10mg	D10BA01	ISOTRETINOIN SANDOZ, pehmekapsel, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	L70.0-L70.0, L71.8-L71.8, L70.1-L70.2	Dermatovenerol oog				
					50						
					75	L43-L43	Dermatovenerol oog, Pediaater				
1112230	isotretinoiin, 20mg	D10BA01	ROACCUTANE 20 MG, pehmekapsel, 30TK	Cheplapharm Registration GmbH	50						
					75	L70.0-L70.0, L71.8-L71.8, L70.1-L70.2	Dermatovenerol oog				
					75	L43-L43	Dermatovenerol oog, Pediaater				
1790041	isotretinoiin, 20mg	D10BA01	ISOTRETINOIN SANDOZ, pehmekapsel, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	L70.0-L70.0, L71.8-L71.8, L70.1-L70.2	Dermatovenerol oog				
					75	L43-L43	Pediaater, Dermatovenerol oog				
					50						
1833599	isotretinoiin, 20mg	D10BA01	ISOTIORGA, pehmekapsel, 30TK	Laboratoires Bailleul S.A.	75	L70.0-L70.0, L71.8-L71.8, L70.1-L70.2	Dermatovenerol oog				
					75	L43-L43	Dermatovenerol oog, Pediaater				
					50						
1183553	itrakonasool, 100mg	J02AC02	CLADOSOL 100MG, kõvakapsel, 14TK	Stada Arzneimittel AG	100	B45-B45, B48.2-B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44-B44					kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1230488	itrakonasool, 100mg	J02AC02	ITRACONAZOL ACTAVIS, kõvakapsel, 28TK	Teva B.V.	50						
					100	B45-B45, B48.2-B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44-B44					kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks
1821057	ivakaftoor, 150mg	R07AX02	KALYDECO, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited	100	E84-E84	Pediaater allergoloogi lisapädevusega, Pulmonoloog, Pediaater				koos ivakaftoori/tesakaftoori/eleksakaftoori tablettidega tsüstilise fibroosi kombinatsioonraviks patsientidele, kellel on tsüstilise fibroosi transmembraanse juhtivuse regulaatorgeenis vähemalt üks F508del-mutatsioon
3058253	ivakaftoor, 59,5mg	R07AX02	KALYDECO, graanulid kotikeses, 28TK	Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited	100	E84-E84	Pediaater allergoloogi lisapädevusega, Pediaater, Pulmonoloog				koos ivakaftoori/tesakaftoori/eleksakaftoori tablettidega tsüstilise fibroosi kombinatsioonraviks patsientidele, kellel on tsüstilise fibroosi transmembraanse juhtivuse regulaatorgeenis vähemalt üks F508del-mutatsioon
1834534	ivakaftoor, 75mg	R07AX02	KALYDECO, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited	100	E84-E84	Pediaater allergoloogi lisapädevusega, Pulmonoloog, Pediaater				koos ivakaftoori/tesakaftoori/eleksakaftoori tablettidega tsüstilise fibroosi kombinatsioonraviks patsientidele, kellel on tsüstilise fibroosi transmembraanse juhtivuse regulaatorgeenis vähemalt üks F508del-mutatsioon
3061516	ivakaftoor, 75mg	R07AX02	KALYDECO, graanulid kotikeses, 28TK	Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited	100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater, Pediaater allergoloogi lisapädevusega				koos ivakaftoori/tesakaftoori/eleksakaftoori tablettidega tsüstilise fibroosi kombinatsioonraviks patsientidele, kellel on tsüstilise fibroosi transmembraanse juhtivuse regulaatorgeenis vähemalt üks F508del-mutatsioon
1872211	ivakaftoor+tesakaftoor+eleksakaftoor, 37,5mg+25mg+50mg	R07AX32	KAFTRIO, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited	100	E84-E84	Pediaater, Pulmonoloog, Pediaater allergoloogi lisapädevusega				koos ivakaftooriga tsüstilise fibroosi kombinatsioonraviks patsientidele, kellel on tsüstilise fibroosi transmembraanse juhtivuse regulaatorgeenis vähemalt üks F508del-mutatsioon
3059771	ivakaftoor+tesakaftoor+eleksakaftoor, 60mg+40mg+80mg	R07AX32	KAFTRIO, graanulid kotikeses, 28TK	Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited	100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater, Pediaater allergoloogi lisapädevusega				koos ivakaftooriga tsüstilise fibroosi kombinatsioonraviks patsientidele, kellel on tsüstilise fibroosi transmembraanse juhtivuse regulaatorgeenis vähemalt üks F508del-mutatsioon

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1826232	ivakaftoor+tesakaftoor+eleksakaftoor, 75mg+50mg+100 mg	R07AX32	KAFTRIO, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited	100	E84-E84	Pediaater, Pediaater allergoloogi lisapädevusega, Pulmonoloog				koos ivakaftooriga tsüstilise fibroosi kombinatsioonraviks patsientidele, kellel on tsüstilise fibroosi transmembraanse juhtivuse regulaatorgeenis vähemalt üks F508del-mutatsioon
3059782	ivakaftoor+tesakaftoor+eleksakaftoor, 75mg+50mg+100 mg	R07AX32	KAFTRIO, graanulid kotikeses, 28TK	Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited	100	E84-E84	Pediaater allergoloogi lisapädevusega, Pediaater, Pulmonoloog				koos ivakaftooriga tsüstilise fibroosi kombinatsioonraviks patsientidele, kellel on tsüstilise fibroosi transmembraanse juhtivuse regulaatorgeenis vähemalt üks F508del-mutatsioon
1718535	IX hüübimisfaktor, 1000RÜ	B02BD04	ALPROLIX, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)	100	D67-D67	Hematoloog, Pediaater, Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega				verejooksu episoodide ennetamiseks B- hemofiiliaga patsientidele, kellel on raskendatud veenisiseste süstete teostamine ning seetõttu pole võimalik kasutada profülaktilises annuses vereplasmast valmistatud IX hüübimisfaktorit
1038068	IX hüübimisfaktor, 1200RÜ	B02BD04	IMMUNINE, süste-/infusioonilahuse pulber ja lahusti, 1TK	Baxalta Innovations GmbH	100	D67-D67	Pediaater, Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega, Hematoloog				
1718546	IX hüübimisfaktor, 2000RÜ	B02BD04	ALPROLIX, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)	100	D67-D67	Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega, Hematoloog, Pediaater				verejooksu episoodide ennetamiseks B- hemofiiliaga patsientidele, kellel on raskendatud veenisiseste süstete teostamine ning seetõttu pole võimalik kasutada profülaktilises annuses vereplasmast valmistatud IX hüübimisfaktorit
1718513	IX hüübimisfaktor, 250RÜ	B02BD04	ALPROLIX, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)	100	D67-D67	Hematoloog, Pediaater, Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega				verejooksu episoodide ennetamiseks B- hemofiiliaga patsientidele, kellel on raskendatud veenisiseste süstete teostamine ning seetõttu pole võimalik kasutada profülaktilises annuses vereplasmast valmistatud IX hüübimisfaktorit

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1718557	IX hüübimisfaktor, 3000RÜ	B02BD04	ALPROLIX, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)	100	D67-D67	Hematoloog, Pediaater, Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega				verejooksu episoodide ennetamiseks B- hemofiiliaga patsientidele, kellel on raskendatud veenisiseste süstete teostamine ning seetõttu pole võimalik kasutada profülaktilises annuses vereplasmast valmistatud IX hüübimisfaktorit
1718524	IX hüübimisfaktor, 500RÜ	B02BD04	ALPROLIX, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)	100	D67-D67	Pediaater, Hematoloog, Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega				verejooksu episoodide ennetamiseks B- hemofiiliaga patsientidele, kellel on raskendatud veenisiseste süstete teostamine ning seetõttu pole võimalik kasutada profülaktilises annuses vereplasmast valmistatud IX hüübimisfaktorit
1038057	IX hüübimisfaktor, 600RÜ	B02BD04	IMMUNINE, süste-/infusioonilahuse pulber ja lahusti, 1TK	Baxalta Innovations GmbH	100	D67-D67	Hematoloog, Pediaater, Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega				
1728840	kabosantiniib, 20mg	L01EX07	CABOMETYX, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Ipsen Pharma	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumis heledarakulise neeru kartsinoomi raviks heas üldseisundis (ECOG 0–1) patsientidele teise rea raviks ning heas üldseisundis (ECOG 0–1) patsientidele kolmanda rea raviks, kui sunitiniib ja pasopaniib on vastunäidustatud või ebaefektiivsed
1728862	kabosantiniib, 40mg	L01EX07	CABOMETYX, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Ipsen Pharma	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumis heledarakulise neeru kartsinoomi raviks heas üldseisundis (ECOG 0–1) patsientidele teise rea raviks ning heas üldseisundis (ECOG 0–1) patsientidele kolmanda rea raviks, kui sunitiniib ja pasopaniib on vastunäidustatud või ebaefektiivsed
1728884	kabosantiniib, 60mg	L01EX07	CABOMETYX, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Ipsen Pharma	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumis heledarakulise neeru kartsinoomi raviks heas üldseisundis (ECOG 0–1) patsientidele teise rea raviks ning heas üldseisundis (ECOG 0–1) patsientidele kolmanda rea raviks, kui sunitiniib ja pasopaniib on vastunäidustatud või ebaefektiivsed
1093340	kaltsipotriool+beetametasoon, 50mcg+0,5mg 1g	D05AX80	DAIVOBET, salv, 30g 1TK	LEO Pharma A/S	50						
					75	L40-L40					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1534621	kaltsipotriool+beetametasoon, 50mcg+0,5mg 1g	D05AX80	DAIVOBET, geel, 30g 1TK	LEO Pharma A/S	50						
					75	L40-L40					
1676369	kaltsipotriool+beetametasoon, 50mcg+0,5mg 1g	D05AX80	CABEMET, salv, 30g 1TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	L40-L40					
					50						
1676370	kaltsipotriool+beetametasoon, 50mcg+0,5mg 1g	D05AX80	CABEMET, salv, 60g 1TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	L40-L40					
					50						
1680050	kaltsipotriool+beetametasoon, 50mcg+0,5mg 1g	D05AX80	ENSTILAR, nahavaht, 60g 1TK	LEO Pharma A/S	75	L40-L40					
					50						
3030871	kaltsipotriool+beetametasoon, 50mcg+0,5mg 1g	D05AX80	DAIVOBET, salv, 15g 2TK	Ideal Trade Links UAB	75	L40-L40					
					50						
1004599	kaltsitriool, 0,25mcg	A11CC04	ROCALTROL, pehmekapsel, 30TK	Atnahs Pharma Netherlands B.V.	100	N25-N25, N18-N18	Nefroloog, Pediaater, Pediaater nefroloogi lisapädevusega				
					100	E89.2-E89.2, E20-E20	Pediaater endokrinoloogi lisapädevusega, Endokrinoloog, Pediaater				
					50						
1392016	kaltsium+kolekaltsiferool, 500mg+400RÜ	A12AX80	CALCIGRAN FORTE, närimistablett, 120TK	Orifarm Healthcare A/S	75	M81-M81, M82-M82, M85.8-M85.8					kombinatsioonravi osana antiresorptiivse või anaboolse ravimiga (bisfosfonaat/ densumab või teriparatiid) suure luumurru riskiga patsientidele, kelle reieluu proksimaalse osa murrurisk >=3% ja/või tõsise osteoporootilise murru risk >=15% (ilma DEXA uuringuta >=20%) vastavalt FRAX luumurru riskikalkulaatorile
					100	N18-N18					
					75	M80-M80					kombinatsioonravi osana antiresorptiivse või anaboolse ravimiga (bisfosfonaat/ denosumab või teriparatiid)

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1046337	kaltsiumkarbonaat, 1250mg	A12AA04	CALCIGRAN SINE, närimistablett, 100TK	Orifarm Healthcare A/S	100	N18-N18					
					100	E89.2-E89.2, E20-E20	Endokrinoloog, Pediaater endokrinoloogi lisapädevusega, Pediaater				
1776483	kaltsiumkarbonaat, 1250mg	A12AA04	CALCIGRAN SINE, närimistablett, 120TK	Orifarm Healthcare A/S	100	N18-N18					
					100	E89.2-E89.2, E20-E20	Pediaater endokrinoloogi lisapädevusega, Pediaater, Endokrinoloog				
1291070	kandesartaan, 16mg	C09CA06	PRESCANDEN 16MG, tablett, 56TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1455061	kandesartaan, 16mg	C09CA06	CANDESARTAN ACTAVIS, tablett, 28TK	Actavis Group Ptc ehf.	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1487572	kandesartaan, 16mg	C09CA06	CARZAN 16MG, tablett, 28TK	Zentiva k.s.	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1497630	kandesartaan, 16mg	C09CA06	CANOCORD 16 MG, tablett, 30TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1183867	kandesartaan, 32mg	C09CA06	ATACAND, tablett, 28TK	Cheplapharm Arzneimittel GmbH	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1396470	kandesartaan, 32mg	C09CA06	PRESCANDEN 32MG, tablett, 56TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	I10-I13, I15-I15, I50-I50					
					50						
1487651	kandesartaan, 32mg	C09CA06	CARZAN 32MG, tablett, 28TK	Zentiva k.s.	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1497719	kandesartaan, 32mg	C09CA06	CANOCORD 32 MG, tablett, 30TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1497551	kandesartaan, 8mg	C09CA06	CANOCORD 8 MG, tablett, 30TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1589665	kandesartaan+amlodipiin, 16mg+10mg	C09DB07	ZENICAMO, tablett, 28TK	Zentiva k.s.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1355879	kandesartaan+hüdroklorotiasiid, 16mg+12,5mg	C09DA84	PRESCANDEN HCT 16 MG/12,5 MG, tablett, 28TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1455375	kandesartaan+hüdroklorotiasiid, 16mg+12,5mg	C09DA84	CANDESARTAN HCT ACTAVIS, tablett, 28TK	Actavis Group Ptc ehf.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1487819	kandesartaan+hüdroklorotiasiid, 16mg+12,5mg	C09DA84	CARZAN HCT 16MG/12,5MG, tablett, 28TK	Zentiva k.s.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1634419	kandesartaan+hüdroklorotiasiid, 16mg+12,5mg	C09DA84	CANOCOMBI, tablett, 30TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1634600	kandesartaan+hüdroklorotiasiid, 32mg+12,5mg	C09DA84	CANOCOMBI, tablett, 30TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1634329	kandesartaan+hüdroklorotiasiid, 32mg+25mg	C09DA84	CANOCOMBI, tablett, 30TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1634510	kandesartaan+hüdroklorotiasiid, 8mg+12,5mg	C09DA84	CANOCOMBI, tablett, 30TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1801460	kannabidiool, 100mg 1ml	N03AX24	EPIDYOLEX, suukaudne lahus, 100ml 1TK	Jazz Pharmaceuticals Ireland Limited	100	G40.4-G40.4	Neuroloog, Pediaater neuroloogi lisapädevusega				koos klobasaamiga Lennoxi-Gastaut' sündroomi, Dravet' sündroomi või tuberoosse skleroosi kompleksiga seotud epileptiliste hoogude lisaraviks alates 2-aastastel patsientidel, tingimusel, et raviefekti hinnatakse iga 6 kuu järel. Juhul kui ravieelse perioodiga võrreldes ei ole epilepsiahood vähenenud vähemalt 30%, ravi lõpetatakse

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1567986	kapetsitabiin, 150mg	L01BC06	CAPECITABINE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	C18-C20	Onkoloog				kolorektaalvähi adjuvantseks ja palliatiivseks monokemoteraapiaks
					100	C22-C25	Onkoloog				biliopankreaatilise süsteemi kasvajate adjuvantraviks
					50						
1540099	kapetsitabiin, 500mg	L01BC06	CAPECITABINE ZENTIVA 500 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Zentiva k.s.	100	C22-C25	Onkoloog				biliopankreaatilise süsteemi kasvajate adjuvantraviks
					100	C18-C20	Onkoloog				kolorektaalvähi adjuvantseks ja palliatiivseks monokemoteraapiaks
					50						
1568055	kapetsitabiin, 500mg	L01BC06	CAPECITABINE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	C22-C25	Onkoloog				biliopankreaatilise süsteemi kasvajate adjuvantraviks
					100	C18-C20	Onkoloog				kolorektaalvähi adjuvantseks ja palliatiivseks monokemoteraapiaks
					50						
3035393	kapetsitabiin, 500mg	L01BC06	CAPECITABINE ZENTIVA K.S., õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Zentiva k.s.	50						
					100	C18-C20	Onkoloog				kolorektaalvähi adjuvantseks ja palliatiivseks monokemoteraapiaks
					100	C22-C25	Onkoloog				biliopankreaatilise süsteemi kasvajate adjuvantraviks
1077117	karbamasepiin, 150mg	N03AF01	TIMONIL 150 RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	Desitin Arzneimittel GmbH	100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
					50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					75	G50.0-G50.0					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1042311	karbamasepiin, 200mg	N03AF01	CARBALEX 200 MG, tablett, 50TK	G.L. Pharma GmbH	100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
					75	G50.0-G50.0					
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50						
1077207	karbamasepiin, 300mg	N03AF01	TIMONIL 300 RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	Desitin Arzneimittel GmbH	50						
					75	G50.0-G50.0					
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1115592	karbamasepiin, 300mg	N03AF01	CARBALEX RETARD 300 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 50TK	G.L. Pharma GmbH	100	F18.4-F18.7, F33.2-F33.3, F70-F79, F00-F09, F15.4-F15.7, F14.4-F14.7, F12.4-F12.7, F30-F31, F11.4-F11.7, F60.3-F60.3, F10.4-F10.7, F16.4-F16.7, F32.2-F32.3, F13.4-F13.7, F20-F29, F19.4-F19.7	Psühhiaater	esmane			
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50						
					75	G50.0-G50.0					
1042322	karbamasepiin, 400mg	N03AF01	CARBALEX 400 MG, tablett, 50TK	G.L. Pharma GmbH	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
					75	G50.0-G50.0					
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1007716	karbamasepiin, 600mg	N03AF01	TIMONIL 600 RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 50TK	Desitin Arzneimittel GmbH	75	G50.0-G50.0					
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
					50						
1042333	karbamasepiin, 600mg	N03AF01	CARBALEX RETARD 600 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 50TK	G.L. Pharma GmbH	75	G50.0-G50.0					
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50						
					100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
1749821	kariprasiin, 1,5mg	N05AX15	REAGILA, kõvakapsel, 28TK	Gedeon Richter Plc.	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1749922	kariprasiin, 3mg	N05AX15	REAGILA, kõvakapsel, 28TK	Gedeon Richter Plc.	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
1750025	kariprasiin, 4,5mg	N05AX15	REAGILA, kõvakapsel, 28TK	Gedeon Richter Plc.	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
1750104	kariprasiin, 6mg	N05AX15	REAGILA, kõvakapsel, 28TK	Gedeon Richter Plc.	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
1110564	karvedilool, 12,5mg	C07AG02	CARVEDILOLHEXAL 12,5 MG, tablett, 30TK	Hexal AG	50						
					75	I50-I50, I47-I49					
3107540	karvedilool, 12,5mg	C07AG02	CARVEDILOLHEXAL 12,5 MG, tablett, 30TK	Lex Ano UAB	75	I50-I50, I47-I49					
					50						
3132278	karvedilool, 12,5mg	C07AG02	CARVEDILOLHEXAL 12,5 MG, tablett, 30TK	Ideal Trade Links UAB	50						
					75	I50-I50, I47-I49					
1110520	karvedilool, 25mg	C07AG02	CARVEDILOLHEXAL 25 MG, tablett, 30TK	Hexal AG	75	I50-I50, I47-I49					
					50						
3107584	karvedilool, 25mg	C07AG02	CARVEDILOLHEXAL 25 MG, tablett, 30TK	Lex Ano UAB	75	I50-I50, I47-I49					
					50						
3132313	karvedilool, 25mg	C07AG02	CARVEDILOLHEXAL 25 MG, tablett, 30TK	Ideal Trade Links UAB	75	I50-I50, I47-I49					
					50						
1110609	karvedilool, 6,25mg	C07AG02	CARVEDILOLHEXAL 6,25 MG, tablett, 30TK	Hexal AG	50						
					75	I50-I50, I47-I49					
3107506	karvedilool, 6,25mg	C07AG02	CARVEDILOLHEXAL 6,25 MG, tablett, 30TK	Lex Ano UAB	50						
					75	I50-I50, I47-I49					
3132267	karvedilool, 6,25mg	C07AG02	CARVEDILOLHEXAL 6,25 MG, tablett, 30TK	Ideal Trade Links UAB	50						
					75	I50-I50, I47-I49					
1115637	keskmise toimeajaga humaaninsuliin, 100RÜ 1ml	A10AC01	HUMULIN N KWIKPEN, süstesuspensioon pen-süstlis, 3ml 5TK	Eli Lilly Nederland B.V.	100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1					
					50						
1018189	ketokonasool, 20mg 1g	D01AC08	NIZORAL, kreem, 15g 1TK	Stada Arzneimittel AG	50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1073461	ketoprofeen, 100mg	M01AE03	KETO, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Vitabalans Oy	100	C00-D48					
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					50						
					75	M15-M19			63,00		
1073483	ketoprofeen, 100mg	M01AE03	KETO, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Vitabalans Oy	50						
					75	M15-M19			63,00		
					100	C00-D48					
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
1752443	kladribiin, 10mg	L04AA40	MAVENCLAD, tablett, 1TK	Merck Europe B.V.	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel (ägenemiste ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks
1028887	klaritromütsiin, 250mg	J01FA09	FROMILID, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
					75	H65-H67, J13-J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliiniga
1032747	klaritromütsiin, 250mg	J01FA09	KLACID 250 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Viatris SIA	75	H65-H67, J13-J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliiniga
					50						
1110261	klaritromütsiin, 250mg	J01FA09	KLERIMED 250MG, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Medochemie Limited	75	H65-H67, J13-J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliiniga
					50						
1549582	klaritromütsiin, 250mg	J01FA09	CLARITHROMYCIN GRINDEKS, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Grindeks AS	50						
					75	H65-H67, J13-J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliiniga
1068881	klaritromütsiin, 25mg 1ml	J01FA09	KLACID 125 MG/5 ML, suukaudse suspensiooni graanulid, 100ml 1TK	Viatris SIA	50						
					75	H65-H67, J13-J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliiniga
3121951	klaritromütsiin, 25mg 1ml	J01FA09	KLACID 125 MG/5 ML, suukaudse suspensiooni graanulid, 100ml 1TK	Ideal Trade Links UAB	75	H65-H67, J13-J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliiniga
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1028876	klaritromütsiin, 500mg	J01FA09	FROMILID, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
					75	H65-H67, J13-J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliiniga
1032758	klaritromütsiin, 500mg	J01FA09	KLACID SR 500 MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 5TK	Viatris SIA	50						
					75	H65-H67, J13-J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliiniga
1068904	klaritromütsiin, 500mg	J01FA09	KLACID SR 500 MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 7TK	Viatris SIA	75	H65-H67, J13-J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliiniga
					50						
1110238	klaritromütsiin, 500mg	J01FA09	KLERIMED 500MG, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Medochemie Limited	50						
					75	H65-H67, J13-J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliiniga
1141276	klaritromütsiin, 500mg	J01FA09	FROMILID UNO, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 5TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
					75	H65-H67, J13-J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliiniga
1141287	klaritromütsiin, 500mg	J01FA09	FROMILID UNO, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 7TK	KRKA, d.d., Novo mesto	75	H65-H67, J13-J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliiniga
					50						
1166677	klaritromütsiin, 500mg	J01FA09	KLABAX, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.	50						
					75	H65-H67, J13-J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliiniga
1405460	klaritromütsiin, 500mg	J01FA09	KLACID, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Viatris SIA	50						
					75	H65-H67, J13-J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliiniga
1549627	klaritromütsiin, 500mg	J01FA09	CLARITHROMYCIN GRINDEKS, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Grindeks AS	75	H65-H67, J13-J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliiniga
					50						
1011160	klindamütsiin, 100mg	G01AA10	DALACIN, vaginaalsuposiit, 3TK	Pfizer Europe MA EEIG	50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1007503	klindamütsiin, 150mg	J01FF01	DALACIN C, kõvakapsel, 16TK	Pfizer Europe MA EEIG	50						
1007536	klindamütsiin, 300mg	J01FF01	DALACIN C, kõvakapsel, 16TK	Pfizer Europe MA EEIG	50						
1108561	klindamütsiin, 300mg	J01FF01	CLINDAMYCIN - MIP 300, õhukese polümeerikattega tablett, 16TK	MIP Pharma GmbH	50						
1865101	klindamütsiin, 300mg	J01FF01	DALACIN C, kõvakapsel, 16TK	Lex Ano UAB	50						
1108606	klindamütsiin, 600mg	J01FF01	CLINDAMYCIN - MIP 600, õhukese polümeerikattega tablett, 16TK	MIP Pharma GmbH	50						
1432268	klindamütsiin, 600mg	J01FF01	CLINDAMYCIN - MIP 600, õhukese polümeerikattega tablett, 32TK	MIP Pharma GmbH	50						
1527814	klindamütsiin+tretinoiin, 10mg+0,25mg 1g	D10AF82	TRECLINAC, geel, 30g 1TK	VIATRIS HEALTHCARE Limited	50						
1005208	klobetasool, 500mcg 1g	D07AD01	DERMOVATE OINTMENT, salv, 25g 1TK	GlaxoSmithKline Trading Services Limited	50						
1005242	klobetasool, 500mcg 1g	D07AD01	DERMOVATE CREAM, kreem, 25g 1TK	GlaxoSmithKline Trading Services Limited	50						
1005286	klobetasool, 500mcg 1ml	D07AD01	DERMOVATE, nahalahus, 25ml 1TK	GlaxoSmithKline Trading Services Limited	50						
1829325	klobetasool, 500mcg 1ml	D07AD01	DERMOVATE, nahalahus, 25ml 1TK	Lex Ano UAB	50						
3041659	klobetasool, 500mcg 1ml	D07AD01	DERMOVATE, nahalahus, 50ml 1TK	Lex Ano UAB	50						
1011407	klomipramiin, 10mg	N06AA04	ANAFRANIL, kaetud tablett, 30TK	pharmaand GmbH	50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1001462	klomipramiin, 25mg	N06AA04	ANAFRANIL, kaetud tablett, 30TK	Pharmaand GmbH	50						
1011418	klomipramiin, 75mg	N06AA04	ANAFRANIL SR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 20TK	pharmaand GmbH	50						
1004544	klonasepaam, 2mg	N03AE01	RIVOTRIL, tablett, 30TK	Cheplapharm Arzneimittel GmbH	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50	G20-G26, G63-G63					
1007345	kloorambutsiil, 2mg	L01AA02	LEUKERAN, õhukese polümeerikattega tablett, 25TK	Aspen Pharma Trading Limited	50						
					100	C00-D48	Hematoloog, Onkoloog				
1044357	klooramfenikool, 5mg 1ml	S01AA01	OFTAN AKVAKOL, silmatilgad, lahus, 10ml 1TK	Santen Oy	50						
1356948	kloormadinoon+etünüülöstradiool, 2mg+0,03mg	G03AA15	CLORMETIN 2 MG/0,03 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 63TK	Exeltis Baltics UAB	75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
					50						
1006063	kloorprotikseen, 25mg	N05AF03	TRUXAL, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	H. Lundbeck A/S	50						
					100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1006096	kloorprotikseen, 50mg	N05AF03	TRUXAL, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	H. Lundbeck A/S	100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
					50						
1040588	klopidogreel, 75mg	B01AC04	PLAVIX, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Sanofi-Aventis Groupe	50						
					75	Z95-Z95, I21-I22, I25.2-I25.2	Kardioloog, Sisearst	esmane			müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12 kuu vältel
1065743	klopidogreel, 75mg	B01AC04	PLAVIX, õhukese polümeerikattega tablett, 84TK	Sanofi-Aventis Groupe	50						
					75	Z95-Z95, I21-I22, I25.2-I25.2	Kardioloog, Sisearst	esmane			müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12 kuu vältel
1357141	klopidogreel, 75mg	B01AC04	TROMBEX 75 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Zentiva k.s.	75	Z95-Z95, I21-I22, I25.2-I25.2	Kardioloog, Sisearst	esmane			müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12 kuu vältel
					50						
1367197	klopidogreel, 75mg	B01AC04	CLOPIDOGREL SANOSWISS 75MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Sanoswiss UAB	75	Z95-Z95, I21-I22, I25.2-I25.2	Sisearst, Kardioloog	esmane			müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12 kuu vältel
					50						
1437465	klopidogreel, 75mg	B01AC04	ZYLLT, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
					75	Z95-Z95, I21-I22, I25.2-I25.2	Kardioloog, Sisearst	esmane			müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12 kuu vältel

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1437500	klopidogreel, 75mg	B01AC04	ZYLLT, õhukese polümeerikattega tablett, 84TK	KRKA, d.d., Novo mesto	75	Z95-Z95, I21-I22, I25.2-I25.2	Kardioloog, Sisearst	esmane			müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12 kuu vältel
					50						
1448489	klopidogreel, 75mg	B01AC04	CLOPIDOGREL KRKA, õhukese polümeerikattega tablett, 84TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
					75	Z95-Z95, I21-I22, I25.2-I25.2	Kardioloog, Sisearst	esmane			müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12 kuu vältel
1004724	klosapiin, 100mg	N05AH02	LEPONEX, tablett, 50TK	Viatris SIA	50						
					100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1663859	klosapiin, 100mg	N05AH02	CLOZAPINE ACCORD, tablett, 50TK	Accord Healthcare B.V.	100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31					
					50						
3126697	klosapiin, 100mg	N05AH02	LEPONEX, tablett, 50TK	Lex Ano UAB	50						
					100	F10.4-F10.7, F20-F29, F17.4-F17.7, F00-F09, F30-F31, F70-F79, F12.4-F12.7, F15.4-F15.7, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F14.4-F14.7, F19.4-F19.7, F16.4-F16.7, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F32.2-F32.3, F33.2-F33.3					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1004768	klosapiin, 25mg	N05AH02	LEPONEX, tablett, 50TK	Viatris SIA	50						
					100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31					
1663657	klosapiin, 25mg	N05AH02	CLOZAPINE ACCORD, tablett, 30TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3126686	klosapiin, 25mg	N05AH02	LEPONEX, tablett, 50TK	Lex Ano UAB	50						
					100	F11.4-F11.7, F16.4-F16.7, F00-F09, F20-F29, F60.3-F60.3, F15.4-F15.7, F10.4-F10.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F18.4-F18.7, F32.2-F32.3, F30-F31, F17.4-F17.7, F12.4-F12.7, F13.4-F13.7, F14.4-F14.7					
1033692	klotrimasool, 1%/100mg	G01AF02	CANIFUG CREMOLUM, kreem + vaginaalsuposiit, 20g 1TK / 6TK	Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel	50						
1033726	klotrimasool, 100mg	G01AF02	CANIFUG CREMOLUM, vaginaalsuposiit, 6TK	Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel	50						
1045123	klotrimasool, 100mg	G01AF02	KLOTRIMASOOL GSK, vaginaaltablett, 6TK	GlaxoSmithKline Trading Services Limited	50						
1893562	klotrimasool, 100mg	G01AF02	KLOTRIMASOOL GSK, vaginaaltablett, 6TK	Ideal Trade Links UAB	50						
1140815	kodeiin+paratsetamool, 30mg+500mg	N02AJ06	PARACETAMOL/CODEINE VITABALANS, tablett, 30TK	Vitabalans Oy	50						
1140826	kodeiin+paratsetamool, 30mg+500mg	N02AJ06	PARACETAMOL/CODEINE VITABALANS, tablett, 100TK	Vitabalans Oy	50						
1485187	kodeiin+paratsetamool, 30mg+500mg	N02AJ06	ALGOCALM, tablett, 30TK	Zentiva k.s.	50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1485200	kodeiin+paratsetamool, 30mg+500mg	N02AJ06	ALGOCALM, tablett, 100TK	Zentiva k.s.	50						
1241356	kvetiapiin, 100mg	N05AH04	KETIPINOR, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Orion Corporation	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
1258297	kvetiapiin, 100mg	N05AH04	KVENTIAX, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
3048544	kvetiapiin, 100mg	N05AH04	KVENTIAX, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Ideal Trade Links UAB	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					50						
1636792	kvetiapiin, 150mg	N05AH04	KVENTIAX SR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	KRKA, d.d., Novo mesto	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					50						
1683750	kvetiapiin, 150mg	N05AH04	QUETIAPINE ACCORD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
1115086	kvetiapiin, 200mg	N05AH04	SEROQUEL, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Cheplapharm Arzneimittel GmbH	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
1241378	kvetiapiin, 200mg	N05AH04	KETIPINOR, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Orion Corporation	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					50						
1258477	kvetiapiin, 200mg	N05AH04	KVENTIAX, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					50						
1301847	kvetiapiin, 200mg	N05AH04	QUETIAPINE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Teva Pharma B.V.	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1454059	kvetiapiin, 200mg	N05AH04	QUETIAPINE ACCORD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	Accord Healthcare B.V.	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					50						
1636859	kvetiapiin, 200mg	N05AH04	KVENTIAX SR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
1241334	kvetiapiin, 25mg	N05AH04	KETIPINOR, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Orion Corporation	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					50						
1258208	kvetiapiin, 25mg	N05AH04	KVENTIAX, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
1258242	kvetiapiin, 25mg	N05AH04	KVENTIAX, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					50						
1377503	kvetiapiin, 25mg	N05AH04	QUETIAPINE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					50						
1301937	kvetiapiin, 300mg	N05AH04	QUETIAPINE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Teva Pharma B.V.	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					50						
1454149	kvetiapiin, 300mg	N05AH04	QUETIAPINE ACCORD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	Accord Healthcare B.V.	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					50						
1496998	kvetiapiin, 300mg	N05AH04	QUETIAPINE TEVA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	Teva Pharma B.V.	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					50						
1636916	kvetiapiin, 300mg	N05AH04	KVENTIAX SR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1895610	kvetiapiin, 300mg	N05AH04	QUETIAPINE TEVA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	Ideal Trade Links UAB	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
1454206	kvetiapiin, 400mg	N05AH04	QUETIAPINE ACCORD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
1497067	kvetiapiin, 400mg	N05AH04	QUETIAPINE TEVA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	Teva Pharma B.V.	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
1724510	kvetiapiin, 400mg	N05AH04	KVENTIAX SR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
1895777	kvetiapiin, 400mg	N05AH04	QUETIAPINE TEVA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	Ideal Trade Links UAB	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
1555253	kvetiapiin, 50mg	N05AH04	QUETIAPINE ACCORD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Accord Healthcare B.V.	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					50						
1007828	labetalool, 100mg	C07AG01	TRANDATE, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	Aspen Pharma Trading Limited	75	O10-O16					
					50						
3110162	labetalool, 100mg	C07AG01	TRANDATE, õhukese polümeerikattega tablett, 75TK	Ideal Trade Links UAB	50						
					75	O10-O16					
1753411	lakosamiid, 100mg	N03AX18	LACOSAMIDE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Accord Healthcare S.L.	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			III ravireas monoteraapiana, kui monoteraapia lamotrigiini, levetiratsetaami, karbamasepiini ja okskarbasepiiniga ei ole olnud efektiivsed; II ravirea lisaraviks, kui eelnevad ravimid on olnud ebaefektiivsed generaliseerunud toonilis-klooniliste epileptiliste hoogudega patsientidel; kui ravi käigus tekkisid kõrvaltoimed, mille tõttu esmavaliku ravimid ei ole sobilikud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1753455	lakosamiid, 150mg	N03AX18	LACOSAMIDE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Accord Healthcare S.L.	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			III ravireas monoteraapiana, kui monoteraapia lamotrigiini, levetiratsetaami, karbamasepiini ja okskarbasepiiniga ei ole olnud efektiivsed; II ravirea lisaraviks, kui eelnevad ravimid on olnud ebaefektiivsed generaliseerunud toonilis-klooniliste epileptiliste hoogudega patsientidel; kui ravi käigus tekkisid kõrvaltoimed, mille tõttu esmavaliku ravimid ei ole sobilikud
1753499	lakosamiid, 200mg	N03AX18	LACOSAMIDE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Accord Healthcare S.L.	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			III ravireas monoteraapiana, kui monoteraapia lamotrigiini, levetiratsetaami, karbamasepiini ja okskarbasepiiniga ei ole olnud efektiivsed; II ravirea lisaraviks, kui eelnevad ravimid on olnud ebaefektiivsed generaliseerunud toonilis-klooniliste epileptiliste hoogudega patsientidel; kui ravi käigus tekkisid kõrvaltoimed, mille tõttu esmavaliku ravimid ei ole sobilikud
1753376	lakosamiid, 50mg	N03AX18	LACOSAMIDE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Accord Healthcare S.L.	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			III ravireas monoteraapiana, kui monoteraapia lamotrigiini, levetiratsetaami, karbamasepiini ja okskarbasepiiniga ei ole olnud efektiivsed; II ravirea lisaraviks, kui eelnevad ravimid on olnud ebaefektiivsed generaliseerunud toonilis-klooniliste epileptiliste hoogudega patsientidel; kui ravi käigus tekkisid kõrvaltoimed, mille tõttu esmavaliku ravimid ei ole sobilikud
1043042	lamivudiin, 100mg	J05AF05	ZEFFIX, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	GlaxoSmithKline Trading Services Limited	50						
1025873	lamivudiin, 150mg	J05AF05	EPIVIR, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Viiv Healthcare B.V.	50		Infektsionist				HIV-nakkuse profülaktikaks, v a tööülesannete täitmisega seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega
1379123	lamotrigiin, 100mg	N03AX09	LAMICTAL 100MG, närimis-/dispergeeruv tablett, 28TK	GlaxoSmithKline Trading Services Limited	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					100	F30-F31	Psühhiaater				
1394210	lamotrigiin, 25mg	N03AX09	LAMICTAL 25MG, närimis-/dispergeeruv tablett, 28TK	GlaxoSmithKline Trading Services Limited	100	F30-F31	Psühhiaater				
					50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
1379088	lamotrigiin, 50mg	N03AX09	LAMICTAL 50MG, närimis-/dispergeeruv tablett, 28TK	GlaxoSmithKline Trading Services Limited	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					100	F30-F31	Psühhiaater				
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1141434	lamotrigiin, 5mg	N03AX09	LAMICTAL 5MG, närimis-/dispergeeruv tablett, 30TK	GlaxoSmithKline Trading Services Limited	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					100	F30-F31	Psühhiaater				
					50						
1134560	lanreotiid, 120mg	H01CB03	SOMATULINE AUTOGEL 120MG, süstelahus süstlis, 1TK	Ipsen Pharma	100	C00-D48, E22.0-E22.0	Onkoloog, Endokrinoloog, Pediaater endokrinoloogi lisapädevusega				neuroendokriinkasvaja või akromegaalia raviks
1134582	lanreotiid, 60mg	H01CB03	SOMATULINE AUTOGEL 60MG, süstelahus süstlis, 1TK	Ipsen Pharma	100	C00-D48, E22.0-E22.0	Pediaater endokrinoloogi lisapädevusega, Onkoloog, Endokrinoloog				neuroendokriinkasvaja või akromegaalia raviks
1134571	lanreotiid, 90mg	H01CB03	SOMATULINE AUTOGEL 90MG, süstelahus süstlis, 1TK	Ipsen Pharma	100	C00-D48, E22.0-E22.0	Onkoloog, Endokrinoloog, Pediaater endokrinoloogi lisapädevusega				neuroendokriinkasvaja või akromegaalia raviks
1235056	lantaan, 750mg	V03AE03	FOSRENOL, närimistablett, 90TK	Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch	50						
					100	N18-N18	Pediaater, Pediaater nefroloogi lisapädevusega, Nefroloog				juhul, kui kaltsiumipõhine fosforisiduja on vastunäidustatud (seerumi kaltsiumisisaldus >2,54 mmol/l)
1781232	lantaan, 750mg	V03AE03	CALAFOS, närimistablett, 90TK	Viatris Limited	50						
					100	N18-N18	Nefroloog, Pediaater, Pediaater nefroloogi lisapädevusega				juhul, kui kaltsiumipõhine fosforisiduja on vastunäidustatud (seerumi kaltsiumisisaldus >2,54 mmol/l)
1041196	latanoprost, 50mcg 1ml	S01EE01	XALATAN, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK	Upjohn EESV	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
1165733	latanoprost, 50mcg 1ml	S01EE01	GLAUMAX, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK	Aktsiaselts KEVELT	100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1346790	latanoprost, 50mcg 1ml	S01EE01	LATANOPROST ACTAVIS, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK	Teva B.V.	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
1346802	latanoprost, 50mcg 1ml	S01EE01	LATANOPROST ACTAVIS, silmatilgad, lahus, 2.5ml 3TK	Teva B.V.	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
1377873	latanoprost, 50mcg 1ml	S01EE01	UNILAT, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK	Unimed Pharma spol. s r.o.	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
1860229	latanoprost, 50mcg 1ml	S01EE01	LATANOPROST ELVIM, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK	SIA Elvim	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
3068951	latanoprost, 50mcg 1ml	S01EE01	XALATAN, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK	Ideal Trade Links UAB	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
3111264	latanoprost, 50mcg 1ml	S01EE01	XALATAN, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK	Lex Ano UAB	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
1836468	latanoprost+netarsudiil, 50mcg+200mcg 1ml	S01EE51	ROCLANDA, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK	Santen Oy	100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			kui monoteraapia prostaglandiini analoogiga ei ole langetanud piisavalt silma siserõhku
1073023	latsidipiin, 4mg	C08CA09	LACIPIL, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	GlaxoSmithKline Trading Services Limited	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1009921	leflunomiid, 10mg	L04AK01	ARAVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	75	M30-M35, M11-M11, M13-M13, M45-M46, M02-M03, M05-M08	Pediaater, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog	esmane			kui metotreksaat pole küllaldaselt efektiivne, on vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
					50						
1873009	leflunomiid, 10mg	L04AK01	LEFLUNOMIDE ELVIM, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	SIA Elvim	75	M30-M35, M11-M11, M13-M13, M45-M46, M02-M03, M05-M08	Pediaater, Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega	esmane			kui metotreksaat pole küllaldaselt efektiivne, on vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1009932	leflunomiid, 20mg	L04AK01	ARAVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	50						
					75	M30-M35, M11-M11, M13-M13, M45-M46, M02-M03, M05-M08	Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater	esmane			kui metotreksaat pole küllaldaselt efektiivne, on vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
1873043	leflunomiid, 20mg	L04AK01	LEFLUNOMIDE ELVIM, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	SIA Elvim	50						
					75	M30-M35, M11-M11, M13-M13, M45-M46, M02-M03, M05-M08	Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater, Reumatoloog	esmane			kui metotreksaat pole küllaldaselt efektiivne, on vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
3121489	leflunomiid, 20mg	L04AK01	ARAVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	50						
					75	M30-M35, M11-M11, M13-M13, M45-M46, M02-M03, M05-M08	Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog, Pediaater	esmane			kui metotreksaat pole küllaldaselt efektiivne, on vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
1748156	lenalidomiid, 10mg	L04AX04	LENALIDOMIDE AUXILIA, kõvakapsel, 21TK	Auxilia Pharma OÜ	100	C90-C90	Hematoloog				
					100	D46-D46	Hematoloog				konsiiliumi (vähemasti 3 hematoloogi) otsuse alusel isoleeritud 5q deletsioonist tingitud tsütogeneetilise häirega seotud müelodüsplastilise sündroomi raviks erütrotsüütide suspensiooni ülekannetest sõltuva (koormusega vähemalt 4 doosi 8 nädala kohta) ja madala või madala-mõõduka riskiskooriga (IPSS 0-1) patsiendile piisava ravivastuse saavutamisel (ülekannete koormus väheneb vähemalt 50% võrra 16. ravinädalaks) ja selle püsimisel

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1766000	lenalidomiid, 10mg	L04AX04	LENALIDOMIDE GRINDEKS, kõvakapsel, 21TK	Grindeks AS	100	C90-C90	Hematoloog				
					100	D46-D46	Hematoloog				konsiiliumi (vähemasti 3 hematoloogi) otsuse alusel isoleeritud 5q deletsioonist tingitud tsütogeneetilise häirega seotud müelodüsplastilise sündroomi raviks erütrotsüütide suspensiooni ülekannetest sõltuva (koormusega vähemalt 4 doosi 8 nädala kohta) ja madala või madala-mõõduka riskiskooriga (IPSS 0-1) patsiendile piisava ravivastuse saavutamisel (ülekannete koormus väheneb vähemalt 50% võrra 16. ravinädalaks) ja selle püsimisel
1780411	lenalidomiid, 10mg	L04AX04	LENALIDOMIDE ACCORD, kõvakapsel, 21TK	Accord Healthcare S.L.	100	C90-C90	Hematoloog				
					100	D46-D46	Hematoloog				konsiiliumi (vähemasti 3 hematoloogi) otsuse alusel isoleeritud 5q deletsioonist tingitud tsütogeneetilise häirega seotud müelodüsplastilise sündroomi raviks erütrotsüütide suspensiooni ülekannetest sõltuva (koormusega vähemalt 4 doosi 8 nädala kohta) ja madala või madala-mõõduka riskiskooriga (IPSS 0-1) patsiendile piisava ravivastuse saavutamisel (ülekannete koormus väheneb vähemalt 50% võrra 16. ravinädalaks) ja selle püsimisel
1835636	lenalidomiid, 10mg	L04AX04	LENALIDOMIDE MYLAN, kõvakapsel, 21TK	Mylan Pharmaceuticals Limited	100	C90-C90	Hematoloog				
					100	D46-D46	Hematoloog				konsiiliumi (vähemasti 3 hematoloogi) otsuse alusel isoleeritud 5q deletsioonist tingitud tsütogeneetilise häirega seotud müelodüsplastilise sündroomi raviks erütrotsüütide suspensiooni ülekannetest sõltuva (koormusega vähemalt 4 doosi 8 nädala kohta) ja madala või madala-mõõduka riskiskooriga (IPSS 0-1) patsiendile piisava ravivastuse saavutamisel (ülekannete koormus väheneb vähemalt 50% võrra 16. ravinädalaks) ja selle püsimisel

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1748202	lenalidomiid, 15mg	L04AX04	LENALIDOMIDE AUXILIA, kõvakapsel, 21TK	Auxilia Pharma OÜ	100	C90-C90	Hematoloog				
					100	D46-D46	Hematoloog				konsiiliumi (vähemasti 3 hematoloogi) otsuse alusel isoleeritud 5q deletsioonist tingitud tsütogeneetilise häirega seotud müelodüsplastilise sündroomi raviks erütrotsüütide suspensiooni ülekannetest sõltuva (koormusega vähemalt 4 doosi 8 nädala kohta) ja madala või madala-mõõduka riskiskooriga (IPSS 0-1) patsiendile piisava ravivastuse saavutamisel (ülekannete koormus väheneb vähemalt 50% võrra 16. ravinädalaks) ja selle püsimisel
1766022	lenalidomiid, 15mg	L04AX04	LENALIDOMIDE GRINDEKS, kõvakapsel, 21TK	Grindeks AS	100	D46-D46	Hematoloog				konsiiliumi (vähemasti 3 hematoloogi) otsuse alusel isoleeritud 5q deletsioonist tingitud tsütogeneetilise häirega seotud müelodüsplastilise sündroomi raviks erütrotsüütide suspensiooni ülekannetest sõltuva (koormusega vähemalt 4 doosi 8 nädala kohta) ja madala või madala-mõõduka riskiskooriga (IPSS 0-1) patsiendile piisava ravivastuse saavutamisel (ülekannete koormus väheneb vähemalt 50% võrra 16. ravinädalaks) ja selle püsimisel
					100	C90-C90	Hematoloog				
1780433	lenalidomiid, 15mg	L04AX04	LENALIDOMIDE ACCORD, kõvakapsel, 21TK	Accord Healthcare S.L.	100	D46-D46	Hematoloog				konsiiliumi (vähemasti 3 hematoloogi) otsuse alusel isoleeritud 5q deletsioonist tingitud tsütogeneetilise häirega seotud müelodüsplastilise sündroomi raviks erütrotsüütide suspensiooni ülekannetest sõltuva (koormusega vähemalt 4 doosi 8 nädala kohta) ja madala või madala-mõõduka riskiskooriga (IPSS 0-1) patsiendile piisava ravivastuse saavutamisel (ülekannete koormus väheneb vähemalt 50% võrra 16. ravinädalaks) ja selle püsimisel
					100	C90-C90	Hematoloog				

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1835658	lenalidomiid, 15mg	L04AX04	LENALIDOMIDE MYLAN, kõvakapsel, 21TK	Mylan Pharmaceuticals Limited	100	C90-C90	Hematoloog				
					100	D46-D46	Hematoloog				konsiiliumi (vähemasti 3 hematoloogi) otsuse alusel isoleeritud 5q deletsioonist tingitud tsütogeneetilise häirega seotud müelodüsplastilise sündroomi raviks erütrotsüütide suspensiooni ülekannetest sõltuva (koormusega vähemalt 4 doosi 8 nädala kohta) ja madala või madala-mõõduka riskiskooriga (IPSS 0-1) patsiendile piisava ravivastuse saavutamisel (ülekannete koormus väheneb vähemalt 50% võrra 16. ravinädalaks) ja selle püsimisel
1748257	lenalidomiid, 25mg	L04AX04	LENALIDOMIDE AUXILIA, kõvakapsel, 21TK	Auxilia Pharma OÜ	100	D46-D46	Hematoloog				konsiiliumi (vähemasti 3 hematoloogi) otsuse alusel isoleeritud 5q deletsioonist tingitud tsütogeneetilise häirega seotud müelodüsplastilise sündroomi raviks erütrotsüütide suspensiooni ülekannetest sõltuva (koormusega vähemalt 4 doosi 8 nädala kohta) ja madala või madala-mõõduka riskiskooriga (IPSS 0-1) patsiendile piisava ravivastuse saavutamisel (ülekannete koormus väheneb vähemalt 50% võrra 16. ravinädalaks) ja selle püsimisel
					100	C90-C90	Hematoloog				
1766066	lenalidomiid, 25mg	L04AX04	LENALIDOMIDE GRINDEKS, kõvakapsel, 21TK	Grindeks AS	100	D46-D46	Hematoloog				konsiiliumi (vähemasti 3 hematoloogi) otsuse alusel isoleeritud 5q deletsioonist tingitud tsütogeneetilise häirega seotud müelodüsplastilise sündroomi raviks erütrotsüütide suspensiooni ülekannetest sõltuva (koormusega vähemalt 4 doosi 8 nädala kohta) ja madala või madala-mõõduka riskiskooriga (IPSS 0-1) patsiendile piisava ravivastuse saavutamisel (ülekannete koormus väheneb vähemalt 50% võrra 16. ravinädalaks) ja selle püsimisel
					100	C90-C90	Hematoloog				

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1780455	lenalidomiid, 25mg	L04AX04	LENALIDOMIDE ACCORD, kõvakapsel, 21TK	Accord Healthcare S.L.	100	D46-D46	Hematoloog				konsiiliumi (vähemasti 3 hematoloogi) otsuse alusel isoleeritud 5q deletsioonist tingitud tsütogeneetilise häirega seotud müelodüsplastilise sündroomi raviks erütrotsüütide suspensiooni ülekannetest sõltuva (koormusega vähemalt 4 doosi 8 nädala kohta) ja madala või madala-mõõduka riskiskooriga (IPSS 0-1) patsiendile piisava ravivastuse saavutamisel (ülekannete koormus väheneb vähemalt 50% võrra 16. ravinädalaks) ja selle püsimisel
					100	C90-C90	Hematoloog				
1835894	lenalidomiid, 25mg	L04AX04	LENALIDOMIDE MYLAN, kõvakapsel, 21TK	Mylan Pharmaceuticals Limited	100	C90-C90	Hematoloog				
					100	D46-D46	Hematoloog				konsiiliumi (vähemasti 3 hematoloogi) otsuse alusel isoleeritud 5q deletsioonist tingitud tsütogeneetilise häirega seotud müelodüsplastilise sündroomi raviks erütrotsüütide suspensiooni ülekannetest sõltuva (koormusega vähemalt 4 doosi 8 nädala kohta) ja madala või madala-mõõduka riskiskooriga (IPSS 0-1) patsiendile piisava ravivastuse saavutamisel (ülekannete koormus väheneb vähemalt 50% võrra 16. ravinädalaks) ja selle püsimisel
1748101	lenalidomiid, 5mg	L04AX04	LENALIDOMIDE AUXILIA, kõvakapsel, 21TK	Auxilia Pharma OÜ	100	D46-D46	Hematoloog				konsiiliumi (vähemasti 3 hematoloogi) otsuse alusel isoleeritud 5q deletsioonist tingitud tsütogeneetilise häirega seotud müelodüsplastilise sündroomi raviks erütrotsüütide suspensiooni ülekannetest sõltuva (koormusega vähemalt 4 doosi 8 nädala kohta) ja madala või madala-mõõduka riskiskooriga (IPSS 0-1) patsiendile piisava ravivastuse saavutamisel (ülekannete koormus väheneb vähemalt 50% võrra 16. ravinädalaks) ja selle püsimisel
					100	C90-C90	Hematoloog				

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1765964	lenalidomiid, 5mg	L04AX04	LENALIDOMIDE GRINDEKS, kõvakapsel, 21TK	Grindeks AS	100	D46-D46	Hematoloog				konsiiliumi (vähemasti 3 hematoloogi) otsuse alusel isoleeritud 5q deletsioonist tingitud tsütogeneetilise häirega seotud müelodüsplastilise sündroomi raviks erütrotsüütide suspensiooni ülekannetest sõltuva (koormusega vähemalt 4 doosi 8 nädala kohta) ja madala või madala-mõõduka riskiskooriga (IPSS 0-1) patsiendile piisava ravivastuse saavutamisel (ülekannete koormus väheneb vähemalt 50% võrra 16. ravinädalaks) ja selle püsimisel
					100	C90-C90	Hematoloog				
1780376	lenalidomiid, 5mg	L04AX04	LENALIDOMIDE ACCORD, kõvakapsel, 21TK	Accord Healthcare S.L.	100	C90-C90	Hematoloog				
					100	D46-D46	Hematoloog				konsiiliumi (vähemasti 3 hematoloogi) otsuse alusel isoleeritud 5q deletsioonist tingitud tsütogeneetilise häirega seotud müelodüsplastilise sündroomi raviks erütrotsüütide suspensiooni ülekannetest sõltuva (koormusega vähemalt 4 doosi 8 nädala kohta) ja madala või madala-mõõduka riskiskooriga (IPSS 0-1) patsiendile piisava ravivastuse saavutamisel (ülekannete koormus väheneb vähemalt 50% võrra 16. ravinädalaks) ja selle püsimisel
1780398	lenalidomiid, 7,5mg	L04AX04	LENALIDOMIDE ACCORD, kõvakapsel, 21TK	Accord Healthcare S.L.	100	D46-D46	Hematoloog				konsiiliumi (vähemasti 3 hematoloogi) otsuse alusel isoleeritud 5q deletsioonist tingitud tsütogeneetilise häirega seotud müelodüsplastilise sündroomi raviks erütrotsüütide suspensiooni ülekannetest sõltuva (koormusega vähemalt 4 doosi 8 nädala kohta) ja madala või madala-mõõduka riskiskooriga (IPSS 0-1) patsiendile piisava ravivastuse saavutamisel (ülekannete koormus väheneb vähemalt 50% võrra 16. ravinädalaks) ja selle püsimisel
					100	C90-C90	Hematoloog				

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1687192	lenvatiniib, 10mg	L01EX08	LENVIMA, kõvakapsel, 30TK	Eisai GmbH	100	C73-C73	Onkoloog				kuni haiguse progresseerumiseni, kui ravi alustamise lenvatiniibiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 2 onkoloogi) vastavaks järgmistele kriteeriumitele: diagnoositud progresseeruv, lokaalselt kaugelearenenud või metastaatiline, diferentseeritud (papillaarne/follikulaarne/Hürthle-rakuline), radioaktiivsele joodile allumatu kilpnäärme kartsinoom ja patsiendi üldseisund on hea (funktsionaalne klass 0-1 ECOG järgi). RAI allumatu kilpnäärme kartsinoom on diagnoositud, kui esineb vähemalt üks haiguskolle, mis ei näita RAI-skaneeringul joodi neeldumist, või haigus progresseerub RAI-ravi foonil, või kumulatiivne RAI annus on >=22,2 GBq. Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi lenvatiniibiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. oktoobrit 2020. a
1687181	lenvatiniib, 4mg	L01EX08	LENVIMA, kõvakapsel, 30TK	Eisai GmbH	100	C22-C22	Onkoloog				kuni haiguse progresseerumiseni, kui ravi alustamise lenvatiniibiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 3 onkoloogi) vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud kaugelearenenud või opereerimatu hepatotsellulaarne kartsinoom, patsiendi üldseisund on hea (funktsionaalne klass 0-1 ECOG järgi) ning maksa funktsioon ei ole oluliselt häiritud. Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi lenvatiniibiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. oktoobrit 2020. a
					100	C73-C73	Onkoloog				kuni haiguse progresseerumiseni, kui ravi alustamise lenvatiniibiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 2 onkoloogi) vastavaks järgmistele kriteeriumitele: diagnoositud progresseeruv, lokaalselt kaugelearenenud või metastaatiline, diferentseeritud (papillaarne/follikulaarne/Hürthle-rakuline), radioaktiivsele joodile allumatu kilpnäärme kartsinoom ja patsiendi üldseisund on hea (funktsionaalne klass 0-1 ECOG järgi). RAI allumatu kilpnäärme kartsinoom on diagnoositud, kui esineb vähemalt üks haiguskolle, mis ei näita RAI-skaneeringul joodi neeldumist, või haigus progresseerub RAI-ravi foonil, või kumulatiivne RAI annus on >=22,2 GBq. Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi lenvatiniibiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. oktoobrit 2020. a

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1474950	lerkanidipiin, 10mg	C08CA13	LERCAPIN, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1611234	lerkanidipiin, 10mg	C08CA13	LERCANIDIPINE ACTAVIS 10MG, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Teva B.V.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1826018	lerkanidipiin, 10mg	C08CA13	LERCANIDIPINE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Accord Healthcare B.V.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1880186	lerkanidipiin, 10mg	C08CA13	LERCAPIN, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Ideal Trade Links UAB	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1474994	lerkanidipiin, 20mg	C08CA13	LERCAPIN, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1611245	lerkanidipiin, 20mg	C08CA13	LERCANIDIPINE ACTAVIS 20MG, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Teva B.V.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1826085	lerkanidipiin, 20mg	C08CA13	LERCANIDIPINE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1034334	letrosool, 2,5mg	L02BG04	FEMARA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Novartis Baltics SIA	50						
					100	C50-C50	Onkoloog, Üldkirurg, Günekoloog				günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1302398	letrosool, 2,5mg	L02BG04	LETROZOLE SANOSWISS 2,5 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Sanoswiss UAB	50						
					100	C50-C50	Onkoloog, Üldkirurg, Günekoloog				günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks
1349771	letrosool, 2,5mg	L02BG04	LETROZOLE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	100	C50-C50	Onkoloog, Günekoloog, Üldkirurg				günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks
					50						
1409352	letrosool, 2,5mg	L02BG04	LETROZOLE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare B.V.	100	C50-C50	Üldkirurg, Günekoloog, Onkoloog				günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks
					50						
1554702	letrosool, 2,5mg	L02BG04	LORTANDA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	50						
					100	C50-C50	Üldkirurg, Günekoloog, Onkoloog				günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks
1156755	leuproreliin, 22,5mg	L02AE02	ELIGARD, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Recordati Industria Chimica E Farmaceutica S.p.A.	100	C61-C61	Onkoloog, Uroloog				lokaalse või lokaalselt levinud kõrge riskiga (kliiniline staadium >=T2c või Gleasoni skoor 8-10 või PSA >=20 ng/ml või regionaalsete lümfisõlmede haaratus või positiivne resektsioonipiir) multimodaalse ravi osana kuni 2 aasta vältel ning metastaseerunud eesnäärmevähiga patsientidele
1287570	leuproreliin, 45mg	L02AE02	ELIGARD, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Recordati Industria Chimica E Farmaceutica S.p.A.	100	C61-C61	Uroloog, Onkoloog				lokaalse või lokaalselt levinud kõrge riskiga (kliiniline staadium >=T2c või Gleasoni skoor 8-10 või PSA >=20 ng/ml või regionaalsete lümfisõlmede haaratus või positiivne resektsioonipiir) multimodaalse ravi osana kuni 2 aasta vältel ning metastaseerunud eesnäärmevähiga patsientidele
1198975	levetiratsetaam, 1000mg	N03AX14	KEPPRA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	UCB Pharma	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50						
1544981	levetiratsetaam, 1000mg	N03AX14	LEVETIRACETAM TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva B.V.	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1545566	levetiratsetaam, 1000mg	N03AX14	LEVETIRACETAM ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50						
1546130	levetiratsetaam, 1000mg	N03AX14	MATEVER, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Pharmathen S.A.	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
3118014	levetiratsetaam, 1000mg	N03AX14	LEVETIRACETAM ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare S.L.U.	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
1198762	levetiratsetaam, 250mg	N03AX14	KEPPRA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	UCB Pharma	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
1544802	levetiratsetaam, 250mg	N03AX14	LEVETIRACETAM TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva B.V.	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
1545353	levetiratsetaam, 250mg	N03AX14	LEVETIRACETAM ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare S.L.U.	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
1545904	levetiratsetaam, 250mg	N03AX14	MATEVER, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Pharmathen S.A.	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50						
3117990	levetiratsetaam, 250mg	N03AX14	LEVETIRACETAM ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare S.L.U.	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
1198829	levetiratsetaam, 500mg	N03AX14	KEPPRA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	UCB Pharma	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
1495054	levetiratsetaam, 500mg	N03AX14	NORMEG 500 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Zentiva k.s.	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1544868	levetiratsetaam, 500mg	N03AX14	LEVETIRACETAM TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva B.V.	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
1545421	levetiratsetaam, 500mg	N03AX14	LEVETIRACETAM ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare S.L.U.	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
1545960	levetiratsetaam, 500mg	N03AX14	MATEVER, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Pharmathen S.A.	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
3118003	levetiratsetaam, 500mg	N03AX14	LEVETIRACETAM ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50						
1077049	levodopa+bensera siid, 100mg+25mg	N04BA80	MADOPAR, dispergeeruv tablett, 100TK	Roche Eesti OÜ	50						
					100	G23-G23, G20-G20, G90.3-G90.3, G24.1-G24.1, G21-G21, G31.8-G31.8	Neuroloog	esmane			
1082922	levodopa+bensera siid, 100mg+25mg	N04BA80	MADOPAR, kõvakapsel, 100TK	Roche Eesti OÜ	100	G23-G23, G20-G20, G90.3-G90.3, G24.1-G24.1, G21-G21, G31.8-G31.8	Neuroloog	esmane			
					50						
1085161	levodopa+bensera siid, 100mg+25mg	N04BA80	MADOPAR HBS, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 100TK	Roche Eesti OÜ	100	G23-G23, G20-G20, G90.3-G90.3, G24.1-G24.1, G21-G21, G31.8-G31.8	Neuroloog	esmane			
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1002014	levodopa+bensera siid, 200mg+50mg	N04BA80	MADOPAR, tablett, 100TK	Roche Eesti OÜ	100	G23-G23, G20-G20, G90.3-G90.3, G24.1-G24.1, G21-G21, G31.8-G31.8	Neuroloog	esmane			
					50						
1599611	levodopa+bensera siid, 200mg+50mg	N04BA80	MADOPAR, tablett, 100TK	First Pharma OÜ	100	G23-G23, G20-G20, G90.3-G90.3, G24.1-G24.1, G21-G21, G31.8-G31.8	Neuroloog	esmane			
					50						
1798072	levodopa+karbido pa, 100mg+25mg	N04BA81	SINEMET 25/100, tablett, 60TK	Organon N.V.	100	G23-G23, G20-G20, G90.3-G90.3, G24.1-G24.1, G21-G21, G31.8-G31.8	Neuroloog	esmane			
					50						
3047981	levodopa+karbido pa, 100mg+25mg	N04BA81	SINEMET 25/100, tablett, 60TK	Lex Ano UAB	100	G23-G23, G20-G20, G90.3-G90.3, G24.1-G24.1, G21-G21, G31.8-G31.8	Neuroloog	esmane			
					50						
1006861	levodopa+karbido pa, 250mg+25mg	N04BA81	SINEMET 25/250, tablett, 100TK	Organon N.V.	50						
					100	G23-G23, G20-G20, G90.3-G90.3, G24.1-G24.1, G21-G21, G31.8-G31.8	Neuroloog	esmane			

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1172854	levodopa+karbidopa+entakapoon, 100mg+25mg+200mg	N04BA03	STALEVO, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Orion Corporation	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1629716	levodopa+karbidopa+entakapoon, 100mg+25mg+200mg	N04BA03	LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Teva Pharma B.V.	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1172898	levodopa+karbidopa+entakapoon, 150mg+37,5mg+200mg	N04BA03	STALEVO, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Orion Corporation	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1630257	levodopa+karbidopa+entakapoon, 150mg+37,5mg+200mg	N04BA03	LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Teva Pharma B.V.	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
3091485	levodopa+karbidopa+entakapoon, 150mg+37,5mg+200mg	N04BA03	STALEVO, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Orion Corporation	50						
					100	G20-G20		esmane			
1368020	levodopa+karbidopa+entakapoon, 200mg+50mg+200mg	N04BA03	STALEVO, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Orion Corporation	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						
1630527	levodopa+karbidopa+entakapoon, 200mg+50mg+200mg	N04BA03	LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Teva Pharma B.V.	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						
3091496	levodopa+karbidopa+entakapoon, 200mg+50mg+200mg	N04BA03	STALEVO, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Orion Corporation	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1629974	levodopa+karbidopa+entakapoon, 75mg+18,75mg+200mg	N04BA03	LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Teva Pharma B.V.	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						
1549650	levonorgestreel, 13,5mg	G02BA03	FLEREE, intrauteriinne ravivahend, 1TK	Bayer AG	50						
					75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
1703955	levonorgestreel, 19,5mg	G02BA03	KYLEENA, intrauteriinne ravivahend, 1TK	Bayer AG	50						
					75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
1009493	levonorgestreel, 52mg	G02BA03	MIRENA, intrauteriinne ravivahend, 1TK	Bayer AG	50						
					75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
1816118	levonorgestreel, 52mg	G02BA03	DONASERT, intrauteriinne ravivahend, 1TK	Gedeon Richter Plc.	50						
					75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
1621752	levonorgestreel+etünüülöstradiool, 0,15mg+0,03mg	G03AA07	LEVERETTE, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Exeltis Baltics UAB	75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
					50						
1138137	levotsetirisiin, 5mg	R06AE09	XYZAL, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	UCB Pharma Oy Finland	50						
1512065	levotsetirisiin, 5mg	R06AE09	CEZERA 5 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	50						
3026652	levotsetirisiin, 5mg	R06AE09	XYZAL, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Ideal Trade Links UAB	50						
3094949	levotsetirisiin, 5mg	R06AE09	CEZERA 5 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Lex Ano UAB	50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1539288	linagliptiin, 5mg	A10BH05	TRAJENTA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	50						
					75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud
1733071	linagliptiin+empagliflosiin, 5mg+10mg	A10BD19	GLYXAMBI, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	75	E14-E14, E11-E11					
					50						
1733161	linagliptiin+empagliflosiin, 5mg+25mg	A10BD19	GLYXAMBI, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	75	E11-E11, E14-E14					
					50						
1643251	linesoliid, 600mg	J01XX08	LINEZOLID ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Accord Healthcare B.V.	50						
1751206	linesoliid, 600mg	J01XX08	APEL, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Medochemie Limited	50						
1063763	lipaas+amülaas+proteaas, 10000ühik+8000ühik+600ühik	A09AA02	KREON 10 000 U, gastroresistentne kõvakapsel, 50TK	VIATRIS HEALTHCARE Limited	50						
					100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater	esmane			
1020205	lipaas+amülaas+proteaas, 10000ühik+9000ühik+500ühik	A09AA02	PANGROL 10000, gastroresistentne kõvakapsel, 20TK	Berlin-Chemie AG	100	E84-E84	Pediaater, Pulmonoloog	esmane			
					50						
1060434	lipaas+amülaas+proteaas, 20000ühik+12000ühik+900ühik	A09AA02	MEZYM 20 000, gastroresistentne tablett, 100TK	Berlin-Chemie AG	50						
					100	E84-E84	Pediaater, Pulmonoloog	esmane			
1063707	lipaas+amülaas+proteaas, 25000ühik+18000ühik+1000ühik	A09AA02	KREON 25 000 U, gastroresistentne kõvakapsel, 50TK	VIATRIS HEALTHCARE Limited	100	E84-E84	Pediaater, Pulmonoloog	esmane			
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1020182	lipaas+amülaas+proteaas, 25000ühik+22500ühik+1250ühik	A09AA02	PANGROL 25000, gastroresistentne kõvakapsel, 20TK	Berlin-Chemie AG	50						
					100	E84-E84	Pediaater, Pulmonoloog	esmane			
1857393	lisdeksamfetamiindimesülaat, 20mg	N06BA12	ADIXEMIN, kõvakapsel, 30TK	Stada Arzneimittel AG	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater	esmane			patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus kehtivatele metüülfenidaadi hüvitamistingimustele, kuid kellel on adekvaatne ravi metüülfenidaadiga osutunud ebaefektiivseks, põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele see ravim on dokumenteeritult meditsiiniliselt vastunäidustatud. Lisaks laieneb soodustus patsientidele, kelle ravi lisdeksamfetamiindimesülaadiga on Tervisekassa rahastusel alustatud enne 01.10.2024. Metüülfenidaadi efektiivsus on hinnatav 6-nädalase perioodi jooksul kasutamisel adekvaatses annuses
3058152	lisdeksamfetamiindimesülaat, 20mg	N06BA12	ELVANSE, kõvakapsel, 30TK	Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater, Psühhiaater – laste- ja noorukitepsühhiaater	esmane			patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus kehtivatele metüülfenidaadi hüvitamistingimustele, kuid kellel on adekvaatne ravi metüülfenidaadiga osutunud ebaefektiivseks, põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele see ravim on dokumenteeritult meditsiiniliselt vastunäidustatud. Lisaks laieneb soodustus patsientidele, kelle ravi lisdeksamfetamiindimesülaadiga on Tervisekassa rahastusel alustatud enne 01.10.2024. Metüülfenidaadi efektiivsus on hinnatav 6-nädalase perioodi jooksul kasutamisel adekvaatses annuses
1857416	lisdeksamfetamiindimesülaat, 30mg	N06BA12	ADIXEMIN, kõvakapsel, 30TK	Stada Arzneimittel AG	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater – laste- ja noorukitepsühhiaater, Psühhiaater	esmane			patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus kehtivatele metüülfenidaadi hüvitamistingimustele, kuid kellel on adekvaatne ravi metüülfenidaadiga osutunud ebaefektiivseks, põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele see ravim on dokumenteeritult meditsiiniliselt vastunäidustatud. Lisaks laieneb soodustus patsientidele, kelle ravi lisdeksamfetamiindimesülaadiga on Tervisekassa rahastusel alustatud enne 01.10.2024. Metüülfenidaadi efektiivsus on hinnatav 6-nädalase perioodi jooksul kasutamisel adekvaatses annuses

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3058028	lisdeksamfetamiin dimesülaat, 30mg	N06BA12	ELVANSE, kõvakapsel, 30TK	Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater – laste- ja noorukitepsühhiaater, Psühhiaater	esmane			patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus kehtivatele metüülfenidaadi hüvitamistingimustele, kuid kellel on adekvaatne ravi metüülfenidaadiga osutunud ebaefektiivseks, põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele see ravim on dokumenteeritult meditsiiniliselt vastunäidustatud. Lisaks laieneb soodustus patsientidele, kelle ravi lisdeksamfetamiindimesülaadiga on Tervisekassa rahastusel alustatud enne 01.10.2024. Metüülfenidaadi efektiivsus on hinnatav 6-nädalase perioodi jooksul kasutamisel adekvaatses annuses
1857438	lisdeksamfetamiin dimesülaat, 40mg	N06BA12	ADIXEMIN, kõvakapsel, 30TK	Stada Arzneimittel AG	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater, Psühhiaater – laste- ja noorukitepsühhiaater	esmane			patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus kehtivatele metüülfenidaadi hüvitamistingimustele, kuid kellel on adekvaatne ravi metüülfenidaadiga osutunud ebaefektiivseks, põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele see ravim on dokumenteeritult meditsiiniliselt vastunäidustatud. Lisaks laieneb soodustus patsientidele, kelle ravi lisdeksamfetamiindimesülaadiga on Tervisekassa rahastusel alustatud enne 01.10.2024. Metüülfenidaadi efektiivsus on hinnatav 6-nädalase perioodi jooksul kasutamisel adekvaatses annuses
1857461	lisdeksamfetamiin dimesülaat, 50mg	N06BA12	ADIXEMIN, kõvakapsel, 30TK	Stada Arzneimittel AG	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater, Psühhiaater – laste- ja noorukitepsühhiaater	esmane			patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus kehtivatele metüülfenidaadi hüvitamistingimustele, kuid kellel on adekvaatne ravi metüülfenidaadiga osutunud ebaefektiivseks, põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele see ravim on dokumenteeritult meditsiiniliselt vastunäidustatud. Lisaks laieneb soodustus patsientidele, kelle ravi lisdeksamfetamiindimesülaadiga on Tervisekassa rahastusel alustatud enne 01.10.2024. Metüülfenidaadi efektiivsus on hinnatav 6-nädalase perioodi jooksul kasutamisel adekvaatses annuses

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1857517	lisdeksamfetamiin dimesülaat, 70mg	N06BA12	ADIXEMIN, kõvakapsel, 30TK	Stada Arzneimittel AG	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater, Psühhiaater – laste- ja noorukitepsühhiaater	esmane			patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus kehtivatele metüülfenidaadi hüvitamistingimustele, kuid kellel on adekvaatne ravi metüülfenidaadiga osutunud ebaefektiivseks, põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele see ravim on dokumenteeritult meditsiiniliselt vastunäidustatud. Lisaks laieneb soodustus patsientidele, kelle ravi lisdeksamfetamiindimesülaadiga on Tervisekassa rahastusel alustatud enne 01.10.2024. Metüülfenidaadi efektiivsus on hinnatav 6-nädalase perioodi jooksul kasutamisel adekvaatses annuses
1300598	lisinopriil+amlodipiin, 10mg+5mg	C09BB03	DIRONORM, tablett, 30TK	Gedeon Richter Plc.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1501456	lisinopriil+amlodipiin, 20mg+5mg	C09BB03	DIRONORM, tablett, 30TK	Gedeon Richter Plc.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1111284	lispro-insuliin, 100ühik 1ml	A10AB04	HUMALOG, süstelahus kolbampullis, 3ml 5TK	Eli Lilly Nederland B.V.	100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1					
					50						
1364510	lispro-insuliin, 100ühik 1ml	A10AB04	HUMALOG KWIKPEN, süstelahus, 3ml 5TK	Eli Lilly Nederland B.V.	50						
					100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1					
1364532	lispro-insuliin, 100ühik 1ml	A10AD04	HUMALOG MIX25 KWIKPEN, süstesuspensioon, 3ml 5TK	Eli Lilly Nederland B.V.	50						
					100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1					
1364554	lispro-insuliin, 100ühik 1ml	A10AD04	HUMALOG MIX50 KWIKPEN, süstesuspensioon, 3ml 5TK	Eli Lilly Nederland B.V.	100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1					
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1754692	lispro-insuliin, 100ühik 1ml	A10AB04	HUMALOG JUNIOR KWIKPEN, süstelahus pen-süstlis, 3ml 5TK	Eli Lilly Nederland B.V.	100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1					
					50						
1814408	lispro-insuliin, 100ühik 1ml	A10AB04	LYUMJEV KWIKPEN, süstelahus pen-süstlis, 3ml 5TK	Eli Lilly Nederland B.V.	100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1					
					50						
1713248	lispro-insuliin, 200ühik 1ml	A10AB04	HUMALOG KWIKPEN, süstelahus pen-süstlis, 3ml 5TK	Eli Lilly Nederland B.V.	100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1					
					50						
1063482	loperamiid, 2mg	A07DA03	IMODIUM, kõvakapsel, 20TK	McNeil Healthcare (Ireland) Limited	50						
1503571	loperamiid, 2mg	A07DA03	LOPACUT, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Vitabalans Oy	50						
1284320	lopinaviir+ritonaviir, 200mg+50mg	J05AR10	KALETRA, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG	50		Infektsionist				HIV-nakkuse profülaktikaks, v a tööülesannete täitmisega seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega
1082472	lopinaviir+ritonaviir, 80mg+20mg 1ml	J05AR10	KALETRA, suukaudne lahus, 60ml 5TK	AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG	50		Infektsionist				HIV-nakkuse profülaktikaks, v a tööülesannete täitmisega seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega
1796104	lorlatiniib, 100mg	L01ED05	LORVIQUA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	C34-C34	Onkoloog				I või II rea raviks anaplastilise lümfoomkinaas-positiivse kaugelearenenud mitteväikerakk-kopsuvähiga heas üldseisundis (ECOG 0-2) täiskasvanud patsientidele, kes on varem ravimata või kelle haigus on progresseerunud pärast esmavaliku ravi ALK türosiinikinaasi inhibiitoriga
1816422	lorlatiniib, 25mg	L01ED05	LORVIQUA, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	C34-C34	Onkoloog				I või II rea raviks anaplastilise lümfoomkinaas-positiivse kaugelearenenud mitteväikerakk-kopsuvähiga heas üldseisundis (ECOG 0-2) täiskasvanud patsientidele, kes on varem ravimata või kelle haigus on progresseerunud pärast esmavaliku ravi ALK türosiinikinaasi inhibiitoriga

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1805767	lornoksikaam, 8mg	M01AC05	XEFO RAPID, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	First Pharma OÜ	50						
1834332	lornoksikaam, 8mg	M01AC05	XEFO, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	Lex Ano UAB	50						
1210688	losartaan, 100mg	C09CA01	LOZAP 100, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Zentiva k.s.	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1268962	losartaan, 100mg	C09CA01	LORISTA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1013735	losartaan, 50mg	C09CA01	LORISTA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1210701	losartaan, 50mg	C09CA01	LOZAP 50, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Zentiva k.s.	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1166059	losartaan+hüdroklorotiasiid, 50mg+12,5mg	C09DA80	LORISTA H, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1217810	losartaan+hüdroklorotiasiid, 50mg+12,5mg	C09DA80	LOZAP H, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Zentiva k.s.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1185195	loteprednool, 0,5%	S01BA14	LOTEMAX, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK	Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm. Fabrik GmbH	50						
1029417	lühikese toimeajaga humaaninsuliin, 100RÜ 1ml	A10AB01	HUMULIN R, süstelahus kolbampullis, 3ml 5TK	Eli Lilly Nederland B.V.	50						
					100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1479416	makrogool+naatriumsulfaat, veevaba+naatriumkloriid+kaaliumkloriid+askorbiinhape+naatriumaskorbaat, 100g+7,5g+2,691g+1,015g+0+0/0+0+0+0+4,7g+5,9g	A06AD83	MOVIPREP, suukaudse lahuse pulber, 2TK / 2TK	Norgine B.V.	50						
1636602	matsitentaan, 10mg	C02KX04	OPSUMIT, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Janssen - Cilag International	100	I27.0-I27.0	Reumatoloog, Pediaater kardioloogi lisapädevusega, Kardioloog, Pediaater, Pulmonoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega				NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafiil ja bosentaan on vastunäidustatud, osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid
					50						
3053720	matsitentaan, 10mg	C02KX04	MACITENTAN NORAMEDA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Norameda UAB	50						
					100	I27.0-I27.0	Kardioloog, Pediaater, Reumatoloog, Pediaater kardioloogi lisapädevusega, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pulmonoloog				NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafiil ja bosentaan on vastunäidustatud, osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3044416	mavakamteen, 10mg	C01EB24	CAMZYOS, kõvakapsel, 28TK	Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG	100	I42.1-I42.1	Kardioloog	esmane			vähemalt kahest kardioloogist koosneva konsiiliumi, kellest üks peab olema ITK, TÜK või PERH kardioloog, otsusel sümptomaatilise (NYHA klassifikatsiooni järgi II-III klass) obstruktiivse hüpertroofilise kardiomüopaatiaga patsiendile, kellel on dokumenteeritud vasaku vatsakese väljutusfraktsioon puhkeolekus >=55%, vasaku vatsakese seina paksus >=15mm (või >=13mm ja perekonnas esinenud OHKM) ja vasaku vatsakese väljavoolutrakti obstruktsioon >=50mmHg puhkeolekus või esilekutsutuna (Valsalva manöövri, seistes või füüsilise koormusega teostatava ehhokardiograafia käigus)
3044438	mavakamteen, 15mg	C01EB24	CAMZYOS, kõvakapsel, 28TK	Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG	100	I42.1-I42.1	Kardioloog	esmane			vähemalt kahest kardioloogist koosneva konsiiliumi, kellest üks peab olema ITK, TÜK või PERH kardioloog, otsusel sümptomaatilise (NYHA klassifikatsiooni järgi II-III klass) obstruktiivse hüpertroofilise kardiomüopaatiaga patsiendile, kellel on dokumenteeritud vasaku vatsakese väljutusfraktsioon puhkeolekus >=55%, vasaku vatsakese seina paksus >=15mm (või >=13mm ja perekonnas esinenud OHKM) ja vasaku vatsakese väljavoolutrakti obstruktsioon >=50mmHg puhkeolekus või esilekutsutuna (Valsalva manöövri, seistes või füüsilise koormusega teostatava ehhokardiograafia käigus)
3044371	mavakamteen, 2,5mg	C01EB24	CAMZYOS, kõvakapsel, 28TK	Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG	100	I42.1-I42.1	Kardioloog	esmane			vähemalt kahest kardioloogist koosneva konsiiliumi, kellest üks peab olema ITK, TÜK või PERH kardioloog, otsusel sümptomaatilise (NYHA klassifikatsiooni järgi II-III klass) obstruktiivse hüpertroofilise kardiomüopaatiaga patsiendile, kellel on dokumenteeritud vasaku vatsakese väljutusfraktsioon puhkeolekus >=55%, vasaku vatsakese seina paksus >=15mm (või >=13mm ja perekonnas esinenud OHKM) ja vasaku vatsakese väljavoolutrakti obstruktsioon >=50mmHg puhkeolekus või esilekutsutuna (Valsalva manöövri, seistes või füüsilise koormusega teostatava ehhokardiograafia käigus)

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3044393	mavakamteen, 5mg	C01EB24	CAMZYOS, kõvakapsel, 28TK	Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG	100	I42.1-I42.1	Kardioloog	esmane			vähemalt kahest kardioloogist koosneva konsiiliumi, kellest üks peab olema ITK, TÜK või PERH kardioloog, otsusel sümptomaatilise (NYHA klassifikatsiooni järgi II-III klass) obstruktiivse hüpertroofilise kardiomüopaatiaga patsiendile, kellel on dokumenteeritud vasaku vatsakese väljutusfraktsioon puhkeolekus >=55%, vasaku vatsakese seina paksus >=15mm (või >=13mm ja perekonnas esinenud OHKM) ja vasaku vatsakese väljavoolutrakti obstruktsioon >=50mmHg puhkeolekus või esilekutsutuna (Valsalva manöövri, seistes või füüsilise koormusega teostatava ehhokardiograafia käigus)
1007222	mebendasool, 100mg	P02CA01	VERMOX 100 MG, tablett, 6TK	Gedeon Richter Plc.	50						
1008245	mebendasool, 100mg	P02CA01	MEBENDAZOLE-GRINDEKS, tablett, 6TK	Grindeks AS	50						
1832486	mebendasool, 100mg	P02CA01	VERMOX 100 MG, tablett, 6TK	Lex Ano UAB	50						
1837076	mebendasool, 100mg	P02CA01	VERMOX 100 MG, tablett, 6TK	Ideal Trade Links UAB	50						
1891672	mebeveriin, 200mg	A03AA04	DUSPATALIN, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	Lex Ano UAB	50						
1013195	medroksüprogesteroon, 500mg	L02AB02	FARLUTAL, tablett, 30TK	Pfizer Europe MA EEIG	50						
					100	C00-D48	Onkoloog				
3128969	medroksüprogesteroon, 500mg	L02AB02	FARLUTAL, tablett, 30TK	First Pharma OÜ	100	C00-D48	Onkoloog				
					50						
1004410	melfalaan, 2mg	L01AA03	ALKERAN, õhukese polümeerikattega tablett, 25TK	Aspen Pharma Trading Limited	50						
					100	C00-D48	Hematoloog, Onkoloog				
1035021	meloksikaam, 15mg	M01AC06	MOVALIS, tablett, 20TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					75	M15-M19			63,00		
					100	C00-D48					
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1140680	meloksikaam, 15mg	M01AC06	MELOX 15MG, tablett, 20TK	Medochemie Limited	50						
					75	M15-M19			63,00		
					100	C00-D48					
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
1149779	meloksikaam, 15mg	M01AC06	MEXOLAN 15 MG, tablett, 30TK	G.L. Pharma GmbH	50						
					100	C00-D48					
					75	M15-M19			63,00		
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
1175936	meloksikaam, 15mg	M01AC06	RECOXA, tablett, 20TK	Zentiva k.s.	100	C00-D48					
					50						
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					75	M15-M19			63,00		
1189199	meloksikaam, 15mg	M01AC06	LORMED 15 MG, tablett, 20TK	Pro.Med.Cs Praha a.s.	100	C00-D48					
					75	M15-M19			63,00		
					50						
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
1240254	meloksikaam, 15mg	M01AC06	RECOXA, tablett, 60TK	Zentiva k.s.	100	C00-D48					
					75	M15-M19			63,00		
					50						
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
1360189	meloksikaam, 15mg	M01AC06	MELOXICAM-RATIOPHARM 15 MG, tablett, 20TK	Ratiopharm GmbH	50						
					75	M15-M19			63,00		
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					100	C00-D48					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1560260	meloksikaam, 15mg	M01AC06	MELOX 15MG, tablett, 60TK	Medochemie Limited	75	M15-M19			63,00		
					100	C00-D48					
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					50						
3038532	meloksikaam, 15mg	M01AC06	MOVALIS, tablett, 20TK	Ideal Trade Links UAB	75	M45-M46, M05-M08, M30-M35					
					50						
					100	C00-D48					
					75	M15-M19			63,00		
1035009	meloksikaam, 7,5mg	M01AC06	MOVALIS, tablett, 20TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	75	M15-M19			63,00		
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					50						
					100	C00-D48					
1140679	meloksikaam, 7,5mg	M01AC06	MELOX 7,5MG, tablett, 30TK	Medochemie Limited	75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					75	M15-M19			63,00		
					100	C00-D48					
					50						
1146350	meloksikaam, 7,5mg	M01AC06	MOVALIS, tablett, 50TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	75	M15-M19			63,00		
					50						
					100	C00-D48					
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
1149746	meloksikaam, 7,5mg	M01AC06	MEXOLAN 7,5 MG, tablett, 30TK	G.L. Pharma GmbH	75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					100	C00-D48					
					75	M15-M19			63,00		
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1360134	meloksikaam, 7,5mg	M01AC06	MELOXICAM-RATIOPHARM 7,5 MG, tablett, 20TK	Ratiopharm GmbH	75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					100	C00-D48					
					75	M15-M19			63,00		
					50						
1360156	meloksikaam, 7,5mg	M01AC06	MELOXICAM-RATIOPHARM 7,5 MG, tablett, 50TK	Ratiopharm GmbH	75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					50						
					100	C00-D48					
					75	M15-M19			63,00		
1560271	meloksikaam, 7,5mg	M01AC06	MELOX 7,5MG, tablett, 60TK	Medochemie Limited	75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					75	M15-M19			63,00		
					100	C00-D48					
					50						
1006007	melperoon, 25mg	N05AD03	BURONIL, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	EQL Pharma AB	50						
					100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1006030	melperoon, 50mg	N05AD03	BURONIL, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	EQL Pharma AB	50						
					100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
1123524	memantiin, 10mg	N06DX01	AXURA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Merz Pharmaceuticals GmbH	50						
1123535	memantiin, 10mg	N06DX01	AXURA, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Merz Pharmaceuticals GmbH	50						
1614024	memantiin, 10mg	N06DX01	NEMDATINE, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Actavis Group Ptc ehf.	50						
1614057	memantiin, 10mg	N06DX01	NEMDATINE, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Actavis Group Ptc ehf.	50						
1614563	memantiin, 10mg	N06DX01	MARIXINO, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA d.d. Novo mesto	50						
1614608	memantiin, 10mg	N06DX01	MARIXINO, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	KRKA d.d. Novo mesto	50						
1618747	memantiin, 10mg	N06DX01	MEMANTINE RATIOPHARM, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Ratiopharm GmbH	50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1618781	memantiin, 10mg	N06DX01	MEMANTINE RATIOPHARM, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Ratiopharm GmbH	50						
1621998	memantiin, 10mg	N06DX01	MANTOMED, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Medochemie Limited	50						
1622023	memantiin, 10mg	N06DX01	MANTOMED, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Medochemie Limited	50						
1635331	memantiin, 10mg	N06DX01	MEMANTINE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare S.L.U.	50						
1635375	memantiin, 10mg	N06DX01	MEMANTINE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Accord Healthcare S.L.U.	50						
1648694	memantiin, 10mg	N06DX01	MEMANTINE GRINDEKS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Grindeks AS	50						
1648739	memantiin, 10mg	N06DX01	MEMANTINE GRINDEKS, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Grindeks AS	50						
1614697	memantiin, 20mg	N06DX01	MARIXINO, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA d.d. Novo mesto	50						
1621819	memantiin, 20mg	N06DX01	MANTOMED, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Medochemie Limited	50						
1823082	menopausaalne humaangonadotropiin, 150RÜ	G03GA02	MERIOFERT SET, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	IBSA Farmaceutici Italia S.r.l.	100	N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1872895	menopausaalne humaangonadotropiin, 75RÜ	G03GA02	MENOPUR, süstelahuse pulber ja lahusti, 5TK	Ferring GmbH	100	N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks
					50						
1848461	menopausaalne humaangonadotropiin, 900RÜ	G03GA02	MERIOFERT SET, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	IBSA Farmaceutici Italia S.r.l.	100	N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1802562	mepolizumab, 100mg	R03DX09	NUCALA, süstelahus pen-süstlis, 1ml 1TK	GlaxoSmithKline Trading Services Limited	100	J32-J33	Allergoloog-immunoloog, Otorinolarüngoloog				vähemalt kolmeliikmelise kõrva-nina-kurguarstidest koosneva eksperdikomisjoni otsuse alusel patsiendile, kellel on raske krooniline rinosinusiit ning ninapolüpooside raviks on viimase 2 aasta jooksul teostatud vähemalt 2 endoskoopilist siinuse operatsiooni või üle kolme endoskoopilise siinuse operatsiooni elu jooksul. Kui 16 nädala möödudes ravi alustamisest ei ole patsiendi NPS skoor vähenenud vähemalt ühe ühiku võrra, siis ravi katkestatakse

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M30.1-M30.1	Reumatoloog, Pulmonoloog				vähemalt kolmeliikmelise ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kellel on retsidiveeruv või refraktaarne eosinofiilne granulomatoos polüangiidiga ning kes saavad glükokortikosteroide >=7,5 mg/päevas, koos või ilma immunosupressiivse raviga. Ravi tuleb katkestada, kui vähemalt 26 nädala jooksul ei ole võimalik olnud vähendada glükokortikosteroidi annust >=50% või alla 7,5mg/ päevas või esineb korduv vajadus glükokortikosteroidide kasutamise annust tõsta
					100	D72.1-D72.1	Sisearst allergoloogi lisapädevusega, Pulmonoloog, Gastroenteroloog, Allergoloog-immunoloog, Pediaater allergoloogi lisapädevusega, Hematoloog				vähemalt kolmeliikmelise ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kellel on vaatamata standardravile ebapiisavalt kontrollitud hüpereosinofiilne sündroom (HES) ning kellel on olnud viimase 12 kuu jooksul, vähemalt kaks HES-i ägenemist ja eosinofiilide arv perifeerses veres >=1000 rakku/µL. Ravi tuleb katkestada, kui 52 nädala jooksul ei ole olnud võimalik HES-i ägenemiste arvu vähendada poole võrra
					100	J45-J45	Pulmonoloog				vähemalt kolmest pulmonoloogist või allergoloog-immunoloogist koosneva eksperdikomisjoni otsusel 2. tüüpi põletikust juhitud astmaga patsiendile, kelle astma on vaatamata eelnevale pikaajalisele kolmikravile (inhaleeritav glükokortikosteroid ja pikatoimeline beeta-2-agonist koos antileukotrieeni või pikatoimelise teofülliinpreparaadi või pikatoimelise antikoliinergilise ainega) puudulikult kontrollitud. Kui 3 kuu möödumisel ravi alustamisest ei ole ekspertkomisjoni hinnangul astma ravi tulemused kliiniliselt oluliselt paranenud, lõpetatakse ravi selle preparaadiga
1004971	merkaptopuriin, 50mg	L01BB02	PURI-NETHOL, tablett, 25TK	Aspen Pharma Trading Limited	100	C00-D48	Onkoloog, Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega, Hematoloog				
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1737648	mesalasiin, 1600mg	A07EC02	YALDIGO, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 30TK	Tillotts Pharma AB	75	K51-K51, K50-K50	Pediaater gastroenteroloogi lisapädevusega, Pediaater, Gastroenteroloog				
					50						
1023815	mesalasiin, 1g	A07EC02	PENTASA, rektaalsuposiit, 28TK	Ferring GmbH	50						
					75	K51-K51, K50-K50	Pediaater gastroenteroloogi lisapädevusega, Gastroenteroloog, Pediaater				
1352810	mesalasiin, 1g	A07EC02	PENTASA 1G, toimeainet prolongeeritult vabastavad graanulid, 50TK	Ferring GmbH	50						
					75	K51-K51, K50-K50	Pediaater, Gastroenteroloog, Pediaater gastroenteroloogi lisapädevusega				
1807578	mesalasiin, 1g	A07EC02	YALDIGO, rektaalsuposiit, 30TK	Tillotts Pharma AB	50						
					75	K51-K51, K50-K50	Pediaater, Pediaater gastroenteroloogi lisapädevusega, Gastroenteroloog				
3115325	mesalasiin, 1g	A07EC02	YALDIGO, rektaalsuposiit, 28TK	Ideal Trade Links UAB	50						
					75	K51-K51, K50-K50	Gastroenteroloog, Pediaater gastroenteroloogi lisapädevusega, Pediaater				

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1352854	mesalasiin, 2g	A07EC02	PENTASA 2G, toimeainet prolongeeritult vabastavad graanulid, 60TK	Ferring GmbH	75	K51-K51, K50-K50	Pediaater gastroenteroloogi lisapädevusega, Gastroenteroloog, Pediaater				
					50						
1146574	mesalasiin, 400mg	A07EC02	ASACOL 400MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 100TK	Tillotts Pharma AB	75	K51-K51, K50-K50	Pediaater gastroenteroloogi lisapädevusega, Gastroenteroloog, Pediaater				
					50						
3006762	mesalasiin, 4g	A07EC02	PENTASA 4G, toimeainet prolongeeritult vabastavad graanulid, 30TK	Ferring GmbH	50						
					75	K51-K51, K50-K50	Gastroenteroloog, Pediaater, Pediaater gastroenteroloogi lisapädevusega				
1023826	mesalasiin, 500mg	A07EC02	PENTASA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	Ferring GmbH	75	K51-K51, K50-K50	Pediaater, Pediaater gastroenteroloogi lisapädevusega, Gastroenteroloog				
					50						
1146541	mesalasiin, 500mg	A07EC02	ASACOL, rektaalsuposiit, 20TK	Tillotts Pharma AB	75	K51-K51, K50-K50	Gastroenteroloog, Pediaater gastroenteroloogi lisapädevusega, Pediaater				
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1184970	mesalasiin, 800mg	A07EC02	ASACOL 800 MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 50TK	Tillotts Pharma AB	75	K51-K51, K50-K50	Gastroenteroloog, Pediaater gastroenteroloogi lisapädevusega, Pediaater				
					50						
3115369	mesalasiin, 800mg	A07EC02	ASACOL 800 MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 60TK	Ideal Trade Links UAB	50						
					75	K51-K51, K50-K50	Pediaater, Pediaater gastroenteroloogi lisapädevusega, Gastroenteroloog				
1034109	metadoon, 1mg 1ml	N07BC02	METADON DAK 1 MG/ML, suukaudne lahus, 1000ml 1TK	Orifarm Healthcare A/S	50						
					100	C00-D48					
					100	R52.1-R52.1	Neuroloog, Anestesioloog, Reumatoloog	esmane			esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul
1164798	metformiin, 1000mg	A10BA02	METFORAL 1000 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Laboratori Guidotti S.p.A.	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1302949	metformiin, 1000mg	A10BA02	METFOGAMMA 1000, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Woerwag Pharma GmbH & Co. KG	75	E14-E14, E11-E11					
					50						
1568246	metformiin, 1000mg	A10BA02	METFORMIN TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Teva Pharma B.V.	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1818019	metformiin, 1000mg	A10BA02	METFORMIN ZENTIVA, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Zentiva k.s.	50						
					75	E11-E11, E14-E14					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1820034	metformiin, 1000mg	A10BA02	METFORMIN ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Accord Healthcare B.V.	75	E14-E14, E11-E11					
					50						
1064719	metformiin, 500mg	A10BA02	METFORAL 500 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Berlin-Chemie AG	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1083169	metformiin, 500mg	A10BA02	METFORMIN-RATIOPHARM 500 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Ratiopharm GmbH	75	E14-E14, E11-E11					
					50						
1116380	metformiin, 500mg	A10BA02	METFOGAMMA 500, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Woerwag Pharma GmbH & Co. KG	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1817816	metformiin, 500mg	A10BA02	METFORMIN ZENTIVA, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Zentiva k.s.	50						
					75	E11-E11, E14-E14					
1819694	metformiin, 500mg	A10BA02	METFORMIN ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Accord Healthcare B.V.	75	E14-E14, E11-E11					
					50						
1064731	metformiin, 850mg	A10BA02	METFORAL 850 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Berlin-Chemie AG	75	E14-E14, E11-E11					
					50						
1083158	metformiin, 850mg	A10BA02	METFORMIN-RATIOPHARM 850 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Ratiopharm GmbH	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1111262	metformiin, 850mg	A10BA02	METFOGAMMA 850, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Woerwag Pharma GmbH & Co. KG	75	E14-E14, E11-E11					
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1156609	metformiin, 850mg	A10BA02	METFORMIN SANDOZ 850 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Sandoz GmbH	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1817939	metformiin, 850mg	A10BA02	METFORMIN ZENTIVA, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Zentiva k.s.	75	E14-E14, E11-E11					
					50						
1819841	metformiin, 850mg	A10BA02	METFORMIN ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Accord Healthcare B.V.	75	E14-E14, E11-E11					
					50						
1637917	metformiin+dapagliflosiin, 1000mg+5mg	A10BD15	XIGDUO, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Astrazeneca AB	50						
					75	E11-E11, E14-E14					
1637861	metformiin+dapagliflosiin, 850mg+5mg	A10BD15	XIGDUO, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Astrazeneca AB	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1687136	metformiin+empagliflosiin, 1000mg+12,5mg	A10BD20	SYNJARDY, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1686955	metformiin+empagliflosiin, 1000mg+5mg	A10BD20	SYNJARDY, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	75	E11-E11, E14-E14					
					50						
1687046	metformiin+empagliflosiin, 850mg+12,5mg	A10BD20	SYNJARDY, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1686865	metformiin+empagliflosiin, 850mg+5mg	A10BD20	SYNJARDY, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	50						
					75	E14-E14, E11-E11					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1590599	metformiin+linagliptiin, 1000mg+2,5mg	A10BD11	JENTADUETO, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama sulfonüüluurea preparaati, välja arvatud juhul kui see on meditsiiniliselt vastunäidustatud
					50						
1590465	metformiin+linagliptiin, 850mg+2,5mg	A10BD11	JENTADUETO, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	50						
					75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama sulfonüüluurea preparaati, välja arvatud juhul kui see on meditsiiniliselt vastunäidustatud
1805307	metformiin+sitagliptiin, 1000mg+50mg	A10BD07	MAYMETSI, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	75	E11-E11, E14-E14					
					50						
1815049	metformiin+sitagliptiin, 1000mg+50mg	A10BD07	SITAGLIPTIN/METFORMIN HYDROCHLORIDE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Teva GmbH	75	E14-E14, E11-E11					
					50						
1822283	metformiin+sitagliptiin, 1000mg+50mg	A10BD07	JAMESI, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Zentiva k.s.	75	E11-E11, E14-E14					
					50						
1828324	metformiin+sitagliptiin, 1000mg+50mg	A10BD07	JUZIMETTE, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Gedeon Richter Plc.	75	E14-E14, E11-E11					
					50						
1830169	metformiin+sitagliptiin, 1000mg+50mg	A10BD07	SITAGLIPTIN/METFORMIN HYDROCHLORIDE SANDOZ, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1833207	metformiin+sitagliptiin, 1000mg+50mg	A10BD07	METFORMIN HYDROCHLORIDE/SITAGLIPTIN GRINDEKS, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Grindeks AS	75	E11-E11, E14-E14					
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3013603	metformiin+sitagliptiin, 1000mg+50mg	A10BD07	SITAGLIPTIN/METFORMIN ZENTIVA, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Zentiva k.s.	75	E11-E11, E14-E14					
					50						
1805239	metformiin+sitagliptiin, 850mg+50mg	A10BD07	MAYMETSI, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	50						
					75	E11-E11, E14-E14					
1814969	metformiin+sitagliptiin, 850mg+50mg	A10BD07	SITAGLIPTIN/METFORMIN HYDROCHLORIDE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Teva GmbH	75	E14-E14, E11-E11					
					50						
1822249	metformiin+sitagliptiin, 850mg+50mg	A10BD07	JAMESI, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Zentiva k.s.	75	E11-E11, E14-E14					
					50						
1828256	metformiin+sitagliptiin, 850mg+50mg	A10BD07	JUZIMETTE, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Gedeon Richter Plc.	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1830091	metformiin+sitagliptiin, 850mg+50mg	A10BD07	SITAGLIPTIN/METFORMIN HYDROCHLORIDE SANDOZ, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	E14-E14, E11-E11					
					50						
1833173	metformiin+sitagliptiin, 850mg+50mg	A10BD07	METFORMIN HYDROCHLORIDE/SITAGLIPTIN GRINDEKS, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Grindeks AS	50						
					75	E11-E11, E14-E14					
3013579	metformiin+sitagliptiin, 850mg+50mg	A10BD07	SITAGLIPTIN/METFORMIN ZENTIVA, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Zentiva k.s.	75	E14-E14, E11-E11					
					50						
1714968	metformiin+vildagliptiin, 1000mg+50mg	A10BD08	VILSPOX, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	E11-E11, E14-E14					
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1848775	metformiin+vildagliptiin, 1000mg+50mg	A10BD08	VILDAGLIPTIN/ METFORMIN ELVIM, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	SIA Elvim	75	E11-E11, E14-E14					
					50						
3106314	metformiin+vildagliptiin, 1000mg+50mg	A10BD08	VILSPOX, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Lex Ano UAB	75	E14-E14, E11-E11					
					50						
1714913	metformiin+vildagliptiin, 850mg+50mg	A10BD08	VILSPOX, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	E11-E11, E14-E14					
1848764	metformiin+vildagliptiin, 850mg+50mg	A10BD08	VILDAGLIPTIN/ METFORMIN ELVIM, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	SIA Elvim	75	E11-E11, E14-E14					
					50						
3106303	metformiin+vildagliptiin, 850mg+50mg	A10BD08	VILSPOX, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Lex Ano UAB	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1000674	metoklopramiid, 10mg	A03FA01	CERUCAL, tablett, 50TK	Teva Pharma B.V.	100	C00-D48					
					50						
1699050	metoklopramiid, 10mg	A03FA01	METOCLOPRAMIDE ACCORD, tablett, 50TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					100	C00-D48					
1327643	metoksüpolüetüleenglükool-beetaepoetiin, 100mcg 0.3ml	B03XA03	MIRCERA, süstelahus süstlis, 0.3ml 1TK	Roche Registration GmbH	100	D46-D46, D47.1-D47.1	Hematoloog				
					100	D63-D63, T86-T86	Nefroloog, Pediaater nefroloogi lisapädevusega, Pediaater, Uroloog				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3094826	metoksüpolüetüleenglükool-beetaepoetiin, 100mcg 0.3ml	B03XA03	MIRCERA, süstelahus süstlis, 0.3ml 1TK	Roche Registration GmbH	100	D63-D63, T86-T86	Uroloog, Pediaater, Pediaater nefroloogi lisapädevusega, Nefroloog				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
					50						
					100	D46-D46, D47.1-D47.1	Hematoloog				
3128992	metoksüpolüetüleenglükool-beetaepoetiin, 100mcg 0.3ml	B03XA03	MIRCERA, süstelahus süstlis, 0.3ml 1TK	Roche Registration GmbH	50						
					100	D63-D63, T86-T86	Pediaater, Nefroloog, Pediaater nefroloogi lisapädevusega, Uroloog				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
					100	D46-D46, D47.1-D47.1	Hematoloog				
1370540	metoksüpolüetüleenglükool-beetaepoetiin, 120mcg 0.3ml	B03XA03	MIRCERA, süstelahus süstlis, 0.3ml 1TK	Roche Registration GmbH	100	D63-D63, T86-T86	Uroloog, Pediaater nefroloogi lisapädevusega, Pediaater, Nefroloog				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
					100	D46-D46, D47.1-D47.1	Hematoloog				
					50						
3094804	metoksüpolüetüleenglükool-beetaepoetiin, 120mcg 0.3ml	B03XA03	MIRCERA, süstelahus süstlis, 0.3ml 1TK	Roche Registration GmbH	50						
					100	D63-D63, T86-T86	Uroloog, Pediaater, Nefroloog, Pediaater nefroloogi lisapädevusega				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
					100	D46-D46, D47.1-D47.1	Hematoloog				

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1327665	metoksüpolüetüleenglükool-beetaepoetiin, 200mcg 0.3ml	B03XA03	MIRCERA, süstelahus süstlis, 0.3ml 1TK	Roche Registration GmbH	100	D46-D46, D47.1-D47.1	Hematoloog				
					50						
					100	D63-D63, T86-T86	Pediaater, Pediaater nefroloogi lisapädevusega, Uroloog, Nefroloog				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
3094837	metoksüpolüetüleenglükool-beetaepoetiin, 200mcg 0.3ml	B03XA03	MIRCERA, süstelahus süstlis, 0.3ml 1TK	Roche Registration GmbH	100	D46-D46, D47.1-D47.1	Hematoloog				
					50						
					100	D63-D63, T86-T86	Nefroloog, Uroloog, Pediaater, Pediaater nefroloogi lisapädevusega				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
1327621	metoksüpolüetüleenglükool-beetaepoetiin, 50mcg 0.3ml	B03XA03	MIRCERA, süstelahus süstlis, 0.3ml 1TK	Roche Registration GmbH	50						
					100	D46-D46, D47.1-D47.1	Hematoloog				
					100	D63-D63, T86-T86	Nefroloog, Pediaater nefroloogi lisapädevusega, Uroloog, Pediaater				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
3094815	metoksüpolüetüleenglükool-beetaepoetiin, 50mcg 0.3ml	B03XA03	MIRCERA, süstelahus süstlis, 0.3ml 1TK	Roche Registration GmbH	100	D46-D46, D47.1-D47.1	Hematoloog				
					50						
					100	D63-D63, T86-T86	Pediaater, Pediaater nefroloogi lisapädevusega, Nefroloog, Uroloog				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3128958	metoksüpolüetüleenglükool-beetaepoetiin, 50mcg 0.3ml	B03XA03	MIRCERA, süstelahus süstlis, 0.3ml 1TK	Roche Registration GmbH	100	D46-D46, D47.1-D47.1	Hematoloog				
					50						
					100	D63-D63, T86-T86	Nefroloog, Uroloog, Pediaater, Pediaater nefroloogi lisapädevusega				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
1327632	metoksüpolüetüleenglükool-beetaepoetiin, 75mcg 0.3ml	B03XA03	MIRCERA, süstelahus süstlis, 0.3ml 1TK	Roche Registration GmbH	100	D46-D46, D47.1-D47.1	Hematoloog				
					50						
					100	D63-D63, T86-T86	Pediaater, Uroloog, Nefroloog, Pediaater nefroloogi lisapädevusega				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
3094792	metoksüpolüetüleenglükool-beetaepoetiin, 75mcg 0.3ml	B03XA03	MIRCERA, süstelahus süstlis, 0.3ml 1TK	Roche Registration GmbH	50						
					100	D46-D46, D47.1-D47.1	Hematoloog				
					100	D63-D63, T86-T86	Uroloog, Pediaater, Nefroloog, Pediaater nefroloogi lisapädevusega				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
3128981	metoksüpolüetüleenglükool-beetaepoetiin, 75mcg 0.3ml	B03XA03	MIRCERA, süstelahus süstlis, 0.3ml 1TK	Roche Registration GmbH	100	D63-D63, T86-T86	Pediaater nefroloogi lisapädevusega, Nefroloog, Pediaater, Uroloog				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
					50						
					100	D46-D46, D47.1-D47.1	Hematoloog				

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1010811	metoprolool, 100mg	C07AB02	EMZOK, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Teva B.V.	75	I47-I49, I50-I50, I20-I20, I10-I13, I15-I15					
					50						
1019720	metoprolool, 100mg	C07AB02	BETALOC ZOK 100, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Recordati Ireland Limited	50						
					75	I47-I49, I50-I50, I20-I20, I10-I13, I15-I15					
1224278	metoprolool, 100mg	C07AB02	METOZOK, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	I47-I49, I50-I50, I20-I20, I10-I13, I15-I15					
1224290	metoprolool, 100mg	C07AB02	METOZOK, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	I47-I49, I50-I50, I20-I20, I10-I13, I15-I15					
1672286	metoprolool, 100mg	C07AB02	BLOXAZOC 100, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	75	I47-I49, I50-I50, I20-I20, I10-I13, I15-I15					
					50						
1083406	metoprolool, 25mg	C07AB02	BETALOC ZOK 25, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK	Recordati Ireland Limited	50						
					75	I47-I49, I50-I50, I20-I20, I10-I13, I15-I15					
1224201	metoprolool, 25mg	C07AB02	METOZOK, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	I47-I49, I50-I50, I20-I20, I10-I13, I15-I15					
1672130	metoprolool, 25mg	C07AB02	BLOXAZOC 25, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	50						
					75	I47-I49, I50-I50, I20-I20, I10-I13, I15-I15					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1009055	metoprolool, 50mg	C07AB02	METOPROLOL-RATIOPHARM 50 MG, tablett, 30TK	Ratiopharm GmbH	50						
					75	I47-I49, I50-I50, I20-I20, I10-I13, I15-I15					
1010800	metoprolool, 50mg	C07AB02	EMZOK, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Teva B.V.	75	I47-I49, I50-I50, I20-I20, I10-I13, I15-I15					
					50						
1019719	metoprolool, 50mg	C07AB02	BETALOC ZOK 50, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Recordati Ireland Limited	75	I47-I49, I50-I50, I20-I20, I10-I13, I15-I15					
					50						
1072190	metoprolool, 50mg	C07AB02	METOPROLOL STADA, tablett, 100TK	Stada Arzneimittel AG	50						
					75	I47-I49, I50-I50, I20-I20, I10-I13, I15-I15					
1224245	metoprolool, 50mg	C07AB02	METOZOK, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	I47-I49, I50-I50, I20-I20, I10-I13, I15-I15					
					50						
1224267	metoprolool, 50mg	C07AB02	METOZOK, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	I47-I49, I50-I50, I20-I20, I10-I13, I15-I15					
					50						
1282160	metoprolool, 50mg	C07AB02	METOPROLOL-RATIOPHARM RETARD 50 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Ratiopharm GmbH	50						
					75	I47-I49, I50-I50, I20-I20, I10-I13, I15-I15					
1672174	metoprolool, 50mg	C07AB02	BLOXAZOC 50, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	75	I47-I49, I50-I50, I20-I20, I10-I13, I15-I15					
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1672242	metoprolool, 50mg	C07AB02	BLOXAZOC 50, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	75	I47-I49, I50-I50, I20-I20, I10-I13, I15-I15					
					50						
1688744	metotreksaat, 2,5mg	L04AX03	TREXAN, tablett, 100TK	Orion Corporation	75	H30.2-H30.2, H20.0-H20.0, H30.0-H30.0, H30.8-H30.8, H20.1-H20.1, H30.9-H30.9, H30.1-H30.1	Oftalmoloog				
					100	C00-D48	Hematoloog, Onkoloog, Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega				
					75	M30-M35, M11-M11, M13-M13, M45-M46, M02-M03, M05-M08	Pediaater, Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega	esmane			
					50						
					75	L40-L40	Pediaater, Dermatovenerol oog				
					75	L94-L94, L93-L93, L63-L63	Dermatovenerol oog				

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3036631	metotreksaat, 2,5mg	L04AX03	TREXAN, tablett, 100TK	Ideal Trade Links UAB	75	M30-M35, M11-M11, M13-M13, M45-M46, M02-M03, M05-M08	Reumatoloog, Pediaater, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega	esmane			
					75	H30.2-H30.2, H20.0-H20.0, H30.0-H30.0, H30.8-H30.8, H20.1-H20.1, H30.9-H30.9, H30.1-H30.1	Oftalmoloog				
					75	L94-L94, L93-L93, L63-L63	Dermatovenerol oog				
					50						
					100	C00-D48	Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega, Onkoloog, Hematoloog				
					75	L40-L40	Pediaater, Dermatovenerol oog				

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1418914	metotreksaat, 20mg 1ml	L04AX03	EBETREX 20MG/ML, süstelahus süstlis, 1ml 5TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	M08.0-M08.8, M46.8-M46.8, M05.8-M05.8, M07.0-M07.6, M05.3-M05.3, M45-M45, M06.0-M06.0	Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog, Pediaater				patsientidele, kellel eelneva 3 kuu jooksul kombineeritud haiguse kulgu mõjutav ravi, sh adekvaatses annuses suukaudse metotreksaadiga ja glükokortikosteroidiga madalas annuses on olnud ebaefektiivne või on tekkinud ravi katkestama sundivad või annuse tõstmist takistavad seedetrakti poolsed kõrvaltoimed
					75	L40-L40	Dermatovenerol oog, Pediaater				ravile allumatu raske psoriaasiga patsientidele, kellel eelnev suukaudne ravi, sh adekvaatses annuses suukaudse metotreksaadiga on olnud ebaefektiivne või tekitanud ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed
					75	M08.0-M08.8, M46.8-M46.8, M05.8-M05.8, M07.0-M07.6, M05.3-M05.3, M45-M45, M06.0-M06.0	Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog, Pediaater			5,00	
1418925	metotreksaat, 20mg 1ml	L04AX03	EBETREX 20MG/ML, süstelahus süstlis, 1.25ml 5TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	L40-L40	Pediaater, Dermatovenerol oog				ravile allumatu raske psoriaasiga patsientidele, kellel eelnev suukaudne ravi, sh adekvaatses annuses suukaudse metotreksaadiga on olnud ebaefektiivne või tekitanud ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed
					75	M08.0-M08.8, M46.8-M46.8, M05.8-M05.8, M07.0-M07.6, M05.3-M05.3, M45-M45, M06.0-M06.0	Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater			5,00	
					75	M08.0-M08.8, M46.8-M46.8, M05.8-M05.8, M07.0-M07.6, M05.3-M05.3, M45-M45, M06.0-M06.0	Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater				patsientidele, kellel eelneva 3 kuu jooksul kombineeritud haiguse kulgu mõjutav ravi, sh adekvaatses annuses suukaudse metotreksaadiga ja glükokortikosteroidiga madalas annuses on olnud ebaefektiivne või on tekkinud ravi katkestama sundivad või annuse tõstmist takistavad seedetrakti poolsed kõrvaltoimed

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1547074	metotreksaat, 20mg 1ml	L04AX03	EBETREX 20MG/ML, süstelahus süstlis, 0.5ml 5TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	M08.0-M08.8, M46.8-M46.8, M05.8-M05.8, M07.0-M07.6, M05.3-M05.3, M45-M45, M06.0-M06.0	Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog, Pediaater				patsientidele, kellel eelneva 3 kuu jooksul kombineeritud haiguse kulgu mõjutav ravi, sh adekvaatses annuses suukaudse metotreksaadiga ja glükokortikosteroidiga madalas annuses on olnud ebaefektiivne või on tekkinud ravi katkestama sundivad või annuse tõstmist takistavad seedetrakti poolsed kõrvaltoimed
					75	L40-L40	Pediaater, Dermatovenerol oog				ravile allumatu raske psoriaasiga patsientidele, kellel eelnev suukaudne ravi, sh adekvaatses annuses suukaudse metotreksaadiga on olnud ebaefektiivne või tekitanud ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed
					75	M08.0-M08.8, M46.8-M46.8, M05.8-M05.8, M07.0-M07.6, M05.3-M05.3, M45-M45, M06.0-M06.0	Pediaater, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog			5,00	
1547120	metotreksaat, 20mg 1ml	L04AX03	EBETREX 20MG/ML, süstelahus süstlis, 0.75ml 5TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	L40-L40	Dermatovenerol oog, Pediaater				ravile allumatu raske psoriaasiga patsientidele, kellel eelnev suukaudne ravi, sh adekvaatses annuses suukaudse metotreksaadiga on olnud ebaefektiivne või tekitanud ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed
					75	M08.0-M08.8, M46.8-M46.8, M05.8-M05.8, M07.0-M07.6, M05.3-M05.3, M45-M45, M06.0-M06.0	Reumatoloog, Pediaater, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega				patsientidele, kellel eelneva 3 kuu jooksul kombineeritud haiguse kulgu mõjutav ravi, sh adekvaatses annuses suukaudse metotreksaadiga ja glükokortikosteroidiga madalas annuses on olnud ebaefektiivne või on tekkinud ravi katkestama sundivad või annuse tõstmist takistavad seedetrakti poolsed kõrvaltoimed
					75	M08.0-M08.8, M46.8-M46.8, M05.8-M05.8, M07.0-M07.6, M05.3-M05.3, M45-M45, M06.0-M06.0	Pediaater, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog			5,00	

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1304637	metotreksaat, 50mg 1ml	L04AX03	METEX, süstelahus süstlis, 0.2ml 6TK	Medac Gesellschaft fuer klinische Spezialpraeparate mbH	75	L40-L40	Dermatovenerol oog, Pediaater				ravile allumatu raske psoriaasiga patsientidele, kellel eelnev suukaudne ravi, sh adekvaatses annuses suukaudse metotreksaadiga on olnud ebaefektiivne või tekitanud ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed
					75	M08.0-M08.8, M46.8-M46.8, M05.8-M05.8, M07.0-M07.6, M05.3-M05.3, M45-M45, M06.0-M06.0	Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog, Pediaater			5,00	
					75	M08.0-M08.8, M46.8-M46.8, M05.8-M05.8, M07.0-M07.6, M05.3-M05.3, M45-M45, M06.0-M06.0	Reumatoloog, Pediaater, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega				patsientidele, kellel eelneva 3 kuu jooksul kombineeritud haiguse kulgu mõjutav ravi, sh adekvaatses annuses suukaudse metotreksaadiga ja glükokortikosteroidiga madalas annuses on olnud ebaefektiivne või on tekkinud ravi katkestama sundivad või annuse tõstmist takistavad seedetrakti poolsed kõrvaltoimed
1304682	metotreksaat, 50mg 1ml	L04AX03	METEX, süstelahus süstlis, 0.3ml 6TK	Medac Gesellschaft fuer klinische Spezialpraeparate mbH	75	M08.0-M08.8, M46.8-M46.8, M05.8-M05.8, M07.0-M07.6, M05.3-M05.3, M45-M45, M06.0-M06.0	Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog, Pediaater				patsientidele, kellel eelneva 3 kuu jooksul kombineeritud haiguse kulgu mõjutav ravi, sh adekvaatses annuses suukaudse metotreksaadiga ja glükokortikosteroidiga madalas annuses on olnud ebaefektiivne või on tekkinud ravi katkestama sundivad või annuse tõstmist takistavad seedetrakti poolsed kõrvaltoimed
					75	M08.0-M08.8, M46.8-M46.8, M05.8-M05.8, M07.0-M07.6, M05.3-M05.3, M45-M45, M06.0-M06.0	Reumatoloog, Pediaater, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega			5,00	
					75	L40-L40	Pediaater, Dermatovenerol oog				ravile allumatu raske psoriaasiga patsientidele, kellel eelnev suukaudne ravi, sh adekvaatses annuses suukaudse metotreksaadiga on olnud ebaefektiivne või tekitanud ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1304738	metotreksaat, 50mg 1ml	L04AX03	METEX, süstelahus süstlis, 0.4ml 6TK	Medac Gesellschaft fuer klinische Spezialpraeparate mbH	75	M08.0-M08.8, M46.8-M46.8, M05.8-M05.8, M07.0-M07.6, M05.3-M05.3, M45-M45, M06.0-M06.0	Pediaater, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog				patsientidele, kellel eelneva 3 kuu jooksul kombineeritud haiguse kulgu mõjutav ravi, sh adekvaatses annuses suukaudse metotreksaadiga ja glükokortikosteroidiga madalas annuses on olnud ebaefektiivne või on tekkinud ravi katkestama sundivad või annuse tõstmist takistavad seedetrakti poolsed kõrvaltoimed
					75	L40-L40	Dermatovenerol oog, Pediaater				ravile allumatu raske psoriaasiga patsientidele, kellel eelnev suukaudne ravi, sh adekvaatses annuses suukaudse metotreksaadiga on olnud ebaefektiivne või tekitanud ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed
					75	M08.0-M08.8, M46.8-M46.8, M05.8-M05.8, M07.0-M07.6, M05.3-M05.3, M45-M45, M06.0-M06.0	Pediaater, Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega			5,00	
1304783	metotreksaat, 50mg 1ml	L04AX03	METEX, süstelahus süstlis, 0.5ml 6TK	Medac Gesellschaft fuer klinische Spezialpraeparate mbH	75	M08.0-M08.8, M46.8-M46.8, M05.8-M05.8, M07.0-M07.6, M05.3-M05.3, M45-M45, M06.0-M06.0	Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater				patsientidele, kellel eelneva 3 kuu jooksul kombineeritud haiguse kulgu mõjutav ravi, sh adekvaatses annuses suukaudse metotreksaadiga ja glükokortikosteroidiga madalas annuses on olnud ebaefektiivne või on tekkinud ravi katkestama sundivad või annuse tõstmist takistavad seedetrakti poolsed kõrvaltoimed
					75	L40-L40	Pediaater, Dermatovenerol oog				ravile allumatu raske psoriaasiga patsientidele, kellel eelnev suukaudne ravi, sh adekvaatses annuses suukaudse metotreksaadiga on olnud ebaefektiivne või tekitanud ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed
					75	M08.0-M08.8, M46.8-M46.8, M05.8-M05.8, M07.0-M07.6, M05.3-M05.3, M45-M45, M06.0-M06.0	Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater, Reumatoloog			5,00	
3106998	metronidasool, 1000mg	G01AF01	ARILIN, vaginaalsuposiit, 2TK	Ideal Trade Links UAB	50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1033658	metronidasool, 1g	G01AF01	ARILIN, vaginaalsuposiit, 2TK	Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel	50						
1008706	metronidasool, 500mg	P01AB01	METRONIDAZOL ORIFARM, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Orifarm Healthcare A/S	50						
1223749	metronidasool, 7,5mg 1g	D06BX01	METROSA, geel, 25g 1TK	Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel	50						
1819234	metronidasool, 7,5mg 1g	D06BX01	ROZEX, geel, 30g 1TK	Lex Ano UAB	50						
1829943	metronidasool, 7,5mg 1g	D06BX01	ROZEX, geel, 30g 1TK	Ideal Trade Links UAB	50						
1869969	metronidasool, 7,5mg 1g	D06BX01	METROSA, geel, 25g 1TK	Ideal Trade Links UAB	50						
1396335	metüülfenidaat, 10mg	N06BA04	MEDIKINET XL 10MG, toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	Medice Arzneimittel Puetter GmbH & Co. KG	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater – laste- ja noorukitepsühhiaater, Psühhiaater	esmane	20,00		esineb mõõdukas kuni raske funktsionaalne kahjustus vähemalt kahes olukorras (sotsiaalne, akadeemiline ja/või tööalane tegevus), haigus mõjutab konkreetse inimese elu mitmeid aspekte ning viide haiguse esinemisele on tõendatult tuvastatav lapseeast
					75	F90.0-F90.1	Psühhiaater – laste- ja noorukitepsühhiaater	esmane	6,00	20,00	ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (2 Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti 2 erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, CGAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega;

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1838033	metüülfenidaat, 10mg	N06BA04	AFFENID, toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	Zentiva k.s.	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater – laste- ja noorukitepsühhiaater, Psühhiaater	esmane	20,00		esineb mõõdukas kuni raske funktsionaalne kahjustus vähemalt kahes olukorras (sotsiaalne, akadeemiline ja/või tööalane tegevus), haigus mõjutab konkreetse inimese elu mitmeid aspekte ning viide haiguse esinemisele on tõendatult tuvastatav lapseeast
					75	F90.0-F90.1	Psühhiaater – laste- ja noorukitepsühhiaater	esmane	6,00	20,00	ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (2 Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti 2 erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, CGAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega;
1313569	metüülfenidaat, 18mg	N06BA04	CONCERTA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Johnson & Johnson UAB	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater, Psühhiaater – laste- ja noorukitepsühhiaater	esmane	20,00		esineb mõõdukas kuni raske funktsionaalne kahjustus vähemalt kahes olukorras (sotsiaalne, akadeemiline ja/või tööalane tegevus), haigus mõjutab konkreetse inimese elu mitmeid aspekte ning viide haiguse esinemisele on tõendatult tuvastatav lapseeast
					75	F90.0-F90.1	Psühhiaater – laste- ja noorukitepsühhiaater	esmane	6,00	20,00	ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (2 Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti 2 erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, CGAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega;

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1396368	metüülfenidaat, 20mg	N06BA04	MEDIKINET XL 20MG, toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	Medice Arzneimittel Puetter GmbH & Co. KG	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater, Psühhiaater – laste- ja noorukitepsühhiaater	esmane	20,00		esineb mõõdukas kuni raske funktsionaalne kahjustus vähemalt kahes olukorras (sotsiaalne, akadeemiline ja/või tööalane tegevus), haigus mõjutab konkreetse inimese elu mitmeid aspekte ning viide haiguse esinemisele on tõendatult tuvastatav lapseeast
					75	F90.0-F90.1	Psühhiaater – laste- ja noorukitepsühhiaater	esmane	6,00	20,00	ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (2 Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti 2 erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, CGAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega;
1838101	metüülfenidaat, 20mg	N06BA04	AFFENID, toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	Zentiva k.s.	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater – laste- ja noorukitepsühhiaater, Psühhiaater	esmane	20,00		esineb mõõdukas kuni raske funktsionaalne kahjustus vähemalt kahes olukorras (sotsiaalne, akadeemiline ja/või tööalane tegevus), haigus mõjutab konkreetse inimese elu mitmeid aspekte ning viide haiguse esinemisele on tõendatult tuvastatav lapseeast
					75	F90.0-F90.1	Psühhiaater – laste- ja noorukitepsühhiaater	esmane	6,00	20,00	ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (2 Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti 2 erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, CGAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega;

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1396391	metüülfenidaat, 30mg	N06BA04	MEDIKINET XL 30MG, toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	Medice Arzneimittel Puetter GmbH & Co. KG	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater – laste- ja noorukitepsühhiaater	esmane	6,00	20,00	ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (2 Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti 2 erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, CGAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega;
					75	F90.0-F90.1	Psühhiaater, Psühhiaater – laste- ja noorukitepsühhiaater	esmane	20,00		esineb mõõdukas kuni raske funktsionaalne kahjustus vähemalt kahes olukorras (sotsiaalne, akadeemiline ja/või tööalane tegevus), haigus mõjutab konkreetse inimese elu mitmeid aspekte ning viide haiguse esinemisele on tõendatult tuvastatav lapseeast
1838178	metüülfenidaat, 30mg	N06BA04	AFFENID, toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	Zentiva k.s.	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater – laste- ja noorukitepsühhiaater, Psühhiaater	esmane	20,00		esineb mõõdukas kuni raske funktsionaalne kahjustus vähemalt kahes olukorras (sotsiaalne, akadeemiline ja/või tööalane tegevus), haigus mõjutab konkreetse inimese elu mitmeid aspekte ning viide haiguse esinemisele on tõendatult tuvastatav lapseeast
					75	F90.0-F90.1	Psühhiaater – laste- ja noorukitepsühhiaater	esmane	6,00	20,00	ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (2 Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti 2 erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, CGAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega;

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1313581	metüülfenidaat, 36mg	N06BA04	CONCERTA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Johnson & Johnson UAB	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater, Psühhiaater – laste- ja noorukitepsühhiaater	esmane	20,00		esineb mõõdukas kuni raske funktsionaalne kahjustus vähemalt kahes olukorras (sotsiaalne, akadeemiline ja/või tööalane tegevus), haigus mõjutab konkreetse inimese elu mitmeid aspekte ning viide haiguse esinemisele on tõendatult tuvastatav lapseeast
					75	F90.0-F90.1	Psühhiaater – laste- ja noorukitepsühhiaater	esmane	6,00	20,00	ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (2 Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti 2 erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, CGAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega;
1395266	metüülfenidaat, 40mg	N06BA04	MEDIKINET XL 40MG, toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	Medice Arzneimittel Puetter GmbH & Co. KG	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater – laste- ja noorukitepsühhiaater	esmane	6,00	20,00	ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (2 Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti 2 erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, CGAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega;
					75	F90.0-F90.1	Psühhiaater, Psühhiaater – laste- ja noorukitepsühhiaater	esmane	20,00		esineb mõõdukas kuni raske funktsionaalne kahjustus vähemalt kahes olukorras (sotsiaalne, akadeemiline ja/või tööalane tegevus), haigus mõjutab konkreetse inimese elu mitmeid aspekte ning viide haiguse esinemisele on tõendatult tuvastatav lapseeast

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1838235	metüülfenidaat, 40mg	N06BA04	AFFENID, toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	Zentiva k.s.	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater – laste- ja noorukitepsühhiaater	esmane	6,00	20,00	ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (2 Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti 2 erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, CGAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega;
					75	F90.0-F90.1	Psühhiaater, Psühhiaater – laste- ja noorukitepsühhiaater	esmane	20,00		esineb mõõdukas kuni raske funktsionaalne kahjustus vähemalt kahes olukorras (sotsiaalne, akadeemiline ja/või tööalane tegevus), haigus mõjutab konkreetse inimese elu mitmeid aspekte ning viide haiguse esinemisele on tõendatult tuvastatav lapseeast
1313660	metüülfenidaat, 54mg	N06BA04	CONCERTA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Johnson & Johnson UAB	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater – laste- ja noorukitepsühhiaater, Psühhiaater	esmane	20,00		esineb mõõdukas kuni raske funktsionaalne kahjustus vähemalt kahes olukorras (sotsiaalne, akadeemiline ja/või tööalane tegevus), haigus mõjutab konkreetse inimese elu mitmeid aspekte ning viide haiguse esinemisele on tõendatult tuvastatav lapseeast
					75	F90.0-F90.1	Psühhiaater – laste- ja noorukitepsühhiaater	esmane	6,00	20,00	ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (2 Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti 2 erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, CGAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega;

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1838291	metüülfenidaat, 60mg	N06BA04	AFFENID, toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	Zentiva k.s.	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater, Psühhiaater – laste- ja noorukitepsühhiaater	esmane	20,00		esineb mõõdukas kuni raske funktsionaalne kahjustus vähemalt kahes olukorras (sotsiaalne, akadeemiline ja/või tööalane tegevus), haigus mõjutab konkreetse inimese elu mitmeid aspekte ning viide haiguse esinemisele on tõendatult tuvastatav lapseeast
					75	F90.0-F90.1	Psühhiaater – laste- ja noorukitepsühhiaater	esmane	6,00	20,00	ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (2 Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti 2 erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, CGAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega;

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1009099	metüülprednisoloon, 16mg	H02AB04	MEDROL, tablett, 50TK	Pfizer Europe MA EEIG	75	M45-M46, M05-M08, M30-M35	Pediaater, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog	esmane			
					100	Z94-Z94, T86-T86					
					75	K50-K51, K73-K74	Pediaater, Pediaater gastroenteroloogi lisapädevusega, Gastroenteroloog				
					50						
					75	N00-N08	Pediaater nefroloogi lisapädevusega, Pediaater, Nefroloog				
					100	G35-G35	Pediaater, Pediaater neuroloogi lisapädevusega, Neuroloog	esmane			
					75	L12-L12, L23-L23, L13.0-L13.0, L10-L10, L20-L20	Pediaater allergoloogi lisapädevusega, Pediaater, Allergoloog-immunoloog, Dermatoveneroloog				

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1866922	metüülprednisoloon, 16mg	H02AB04	MEDROL, tablett, 50TK	Lex Ano UAB	100	Z94-Z94, T86-T86					
					75	M05-M08, M30-M35, M45-M46	Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog, Pediaater	esmane			
					100	G35-G35	Pediaater, Neuroloog, Pediaater neuroloogi lisapädevusega	esmane			
					75	L12-L12, L23-L23, L13.0-L13.0, L10-L10, L20-L20	Pediaater allergoloogi lisapädevusega, Dermatovenerloog, Allergoloog-immunoloog, Pediaater				
					50						
					75	K50-K51, K73-K74	Pediaater gastroenteroloogi lisapädevusega, Gastroenteroloog, Pediaater				
					75	N00-N08	Pediaater nefroloogi lisapädevusega, Nefroloog, Pediaater				

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1009190	metüülprednisoloon, 40mg 1ml	H02AB04	DEPO-MEDROL, süstesuspensioon, 1ml 1TK	Pfizer Europe MA EEIG	50						
					100	Z94-Z94, T86-T86					
					100	G35-G35	Neuroloog, Pediaater, Pediaater neuroloogi lisapädevusega	esmane			
					75	N00-N08	Pediaater, Nefroloog, Pediaater nefroloogi lisapädevusega				
					75	M45-M46, M05-M08, M30-M35	Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog, Pediaater	esmane			
3107652	metüülprednisoloon, 40mg 1ml	H02AB04	DEPO-MEDROL, süstesuspensioon, 1ml 1TK	Ideal Trade Links UAB	75	M45-M46, M30-M35, M05-M08	Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog, Pediaater	esmane			
					50						
					75	N00-N08	Pediaater nefroloogi lisapädevusega, Pediaater, Nefroloog				
					100	Z94-Z94, T86-T86					
					100	G35-G35	Neuroloog, Pediaater neuroloogi lisapädevusega, Pediaater	esmane			

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1065754	metüülprednisoloon, 4mg	H02AB04	MEDROL, tablett, 100TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	G35-G35	Neuroloog, Pediaater, Pediaater neuroloogi lisapädevusega	esmane			
					100	Z94-Z94, T86-T86					
					75	N00-N08	Pediaater, Nefroloog, Pediaater nefroloogi lisapädevusega				
					75	M45-M46, M05-M08, M30-M35	Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater	esmane			
					75	K50-K51, K73-K74	Pediaater gastroenteroloogi lisapädevusega, Gastroenteroloog, Pediaater				
					75	L12-L12, L23-L23, L13.0-L13.0, L10-L10, L20-L20	Pediaater, Allergoloog-immunoloog, Dermatoveneroloog, Pediaater allergoloogi lisapädevusega				
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1868328	metüülprednisoloon, 4mg	H02AB04	MEDROL, tablett, 100TK	Lex Ano UAB	50						
					75	N00-N08	Pediaater nefroloogi lisapädevusega, Pediaater, Nefroloog				
					100	G35-G35	Pediaater neuroloogi lisapädevusega, Neuroloog, Pediaater	esmane			
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46	Reumatoloog, Pediaater, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega	esmane			
					75	L12-L12, L23-L23, L13.0-L13.0, L10-L10, L20-L20	Dermatovenerol oog, Pediaater allergoloogi lisapädevusega, Pediaater, Allergoloog-immunoloog				
					100	Z94-Z94, T86-T86					
					75	K50-K51, K73-K74	Gastroenteroloog, Pediaater, Pediaater gastroenteroloogi lisapädevusega				
1028102	metüülprednisoloonatseponaat, 1mg 1g	D07AC14	ADVANTAN, kreem, 15g 1TK	LEO Pharma A/S	50						
					75	L20-L20, L40-L40, L23-L23					
1062009	metüülprednisoloonatseponaat, 1mg 1g	D07AC14	ADVANTAN, salv, 15g 1TK	LEO Pharma A/S	50						
					75	L20-L20, L40-L40, L23-L23					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1133356	metüülprednisoloonatseponaat, 1mg 1g	D07AC14	ADVANTAN MILK, nahaemulsioon, 20g 1TK	LEO Pharma A/S	75	L20-L20, L40-L40, L23-L23					
					50						
3031681	metüülprednisoloonatseponaat, 1mg 1g	D07AC14	ADVANTAN MILK, nahaemulsioon, 50g 1TK	Ideal Trade Links UAB	75	L20-L20, L40-L40, L23-L23					
					50						
3083149	metüülprednisoloonatseponaat, 1mg 1g	D07AC14	ADVANTAN MILK, nahaemulsioon, 50g 1TK	Lex Ano UAB	50						
					75	L20-L20, L40-L40, L23-L23					
1764794	midostauriin, 25mg	L01EX10	RYDAPT, pehmekapsel, 56TK	Novartis Europharm Limited	100	C92-C92	Hematoloog				esmakordselt diagnoositud ägeda müeloidleukeemia ja FLT3 mutatsiooniga täiskasvanud patsientidele koos standardse antratsükliini ja tsütarabiini induktsioonkeemiaraviga ning koos suures annuses tsütarabiini konsolideeriva keemiaraviga, millele täieliku ravivastuse korral järgneb säilitusravi ainult midostauriiniga
1722013	migalastaat, 123mg	A16AX14	GALAFOLD, kõvakapsel, 14TK	Amicus Therapeutics Europe Limited	100	E75.2-E75.2	Sisearst, Neuroloog	esmane			
1024579	mikonasool, 20mg 1g	A01AB09	DAKTARIN, suukaudne geel, 40g 1TK	McNeil Healthcare (Ireland) Limited	50						
1828379	mikonasool, 20mg 1g	A01AB09	DAKTARIN, suukaudne geel, 40g 1TK	Lex Ano UAB	50						
1891379	mikonasool, 20mg 1g	A01AB09	DAKTARIN, suukaudne geel, 40g 1TK	Ideal Trade Links UAB	50						
1604337	mirabegroon, 50mg	G04BD12	BETMIGA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Astellas Pharma Europe B.V.	50						
1158252	mirtasapiin, 15mg	N06AX11	MIRZATEN, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1181607	mirtasapiin, 15mg	N06AX11	MIRTASTAD 15 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Stada Arzneimittel AG	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1243684	mirtasapiin, 15mg	N06AX11	MIRTAZAPIN ORION, suus dispergeeruv tablett, 30TK	Orion Corporation	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1273137	mirtasapiin, 15mg	N06AX11	MIRTAZAPIN ACTAVIS, suus dispergeeruv tablett, 30TK	Teva B.V.	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
1314683	mirtasapiin, 15mg	N06AX11	MIRZATEN Q-TAB, suus dispergeeruv tablett, 30TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1158421	mirtasapiin, 30mg	N06AX11	MIRZATEN, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
1181797	mirtasapiin, 30mg	N06AX11	MIRTASTAD 30 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Stada Arzneimittel AG	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1243729	mirtasapiin, 30mg	N06AX11	MIRTAZAPIN ORION, suus dispergeeruv tablett, 30TK	Orion Corporation	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1273227	mirtasapiin, 30mg	N06AX11	MIRTAZAPIN ACTAVIS, suus dispergeeruv tablett, 30TK	Teva B.V.	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
1301522	mirtasapiin, 30mg	N06AX11	MIRZATEN Q-TAB, suus dispergeeruv tablett, 30TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1243741	mirtasapiin, 45mg	N06AX11	MIRTAZAPIN ORION, suus dispergeeruv tablett, 30TK	Orion Corporation	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1751891	moksifloksatsiin, 400mg	J01MA14	FLOXELAN, õhukese polümeerikattega tablett, 5TK	Medochemie Limited	50	J44-J44, J41-J41, J47-J47, J13-J15					kui beetalaktaam-antibiootikum, tetratsükliin ja makroliid on ebaefektiivsed või vastunäidustatud
					100	F30-F31	Psühhiaater				

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1145999	moksonidiin, 0,2mg	C02AC05	MOXONIDINHEXAL 0,2 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Hexal AG	50						
1155091	moksonidiin, 0,2mg	C02AC05	STADAPRESS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Stada Arzneimittel AG	50						
1157778	moksonidiin, 0,2mg	C02AC05	MOXOGAMMA 0,2 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Woerwag Pharma GmbH & Co. KG	50						
1247598	moksonidiin, 0,2mg	C02AC05	MOXONIDIN ACTAVIS 0,2 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva B.V.	50						
1146079	moksonidiin, 0,3mg	C02AC05	MOXONIDINHEXAL 0,3 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Hexal AG	50						
1157857	moksonidiin, 0,3mg	C02AC05	MOXOGAMMA 0,3 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Woerwag Pharma GmbH & Co. KG	50						
1247677	moksonidiin, 0,3mg	C02AC05	MOXONIDIN ACTAVIS 0,3 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva B.V.	50						
1013791	moksonidiin, 0,4mg	C02AC05	PHYSIOTENS 0,4 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Viatris SIA	50						
1146170	moksonidiin, 0,4mg	C02AC05	MOXONIDINHEXAL 0,4 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Hexal AG	50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1155259	moksonidiin, 0,4mg	C02AC05	STADAPRESS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Stada Arzneimittel AG	50						
1157947	moksonidiin, 0,4mg	C02AC05	MOXOGAMMA 0,4 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Woerwag Pharma GmbH & Co. KG	50						
1247756	moksonidiin, 0,4mg	C02AC05	MOXONIDIN ACTAVIS 0,4 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva B.V.	50						
1028933	mometasoon, 1mg 1g	D07AC13	ELOCON, nahalahus, 20ml 1TK	Organon N.V.	50						
					75	L20-L20, L23-L23, L40-L40					
1028944	mometasoon, 1mg 1g	D07AC13	ELOCON, salv, 20g 1TK	Organon N.V.	75	L20-L20, L23-L23, L40-L40					
					50						
1028955	mometasoon, 1mg 1g	D07AC13	ELOCON, kreem, 20g 1TK	Organon N.V.	75	L20-L20, L23-L23, L40-L40					
					50						
1833904	mometasoon, 1mg 1g	D07AC13	ELOCOM, kreem, 15g 1TK	Lex Ano UAB	75	L23-L23, L40-L40, L20-L20					
					50						
1833915	mometasoon, 1mg 1g	D07AC13	ELOCOM, salv, 15g 1TK	Lex Ano UAB	50						
					75	L23-L23, L40-L40, L20-L20					
1847101	mometasoon, 1mg 1g	D07AC13	ELOCON, salv, 15g 2TK	Ideal Trade Links UAB	75	L23-L23, L20-L20, L40-L40					
					50						
3071180	mometasoon, 1mg 1g	D07AC13	ELOCOM, nahalahus, 60ml 1TK	Lex Ano UAB	50						
					75	L23-L23, L40-L40, L20-L20					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3115662	mometasoon, 1mg 1g	D07AC13	ELOCON, nahalahus, 30ml 1TK	Organon N.V.	75	L20-L20, L40-L40, L23-L23					
					50						
1028966	mometasoon, 50mcg 1annus	R01AD09	NASONEX, ninasprei, suspensioon, 140annus 1TK	Organon N.V.	50						
					75	J30-J30				17,00	
1621224	mometasoon, 50mcg 1annus	R01AD09	BRESO, ninasprei, suspensioon, 140annus 1TK	Norameda UAB	75	J30-J30				17,00	
					50						
1820135	mometasoon, 50mcg 1annus	R01AD09	NASONEX, ninasprei, suspensioon, 140annus 1TK	Lex Ano UAB	50						
					75	J30-J30				17,00	
1484298	mometasoon, 50mcg 1mõõtannus	R01AD09	NASOMETIN, ninasprei, suspensioon, 140mõõtannus 1TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	J30-J30				17,00	
1274116	montelukast, 10mg	R03DC03	MONTELUKAST TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Teva Pharma B.V.	75	J45-J45			11,00		mõõduka ja raske haiguse puhul lisaks püsiravile optimaalses annuses inhaleeritava kortikosteroidiga
					50						
					75	J45-J45				11,00	
1289987	montelukast, 10mg	R03DC03	MONKASTA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA d.d. Novo mesto	75	J45-J45				11,00	
					50						
					75	J45-J45			11,00		mõõduka ja raske haiguse puhul lisaks püsiravile optimaalses annuses inhaleeritava kortikosteroidiga
3116494	montelukast, 10mg	R03DC03	MONTELUKAST TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Lex Ano UAB	75	J45-J45				11,00	
					75	J45-J45			11,00		mõõduka ja raske haiguse puhul lisaks püsiravile optimaalses annuses inhaleeritava kortikosteroidiga
					50						
1289718	montelukast, 4mg	R03DC03	MONKASTA, närimistablett, 28TK	KRKA, d.d., Novo mesto	75	J45-J45				11,00	
					50						
					75	J45-J45			11,00		mõõduka ja raske haiguse puhul lisaks püsiravile optimaalses annuses inhaleeritava kortikosteroidiga
1289831	montelukast, 5mg	R03DC03	MONKASTA, närimistablett, 28TK	KRKA, d.d., Novo mesto	75	J45-J45				11,00	
					50						
					75	J45-J45			11,00		mõõduka ja raske haiguse puhul lisaks püsiravile optimaalses annuses inhaleeritava kortikosteroidiga

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1035717	morfiin, 10mg	N02AA01	VENDAL RETARD 10 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	G.L. Pharma GmbH	100	R52.1-R52.1	Anestesioloog, Neuroloog, Reumatoloog	esmane			esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul
					100	C00-D48					
					50						
1382284	morfiin, 10mg	N02AA01	SEVREDOL, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Mundipharma Ges.m.b.H.	100	C00-D48					
					100	R52.1-R52.1	Reumatoloog, Anestesioloog, Neuroloog	esmane			esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul
					50						
1382307	morfiin, 20mg	N02AA01	SEVREDOL, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Mundipharma Ges.m.b.H.	100	R52.1-R52.1	Anestesioloog, Neuroloog, Reumatoloog	esmane			esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul
					50						
					100	C00-D48					
1035728	morfiin, 30mg	N02AA01	VENDAL RETARD 30 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	G.L. Pharma GmbH	100	R52.1-R52.1	Anestesioloog, Reumatoloog, Neuroloog	esmane			esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul
					50						
					100	C00-D48					
1339422	morfiin, 30mg	N02AA01	MXL 30 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	Mundipharma Ges.m.b.H.	100	C00-D48					
					50						
					100	R52.1-R52.1	Anestesioloog, Reumatoloog, Neuroloog	esmane			esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul
1035739	morfiin, 60mg	N02AA01	VENDAL RETARD 60 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	G.L. Pharma GmbH	100	C00-D48					
					100	R52.1-R52.1	Reumatoloog, Anestesioloog, Neuroloog	esmane			esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1023556	mükofenoolhape, 250mg	L04AA06	CELLCEPT, kõvakapsel, 100TK	Roche Registration GmbH	50						
					75	L94-L94, L10-L10					
					75	N00-N08	Pediaater nefroloogi lisapädevusega, Nefroloog, Pediaater	esmane			
					75	E05.0-E05.0	Endokrinoloog, Oftalmoloog				
					75	L12-L12, L20-L20	Dermatovenerol oog				
					100	Z94-Z94, T86-T86					
					75	M30-M36	Reumatoloog, Pediaater, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega	esmane			

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1164697	mükofenoolhape, 360mg	L04AA06	MYFORTIC, gastroresistentne tablett, 120TK	Novartis Baltics SIA	75	N00-N08	Pediaater nefroloogi lisapädevusega, Nefroloog, Pediaater	esmane			
					75	L94-L94, L10-L10					
					100	Z94-Z94, T86-T86					
					75	E05.0-E05.0	Oftalmoloog, Endokrinoloog				
					75	L12-L12, L20-L20	Dermatovenerol oog				
					75	M30-M36	Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater, Reumatoloog	esmane			
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1088344	mükofenoolhape, 500mg	L04AA06	CELLCEPT, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	Roche Registration GmbH	75	L94-L94, L10-L10					
					75	M30-M36	Pediaater, Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega	esmane			
					75	L12-L12, L20-L20	Dermatovenerol oog				
					75	E05.0-E05.0	Endokrinoloog, Oftalmoloog				
					100	Z94-Z94, T86-T86					
					50						
					75	N00-N08	Nefroloog, Pediaater nefroloogi lisapädevusega, Pediaater	esmane			

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1276736	mükofenoolhape, 500mg	L04AA06	MYCOPHENOLATE MOFETIL ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	Accord Healthcare B.V.	75	E05.0-E05.0	Oftalmoloog, Endokrinoloog				
					75	L94-L94, L10-L10					
					75	N00-N08	Nefroloog, Pediaater nefroloogi lisapädevusega, Pediaater	esmane			
					75	M30-M36	Reumatoloog, Pediaater, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega	esmane			
					50						
					75	L12-L12, L20-L20	Dermatovenerol oog				
					100	Z94-Z94, T86-T86					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1343270	mükofenoolhape, 500mg	L04AA06	MYFENAX, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	Teva B.V.	100	Z94-Z94, T86-T86					
					75	E05.0-E05.0	Oftalmoloog, Endokrinoloog				
					50						
					75	L12-L12, L20-L20	Dermatovenerol oog				
					75	M30-M36	Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater, Reumatoloog	esmane			
					75	L94-L94, L10-L10					
					75	N00-N08	Pediaater, Pediaater nefroloogi lisapädevusega, Nefroloog	esmane			

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3042964	mükofenoolhape, 500mg	L04AA06	CELLCEPT, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	Roche Registration GmbH	100	Z94-Z94, T86-T86					
					75	L94-L94, L10-L10					
					75	E05.0-E05.0	Oftalmoloog, Endokrinoloog				
					75	N00-N08	Pediaater nefroloogi lisapädevusega, Pediaater, Nefroloog	esmane			
					75	L12-L12, L20-L20	Dermatovenerol oog				
					50						
					75	M30-M36	Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater	esmane			

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3128947	mükofenoolhape, 500mg	L04AA06	MYFENAX, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	Teva B.V.	75	L94-L94, L10-L10					
					75	N00-N08	Nefroloog, Pediaater, Pediaater nefroloogi lisapädevusega	esmane			
					75	M30-M36	Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater, Reumatoloog	esmane			
					75	L12-L12, L20-L20	Dermatovenerol oog				
					100	Z94-Z94, T86-T86					
					50						
					75	E05.0-E05.0	Endokrinoloog, Oftalmoloog				
1193127	naatriumbemiparii n, 2500RÜ anti Xa 0.2ml	B01AB12	ZIBOR, süstelahus süstlis, 0.2ml 10TK	Gineladius S.L.	100	I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6					kuni 10 päevaks
					50						
					100	O99.8-O99.8					
1193172	naatriumbemiparii n, 3500RÜ anti Xa 0.2ml	B01AB12	ZIBOR, süstelahus süstlis, 10TK	Gineladius S.L.	75	M17-M17, S72.7-S72.7, S72.1-S72.1, S72.2-S72.2, M16-M16, S72.0-S72.0					kuni 30 päevaks
					50						
					100	I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6					kuni 10 päevaks
					100	O99.8-O99.8					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1065608	naatriumenoksapariin, 10000RÜ 1ml	B01AB05	CLEXANE, süstelahus süstlis, 1ml 10TK	Sanofi Winthrop Industrie	100	I80-I82, I26-I26, I67.6-I67.6					kuni 10 päevaks või kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
					100	O99.8-O99.8					
					50						
1065529	naatriumenoksapariin, 2000RÜ 0.2ml	B01AB05	CLEXANE, süstelahus süstlis, 0.2ml 10TK	Sanofi Winthrop Industrie	50						
					100	I80-I82, I26-I26, I67.6-I67.6					kuni 10 päevaks või kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
					100	O99.8-O99.8					
					75	M17-M17, S72.7-S72.7, S72.1-S72.1, S72.2-S72.2, M16-M16, S72.0-S72.0					kuni 30 päevaks
1745939	naatriumenoksapariin, 2000RÜ 0.2ml	B01AB05	LOSMINA, süstelahus süstlis, 0.2ml 10TK	Laboratorios Farmaceuticos Rovi S.A.	50						
					100	I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6					kuni 10 päevaks või kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
					75	M17-M17, S72.7-S72.7, S72.1-S72.1, S72.2-S72.2, M16-M16, S72.0-S72.0					kuni 30 päevaks
					100	O99.8-O99.8					
1065541	naatriumenoksapariin, 4000RÜ 0.4ml	B01AB05	CLEXANE, süstelahus süstlis, 0.4ml 10TK	Sanofi Winthrop Industrie	75	M17-M17, S72.7-S72.7, S72.1-S72.1, S72.2-S72.2, M16-M16, S72.0-S72.0					kuni 30 päevaks
					100	O99.8-O99.8					
					50						
					100	I26-I26, I67.6-I67.6, I80-I82					kuni 10 päevaks või kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1781489	naatriumenoksapariin, 4000RÜ 0.4ml	B01AB05	LOSMINA, süstelahus süstlis, 0.4ml 10TK	Laboratorios Farmaceuticos Rovi S.A.	100	I26-I26, I67.6-I67.6, I80-I82					kuni 10 päevaks või kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
					75	M17-M17, S72.7-S72.7, S72.1-S72.1, S72.2-S72.2, M16-M16, S72.0-S72.0					kuni 30 päevaks
					50						
					100	O99.8-O99.8					
1065563	naatriumenoksapariin, 6000RÜ 0.6ml	B01AB05	CLEXANE, süstelahus süstlis, 0.6ml 10TK	Sanofi Winthrop Industrie	100	I80-I82, I26-I26, I67.6-I67.6					kuni 10 päevaks või kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
					50						
					100	O99.8-O99.8					
1065585	naatriumenoksapariin, 8000RÜ 0.8ml	B01AB05	CLEXANE, süstelahus süstlis, 0.8ml 10TK	Sanofi Winthrop Industrie	100	O99.8-O99.8					
					100	I80-I82, I26-I26, I67.6-I67.6					kuni 10 päevaks või kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
					50						
1201521	naatriumfenüülbutüraat, 500mg	A16AX03	AMMONAPS, tablett, 250TK	Immedica Pharma AB	100	E72.2-E72.2					konsiiliumi (vähemalt 2 pediaatri ühise) otsuse alusel järgmistel tingimustel: haigus kulgeb metaboolsete kriisidega vaatamata muule suukaudsele ravile, patsiendi prognoos paranemisele on hea (püsivat ajukahjustust või organpuudulikkust ei esine), ravi jätkatakse patsiendil, kellel 1 kuu kestnud ravi on andnud hea tulemuse (hüperammoneemilisi kriise ei ole esinenud või on nende sagedus oluliselt vähenenud)
1065822	naatriumlevotüroksiin, 100mcg	H03AA01	L-THYROXIN BERLIN-CHEMIE, tablett, 100TK	Berlin-Chemie AG	100	E89.0-E89.0, E03-E03, E89.3-E89.3					
					50						
1892022	naatriumlevotüroksiin, 100mcg	H03AA01	L-THYROXIN BERLIN-CHEMIE, tablett, 100TK	Ideal Trade Links UAB	50						
					100	E89.0-E89.0, E89.3-E89.3, E03-E03					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3074329	naatriumlevotüroksiin, 100mcg	H03AA01	L-THYROXIN BERLIN-CHEMIE, tablett, 100TK	Ideal Trade Links UAB	50						
					100	E89.0-E89.0, E89.3-E89.3, E03-E03					
1065866	naatriumlevotüroksiin, 50mcg	H03AA01	L-THYROXIN BERLIN-CHEMIE, tablett, 100TK	Berlin-Chemie AG	50						
					100	E89.0-E89.0, E03-E03, E89.3-E89.3					
1891997	naatriumlevotüroksiin, 50mcg	H03AA01	L-THYROXIN BERLIN-CHEMIE, tablett, 100TK	Ideal Trade Links UAB	50						
					100	E89.0-E89.0, E89.3-E89.3, E03-E03					
1836558	naatriumpikosulfaat+magneesiumoksiid+sidrunhape, 10mg+3,5g+10,97g	A06AB80	CITRAFLEET, suukaudse lahuse pulber kotikeses, 2TK	Casen Recordati S.L.	50						
1448524	naatriumpikosulfaat+magneesiumoksiid+sidrunhape, 10mg+3,5g+12g	A06AB80	PICOPREP, suukaudse lahuse pulber, 2TK	Ferring GmbH	50						
1035346	naatriumsulfaat, veevaba+kaaliumkloriid+naatriumkloriid+makrogool+naatriumvesinikkarbonaat, 5,7g+0,75g+1,46g+64g+1,68g	A06AD81	FORTRANS, suukaudse lahuse pulber kotikeses, 4TK	Mayoly Pharma France	50						
1023949	nabumetoon, 1g	M01AX01	RELIFEX, dispergeeruv tablett, 20TK	Viatris SIA	50						
1205479	nabumetoon, 1g	M01AX01	RELIFEX, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	Viatris SIA	50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1147913	naftidrofurüül, 100mg	C04AX21	ENELBIN 100 RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	Zentiva k.s.	50						
1644713	naprokseen, 550mg	M01AE02	NALGESIN FORTE, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	KRKA d.d. Novo mesto	50						
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					100	C00-D48					
					75	M15-M19			63,00		
1437791	naprokseen+esomeprasool, 500mg+20mg	M01AE52	VIMOVO, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 60TK	Grunenthal GmbH	50						
3007640	naprokseen+esomeprasool, 500mg+20mg	M01AE52	ESMAPREN, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
3007651	naprokseen+esomeprasool, 500mg+20mg	M01AE52	ESMAPREN, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 60TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
1843882	natalizumab, 150mg 1ml	L04AG03	TYSABRI, süstelahus süstlis, 1ml 2TK	Biogen Netherlands B.V.	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel hulgiskleroosi raviks patsientidele, keda on varem ravitud vähemalt kahe esmavaliku ravimiga ning kellel vaatamata eelnevale ravile on viimase aasta jooksul esinenud vähemalt kaks olulist ägenemist.
1072437	nebivolool, 5mg	C07AB12	NEBILET, tablett, 28TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	50						
					75	I10-I13, I47-I49, I15-I15, I50-I50					
1237429	nebivolool, 5mg	C07AB12	NEBIVOLOL STADA, tablett, 100TK	Stada Arzneimittel AG	50						
					75	I10-I13, I47-I49, I15-I15, I50-I50					
1259344	nebivolool, 5mg	C07AB12	NEBICARD 5MG, tablett, 56TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	I10-I13, I47-I49, I15-I15, I50-I50					
					50						
1259355	nebivolool, 5mg	C07AB12	NEBICARD 5MG, tablett, 60TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	I10-I13, I47-I49, I15-I15, I50-I50					
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1259377	nebivolool, 5mg	C07AB12	NEBICARD 5MG, tablett, 90TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	I10-I13, I47-I49, I15-I15, I50-I50					
					50						
1269862	nebivolool, 5mg	C07AB12	NEBIVOLOL ACTAVIS, tablett, 28TK	Teva B.V.	50						
					75	I10-I13, I47-I49, I15-I15, I50-I50					
1269907	nebivolool, 5mg	C07AB12	NEBIVOLOL ACTAVIS, tablett, 90TK	Teva B.V.	50						
					75	I10-I13, I47-I49, I15-I15, I50-I50					
1344259	nebivolool, 5mg	C07AB12	NEBIPHAR, tablett, 28TK	Teva Pharma B.V.	75	I10-I13, I47-I49, I15-I15, I50-I50					
					50						
1445149	nebivolool, 5mg	C07AB12	NEBILET, tablett, 90TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	75	I10-I13, I47-I49, I15-I15, I50-I50					
					50						
1880276	nebivolool, 5mg	C07AB12	NEBILET, tablett, 90TK	Ideal Trade Links UAB	75	I10-I13, I47-I49, I15-I15, I50-I50					
					50						
1343001	nepafenak, 1mg 1ml	S01BC10	NEVANAC, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK	Novartis Europharm Limited	50						katarakti operatsiooni järgseks kuni 60-päevaseks raviks kaasuva diabeetilise retinopaatia esinemisel
1072572	nifedipiin, 10mg	C08CA05	CORINFAR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	Teva Pharma B.V.	50						
1072550	nifedipiin, 20mg	C08CA05	CORINFAR RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	Teva Pharma B.V.	75	I10-I13, I15-I15, I20-I20, O10-O16					
					50						
					75	M34-M34	Pediaater, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog	esmane			
					100	I27.0-I27.0					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1342190	nilotiniib, 200mg	L01EA03	TASIGNA, kõvakapsel, 112TK	Novartis Europharm Limited	100	C92.1-C92.1	Hematoloog				konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi, eelnev ravi imatiniibiga annuses 600mg on ebaõnnestunud või osutunud talumatuks (imatiniibravi on põhjustanud III või IV astme kõrvaltoime või üle 3 kuu püsinud II astme kõrvaltoime CTC klassifikatsiooni järgi) ning ravi alustatakse kuni 3. rea ravina; ravi võib jätkata kuni hematoloogilise ravivastuse püsimiseni (haigus ei progresseeru nilotiniibravi foonil).
3024403	nilotiniib, 200mg	L01EA03	NILOTINIB STADA, kõvakapsel, 112TK	Stada Arzneimittel AG	100	C92.1-C92.1	Hematoloog				konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi, eelnev ravi imatiniibiga annuses 600mg on ebaõnnestunud või osutunud talumatuks (imatiniibravi on põhjustanud III või IV astme kõrvaltoime või üle 3 kuu püsinud II astme kõrvaltoime CTC klassifikatsiooni järgi) ning ravi alustatakse kuni 3. rea ravina; ravi võib jätkata kuni hematoloogilise ravivastuse püsimiseni (haigus ei progresseeru nilotiniibravi foonil).
3024582	nilotiniib, 200mg	L01EA03	NILOTINIB ZENTIVA, kõvakapsel, 112TK	Zentiva k.s.	100	C92.1-C92.1	Hematoloog				konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi, eelnev ravi imatiniibiga annuses 600mg on ebaõnnestunud või osutunud talumatuks (imatiniibravi on põhjustanud III või IV astme kõrvaltoime või üle 3 kuu püsinud II astme kõrvaltoime CTC klassifikatsiooni järgi) ning ravi alustatakse kuni 3. rea ravina; ravi võib jätkata kuni hematoloogilise ravivastuse püsimiseni (haigus ei progresseeru nilotiniibravi foonil).
3026517	nilotiniib, 200mg	L01EA03	NILOTINIB VIATRIS, kõvakapsel, 112TK	Viatris Limited	100	C92.1-C92.1	Hematoloog				konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi, eelnev ravi imatiniibiga annuses 600mg on ebaõnnestunud või osutunud talumatuks (imatiniibravi on põhjustanud III või IV astme kõrvaltoime või üle 3 kuu püsinud II astme kõrvaltoime CTC klassifikatsiooni järgi) ning ravi alustatakse kuni 3. rea ravina; ravi võib jätkata kuni hematoloogilise ravivastuse püsimiseni (haigus ei progresseeru nilotiniibravi foonil).

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3089752	nilotiniib, 200mg	L01EA03	NILOTINIB ACCORD, kõvakapsel, 112TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	C92.1-C92.1	Hematoloog				konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi, eelnev ravi imatiniibiga annuses 600mg on ebaõnnestunud või osutunud talumatuks (imatiniibravi on põhjustanud III või IV astme kõrvaltoime või üle 3 kuu püsinud II astme kõrvaltoime CTC klassifikatsiooni järgi) ning ravi alustatakse kuni 3. rea ravina; ravi võib jätkata kuni hematoloogilise ravivastuse püsimiseni (haigus ei progresseeru nilotiniibravi foonil).
1675571	nintedaniib, 100mg	L01EX09	OFEV, pehmekapsel, 60TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	100	J67-J67, J84.1-J84.1, M34.8-M34.8, J84.8-J84.8, J84.9-J84.9	Pulmonoloog				konsiiliumi (kahe pulmonoloogi ühise) otsuse alusel progresseeruva fenotüübiga teiste krooniliste fibroseerivate interstitsiaalsete kopsuhaiguste ja süsteemse skleroosiga seotud progresseeruva kuluga fibroseeriva interstitsiaalse kopsuhaiguse raviks patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=45%
					100	J84.1-J84.1	Pulmonoloog				patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=50% eeldatavast. Soodustus ei hõlma nintedaniibi ja pirfenidooni kombinatsioonravi.
3010880	nintedaniib, 100mg	L01EX09	NINTEDANIB ZENTIVA, pehmekapsel, 60TK	Zentiva k.s.	100	J67-J67, J84.1-J84.1, M34.8-M34.8, J84.8-J84.8, J84.9-J84.9	Pulmonoloog				konsiiliumi (kahe pulmonoloogi ühise) otsuse alusel progresseeruva fenotüübiga teiste krooniliste fibroseerivate interstitsiaalsete kopsuhaiguste ja süsteemse skleroosiga seotud progresseeruva kuluga fibroseeriva interstitsiaalse kopsuhaiguse raviks patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=45%
					100	J84.1-J84.1	Pulmonoloog				patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=50% eeldatavast. Soodustus ei hõlma nintedaniibi ja pirfenidooni kombinatsioonravi.

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3011847	nintedaniib, 100mg	L01EX09	NINTEDANIB SANDOZ, pehmekapsel, 60TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	100	J84.1-J84.1	Pulmonoloog				patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=50% eeldatavast. Soodustus ei hõlma nintedaniibi ja pirfenidooni kombinatsioonravi.
					100	J67-J67, J84.1-J84.1, M34.8-M34.8, J84.8-J84.8, J84.9-J84.9	Pulmonoloog				konsiiliumi (kahe pulmonoloogi ühise) otsuse alusel progresseeruva fenotüübiga teiste krooniliste fibroseerivate interstitsiaalsete kopsuhaiguste ja süsteemse skleroosiga seotud progresseeruva kuluga fibroseeriva interstitsiaalse kopsuhaiguse raviks patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=45%
3033469	nintedaniib, 100mg	L01EX09	NINTEDANIB TEVA, pehmekapsel, 60TK	Teva GmbH	100	J67-J67, J84.1-J84.1, M34.8-M34.8, J84.8-J84.8, J84.9-J84.9	Pulmonoloog				konsiiliumi (kahe pulmonoloogi ühise) otsuse alusel progresseeruva fenotüübiga teiste krooniliste fibroseerivate interstitsiaalsete kopsuhaiguste ja süsteemse skleroosiga seotud progresseeruva kuluga fibroseeriva interstitsiaalse kopsuhaiguse raviks patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=45%
					100	J84.1-J84.1	Pulmonoloog				patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=50% eeldatavast. Soodustus ei hõlma nintedaniibi ja pirfenidooni kombinatsioonravi.
3072068	nintedaniib, 100mg	L01EX09	NINTEDANIB ACCORD, pehmekapsel, 60TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	J67-J67, J84.1-J84.1, M34.8-M34.8, J84.8-J84.8, J84.9-J84.9	Pulmonoloog				konsiiliumi (kahe pulmonoloogi ühise) otsuse alusel progresseeruva fenotüübiga teiste krooniliste fibroseerivate interstitsiaalsete kopsuhaiguste ja süsteemse skleroosiga seotud progresseeruva kuluga fibroseeriva interstitsiaalse kopsuhaiguse raviks patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=45%
					100	J84.1-J84.1	Pulmonoloog				patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=50% eeldatavast. Soodustus ei hõlma nintedaniibi ja pirfenidooni kombinatsioonravi.

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1675593	nintedaniib, 150mg	L01EX09	OFEV, pehmekapsel, 60TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	100	J67-J67, J84.1-J84.1, M34.8-M34.8, J84.8-J84.8, J84.9-J84.9	Pulmonoloog				konsiiliumi (kahe pulmonoloogi ühise) otsuse alusel progresseeruva fenotüübiga teiste krooniliste fibroseerivate interstitsiaalsete kopsuhaiguste ja süsteemse skleroosiga seotud progresseeruva kuluga fibroseeriva interstitsiaalse kopsuhaiguse raviks patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=45%
					100	J84.1-J84.1	Pulmonoloog				patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=50% eeldatavast. Soodustus ei hõlma nintedaniibi ja pirfenidooni kombinatsioonravi.
3010868	nintedaniib, 150mg	L01EX09	NINTEDANIB STADA, pehmekapsel, 60TK	Stada Arzneimittel AG	100	J67-J67, J84.1-J84.1, M34.8-M34.8, J84.8-J84.8, J84.9-J84.9	Pulmonoloog				konsiiliumi (kahe pulmonoloogi ühise) otsuse alusel progresseeruva fenotüübiga teiste krooniliste fibroseerivate interstitsiaalsete kopsuhaiguste ja süsteemse skleroosiga seotud progresseeruva kuluga fibroseeriva interstitsiaalse kopsuhaiguse raviks patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=45%
					100	J84.1-J84.1	Pulmonoloog				patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=50% eeldatavast. Soodustus ei hõlma nintedaniibi ja pirfenidooni kombinatsioonravi.
3010903	nintedaniib, 150mg	L01EX09	NINTEDANIB ZENTIVA, pehmekapsel, 60TK	Zentiva k.s.	100	J84.1-J84.1	Pulmonoloog				patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=50% eeldatavast. Soodustus ei hõlma nintedaniibi ja pirfenidooni kombinatsioonravi.
					100	J67-J67, J84.1-J84.1, M34.8-M34.8, J84.8-J84.8, J84.9-J84.9	Pulmonoloog				konsiiliumi (kahe pulmonoloogi ühise) otsuse alusel progresseeruva fenotüübiga teiste krooniliste fibroseerivate interstitsiaalsete kopsuhaiguste ja süsteemse skleroosiga seotud progresseeruva kuluga fibroseeriva interstitsiaalse kopsuhaiguse raviks patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=45%

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3011869	nintedaniib, 150mg	L01EX09	NINTEDANIB SANDOZ, pehmekapsel, 60TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	100	J67-J67, J84.1-J84.1, M34.8-M34.8, J84.8-J84.8, J84.9-J84.9	Pulmonoloog				konsiiliumi (kahe pulmonoloogi ühise) otsuse alusel progresseeruva fenotüübiga teiste krooniliste fibroseerivate interstitsiaalsete kopsuhaiguste ja süsteemse skleroosiga seotud progresseeruva kuluga fibroseeriva interstitsiaalse kopsuhaiguse raviks patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=45%
					100	J84.1-J84.1	Pulmonoloog				patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=50% eeldatavast. Soodustus ei hõlma nintedaniibi ja pirfenidooni kombinatsioonravi.
3033481	nintedaniib, 150mg	L01EX09	NINTEDANIB TEVA, pehmekapsel, 60TK	Teva GmbH	100	J67-J67, J84.1-J84.1, M34.8-M34.8, J84.8-J84.8, J84.9-J84.9	Pulmonoloog				konsiiliumi (kahe pulmonoloogi ühise) otsuse alusel progresseeruva fenotüübiga teiste krooniliste fibroseerivate interstitsiaalsete kopsuhaiguste ja süsteemse skleroosiga seotud progresseeruva kuluga fibroseeriva interstitsiaalse kopsuhaiguse raviks patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=45%
					100	J84.1-J84.1	Pulmonoloog				patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=50% eeldatavast. Soodustus ei hõlma nintedaniibi ja pirfenidooni kombinatsioonravi.
3072125	nintedaniib, 150mg	L01EX09	NINTEDANIB ACCORD, pehmekapsel, 60TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	J84.1-J84.1	Pulmonoloog				patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=50% eeldatavast. Soodustus ei hõlma nintedaniibi ja pirfenidooni kombinatsioonravi.
					100	J67-J67, J84.1-J84.1, M34.8-M34.8, J84.8-J84.8, J84.9-J84.9	Pulmonoloog				konsiiliumi (kahe pulmonoloogi ühise) otsuse alusel progresseeruva fenotüübiga teiste krooniliste fibroseerivate interstitsiaalsete kopsuhaiguste ja süsteemse skleroosiga seotud progresseeruva kuluga fibroseeriva interstitsiaalse kopsuhaiguse raviks patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=45%

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3129735	nintedaniib, 150mg	L01EX09	NINTEDANIB VIATRIS, pehmekapsel, 30TK	Viatris Limited	100	J84.1-J84.1	Pulmonoloog				patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=50% eeldatavast. Soodustus ei hõlma nintedaniibi ja pirfenidooni kombinatsioonravi.
					100	J67-J67, J84.1-J84.1, M34.8-M34.8, J84.8-J84.8, J84.9-J84.9	Pulmonoloog				konsiiliumi (kahe pulmonoloogi ühise) otsuse alusel progresseeruva fenotüübiga teiste krooniliste fibroseerivate interstitsiaalsete kopsuhaiguste ja süsteemse skleroosiga seotud progresseeruva kuluga fibroseeriva interstitsiaalse kopsuhaiguse raviks patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=45%
1885114	niirapariib, 100mg	L01XK02	ZEJULA, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	100	C48-C48, C57.0-C57.0, C56-C56	Onkoloog				monoteraapiana kaugelearenenud epiteliaalse (FIGO III ja IV staadium) madalalt diferentseerunud munasarjavähi, munajuhavähi või primaarse peritoneaalvähi säilitusraviks HRD positiivse staatusega patsientidel, kellel on tekkinud (täielik või osaline) ravivastus esmavaliku plaatinapõhise keemiaravi läbimise järgselt
3037193	niirapariib+abiraterooon, 100mg+500mg	L01XK52	AKEEGA, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Janssen - Cilag International	100	C61-C61	Onkoloog, Uroloog				koos prednisooni või prednisolooniga metastaatilise kastratsioonresistentse eesnäärmevähi raviks BRCA1/2 mutatsiooniga (iduliini ja/või somaatiline) patsientidele, kellele ei ole kemoteraapia kliiniliselt näidustatud ja kes ei ole enne haiguse metastaseerumist saanud ravi teise põlvkonna androgeeniretseptori inhibiitoritega ja kes ei ole saanud varasemalt süsteemset mCRPC ravi (lubatud kuni 4 kuud ravi abiraterooniga) (RHK-10 diagnoos C61) ega ravi PARP inhibiitoriga
3037182	niirapariib+abiraterooon, 50mg+500mg	L01XK52	AKEEGA, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Janssen - Cilag International	100	C61-C61	Onkoloog, Uroloog				koos prednisooni või prednisolooniga metastaatilise kastratsioonresistentse eesnäärmevähi raviks BRCA1/2 mutatsiooniga (iduliini ja/või somaatiline) patsientidele, kellele ei ole kemoteraapia kliiniliselt näidustatud ja kes ei ole enne haiguse metastaseerumist saanud ravi teise põlvkonna androgeeniretseptori inhibiitoritega ja kes ei ole saanud varasemalt süsteemset mCRPC ravi (lubatud kuni 4 kuud ravi abiraterooniga) (RHK-10 diagnoos C61) ega ravi PARP inhibiitoriga

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1872200	nirmatrelviir+ritonaviir, 150mg+0/0+100mg	J05AE30	PAXLOVID, õhukese polümeerikattega tablett, 150mg 20TK / 100mg 10TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	U07.2-U07.2, U07.1-U07.1					riskirühma patsientidele, kellel esinevad COVID-19 sümptomid ning kellel tervishoiuteenuse osutaja juures tehtud COVID-19 antigeeni kiirtest või PCR test või kodune antigeeni kiirtest koos epidemioloogilise seosega on kinnitanud COVID-19-sse haigestumist. Riskirühma kuuluvad patsiendid, kellel esineb vähemalt 1 järgnevatest riskiteguritest: vanus üle 70 a, immuunsupresseeriv haigus või -ravi, KOK või muu raske kopsuhaigus (bronhiektaasiatõbi, krooniline bronhiit, emfüseem) või patsiendil esineb vähemalt 3 Terviseameti kodulehel avaldatud juhendis „Juhis tervishoiuteenuse osutajale esmatasandil (COVID-19)“, Lisa 2. COVID-19 riskirühmade nimekirjas nimetatud riskirühma haigusseisundit
1214806	nitisinoon, 10mg	A16AX04	ORFADIN, kõvakapsel, 60TK	Swedish Orphan Biovitrum International AB	100	E70.2-E70.2					alkaptonuuria raviks
1197738	nitisinoon, 2mg	A16AX04	ORFADIN, kõvakapsel, 60TK	Swedish Orphan Biovitrum International AB	100	E70.2-E70.2					alkaptonuuria raviks
1197749	nitisinoon, 5mg	A16AX04	ORFADIN, kõvakapsel, 60TK	Swedish Orphan Biovitrum International AB	100	E70.2-E70.2					alkaptonuuria raviks
1261842	nitrendipiin, 10mg	C08CA08	NITRESAN 10 MG, tablett, 50TK	Pro.Med.Cs Praha a.s.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1014545	nitrendipiin, 20mg	C08CA08	LUSOPRESS, tablett, 28TK	Istituto Luso Farmaco D'Italia S.p.A.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1261886	nitrendipiin, 20mg	C08CA08	NITRESAN 20 MG, tablett, 50TK	Pro.Med.Cs Praha a.s.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
3094488	nitrendipiin, 20mg	C08CA08	LUSOPRESS, tablett, 28TK	Lex Ano UAB	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1865347	nitrofurantoiin, 100mg	J01XE01	MAGROMAG, toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel, 20TK	Olpha AS	50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1003857	nitrofurantoiin, 50mg	J01XE01	NITROFURANTOIN ORIFARM, tablett, 20TK	Orifarm Healthcare A/S	50						
3059917	nitrofurantoiin, 50mg	J01XE01	NITROFURANTOIN ORIFARM, tablett, 20TK	Ideal Trade Links UAB	50						
1175464	noretisteroon+östradiool, 0,5mg+1mg	G03FA01	ACTIVELLE, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Novo Nordisk A/S	50						
1887992	noretisteroon+östradiool, 0,5mg+1mg	G03FA01	ACTIVELLE, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Lex Ano UAB	50						
1030453	noretisteroon+östradiool, 0+1mg/1mg+2mg/0+2mg	G03FB05	TRISEQUENS, õhukese polümeerikattega tablett, 6TK / 10TK / 12TK	Novo Nordisk A/S	100	E89.4-E89.4, E28.3-E28.3, E23.0-E23.0, Q96-Q97	Endokrinoloog, Günekoloog	esmane		50,00	haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient on alla 50. eluaasta vana
					50						
3068849	noretisteroon+östradiool, 0+1mg/1mg+2mg/0+2mg	G03FB05	TRISEQUENS, õhukese polümeerikattega tablett, 6TK / 10TK / 12TK	Ideal Trade Links UAB	100	E89.4-E89.4, E28.3-E28.3, E23.0-E23.0, Q96-Q97	Günekoloog, Endokrinoloog	esmane		50,00	haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient on alla 50. eluaasta vana
					50						
3114582	noretisteroon+östradiool, 0+1mg/1mg+2mg/0+2mg	G03FB05	TRISEQUENS, õhukese polümeerikattega tablett, 6TK / 10TK / 12TK	Lex Ano UAB	50						
					100	E89.4-E89.4, E28.3-E28.3, E23.0-E23.0, Q96-Q97	Günekoloog, Endokrinoloog	esmane		50,00	kui haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient on alla 50. eluaasta vana
1116560	noretisteroon+östradiool, 1mg+1mg/0+1mg	G03FB05	NOVOFEM, õhukese polümeerikattega tablett, 12TK / 16TK	Novo Nordisk A/S	50						
					100	E89.4-E89.4, E28.3-E28.3, E23.0-E23.0, Q96-Q97	Günekoloog, Endokrinoloog	esmane		50,00	haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient on alla 50. eluaasta vana
1030464	noretisteroon+östradiool, 1mg+2mg	G03FA01	KLIOGEST, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Novo Nordisk A/S	50						
3124202	noretisteroon+östradiool, 1mg+2mg	G03FA01	KLIOGEST, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Ideal Trade Links UAB	50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1005455	norfloksatsiin, 400mg	J01MA06	NOLICIN, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	50						
1005927	nortriptüliin, 25mg	N06AA10	NORITREN, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	H. Lundbeck A/S	50						
					100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
					75	G63-G63, G43-G43, G62.0-G62.0					
1858631	odeviksibaat, 1200mcg	A05AX05	BYLVAY, kõvakapsel, 30TK	Ipsen Pharma	100	K76.8-K76.8	Pediaater				progresseeruva perekondliku intrahepaatilise kolestaasi raviks vähemalt 6 kuu vanustel patsientidel. Ravivastust hinnatakse 6 ravikuu möödumisel ning soodustusega väljakirjutamise õigus jätkub patsientidele, kellel raviarsti hinnangul on saavutatud kliiniline tulemus – sh hinnatakse sapphapete taset, sügeluse kliinilisi tunnuseid (põletikuline nahk, kratsimisjäljed, nahakahjustused), samuti lapsevanema tagasiside sügeluse ja unehäirete muutuse kohta. Edaspidi tuleb ravi jätkamise vajadust hinnata regulaarselt 6 kuu järel, ravi jätkamise eelduseks on püsiv ravivastus

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3090350	odeviksibaat, 1200mcg	A05AX05	KAYFANDA, kõvakapsel, 30TK	Ipsen Pharma	100	Q44.7-Q44.7	Pediaater				Alagille'i sündroomiga vähemalt 6 kuu vanustele patsientidele. Ravivastust hinnatakse 6 ravikuu möödumisel ning soodustusega väljakirjutamise õigus jätkub patsientidele, kellel raviarsti hinnangul on saavutatud kliiniline tulemus – sh hinnatakse sapphapete taset, sügeluse kliinilisi tunnuseid (põletikuline nahk, kratsimisjäljed, nahakahjustused), samuti lapsevanema tagasiside sügeluse ja unehäirete muutuse kohta. Edaspidi tuleb ravi jätkamise vajadust hinnata regulaarselt iga 6 kuu järel, ravi jätkamise eelduseks on püsiv ravivastus
1858608	odeviksibaat, 200mcg	A05AX05	BYLVAY, kõvakapsel, 30TK	Ipsen Pharma	100	K76.8-K76.8	Pediaater				progresseeruva perekondliku intrahepaatilise kolestaasi raviks vähemalt 6 kuu vanustel patsientidel. Ravivastust hinnatakse 6 ravikuu möödumisel ning soodustusega väljakirjutamise õigus jätkub patsientidele, kellel raviarsti hinnangul on saavutatud kliiniline tulemus – sh hinnatakse sapphapete taset, sügeluse kliinilisi tunnuseid (põletikuline nahk, kratsimisjäljed, nahakahjustused), samuti lapsevanema tagasiside sügeluse ja unehäirete muutuse kohta. Edaspidi tuleb ravi jätkamise vajadust hinnata regulaarselt 6 kuu järel, ravi jätkamise eelduseks on püsiv ravivastus
3090327	odeviksibaat, 200mcg	A05AX05	KAYFANDA, kõvakapsel, 30TK	Ipsen Pharma	100	Q44.7-Q44.7	Pediaater				Alagille'i sündroomiga vähemalt 6 kuu vanustele patsientidele. Ravivastust hinnatakse 6 ravikuu möödumisel ning soodustusega väljakirjutamise õigus jätkub patsientidele, kellel raviarsti hinnangul on saavutatud kliiniline tulemus – sh hinnatakse sapphapete taset, sügeluse kliinilisi tunnuseid (põletikuline nahk, kratsimisjäljed, nahakahjustused), samuti lapsevanema tagasiside sügeluse ja unehäirete muutuse kohta. Edaspidi tuleb ravi jätkamise vajadust hinnata regulaarselt iga 6 kuu järel, ravi jätkamise eelduseks on püsiv ravivastus

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1858619	odeviksibaat, 400mcg	A05AX05	BYLVAY, kõvakapsel, 30TK	Ipsen Pharma	100	K76.8-K76.8	Pediaater				progresseeruva perekondliku intrahepaatilise kolestaasi raviks vähemalt 6 kuu vanustel patsientidel. Ravivastust hinnatakse 6 ravikuu möödumisel ning soodustusega väljakirjutamise õigus jätkub patsientidele, kellel raviarsti hinnangul on saavutatud kliiniline tulemus – sh hinnatakse sapphapete taset, sügeluse kliinilisi tunnuseid (põletikuline nahk, kratsimisjäljed, nahakahjustused), samuti lapsevanema tagasiside sügeluse ja unehäirete muutuse kohta. Edaspidi tuleb ravi jätkamise vajadust hinnata regulaarselt 6 kuu järel, ravi jätkamise eelduseks on püsiv ravivastus
3090338	odeviksibaat, 400mcg	A05AX05	KAYFANDA, kõvakapsel, 30TK	Ipsen Pharma	100	Q44.7-Q44.7	Pediaater				Alagille'i sündroomiga vähemalt 6 kuu vanustele patsientidele. Ravivastust hinnatakse 6 ravikuu möödumisel ning soodustusega väljakirjutamise õigus jätkub patsientidele, kellel raviarsti hinnangul on saavutatud kliiniline tulemus – sh hinnatakse sapphapete taset, sügeluse kliinilisi tunnuseid (põletikuline nahk, kratsimisjäljed, nahakahjustused), samuti lapsevanema tagasiside sügeluse ja unehäirete muutuse kohta. Edaspidi tuleb ravi jätkamise vajadust hinnata regulaarselt iga 6 kuu järel, ravi jätkamise eelduseks on püsiv ravivastus
1858620	odeviksibaat, 600mcg	A05AX05	BYLVAY, kõvakapsel, 30TK	Ipsen Pharma	100	K76.8-K76.8	Pediaater				progresseeruva perekondliku intrahepaatilise kolestaasi raviks vähemalt 6 kuu vanustel patsientidel. Ravivastust hinnatakse 6 ravikuu möödumisel ning soodustusega väljakirjutamise õigus jätkub patsientidele, kellel raviarsti hinnangul on saavutatud kliiniline tulemus – sh hinnatakse sapphapete taset, sügeluse kliinilisi tunnuseid (põletikuline nahk, kratsimisjäljed, nahakahjustused), samuti lapsevanema tagasiside sügeluse ja unehäirete muutuse kohta. Edaspidi tuleb ravi jätkamise vajadust hinnata regulaarselt 6 kuu järel, ravi jätkamise eelduseks on püsiv ravivastus

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3090349	odeviksibaat, 600mcg	A05AX05	KAYFANDA, kõvakapsel, 30TK	Ipsen Pharma	100	Q44.7-Q44.7	Pediaater				Alagille'i sündroomiga vähemalt 6 kuu vanustele patsientidele. Ravivastust hinnatakse 6 ravikuu möödumisel ning soodustusega väljakirjutamise õigus jätkub patsientidele, kellel raviarsti hinnangul on saavutatud kliiniline tulemus – sh hinnatakse sapphapete taset, sügeluse kliinilisi tunnuseid (põletikuline nahk, kratsimisjäljed, nahakahjustused), samuti lapsevanema tagasiside sügeluse ja unehäirete muutuse kohta. Edaspidi tuleb ravi jätkamise vajadust hinnata regulaarselt iga 6 kuu järel, ravi jätkamise eelduseks on püsiv ravivastus
1845514	ofatumumab, 20mg 0.4ml	L04AG12	KESIMPTA, süstesuspensioon pen-süstlis, 0.4ml 1TK	Novartis Europharm Limited	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel (ägenemiste ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks
1012374	ofloksatsiin, 200mg	J01MA01	MEDOFLOXINE 200 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Medochemie Limited	50						
1089402	ofloksatsiin, 200mg	J01MA01	OFLOXIN 200, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Zentiva k.s.	50						
3078884	okrelizumab, 920mg 23ml	L04AG08	OCREVUS, süstelahus, 23ml 1TK	Roche Registration GmbH	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel ägenemiste ja remissioonidega kulgeva ja kuni 65 aastaselt ravi alustanud primaarselt progresseeruva hulgiskleroosi patsientide raviks
1009673	okskarbasepiin, 300mg	N03AF02	TRILEPTAL, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	Novartis Baltics SIA	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50						
1036044	okskarbasepiin, 300mg	N03AF02	APYDAN 300 MG, tablett, 50TK	Desitin Arzneimittel GmbH	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
1009684	okskarbasepiin, 600mg	N03AF02	TRILEPTAL, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	Novartis Baltics SIA	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
1036033	okskarbasepiin, 600mg	N03AF02	APYDAN 600 MG, tablett, 50TK	Desitin Arzneimittel GmbH	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1028483	oksübutüniin, 5mg	G04BD04	DRIPTANE, tablett, 60TK	Viatris SIA	75	N31-N31	Pediaater neuroloogi lisapädevusega, Neuroloog, Pediaater, Uroloog	esmane			
					50						
1402568	oksükodoon, 10mg	N02AA05	OXYCONTIN 10 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	Mundipharma Ges.m.b.H.	100	C00-D48					patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist
					50						
					100	R52.1-R52.1	Reumatoloog, Anestesioloog, Neuroloog	esmane			esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist
1526576	oksükodoon, 10mg	N02AA05	OXYCODONE VITABALANS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Vitabalans Oy	100	R52.1-R52.1	Anestesioloog, Neuroloog, Reumatoloog	esmane			esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist
					50						
					100	C00-D48					patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1402580	oksükodoon, 20mg	N02AA05	OXYCONTIN 20 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	Mundipharma Ges.m.b.H.	100	R52.1-R52.1	Anestesioloog, Neuroloog, Reumatoloog	esmane			esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist
					100	C00-D48					patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist
					50						
1402603	oksükodoon, 40mg	N02AA05	OXYCONTIN 40 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	Mundipharma Ges.m.b.H.	50						
					100	R52.1-R52.1	Reumatoloog, Anestesioloog, Neuroloog	esmane			esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist
					100	C00-D48					patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist
1526554	oksükodoon, 5mg	N02AA05	OXYCODONE VITABALANS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Vitabalans Oy	100	C00-D48					patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist
					50						
					100	R52.1-R52.1	Reumatoloog, Anestesioloog, Neuroloog	esmane			esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1402625	oksükodoon, 80mg	N02AA05	OXYCONTIN 80 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	Mundipharma Ges.m.b.H.	50						
					100	R52.1-R52.1	Neuroloog, Reumatoloog, Anestesioloog	esmane			esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist
					100	C00-D48					patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist
1004926	oktreotiid, 0,1mg 1ml	H01CB02	SANDOSTATIN, süste-/infusioonilahus, 1ml 5TK	Novartis Baltics SIA	100	E22.0-E22.0	Endokrinoloog, Pediaater endokrinoloogi lisapädevusega				akromegaalia raviks
1041309	oktreotiid, 10mg	H01CB02	SANDOSTATIN LAR, süstesuspensiooni pulber ja lahusti, 1TK	Novartis Baltics SIA	100	C00-D48, E22.0-E22.0	Pediaater endokrinoloogi lisapädevusega, Onkoloog, Endokrinoloog				neuroendokriinkasvaja või akromegaalia raviks
1041310	oktreotiid, 20mg	H01CB02	SANDOSTATIN LAR, süstesuspensiooni pulber ja lahusti, 1TK	Novartis Baltics SIA	100	C00-D48, E22.0-E22.0	Endokrinoloog, Pediaater endokrinoloogi lisapädevusega, Onkoloog				neuroendokriinkasvaja või akromegaalia raviks
1041321	oktreotiid, 30mg	H01CB02	SANDOSTATIN LAR, süstesuspensiooni pulber ja lahusti, 1TK	Novartis Baltics SIA	100	C00-D48, E22.0-E22.0	Pediaater endokrinoloogi lisapädevusega, Endokrinoloog, Onkoloog				neuroendokriinkasvaja või akromegaalia raviks
1267714	olansapiin, 10mg	N05AH03	OLANZAPIN ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Teva B.V.	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					100	F32.3-F32.3, F33.3-F33.3	Psühhiaater	esmane			
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1289516	olansapiin, 10mg	N05AH03	OLANZAPINE ACTAVIS, suus dispergeeruv tablett, 28TK	Teva B.V.	50						
					100	F32.3-F32.3, F33.3-F33.3	Psühhiaater	esmane			
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
1326259	olansapiin, 10mg	N05AH03	ZALASTA, tablett, 28TK	KRKA d.d. Novo mesto	50						
					100	F32.3-F32.3, F33.3-F33.3	Psühhiaater	esmane			
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
1326507	olansapiin, 10mg	N05AH03	ZALASTA, suus dispergeeruv tablett, 28TK	KRKA d.d. Novo mesto	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					50						
					100	F32.3-F32.3, F33.3-F33.3	Psühhiaater	esmane			
1342820	olansapiin, 10mg	N05AH03	OLANZAPINE TEVA, suus dispergeeruv tablett, 28TK	Teva B.V.	100	F32.3-F32.3, F33.3-F33.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
1354294	olansapiin, 10mg	N05AH03	OLANZAPINE ACCORD 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					50						
					100	F32.3-F32.3, F33.3-F33.3	Psühhiaater	esmane			
1768642	olansapiin, 10mg	N05AH03	FARPENTA, suus dispergeeruv tablett, 28TK	Sanoswiss UAB	100	F32.3-F32.3, F33.3-F33.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
1289572	olansapiin, 15mg	N05AH03	OLANZAPINE ACTAVIS, suus dispergeeruv tablett, 28TK	Teva B.V.	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					50						
					100	F32.3-F32.3, F33.3-F33.3	Psühhiaater	esmane			

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1326552	olansapiin, 15mg	N05AH03	ZALASTA, suus dispergeeruv tablett, 28TK	KRKA d.d. Novo mesto	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					50						
					100	F32.3-F32.3, F33.3-F33.3	Psühhiaater	esmane			
1354351	olansapiin, 15mg	N05AH03	OLANZAPINE ACCORD 15 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					100	F32.3-F32.3, F33.3-F33.3	Psühhiaater	esmane			
1768664	olansapiin, 15mg	N05AH03	FARPENTA, suus dispergeeruv tablett, 28TK	Sanoswiss UAB	50						
					100	F32.3-F32.3, F33.3-F33.3	Psühhiaater	esmane			
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
1267455	olansapiin, 5mg	N05AH03	OLANZAPIN ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Teva B.V.	50						
					100	F32.3-F32.3, F33.3-F33.3	Psühhiaater	esmane			
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
1289459	olansapiin, 5mg	N05AH03	OLANZAPINE ACTAVIS, suus dispergeeruv tablett, 28TK	Teva B.V.	50						
					100	F32.3-F32.3, F33.3-F33.3	Psühhiaater	esmane			
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
1326406	olansapiin, 5mg	N05AH03	ZALASTA, suus dispergeeruv tablett, 28TK	KRKA d.d. Novo mesto	50						
					100	F32.3-F32.3, F33.3-F33.3	Psühhiaater	esmane			
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
1342763	olansapiin, 5mg	N05AH03	OLANZAPINE TEVA, suus dispergeeruv tablett, 28TK	Teva B.V.	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					50						
					100	F32.3-F32.3, F33.3-F33.3	Psühhiaater	esmane			

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1354104	olansapiin, 5mg	N05AH03	OLANZAPINE ACCORD 5 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					100	F32.3-F32.3, F33.3-F33.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1768620	olansapiin, 5mg	N05AH03	FARPENTA, suus dispergeeruv tablett, 28TK	Sanoswiss UAB	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					100	F32.3-F32.3, F33.3-F33.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1771196	olapariib, 100mg	L01XK01	LYNPARZA, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Astrazeneca AB	100	C61-C61	Onkoloog				monoteraapiana patsientidele, kellel on metastaatiline kastratsioonresistentne eesnäärmevähk (ECOG 0-2) ja BRCA1/2-mutatsioon (iduliini ja/või somaatiline) ning kelle haigus on progresseerunud pärast varasemat ravi uue põlvkonna hormoonravimiga
					100	C48-C48, C56-C56, C57.0-C57.0	Onkoloog				levinud (FIGO III ja IV staadium) madalalt diferentseerunud epiteliaalse munasarja-, munajuha või primaarse peritoneaalvähi raviks: säilitusraviks HRD positiivse staatusega patsientidel, kellel on saavutatud osaline või täielik ravivastus pärast esimese rea plaatinapõhise keemiaravi lõpetamist ning retsidiveerunud haiguse korral BRCA mutatsiooniga (iduliini või somaatiline) patsientidele, keda on eelnevalt ravitud kahe või enama plaatinapõhise keemiaraviga ning kes on saanud osalise või täieliku ravivastuse viimasele plaatinapõhisele keemiaravile. Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi olapariibiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. juulit 2020. a

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1771219	olapariib, 150mg	L01XK01	LYNPARZA, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Astrazeneca AB	100	C61-C61	Onkoloog				monoteraapiana patsientidele, kellel on metastaatiline kastratsioonresistentne eesnäärmevähk (ECOG 0-2) ja BRCA1/2-mutatsioon (iduliini ja/või somaatiline) ning kelle haigus on progresseerunud pärast varasemat ravi uue põlvkonna hormoonravimiga
					100	C48-C48, C56-C56, C57.0-C57.0	Onkoloog				levinud (FIGO III ja IV staadium) madalalt diferentseerunud epiteliaalse munasarja-, munajuha või primaarse peritoneaalvähi raviks: säilitusraviks HRD positiivse staatusega patsientidel, kellel on saavutatud osaline või täielik ravivastus pärast esimese rea plaatinapõhise keemiaravi lõpetamist ning retsidiveerunud haiguse korral BRCA mutatsiooniga (iduliini või somaatiline) patsientidele, keda on eelnevalt ravitud kahe või enama plaatinapõhise keemiaraviga ning kes on saanud osalise või täieliku ravivastuse viimasele plaatinapõhisele keemiaravile. Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi olapariibiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. juulit 2020. a
1407664	olmesartaanmedoksomiil, 10mg	C09CA08	OLIMESTRA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1676459	olmesartaanmedoksomiil, 10mg	C09CA08	OLMESARTAN MEDOXOMIL ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1407833	olmesartaanmedoksomiil, 20mg	C09CA08	OLIMESTRA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1676538	olmesartaanmedoksomiil, 20mg	C09CA08	OLMESARTAN MEDOXOMIL ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1407934	olmesartaanmedoksomiil, 40mg	C09CA08	OLIMESTRA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15					
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1676617	olmesartaanmedoksomiil, 40mg	C09CA08	OLMESARTAN MEDOXOMIL ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1308349	olmesartaanmedoksomiil+amlodipiin, 20mg+5mg	C09DB02	SANORAL, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1727434	olmesartaanmedoksomiil+amlodipiin, 20mg+5mg	C09DB02	OLMESARTAN MEDOXOMIL/AMLODIPINE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1308563	olmesartaanmedoksomiil+amlodipiin, 40mg+10mg	C09DB02	SANORAL, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1720628	olmesartaanmedoksomiil+amlodipiin, 40mg+10mg	C09DB02	OLSSA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1727579	olmesartaanmedoksomiil+amlodipiin, 40mg+10mg	C09DB02	OLMESARTAN MEDOXOMIL/AMLODIPINE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1308451	olmesartaanmedoksomiil+amlodipiin, 40mg+5mg	C09DB02	SANORAL, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1720538	olmesartaanmedoksomiil+amlodipiin, 40mg+5mg	C09DB02	OLSSA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1727175	olmesartaanmedoksomiil+amlodipiin, 40mg+5mg	C09DB02	OLMESARTAN MEDOXOMIL/AMLODIPINE ZENTIVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Zentiva k.s.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1727502	olmesartaanmedoksomiil+amlodipiin, 40mg+5mg	C09DB02	OLMESARTAN MEDOXOMIL/AMLODIPINE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1452866	olmesartaanmedoksomiil+amlodipiin+hüdroklorotiasiid, 40mg+10mg+12,5mg	C09DX03	SANORAL HCT, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1786394	olmesartaanmedoksomiil+amlodipiin+hüdroklorotiasiid, 40mg+10mg+12,5mg	C09DX03	OLMESARTAN MEDOXOMIL/AMLODIPINE/HCT ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1790939	olmesartaanmedoksomiil+amlodipiin+hüdroklorotiasiid, 40mg+10mg+12,5mg	C09DX03	OLSITRI, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1797509	olmesartaanmedoksomiil+amlodipiin+hüdroklorotiasiid, 40mg+10mg+12,5mg	C09DX03	OLMESARTAN MEDOXOMIL/AMLODIPINE/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Teva B.V.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1801527	olmesartaanmedoksomiil+amlodipiin+hüdroklorotiasiid, 40mg+10mg+12,5mg	C09DX03	GADUAR, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Zentiva k.s.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1452709	olmesartaanmedoksomiil+amlodipiin+hüdroklorotiasiid, 40mg+5mg+12,5mg	C09DX03	SANORAL HCT, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1786350	olmesartaanmedoksomiil+amlodipiin+hüdroklorotiasiid, 40mg+5mg+12,5mg	C09DX03	OLMESARTAN MEDOXOMIL/AMLODIPINE/HCT ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1790771	olmesartaanmedoksomiil+amlodipiin+hüdroklorotiasiid, 40mg+5mg+12,5mg	C09DX03	OLSITRI, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1801482	olmesartaanmedoksomiil+amlodipiin+hüdroklorotiasiid, 40mg+5mg+12,5mg	C09DX03	GADUAR, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Zentiva k.s.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1530672	olmesartaanmedoksomiil+hüdroklorotiasiid, 20mg+12,5mg	C09DA86	CO-OLIMESTRA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1530762	olmesartaanmedoksomiil+hüdroklorotiasiid, 20mg+25mg	C09DA86	CO-OLIMESTRA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1648481	olodaterool+tiotroopium, 2,5mcg+2,5mcg 1mõõtannus	R03AL06	SPIOLTO RESPIMAT, inhalatsioonilahus, 60mõõtannus 1TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			
					50						
1140220	olopatadiin, 1mg 1ml	S01GX09	OPATANOL, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK	Novartis Europharm Limited	50						
1774728	olopatadiin, 1mg 1ml	S01GX09	OLOPATADINE UNIMED PHARMA, silmatilgad, lahus, 10ml 1TK	Unimed Pharma spol. s r.o.	50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1062166	omeprasool, 20mg	A02BC01	OMEPRAZOLE-RATIOPHARM, gastroresistentne kõvakapsel, 30TK	Ratiopharm GmbH	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
1062201	omeprasool, 20mg	A02BC01	GASEC GASTROCAPS 20 MG, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK	Teva B.V.	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
1269222	omeprasool, 20mg	A02BC01	OMEP 20MG, gastroresistentne kõvakapsel, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1269244	omeprasool, 20mg	A02BC01	OMEP 20MG, gastroresistentne kõvakapsel, 56TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
1352393	omeprasool, 20mg	A02BC01	OMEPRAZOLE STADA 20 MG, gastroresistentne kõvakapsel, 30TK	Stada Arzneimittel AG	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
1423077	omeprasool, 20mg	A02BC01	ULTOP, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK	KRKA, d.d., Novo mesto	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
1516250	omeprasool, 20mg	A02BC01	GASEC GASTROCAPS 20 MG, gastroresistentne kõvakapsel, 56TK	Teva B.V.	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1112825	omeprasool, 40mg	A02BC01	GASEC GASTROCAPS 40 MG, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK	Teva B.V.	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
1269301	omeprasool, 40mg	A02BC01	OMEP 40MG, gastroresistentne kõvakapsel, 15TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
1269323	omeprasool, 40mg	A02BC01	OMEP 40MG, gastroresistentne kõvakapsel, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1269345	omeprasool, 40mg	A02BC01	OMEP 40MG, gastroresistentne kõvakapsel, 56TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1352551	omeprasool, 40mg	A02BC01	OMEPRAZOLE STADA 40 MG, gastroresistentne kõvakapsel, 30TK	Stada Arzneimittel AG	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1888892	omeprasool, 40mg	A02BC01	OMEP 40MG, gastroresistentne kõvakapsel, 30TK	Lex Ano UAB	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1137372	oomega-3-rasvhappe etüülestrid 90, 1000mg	C10AX80	OMACOR, pehmekapsel, 28TK	BASF AS	50						
1828380	oomega-3-rasvhappe etüülestrid 90, 1000mg	C10AX80	OMACOR, pehmekapsel, 28TK	Lex Ano UAB	50						
1889219	oomega-3-rasvhappe etüülestrid 90, 1000mg	C10AX80	OMACOR, pehmekapsel, 28TK	Ideal Trade Links UAB	50						
1722642	opikapoon, 50mg	N04BX04	ONGENTYS, kõvakapsel, 30TK	Bial - Portela & Ca S.A.	100	G20-G20	Neuroloog				patsientidele, kes on saanud adekvaatses annuses entakapooni ravi, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on ravi entakapooniga vastunäidustatud.
1367951	oseltamiviir, 30mg	J05AH02	TAMIFLU, kõvakapsel, 10TK	Roche Registration GmbH	50						patsientidele, kellel esinevad gripi sümptomid ja kellel on tehtud kodune gripi antigeeni kiirtest ning on kinnitatud A või B grippi haigestumine, kui tegemist on kas kuni 40 kg kaaluva lapse või patsiendiga, kelle eGFR on alla 60 mL/min/1,73 m²
1110643	oseltamiviir, 75mg	J05AH02	TAMIFLU, kõvakapsel, 10TK	Roche Registration GmbH	50						riskirühma patsientide raviks ja profülaktikaks, kellel esinevad gripi sümptomid ja kellel on tehtud kodune gripi antigeeni kiirtest ning on kinnitatud A või B grippi haigestumine. Gripi riskirühma kuuluvad patsiendid on nimetatud kehtivas riiklikus immuniseerimiskavas

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1649088	oseltamiviir, 75mg	J05AH02	EBILFUMIN, kõvakapsel, 10TK	Actavis Group PTC ehf.	50						riskirühma patsientide raviks ja profülaktikaks, kellel esinevad gripi sümptomid ja kellel on tehtud kodune gripi antigeeni kiirtest ning on kinnitatud A või B grippi haigestumine. Gripi riskirühma kuuluvad patsiendid on nimetatud kehtivas riiklikus immuniseerimiskavas
1710379	osimertiniib, 40mg	L01EB04	TAGRISSO, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Astrazeneca AB	100	C34-C34	Onkoloog				kombinatsioonis pemetrekseedi ja plaatinapõhise keemiaraviga lokaalselt levinud või metastaatilise mitteväikerakulise kopsuvähi esmavaliku raviks täiskasvanud patsientidel, kellel esinevad EGFR 19. eksoni deletsioonid või 21. eksoni asendusmutatsioonid (L858R)
					100	C34-C34	Onkoloog				monoteraapiana kasvaja täieliku resektsiooni järgselt adjuvantraviks IB...IIIA raskusastmega mitteväikerakulise kopsuvähiga täiskasvanud patsientidel, kelle kasvajatel on epidermaalse kasvufaktori retseptori (EGFR) 19. eksoni deletsioonid või 21. eksoni asendusmutatsioonid (L858R) kuni kolmeks aastaks ning monoteraapiana lokaalselt levinud või metastaatilise mitteväikerakulise kopsuvähi esmavaliku raviks täiskasvanud patsientidel, kellel esinevad EGFR aktiveerivad mutatsioonid ning monoteraapiana lokaalselt levinud või metastaatilise EGFR T790M-mutatsioonpositiivse mitteväikerakk kopsuvähiga patsientidele, kelle haigus on progresseerunud pärast ravi EGFR-türosiini kinaasi inhibiitoritega

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1710380	osimertiniib, 80mg	L01EB04	TAGRISSO, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Astrazeneca AB	100	C34-C34	Onkoloog				monoteraapiana kasvaja täieliku resektsiooni järgselt adjuvantraviks IB...IIIA raskusastmega mitteväikerakulise kopsuvähiga täiskasvanud patsientidel, kelle kasvajatel on epidermaalse kasvufaktori retseptori (EGFR) 19. eksoni deletsioonid või 21. eksoni asendusmutatsioonid (L858R) kuni kolmeks aastaks ning monoteraapiana lokaalselt levinud või metastaatilise mitteväikerakulise kopsuvähi esmavaliku raviks täiskasvanud patsientidel, kellel esinevad EGFR aktiveerivad mutatsioonid ning monoteraapiana lokaalselt levinud või metastaatilise EGFR T790M-mutatsioonpositiivse mitteväikerakk kopsuvähiga patsientidele, kelle haigus on progresseerunud pärast ravi EGFR-türosiini kinaasi inhibiitoritega
					100	C34-C34	Onkoloog				kombinatsioonis pemetrekseedi ja plaatinapõhise keemiaraviga lokaalselt levinud või metastaatilise mitteväikerakulise kopsuvähi esmavaliku raviks täiskasvanud patsientidel, kellel esinevad EGFR 19. eksoni deletsioonid või 21. eksoni asendusmutatsioonid (L858R)
1811540	palbotsikliib, 100mg	L01EF01	IBRANCE, õhukese polümeerikattega tablett, 21TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	C50-C50	Onkoloog				hormoonretseptor (HR)-positiivse, inimese epidermaalse kasvufaktori retseptor 2 (HER2)-negatiivse, lokaalselt kaugelearenenud või metastaatilise rinnavähi I rea raviks kombinatsioonis aromataasi inhibiitoriga patsiendile kuni haiguse progresseerumiseni ning kombinatsioonis fulvestrandiga I rea raviks kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle haigus on adjuvantse või neoadjuvantse aromataasi inhibiitori foonil või 12 kuud pärast selle lõpetamist progresseerunud ning kombinatsioonis fulvestrandiga II rea raviks kuni haiguse progresseerumiseni patsientidele, kes ei ole varasemalt ravi CDK-4/6 inibiitoritega saanud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1811562	palbotsikliib, 125mg	L01EF01	IBRANCE, õhukese polümeerikattega tablett, 21TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	C50-C50	Onkoloog				hormoonretseptor (HR)-positiivse, inimese epidermaalse kasvufaktori retseptor 2 (HER2)-negatiivse, lokaalselt kaugelearenenud või metastaatilise rinnavähi I rea raviks kombinatsioonis aromataasi inhibiitoriga patsiendile kuni haiguse progresseerumiseni ning kombinatsioonis fulvestrandiga I rea raviks kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle haigus on adjuvantse või neoadjuvantse aromataasi inhibiitori foonil või 12 kuud pärast selle lõpetamist progresseerunud ning kombinatsioonis fulvestrandiga II rea raviks kuni haiguse progresseerumiseni patsientidele, kes ei ole varasemalt ravi CDK-4/6 inibiitoritega saanud
1811528	palbotsikliib, 75mg	L01EF01	IBRANCE, õhukese polümeerikattega tablett, 21TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	C50-C50	Onkoloog				hormoonretseptor (HR)-positiivse, inimese epidermaalse kasvufaktori retseptor 2 (HER2)-negatiivse, lokaalselt kaugelearenenud või metastaatilise rinnavähi I rea raviks kombinatsioonis aromataasi inhibiitoriga patsiendile kuni haiguse progresseerumiseni ning kombinatsioonis fulvestrandiga I rea raviks kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle haigus on adjuvantse või neoadjuvantse aromataasi inhibiitori foonil või 12 kuud pärast selle lõpetamist progresseerunud ning kombinatsioonis fulvestrandiga II rea raviks kuni haiguse progresseerumiseni patsientidele, kes ei ole varasemalt ravi CDK-4/6 inibiitoritega saanud
1696068	panobinostaat, 10mg	L01XH03	FARYDAK, kõvakapsel, 6TK	pharmaand GmbH	100	C90.0-C90.0	Hematoloog				kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise panobinostaadiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: kasutamiseks kombinatsioonis bortesomiibi ja deksametasooniga, retsidiveerunud ja/või refraktaarse hulgimüeloomiga täiskasvanud patsientidele, keda on varasemalt ravitud vähemalt kahe raviskeemiga, sealhulgas bortesomiibi ja immuunomoduleeriva ravimiga ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi panobinostaadiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. aprilli 2018. a.

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1696091	panobinostaat, 15mg	L01XH03	FARYDAK, kõvakapsel, 6TK	pharmaand GmbH	100	C90.0-C90.0	Hematoloog				kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise panobinostaadiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: kasutamiseks kombinatsioonis bortesomiibi ja deksametasooniga, retsidiveerunud ja/või refraktaarse hulgimüeloomiga täiskasvanud patsientidele, keda on varasemalt ravitud vähemalt kahe raviskeemiga, sealhulgas bortesomiibi ja immuunomoduleeriva ravimiga ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi panobinostaadiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. aprilli 2018. a.
1696125	panobinostaat, 20mg	L01XH03	FARYDAK, kõvakapsel, 6TK	pharmaand GmbH	100	C90.0-C90.0	Hematoloog				kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise panobinostaadiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: kasutamiseks kombinatsioonis bortesomiibi ja deksametasooniga, retsidiveerunud ja/või refraktaarse hulgimüeloomiga täiskasvanud patsientidele, keda on varasemalt ravitud vähemalt kahe raviskeemiga, sealhulgas bortesomiibi ja immuunomoduleeriva ravimiga ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi panobinostaadiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. aprilli 2018. a.
1043020	pantoprasool, 20mg	A02BC02	CONTROLOC 20 MG, gastroresistentne tablett, 14TK	Takeda GmbH	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1249770	pantoprasool, 20mg	A02BC02	NOLPAZA, gastroresistentne tablett, 28TK	KRKA d.d. Novo mesto	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1249792	pantoprasool, 20mg	A02BC02	NOLPAZA, gastroresistentne tablett, 56TK	KRKA d.d. Novo mesto	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1277232	pantoprasool, 20mg	A02BC02	PANTOPRAZOLE ACTAVIS, gastroresistentne tablett, 28TK	Teva B.V.	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1418813	pantoprasool, 20mg	A02BC02	OZZION, gastroresistentne tablett, 28TK	Zentiva k.s.	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1441178	pantoprasool, 20mg	A02BC02	PANTOPRAZOLE-MEPHA, gastroresistentne tablett, 14TK	Teva B.V.	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1441189	pantoprasool, 20mg	A02BC02	PANTOPRAZOLE-MEPHA, gastroresistentne tablett, 28TK	Teva B.V.	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
1537006	pantoprasool, 20mg	A02BC02	PANTOPRAZOLE-MEPHA, gastroresistentne tablett, 56TK	Teva B.V.	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1043031	pantoprasool, 40mg	A02BC02	CONTROLOC 40 MG, gastroresistentne tablett, 14TK	Takeda GmbH	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1249646	pantoprasool, 40mg	A02BC02	NOLPAZA, gastroresistentne tablett, 14TK	KRKA d.d. Novo mesto	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1249668	pantoprasool, 40mg	A02BC02	NOLPAZA, gastroresistentne tablett, 28TK	KRKA d.d. Novo mesto	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
1249680	pantoprasool, 40mg	A02BC02	NOLPAZA, gastroresistentne tablett, 56TK	KRKA d.d. Novo mesto	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
1277344	pantoprasool, 40mg	A02BC02	PANTOPRAZOLE ACTAVIS, gastroresistentne tablett, 28TK	Teva B.V.	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
1280449	pantoprasool, 40mg	A02BC02	PANTOPRAZOL - RATIOPHARM 40 MG, gastroresistentne tablett, 14TK	Ratiopharm GmbH	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1418835	pantoprasool, 40mg	A02BC02	OZZION, gastroresistentne tablett, 28TK	Zentiva k.s.	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1441190	pantoprasool, 40mg	A02BC02	PANTOPRAZOLE-MEPHA, gastroresistentne tablett, 14TK	Teva B.V.	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
1441202	pantoprasool, 40mg	A02BC02	PANTOPRAZOLE-MEPHA, gastroresistentne tablett, 28TK	Teva B.V.	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1537028	pantoprasool, 40mg	A02BC02	PANTOPRAZOLE-MEPHA, gastroresistentne tablett, 56TK	Teva B.V.	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
1810268	pantoprasool, 40mg	A02BC02	NOLPAZA, gastroresistentne tablett, 28TK	First Pharma OÜ	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
1060232	paroksetiin, 20mg	N06AB05	SEROXAT, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	GlaxoSmithKline Trading Services Limited	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
1096837	paroksetiin, 20mg	N06AB05	REXETIN, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Gedeon Richter Plc.	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1110799	paroksetiin, 20mg	N06AB05	PAROXETIN HEXAL 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Hexal AG	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1185072	paroksetiin, 20mg	N06AB05	PAROXETIN ACTAVIS 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva B.V.	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1244900	paroksetiin, 20mg	N06AB05	ARKETIS 20 MG, tablett, 30TK	Medochemie Limited	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3110634	paroksetiin, 20mg	N06AB05	SEROXAT, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Lex Ano UAB	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1245103	paroksetiin, 40mg	N06AB05	ARKETIS 40 MG, tablett, 30TK	Medochemie Limited	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
1482027	pasopaniib, 200mg	L01EX03	VOTRIENT, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Novartis Europharm Limited	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks
1830215	pasopaniib, 200mg	L01EX03	PAZOPANIB AUXILIA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Auxilia Pharma OÜ	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks
1830237	pasopaniib, 200mg	L01EX03	PAZOPANIB AUXILIA, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Auxilia Pharma OÜ	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks
1834062	pasopaniib, 200mg	L01EX03	PAZOPANIB ZENTIVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Zentiva k.s.	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks
1851151	pasopaniib, 200mg	L01EX03	PAZOPANIB TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva B.V.	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks
1886575	pasopaniib, 200mg	L01EX03	PAZOPANIB ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare B.V.	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks
1482050	pasopaniib, 400mg	L01EX03	VOTRIENT, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Novartis Europharm Limited	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks
1834107	pasopaniib, 400mg	L01EX03	PAZOPANIB ZENTIVA, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Zentiva k.s.	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1851207	pasopaniib, 400mg	L01EX03	PAZOPANIB TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva B.V.	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks
1886676	pasopaniib, 400mg	L01EX03	PAZOPANIB ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare B.V.	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks
1886700	pasopaniib, 400mg	L01EX03	PAZOPANIB ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Accord Healthcare B.V.	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks
1846010	pemigatiniib, 13,5mg	L01EN02	PEMAZYRE, tablett, 14TK	Incyte Biosciences Distribution B.V.	100	C22.1-C22.1, C24.0-C24.0	Onkoloog				patsientidele, kellel on fibroblastide kasvufaktori retseptori 2 (FGFR2) fuseerumise või ümberkorraldumisega lokaalselt kaugelearenenud või metastaatiline kolangiokartsinoom, mis on vähemalt ühe varasema süsteemse ravikuuri järel progresseerunud.
1845974	pemigatiniib, 4,5mg	L01EN02	PEMAZYRE, tablett, 14TK	Incyte Biosciences Distribution B.V.	100	C22.1-C22.1, C24.0-C24.0	Onkoloog				patsientidele, kellel on fibroblastide kasvufaktori retseptori 2 (FGFR2) fuseerumise või ümberkorraldumisega lokaalselt kaugelearenenud või metastaatiline kolangiokartsinoom, mis on vähemalt ühe varasema süsteemse ravikuuri järel progresseerunud.
1845996	pemigatiniib, 9mg	L01EN02	PEMAZYRE, tablett, 14TK	Incyte Biosciences Distribution B.V.	100	C22.1-C22.1, C24.0-C24.0	Onkoloog				patsientidele, kellel on fibroblastide kasvufaktori retseptori 2 (FGFR2) fuseerumise või ümberkorraldumisega lokaalselt kaugelearenenud või metastaatiline kolangiokartsinoom, mis on vähemalt ühe varasema süsteemse ravikuuri järel progresseerunud.
1147980	pentoksüfülliin, 400mg	C04AD03	PENTILIN, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	KRKA d.d. Novo mesto	50						
1028854	pentoksüfülliin, 600mg	C04AD03	VASONIT RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 20TK	G.L. Pharma GmbH	50						
1473409	pentoksüfülliin, 600mg	C04AD03	VASONIT RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	G.L. Pharma GmbH	50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1168422	perindopriil, 10mg	C09AA04	PRESTARIUM ARGININE 10MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Les Laboratoires Servier	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1829190	perindopriil, 10mg	C09AA04	PRENESSA NEO, tablett, 30TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1829213	perindopriil, 10mg	C09AA04	PRENESSA NEO, tablett, 90TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15, I50-I50					
					50						
1843231	perindopriil, 10mg	C09AA04	PERINDOPRIL ZENTIVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Zentiva k.s.	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1843242	perindopriil, 10mg	C09AA04	PERINDOPRIL ZENTIVA, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Zentiva k.s.	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1302860	perindopriil, 4mg	C09AA04	STOPRESS, tablett, 30TK	Zaklady Farmaceutyczne Polpharma S.A.	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1377233	perindopriil, 4mg	C09AA04	PRENESSA, tablett, 30TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1845020	perindopriil, 4mg	C09AA04	PRENESSA, tablett, 90TK	First Pharma OÜ	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1168310	perindopriil, 5mg	C09AA04	PRESTARIUM ARGININE 5MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Les Laboratoires Servier	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1829156	perindopriil, 5mg	C09AA04	PRENESSA NEO, tablett, 30TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1829178	perindopriil, 5mg	C09AA04	PRENESSA NEO, tablett, 90TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1843208	perindopriil, 5mg	C09AA04	PERINDOPRIL ZENTIVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Zentiva k.s.	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1843219	perindopriil, 5mg	C09AA04	PERINDOPRIL ZENTIVA, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Zentiva k.s.	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1302871	perindopriil, 8mg	C09AA04	STOPRESS, tablett, 30TK	Zaklady Farmaceutyczne Polpharma S.A.	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1377312	perindopriil, 8mg	C09AA04	PRENESSA, tablett, 30TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1822823	perindopriil, 8mg	C09AA04	PRENESSA, tablett, 90TK	First Pharma OÜ	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1289101	perindopriil+amlodipiin, 10mg+10mg	C09BB04	COVERAM, tablett, 30TK	Les Laboratoires Servier	75	I20-I20, I50-I50, I10-I13, I15-I15					
					50						
1288953	perindopriil+amlodipiin, 10mg+5mg	C09BB04	COVERAM, tablett, 30TK	Les Laboratoires Servier	75	I20-I20, I50-I50, I10-I13, I15-I15					
					50						
1499250	perindopriil+amlodipiin, 4mg+10mg	C09BB04	DALNESSA, tablett, 30TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
					75	I20-I20, I50-I50, I10-I13, I15-I15					
1499003	perindopriil+amlodipiin, 4mg+5mg	C09BB04	DALNESSA, tablett, 30TK	KRKA, d.d., Novo mesto	75	I20-I20, I50-I50, I10-I13, I15-I15					
					50						
1288818	perindopriil+amlodipiin, 5mg+10mg	C09BB04	COVERAM, tablett, 30TK	Les Laboratoires Servier	75	I20-I20, I50-I50, I10-I13, I15-I15					
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1288672	perindopriil+amlodipiin, 5mg+5mg	C09BB04	COVERAM, tablett, 30TK	Les Laboratoires Servier	75	I20-I20, I50-I50, I10-I13, I15-I15					
					50						
1499126	perindopriil+amlodipiin, 8mg+10mg	C09BB04	DALNESSA, tablett, 30TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
					75	I20-I20, I50-I50, I10-I13, I15-I15					
1499069	perindopriil+amlodipiin, 8mg+5mg	C09BB04	DALNESSA, tablett, 30TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
					75	I20-I20, I50-I50, I10-I13, I15-I15					
1588079	perindopriil+amlodipiin+indapamiid, 10mg+10mg+2,5mg	C09BX01	TRIPLIXAM, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Les Laboratoires Servier	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1588091	perindopriil+amlodipiin+indapamiid, 10mg+10mg+2,5mg	C09BX01	TRIPLIXAM, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Les Laboratoires Servier	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1858563	perindopriil+amlodipiin+indapamiid, 10mg+10mg+2,5mg	C09BX01	PERINDOPRIL ARGININE/INDAPAMIDE/AMLODIPINE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva B.V.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1858574	perindopriil+amlodipiin+indapamiid, 10mg+10mg+2,5mg	C09BX01	PERINDOPRIL ARGININE/INDAPAMIDE/AMLODIPINE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Teva B.V.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1883460	perindopriil+amlodipiin+indapamiid, 10mg+10mg+2,5mg	C09BX01	CO-AMLESSA NEO, tablett, 90TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1588024	perindopriil+amlodipiin+indapamiid, 10mg+5mg+2,5mg	C09BX01	TRIPLIXAM, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Les Laboratoires Servier	75	I10-I13, I15-I15					
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1588046	perindopriil+amlodipiin+indapamiid, 10mg+5mg+2,5mg	C09BX01	TRIPLIXAM, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Les Laboratoires Servier	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1858529	perindopriil+amlodipiin+indapamiid, 10mg+5mg+2,5mg	C09BX01	PERINDOPRIL ARGININE/INDAPAMIDE/AMLODIPINE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva B.V.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1858530	perindopriil+amlodipiin+indapamiid, 10mg+5mg+2,5mg	C09BX01	PERINDOPRIL ARGININE/INDAPAMIDE/AMLODIPINE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Teva B.V.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1883415	perindopriil+amlodipiin+indapamiid, 10mg+5mg+2,5mg	C09BX01	CO-AMLESSA NEO, tablett, 90TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1602481	perindopriil+amlodipiin+indapamiid, 4mg+10mg+1,25mg	C09BX01	CO-DALNESSA, tablett, 30TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1602504	perindopriil+amlodipiin+indapamiid, 4mg+10mg+1,25mg	C09BX01	CO-DALNESSA, tablett, 60TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1602571	perindopriil+amlodipiin+indapamiid, 4mg+5mg+1,25mg	C09BX01	CO-DALNESSA, tablett, 30TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1602593	perindopriil+amlodipiin+indapamiid, 4mg+5mg+1,25mg	C09BX01	CO-DALNESSA, tablett, 60TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1587977	perindopriil+amlodipiin+indapamiid, 5mg+10mg+1,25mg	C09BX01	TRIPLIXAM, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Les Laboratoires Servier	50						
					75	I10-I13, I15-I15					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1587999	perindopriil+amlodipiin+indapamiid, 5mg+10mg+1,25mg	C09BX01	TRIPLIXAM, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Les Laboratoires Servier	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1587922	perindopriil+amlodipiin+indapamiid, 5mg+5mg+1,25mg	C09BX01	TRIPLIXAM, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Les Laboratoires Servier	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1587944	perindopriil+amlodipiin+indapamiid, 5mg+5mg+1,25mg	C09BX01	TRIPLIXAM, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Les Laboratoires Servier	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1858439	perindopriil+amlodipiin+indapamiid, 5mg+5mg+1,25mg	C09BX01	PERINDOPRIL ARGININE/INDAPAMIDE/AMLODIPINE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva B.V.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1858440	perindopriil+amlodipiin+indapamiid, 5mg+5mg+1,25mg	C09BX01	PERINDOPRIL ARGININE/INDAPAMIDE/AMLODIPINE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Teva B.V.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1883369	perindopriil+amlodipiin+indapamiid, 5mg+5mg+1,25mg	C09BX01	CO-AMLESSA NEO, tablett, 90TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1602683	perindopriil+amlodipiin+indapamiid, 8mg+10mg+2,5mg	C09BX01	CO-DALNESSA, tablett, 30TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1602706	perindopriil+amlodipiin+indapamiid, 8mg+10mg+2,5mg	C09BX01	CO-DALNESSA, tablett, 60TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
3109058	perindopriil+amlodipiin+indapamiid, 8mg+10mg+2,5mg	C09BX01	CO-DALNESSA, tablett, 30TK	Lex Ano UAB	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
3109069	perindopriil+amlodipiin+indapamiid, 8mg+10mg+2,5mg	C09BX01	CO-DALNESSA, tablett, 60TK	Lex Ano UAB	75	I10-I13, I15-I15					
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1602795	perindopriil+amlodipiin+indapamiid, 8mg+5mg+2,5mg	C09BX01	CO-DALNESSA, tablett, 30TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1602818	perindopriil+amlodipiin+indapamiid, 8mg+5mg+2,5mg	C09BX01	CO-DALNESSA, tablett, 60TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
3109092	perindopriil+amlodipiin+indapamiid, 8mg+5mg+2,5mg	C09BX01	CO-DALNESSA, tablett, 30TK	Lex Ano UAB	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
3109115	perindopriil+amlodipiin+indapamiid, 8mg+5mg+2,5mg	C09BX01	CO-DALNESSA, tablett, 60TK	Lex Ano UAB	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1339488	perindopriil+indapamiid, 10mg+2,5mg	C09BA83	NOLITERAX 10 MG/2,5 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Les Laboratoires Servier	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1686720	perindopriil+indapamiid, 10mg+2,5mg	C09BA83	PERINDOPRIL/INDAPAMIDE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1686742	perindopriil+indapamiid, 10mg+2,5mg	C09BA83	PERINDOPRIL/INDAPAMIDE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Teva Pharma B.V.	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1834219	perindopriil+indapamiid, 10mg+2,5mg	C09BA83	CO-PRENESSANEO, tablett, 30TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1229587	perindopriil+indapamiid, 2,5mg+0,625mg	C09BA83	NOLIPREL ARGININE, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Les Laboratoires Servier	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1544374	perindopriil+indapamiid, 2,5mg+0,625mg	C09BA83	PERINDOPRIL/INDAPAMIDE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1600647	perindopriil+indapamiid, 2,5mg+0,625mg	C09BA83	PERINDOPRIL/INDAPAMIDE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Teva Pharma B.V.	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1407068	perindopriil+indapamiid, 2mg+0,625mg	C09BA83	CO-PRENESSA, tablett, 30TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1295894	perindopriil+indapamiid, 4mg+1,25mg	C09BA83	PRENEWEL, tablett, 60TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1407158	perindopriil+indapamiid, 4mg+1,25mg	C09BA83	CO-PRENESSA, tablett, 30TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1229879	perindopriil+indapamiid, 5mg+1,25mg	C09BA83	NOLIPREL FORTE ARGININE, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Les Laboratoires Servier	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1544486	perindopriil+indapamiid, 5mg+1,25mg	C09BA83	PERINDOPRIL/INDAPAMIDE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1600670	perindopriil+indapamiid, 5mg+1,25mg	C09BA83	PERINDOPRIL/INDAPAMIDE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Teva Pharma B.V.	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1834130	perindopriil+indapamiid, 5mg+1,25mg	C09BA83	CO-PRENESSANEO, tablett, 30TK	KRKA, d.d., Novo mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1407248	perindopriil+indapamiid, 8mg+2,5mg	C09BA83	CO-PRENESSA, tablett, 30TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1458367	perindopriil+indapamiid, 8mg+2,5mg	C09BA83	PRENEWEL 8 MG/ 2,5 MG, tablett, 60TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1837155	perindopriil+indapamiid, 8mg+2,5mg	C09BA83	CO-PRENESSA, tablett, 30TK	Ideal Trade Links UAB	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1104680	pimekroliimus, 10mg 1g	D11AH02	ELIDEL, kreem, 15g 1TK	VIATRIS HEALTHCARE Limited	50						
1563454	pioglitasoon, 15mg	A10BG03	PIOGLITAZONE ACCORD, tablett, 28TK	Accord Healthcare S.L.U.	50						
					75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud
1498495	pioglitasoon, 30mg	A10BG03	ZIPION 30MG, tablett, 28TK	Zentiva k.s.	75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud
					50						
1563555	pioglitasoon, 30mg	A10BG03	PIOGLITAZONE ACCORD, tablett, 28TK	Accord Healthcare S.L.U.	50						
					75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud
1563757	pioglitasoon, 45mg	A10BG03	PIOGLITAZONE ACCORD, tablett, 28TK	Accord Healthcare S.L.U.	50						
					75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud
1813766	piratsetaam, 800mg	N06BX03	NOOTROPIL, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Ideal Trade Links UAB	50	G25.3-G25.3					
1826377	piratsetaam, 800mg	N06BX03	NOOTROPIL, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	First Pharma OÜ	50	G25.3-G25.3					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1829347	piratsetaam, 800mg	N06BX03	NOOTROPIL, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Lex Ano UAB	50	G25.3-G25.3					
1750856	pirfenidoon, 267mg	L04AX05	ESBRIET, õhukese polümeerikattega tablett, 252TK	H.A.C. Pharma	100	J84.1-J84.1	Pulmonoloog				patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=50% eeldatavast. Soodustus ei hõlma nintedaniibi ja pirfenidooni kombinatsioonravi.
1880434	pirfenidoon, 267mg	L04AX05	PIRFENIDONE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 252TK	Teva GmbH	100	J84.1-J84.1	Pulmonoloog				patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=50% eeldatavast. Soodustus ei hõlma nintedaniibi ja pirfenidooni kombinatsioonravi.
1897678	pirfenidoon, 267mg	L04AX05	PIRFENIDONE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 252TK	Accord Healthcare B.V.	100	J84.1-J84.1	Pulmonoloog				patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=50% eeldatavast. Soodustus ei hõlma nintedaniibi ja pirfenidooni kombinatsioonravi.
1750801	pirfenidoon, 801mg	L04AX05	ESBRIET, õhukese polümeerikattega tablett, 84TK	H.A.C. Pharma	100	J84.1-J84.1	Pulmonoloog				patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=50% eeldatavast. Soodustus ei hõlma nintedaniibi ja pirfenidooni kombinatsioonravi.
1880445	pirfenidoon, 801mg	L04AX05	PIRFENIDONE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 84TK	Teva GmbH	100	J84.1-J84.1	Pulmonoloog				patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=50% eeldatavast. Soodustus ei hõlma nintedaniibi ja pirfenidooni kombinatsioonravi.
1897689	pirfenidoon, 801mg	L04AX05	PIRFENIDONE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 84TK	Accord Healthcare B.V.	100	J84.1-J84.1	Pulmonoloog				patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=50% eeldatavast. Soodustus ei hõlma nintedaniibi ja pirfenidooni kombinatsioonravi.
1039889	piroksikaam, 20mg	M01AC01	BREXIN, tablett, 20TK	CHIESI Pharmaceuticals GmbH	50						
3076668	piroksikaam, 20mg	M01AC01	BREXIN, tablett, 20TK	Lex Ano UAB	50						
1271775	polüstüreensulfonaat, 949mg 1g	V03AE01	SORBISTERIT, suukaudse/rektaalsuspensiooni pulber, 500g 1TK	Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH	50						
					100	N18-N18					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3035618	pomalidomiid, 2mg	L04AX06	POMALIDOMIDE GRINDEKS, kõvakapsel, 21TK	Grindeks AS	100	C90.0-C90.0	Hematoloog				kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise pomalidomiidiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: kasutamine kombinatsioonis deksametasooniga retsidiveerunud, progresseerunud või refraktaarse hulgimüeloomiga täiskasvanud patsiendil, kelle eelnevad raviskeemid on sisaldanud bortesomiibi, talidomiidi (ainult vereloome tüvirakkude siirdamise näidustuseta patsiendid) ja lenalidomiidi, kuid kelle haigus on viimase ravikuuri ajal või 6 kuud pärast ravi lõpetamist progresseerunud või retsidiveerunud ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi)
3087615	pomalidomiid, 2mg	L04AX06	POMALIDOMIDE ZENTIVA, kõvakapsel, 21TK	Zentiva k.s.	100	C90.0-C90.0	Hematoloog				kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise pomalidomiidiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: kasutamine kombinatsioonis deksametasooniga retsidiveerunud, progresseerunud või refraktaarse hulgimüeloomiga täiskasvanud patsiendil, kelle eelnevad raviskeemid on sisaldanud bortesomiibi, talidomiidi (ainult vereloome tüvirakkude siirdamise näidustuseta patsiendid) ja lenalidomiidi, kuid kelle haigus on viimase ravikuuri ajal või 6 kuud pärast ravi lõpetamist progresseerunud või retsidiveerunud ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi)
1622225	pomalidomiid, 3mg	L04AX06	IMNOVID, kõvakapsel, 21TK	Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG	100	C90.0-C90.0	Hematoloog				kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise pomalidomiidiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: kasutamine kombinatsioonis deksametasooniga retsidiveerunud, progresseerunud või refraktaarse hulgimüeloomiga täiskasvanud patsiendil, kelle eelnevad raviskeemid on sisaldanud bortesomiibi, talidomiidi (ainult vereloome tüvirakkude siirdamise näidustuseta patsiendid) ja lenalidomiidi, kuid kelle haigus on viimase ravikuuri ajal või 6 kuud pärast ravi lõpetamist progresseerunud või retsidiveerunud ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi)

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3035629	pomalidomiid, 3mg	L04AX06	POMALIDOMIDE GRINDEKS, kõvakapsel, 21TK	Grindeks AS	100	C90.0-C90.0	Hematoloog				kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise pomalidomiidiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: kasutamine kombinatsioonis deksametasooniga retsidiveerunud, progresseerunud või refraktaarse hulgimüeloomiga täiskasvanud patsiendil, kelle eelnevad raviskeemid on sisaldanud bortesomiibi, talidomiidi (ainult vereloome tüvirakkude siirdamise näidustuseta patsiendid) ja lenalidomiidi, kuid kelle haigus on viimase ravikuuri ajal või 6 kuud pärast ravi lõpetamist progresseerunud või retsidiveerunud ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi)
1622236	pomalidomiid, 4mg	L04AX06	IMNOVID, kõvakapsel, 21TK	Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG	100	C90.0-C90.0	Hematoloog				kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise pomalidomiidiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: kasutamine kombinatsioonis deksametasooniga retsidiveerunud, progresseerunud või refraktaarse hulgimüeloomiga täiskasvanud patsiendil, kelle eelnevad raviskeemid on sisaldanud bortesomiibi, talidomiidi (ainult vereloome tüvirakkude siirdamise näidustuseta patsiendid) ja lenalidomiidi, kuid kelle haigus on viimase ravikuuri ajal või 6 kuud pärast ravi lõpetamist progresseerunud või retsidiveerunud ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi)
3035562	pomalidomiid, 4mg	L04AX06	POMALIDOMIDE STADA, kõvakapsel, 21TK	Stada Arzneimittel AG	100	C90.0-C90.0	Hematoloog				kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise pomalidomiidiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: kasutamine kombinatsioonis deksametasooniga retsidiveerunud, progresseerunud või refraktaarse hulgimüeloomiga täiskasvanud patsiendil, kelle eelnevad raviskeemid on sisaldanud bortesomiibi, talidomiidi (ainult vereloome tüvirakkude siirdamise näidustuseta patsiendid) ja lenalidomiidi, kuid kelle haigus on viimase ravikuuri ajal või 6 kuud pärast ravi lõpetamist progresseerunud või retsidiveerunud ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi)

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3035630	pomalidomiid, 4mg	L04AX06	POMALIDOMIDE GRINDEKS, kõvakapsel, 21TK	Grindeks AS	100	C90.0-C90.0	Hematoloog				kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise pomalidomiidiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: kasutamine kombinatsioonis deksametasooniga retsidiveerunud, progresseerunud või refraktaarse hulgimüeloomiga täiskasvanud patsiendil, kelle eelnevad raviskeemid on sisaldanud bortesomiibi, talidomiidi (ainult vereloome tüvirakkude siirdamise näidustuseta patsiendid) ja lenalidomiidi, kuid kelle haigus on viimase ravikuuri ajal või 6 kuud pärast ravi lõpetamist progresseerunud või retsidiveerunud ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi)
3046137	pomalidomiid, 4mg	L04AX06	POMALIDOMIDE OLPHA, kõvakapsel, 21TK	Olpha AS	100	C90.0-C90.0	Hematoloog				kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise pomalidomiidiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: kasutamine kombinatsioonis deksametasooniga retsidiveerunud, progresseerunud või refraktaarse hulgimüeloomiga täiskasvanud patsiendil, kelle eelnevad raviskeemid on sisaldanud bortesomiibi, talidomiidi (ainult vereloome tüvirakkude siirdamise näidustuseta patsiendid) ja lenalidomiidi, kuid kelle haigus on viimase ravikuuri ajal või 6 kuud pärast ravi lõpetamist progresseerunud või retsidiveerunud ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi)
3087693	pomalidomiid, 4mg	L04AX06	POMALIDOMIDE ZENTIVA, kõvakapsel, 21TK	Zentiva k.s.	100	C90.0-C90.0	Hematoloog				kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise pomalidomiidiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: kasutamine kombinatsioonis deksametasooniga retsidiveerunud, progresseerunud või refraktaarse hulgimüeloomiga täiskasvanud patsiendil, kelle eelnevad raviskeemid on sisaldanud bortesomiibi, talidomiidi (ainult vereloome tüvirakkude siirdamise näidustuseta patsiendid) ja lenalidomiidi, kuid kelle haigus on viimase ravikuuri ajal või 6 kuud pärast ravi lõpetamist progresseerunud või retsidiveerunud ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi)

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3088953	pomalidomiid, 4mg	L04AX06	POMALIDOMIDE ACCORD, kõvakapsel, 21TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	C90.0-C90.0	Hematoloog				kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise pomalidomiidiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: kasutamine kombinatsioonis deksametasooniga retsidiveerunud, progresseerunud või refraktaarse hulgimüeloomiga täiskasvanud patsiendil, kelle eelnevad raviskeemid on sisaldanud bortesomiibi, talidomiidi (ainult vereloome tüvirakkude siirdamise näidustuseta patsiendid) ja lenalidomiidi, kuid kelle haigus on viimase ravikuuri ajal või 6 kuud pärast ravi lõpetamist progresseerunud või retsidiveerunud ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi)
1856842	ponesimood, 20mg	L04AE04	PONVORY, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Laboratoires Juvise Pharmaceuticals	100	G35-G35	Neuroloog				konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel ägenemistega kulgeva hulgiskleroosi raviks
1863402	ponesimood, 2mg/3mg/4mg/5mg/6mg/7mg/8mg/9mg/10mg	L04AE04	PONVORY, õhukese polümeerikattega tablett, 2TK / 2TK / 2TK / 1TK / 1TK / 1TK / 1TK / 1TK / 3TK	Laboratoires Juvise Pharmaceuticals	100	G35-G35	Neuroloog				konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel ägenemistega kulgeva hulgiskleroosi raviks
1800627	posakonasool, 100mg	J02AC04	POSACONAZOLE ACCORD, gastroresistentne tablett, 24TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	B45-B45, B48.2-B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44-B44					vereloome tüvirakkude siirdamisega seotud transplantaat-peremehe-vastu haiguse, ägeda müeloidse leukeemia, ägeda lümfoblastse leukeemia või müelodüsplastilise sündroomi intensiivsest keemiaravist tingitud mükoosi profülaktikaks
1811124	posakonasool, 100mg	J02AC04	POSACONAZOLE STADA, gastroresistentne tablett, 24TK	Stada Arzneimittel AG	100	B45-B45, B48.2-B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44-B44					vereloome tüvirakkude siirdamisega seotud transplantaat-peremehe-vastu haiguse, ägeda müeloidse leukeemia, ägeda lümfoblastse leukeemia või müelodüsplastilise sündroomi intensiivsest keemiaravist tingitud mükoosi profülaktikaks
3098628	posakonasool, 100mg	J02AC04	POSACONAZOLE STADA, gastroresistentne tablett, 24TK	Ideal Trade Links UAB	100	B45-B45, B48.2-B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44-B44					vereloome tüvirakkude siirdamisega seotud transplantaat-peremehe-vastu haiguse, ägeda müeloidse leukeemia, ägeda lümfoblastse leukeemia või müelodüsplastilise sündroomi intensiivsest keemiaravist tingitud mükoosi profülaktikaks

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1800010	posakonasool, 40mg 1ml	J02AC04	POSACONAZOLE AHCL, suukaudne suspensioon, 105ml 1TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	B45-B45, B48.2-B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44-B44					vereloome tüvirakkude siirdamisega seotud transplantaat-peremehe-vastu haiguse, ägeda müeloidse leukeemia, ägeda lümfoblastse leukeemia või müelodüsplastilise sündroomi intensiivsest keemiaravist tingitud mükoosi profülaktikaks
1041253	pramipeksool, 0,18mg	N04BC05	MIRAPEXIN, tablett, 30TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						
1450998	pramipeksool, 0,26mg	N04BC05	MIRAPEXIN, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						
1451023	pramipeksool, 0,52mg	N04BC05	MIRAPEXIN, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1637210	pramipeksool, 0,52mg	N04BC05	OPRYMEA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	KRKA d.d. Novo mesto	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						
1041264	pramipeksool, 0,7mg	N04BC05	MIRAPEXIN, tablett, 30TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						
1373824	pramipeksool, 0,7mg	N04BC05	OPRYMEA, tablett, 30TK	KRKA d.d. Novo mesto	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						
1451067	pramipeksool, 1,05mg	N04BC05	MIRAPEXIN, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1637265	pramipeksool, 1,05mg	N04BC05	OPRYMEA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	KRKA d.d. Novo mesto	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1451135	pramipeksool, 2,1mg	N04BC05	MIRAPEXIN, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1637344	pramipeksool, 2,1mg	N04BC05	OPRYMEA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	KRKA d.d. Novo mesto	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1451168	pramipeksool, 3,15mg	N04BC05	MIRAPEXIN, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						
1118034	pravastatiin, 20mg	C10AA03	PRAVAHEXAL 20 MG, tablett, 30TK	Hexal AG	50						
					100	N18-N18					
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1065776	prednisoloon, 5mg	H02AB06	PREDNISOLON-RICHTER, tablett, 100TK	Gedeon Richter Plc.	75	L40-L40	Dermatovenerloog, Pediaater				

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					75	N00-N08	Nefroloog, Pediaater, Pediaater nefroloogi lisapädevusega				

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	E89.6-E89.6, E27-E27, E89.3-E89.3, E23-E23, E25-E25	Endokrinoloog, Pediaater, Pediaater endokrinoloogi lisapädevusega	esmane			

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					75	M05-M08, M30-M35, M45-M46	Pediaater, Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega	esmane			
					75	L12-L12, L23-L23, L13.0-L13.0, L10-L10, L20-L20	Dermatovenerol oog, Allergoloog-immunoloog, Pediaater, Pediaater allergoloogi lisapädevusega				
					50						
					100	C00-D48					
					100	G70-G70	Pediaater neuroloogi lisapädevusega, Pediaater, Neuroloog	esmane			
					100	D60-D64, D59-D59, D69-D69	Hematoloog, Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega, Pediaater	esmane			
					75	K50-K51, K73-K74	Gastroenteroloo g, Pediaater gastroenteroloog i lisapädevusega, Pediaater				
					75	J45-J45					
1031702	prednisoloon+salit süülhape, 0,2%+0,4%	D07XA8 1	ALPICORT, nahalahus, 100ml 1TK	Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel	50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1897803	prednisoloon+salit süülhape, 0,2%+0,4%	D07XA81	ALPICORT, nahalahus, 100ml 1TK	Ideal Trade Links UAB	50						
1208663	pregabaliin, 150mg	N02BF02	LYRICA, kõvakapsel, 56TK	Upjohn EESV	75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
1655513	pregabaliin, 150mg	N02BF02	PRAGIOLA, kõvakapsel, 14TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50						
1655546	pregabaliin, 150mg	N02BF02	PRAGIOLA, kõvakapsel, 56TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
1657829	pregabaliin, 150mg	N02BF02	BRIEKA, kõvakapsel, 56TK	Teva B.V.	75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50						
1693122	pregabaliin, 150mg	N02BF02	PREGABALIN ZENTIVA, kõvakapsel, 14TK	Zentiva k.s.	50						
					75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1693133	pregabaliin, 150mg	N02BF02	PREGABALIN ZENTIVA, kõvakapsel, 56TK	Zentiva k.s.	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
1695630	pregabaliin, 150mg	N02BF02	PREGABALIN ACCORD, kõvakapsel, 14TK	Accord Healthcare S.L.U.	50						
					75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
1695663	pregabaliin, 150mg	N02BF02	PREGABALIN ACCORD, kõvakapsel, 56TK	Accord Healthcare S.L.U.	75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
1766347	pregabaliin, 150mg	N02BF02	SIRANALEN, kõvakapsel, 14TK	Medochemie Limited	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
1766370	pregabaliin, 150mg	N02BF02	SIRANALEN, kõvakapsel, 56TK	Medochemie Limited	75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1820326	pregabaliin, 150mg	N02BF02	PRAGIOLA, kõvakapsel, 56TK	First Pharma OÜ	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50						
					75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
1848371	pregabaliin, 150mg	N02BF02	PRAGIOLA, kõvakapsel, 56TK	Ideal Trade Links UAB	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					50						
3015447	pregabaliin, 150mg	N02BF02	BULGAPLIN, kõvakapsel, 56TK	Orion Corporation	75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
1655760	pregabaliin, 300mg	N02BF02	PRAGIOLA, kõvakapsel, 14TK	KRKA, d.d., Novo mesto	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50						
					75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
1766415	pregabaliin, 300mg	N02BF02	SIRANALEN, kõvakapsel, 14TK	Medochemie Limited	75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1208584	pregabaliin, 75mg	N02BF02	LYRICA, kõvakapsel, 56TK	Upjohn EESV	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
1655355	pregabaliin, 75mg	N02BF02	PRAGIOLA, kõvakapsel, 14TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
1655388	pregabaliin, 75mg	N02BF02	PRAGIOLA, kõvakapsel, 56TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
1657740	pregabaliin, 75mg	N02BF02	BRIEKA, kõvakapsel, 56TK	Teva B.V.	75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50						
1693043	pregabaliin, 75mg	N02BF02	PREGABALIN ZENTIVA, kõvakapsel, 14TK	Zentiva k.s.	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1693065	pregabaliin, 75mg	N02BF02	PREGABALIN ZENTIVA, kõvakapsel, 56TK	Zentiva k.s.	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
1695438	pregabaliin, 75mg	N02BF02	PREGABALIN ACCORD, kõvakapsel, 14TK	Accord Healthcare S.L.U.	75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50						
1695461	pregabaliin, 75mg	N02BF02	PREGABALIN ACCORD, kõvakapsel, 56TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					50						
1766303	pregabaliin, 75mg	N02BF02	SIRANALEN, kõvakapsel, 56TK	Medochemie Limited	75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
3015245	pregabaliin, 75mg	N02BF02	BULGAPLIN, kõvakapsel, 56TK	Orion Corporation	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					50						
1077027	primidoon, 250mg	N03AA03	LISKANTIN, tablett, 100TK	Desitin Arzneimittel GmbH	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
1020126	propafenoon, 150mg	C01BC03	RYTMONORM, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	Viatris SIA	50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1044526	propafenoon, 150mg	C01BC03	PROPANORM 150 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	Pro.Med.Cs Praha a.s.	50						
1704833	propafenoon, 150mg	C01BC03	PROPAFENONE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Accord Healthcare B.V.	50						
3132469	propafenoon, 150mg	C01BC03	RYTMONORM, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	Ideal Trade Links UAB	50						
1020137	propafenoon, 300mg	C01BC03	RYTMONORM, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	Viatris SIA	50						
1704888	propafenoon, 300mg	C01BC03	PROPAFENONE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Accord Healthcare B.V.	50						
3132492	propafenoon, 300mg	C01BC03	RYTMONORM, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	Ideal Trade Links UAB	50						
1053223	propranolool, 40mg	C07AA05	PROPRA-RATIOPHARM 40 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	Ratiopharm GmbH	50						
					75	G43-G43, I47-I49, I15-I15, I10-I13					
1596944	propranolool, 40mg	C07AA05	PROPRANOLOL ACCORD 40MG, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	Accord Healthcare B.V.	75	G43-G43, I47-I49, I15-I15, I10-I13					
					50						
1141311	pseudoefedriin+tsetirisiin, 120mg+5mg	R01BA93	CIRRUS, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 14TK	UCB Pharma Oy Finland	50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1074451	püridostigmiinbromiid, 60mg	N07AA02	KALYMIN 60 N, tablett, 100TK	Teva Pharma B.V.	50						
					100	G70-G70	Neuroloog, Pediaater, Pediaater neuroloogi lisapädevusega	esmane			
1664647	püridostigmiinbromiid, 60mg	N07AA02	MESTINON, kaetud tablett, 150TK	VIATRIS HEALTHCARE Limited	100	G70-G70	Neuroloog, Pediaater, Pediaater neuroloogi lisapädevusega	esmane			
					50						
1865189	püridostigmiinbromiid, 60mg	N07AA02	KALYMIN 60 N, tablett, 100TK	Ideal Trade Links UAB	100	G70-G70	Neuroloog, Pediaater neuroloogi lisapädevusega, Pediaater	esmane			
					50						
3107876	püridostigmiinbromiid, 60mg	N07AA02	KALYMIN 60 N, tablett, 100TK	Lex Ano UAB	50						
					100	G70-G70	Neuroloog, Pediaater neuroloogi lisapädevusega, Pediaater	esmane			
1750553	raltegraviir, 600mg	J05AJ01	ISENTRESS, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Merck Sharp & Dohme B.V.	100	Z20.6-Z20.6	Infektsionist				kombinatsioonis tenofoviirdisoproksiil+emtritsitabiiniga kokkupuute-järgseks (PEP) profülaktiliseks raviks HIV-infektsiooni nakatumise vältimiseks kuni 30 päevaks v.a tööülesannete täitmisega seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega
1059218	ramipriil, 10mg	C09AA05	CARDACE, tablett, 28TK	Sanofi Winthrop Industrie	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1153527	ramipriil, 10mg	C09AA05	RAMICOR 10 MG, tablett, 30TK	Hexal AG	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1169939	ramipriil, 10mg	C09AA05	RAMIPRIL ACTAVIS 10MG, tablett, 28TK	Teva B.V.	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1190078	ramipriil, 10mg	C09AA05	AMPRIL 10 MG, tablett, 30TK	KRKA, d.d., Novo mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1190090	ramipriil, 10mg	C09AA05	AMPRIL 10 MG, tablett, 60TK	KRKA, d.d., Novo mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1217977	ramipriil, 10mg	C09AA05	RAMICOR 10 MG, tablett, 60TK	Hexal AG	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1502345	ramipriil, 10mg	C09AA05	CARDACE, tablett, 56TK	Sanofi Winthrop Industrie	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1583423	ramipriil, 10mg	C09AA05	RAMIPRIL ACTAVIS 10MG, tablett, 90TK	Teva B.V.	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
3063574	ramipriil, 10mg	C09AA05	CARDACE, tablett, 56TK	Ideal Trade Links UAB	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1005826	ramipriil, 2,5mg	C09AA05	CARDACE 2,5 MG, tablett, 28TK	Sanofi Winthrop Industrie	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1074743	ramipriil, 2,5mg	C09AA05	CARDACE 2,5 MG, tablett, 98TK	Sanofi Winthrop Industrie	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1153381	ramipriil, 2,5mg	C09AA05	RAMICOR 2,5 MG, tablett, 30TK	Hexal AG	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1189953	ramipriil, 2,5mg	C09AA05	AMPRIL 2,5 MG, tablett, 30TK	KRKA, d.d., Novo mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1005859	ramipriil, 5mg	C09AA05	CARDACE 5 MG, tablett, 28TK	Sanofi Winthrop Industrie	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1074754	ramipriil, 5mg	C09AA05	CARDACE 5 MG, tablett, 98TK	Sanofi Winthrop Industrie	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1153459	ramipriil, 5mg	C09AA05	RAMICOR 5 MG, tablett, 30TK	Hexal AG	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1169849	ramipriil, 5mg	C09AA05	RAMIPRIL ACTAVIS 5MG, tablett, 28TK	Teva B.V.	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1190034	ramipriil, 5mg	C09AA05	AMPRIL 5 MG, tablett, 30TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1190056	ramipriil, 5mg	C09AA05	AMPRIL 5 MG, tablett, 60TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1217966	ramipriil, 5mg	C09AA05	RAMICOR 5 MG, tablett, 60TK	Hexal AG	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1502198	ramipriil, 5mg	C09AA05	CARDACE 5 MG, tablett, 56TK	Sanofi Winthrop Industrie	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1583412	ramipriil, 5mg	C09AA05	RAMIPRIL ACTAVIS 5MG, tablett, 90TK	Teva B.V.	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1510467	ramipriil+amlodipiin, 10mg+10mg	C09BB07	RAMDACORDIA, kõvakapsel, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	I20-I20, I50-I50, I10-I13, I15-I15					
1855627	ramipriil+amlodipiin, 10mg+10mg	C09BB07	RAMIPRIL/AMLODIPINE SANDOZ, kõvakapsel, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	I20-I20, I50-I50, I10-I13, I15-I15					
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1510388	ramipriil+amlodipiin, 10mg+5mg	C09BB07	RAMDACORDIA, kõvakapsel, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	I20-I20, I50-I50, I10-I13, I15-I15					
1510423	ramipriil+amlodipiin, 5mg+10mg	C09BB07	RAMDACORDIA, kõvakapsel, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	I20-I20, I50-I50, I10-I13, I15-I15					
1855481	ramipriil+amlodipiin, 5mg+10mg	C09BB07	RAMIPRIL/AMLODIPINE SANDOZ, kõvakapsel, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	I20-I20, I50-I50, I10-I13, I15-I15					
					50						
1510344	ramipriil+amlodipiin, 5mg+5mg	C09BB07	RAMDACORDIA, kõvakapsel, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	I20-I20, I50-I50, I10-I13, I15-I15					
					50						
1512953	ramipriil+hüdroklorotiasiid, 10mg+12,5mg	C09BA84	CARDACE FORTE, tablett, 56TK	Sanofi Winthrop Industrie	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1881738	ramipriil+hüdroklorotiasiid, 10mg+25mg	C09BA84	CARDACE FORTE, tablett, 56TK	First Pharma OÜ	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1881749	ramipriil+hüdroklorotiasiid, 10mg+25mg	C09BA84	CARDACE FORTE, tablett, 60TK	First Pharma OÜ	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1113657	ramipriil+hüdroklorotiasiid, 2,5mg+12,5mg	C09BA84	CO-RAMICOR 2,5 MG/12,5 MG, tablett, 30TK	Hexal AG	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1190269	ramipriil+hüdroklorotiasiid, 2,5mg+12,5mg	C09BA84	AMPRIL HL 2,5MG/12,5MG, tablett, 30TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1113680	ramipriil+hüdroklorotiasiid, 5mg+25mg	C09BA84	CO-RAMICOR 5 MG/25 MG, tablett, 30TK	Hexal AG	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1141715	ramipriil+hüdroklorotiasiid, 5mg+25mg	C09BA84	CARDACE PLUS, tablett, 28TK	Sanofi Winthrop Industrie	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1190179	ramipriil+hüdroklor otiasiid, 5mg+25mg	C09BA84	AMPRIL HD 5MG/25MG, tablett, 30TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1881637	ramipriil+hüdroklor otiasiid, 5mg+25mg	C09BA84	CARDACE PLUS, tablett, 56TK	First Pharma OÜ	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1361652	ranolasiin, 375mg	C01EB18	RANEXA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	75	I20-I20	Sisearst, Kardioloog	esmane			III-IV funktsionaalse klassi stenokardia esineb vaatamata adekvaatsele antiisheemilisele ravile (beeta-adrenoblokaator, kaltsiumikanali blokaator ja pika toimega nitropreparaat) või need ravimid on vastunäidustatud ja on teostatud koronaarhaiguse invasiivne uurimine ning võimalusel revaskulariseerimine
1859081	ranolasiin, 375mg	C01EB18	RANOLAZINE STADA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	Stada Arzneimittel AG	75	I20-I20	Kardioloog, Sisearst	esmane			III-IV funktsionaalse klassi stenokardia esineb vaatamata adekvaatsele antiisheemilisele ravile (beeta-adrenoblokaator, kaltsiumikanali blokaator ja pika toimega nitropreparaat) või need ravimid on vastunäidustatud ja on teostatud koronaarhaiguse invasiivne uurimine ning võimalusel revaskulariseerimine
1869138	ranolasiin, 375mg	C01EB18	TEZULIX, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	KRKA, d.d., Novo mesto	75	I20-I20	Kardioloog, Sisearst	esmane			III-IV funktsionaalse klassi stenokardia esineb vaatamata adekvaatsele antiisheemilisele ravile (beeta-adrenoblokaator, kaltsiumikanali blokaator ja pika toimega nitropreparaat) või need ravimid on vastunäidustatud ja on teostatud koronaarhaiguse invasiivne uurimine ning võimalusel revaskulariseerimine
3118722	ranolasiin, 375mg	C01EB18	RANEXA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	75	I20-I20	Kardioloog, Sisearst	esmane			III-IV funktsionaalse klassi stenokardia esineb vaatamata adekvaatsele antiisheemilisele ravile (beeta-adrenoblokaator, kaltsiumikanali blokaator ja pika toimega nitropreparaat) või need ravimid on vastunäidustatud ja on teostatud koronaarhaiguse invasiivne uurimine ning võimalusel revaskulariseerimine
3133101	ranolasiin, 375mg	C01EB18	RANEXA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	75	I20-I20	Sisearst, Kardioloog	esmane			III-IV funktsionaalse klassi stenokardia esineb vaatamata adekvaatsele antiisheemilisele ravile (beeta-adrenoblokaator, kaltsiumikanali blokaator ja pika toimega nitropreparaat) või need ravimid on vastunäidustatud ja on teostatud koronaarhaiguse invasiivne uurimine ning võimalusel revaskulariseerimine

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3140301	ranolasiin, 375mg	C01EB18	RANEXA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	75	I20-I20	Sisearst, Kardioloog	esmane			III-IV funktsionaalse klassi stenokardia esineb vaatamata adekvaatsele antiisheemilisele ravile (beeta-adrenoblokaator, kaltsiumikanali blokaator ja pika toimega nitropreparaat) või need ravimid on vastunäidustatud ja on teostatud koronaarhaiguse invasiivne uurimine ning võimalusel revaskulariseerimine
1361674	ranolasiin, 500mg	C01EB18	RANEXA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	75	I20-I20	Kardioloog, Sisearst	esmane			III-IV funktsionaalse klassi stenokardia esineb vaatamata adekvaatsele antiisheemilisele ravile (beeta-adrenoblokaator, kaltsiumikanali blokaator ja pika toimega nitropreparaat) või need ravimid on vastunäidustatud ja on teostatud koronaarhaiguse invasiivne uurimine ning võimalusel revaskulariseerimine
1859115	ranolasiin, 500mg	C01EB18	RANOLAZINE STADA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	Stada Arzneimittel AG	75	I20-I20	Sisearst, Kardioloog	esmane			III-IV funktsionaalse klassi stenokardia esineb vaatamata adekvaatsele antiisheemilisele ravile (beeta-adrenoblokaator, kaltsiumikanali blokaator ja pika toimega nitropreparaat) või need ravimid on vastunäidustatud ja on teostatud koronaarhaiguse invasiivne uurimine ning võimalusel revaskulariseerimine
1869161	ranolasiin, 500mg	C01EB18	TEZULIX, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	KRKA, d.d., Novo mesto	75	I20-I20	Sisearst, Kardioloog	esmane			III-IV funktsionaalse klassi stenokardia esineb vaatamata adekvaatsele antiisheemilisele ravile (beeta-adrenoblokaator, kaltsiumikanali blokaator ja pika toimega nitropreparaat) või need ravimid on vastunäidustatud ja on teostatud koronaarhaiguse invasiivne uurimine ning võimalusel revaskulariseerimine
3133112	ranolasiin, 500mg	C01EB18	RANEXA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	75	I20-I20	Kardioloog, Sisearst	esmane			III-IV funktsionaalse klassi stenokardia esineb vaatamata adekvaatsele antiisheemilisele ravile (beeta-adrenoblokaator, kaltsiumikanali blokaator ja pika toimega nitropreparaat) või need ravimid on vastunäidustatud ja on teostatud koronaarhaiguse invasiivne uurimine ning võimalusel revaskulariseerimine
3140334	ranolasiin, 500mg	C01EB18	RANEXA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	75	I20-I20	Kardioloog, Sisearst	esmane			III-IV funktsionaalse klassi stenokardia esineb vaatamata adekvaatsele antiisheemilisele ravile (beeta-adrenoblokaator, kaltsiumikanali blokaator ja pika toimega nitropreparaat) või need ravimid on vastunäidustatud ja on teostatud koronaarhaiguse invasiivne uurimine ning võimalusel revaskulariseerimine

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1361685	ranolasiin, 750mg	C01EB18	RANEXA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	75	I20-I20	Kardioloog, Sisearst	esmane			III-IV funktsionaalse klassi stenokardia esineb vaatamata adekvaatsele antiisheemilisele ravile (beeta-adrenoblokaator, kaltsiumikanali blokaator ja pika toimega nitropreparaat) või need ravimid on vastunäidustatud ja on teostatud koronaarhaiguse invasiivne uurimine ning võimalusel revaskulariseerimine
1859148	ranolasiin, 750mg	C01EB18	RANOLAZINE STADA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	Stada Arzneimittel AG	75	I20-I20	Kardioloog, Sisearst	esmane			III-IV funktsionaalse klassi stenokardia esineb vaatamata adekvaatsele antiisheemilisele ravile (beeta-adrenoblokaator, kaltsiumikanali blokaator ja pika toimega nitropreparaat) või need ravimid on vastunäidustatud ja on teostatud koronaarhaiguse invasiivne uurimine ning võimalusel revaskulariseerimine
1869194	ranolasiin, 750mg	C01EB18	TEZULIX, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	KRKA, d.d., Novo mesto	75	I20-I20	Kardioloog, Sisearst	esmane			III-IV funktsionaalse klassi stenokardia esineb vaatamata adekvaatsele antiisheemilisele ravile (beeta-adrenoblokaator, kaltsiumikanali blokaator ja pika toimega nitropreparaat) või need ravimid on vastunäidustatud ja on teostatud koronaarhaiguse invasiivne uurimine ning võimalusel revaskulariseerimine
3133123	ranolasiin, 750mg	C01EB18	RANEXA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	75	I20-I20	Kardioloog, Sisearst	esmane			III-IV funktsionaalse klassi stenokardia esineb vaatamata adekvaatsele antiisheemilisele ravile (beeta-adrenoblokaator, kaltsiumikanali blokaator ja pika toimega nitropreparaat) või need ravimid on vastunäidustatud ja on teostatud koronaarhaiguse invasiivne uurimine ning võimalusel revaskulariseerimine
3140356	ranolasiin, 750mg	C01EB18	RANEXA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	75	I20-I20	Kardioloog, Sisearst	esmane			III-IV funktsionaalse klassi stenokardia esineb vaatamata adekvaatsele antiisheemilisele ravile (beeta-adrenoblokaator, kaltsiumikanali blokaator ja pika toimega nitropreparaat) või need ravimid on vastunäidustatud ja on teostatud koronaarhaiguse invasiivne uurimine ning võimalusel revaskulariseerimine
1203422	rasagiliin, 1mg	N04BD02	AZILECT, tablett, 28TK	Teva B.V.	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						
1678215	rasagiliin, 1mg	N04BD02	RALAGO, tablett, 30TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						
1679272	rasagiliin, 1mg	N04BD02	SAGILIA, tablett, 30TK	Medochemie Limited	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1011036	raud(III)hüdroksiid-polümaltooskompleks, 100mg	B03AB80	FERRUM LEK, närimistablett, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	D50-D50					rasedatele
					50	D50-D50				3,00	
1011025	raud(III)hüdroksiid-polümaltooskompleks, 10mg 1ml	B03AB80	FERRUM LEK, siirup, 100ml 1TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	D50-D50					rasedatele
					50	D50-D50				3,00	
1883134	relugoliks, 120mg	L02BX04	ORGOVYX, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	C61-C61	Uroloog, Onkoloog				lokaalse või lokaalselt levinud kõrge riskiga (kliiniline staadium >=T2c või Gleasoni skoor 8-10 või PSA >=20 ng/ml või regionaalsete lümfisõlmede haaratus või positiivne resektsioonipiir) multimodaalse ravi osana kuni 2 aasta vältel ning metastaseerunud eesnäärmevähiga patsientidele
1858103	relugoliks+östradiol+noretisteroon, 40mg+1mg+0,5mg	H01CC54	RYEQO, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Gedeon Richter Plc.	75	N80-N80	Günekoloog				endometrioosi sümptomaatiliseks raviks naistele, keda on eelnevalt ravitud endometrioosi ravimitega või kirurgiliselt
					75	D25-D25	Günekoloog	esmane			mõõdukate kuni raskete sümptomitega patsientidele, kellel esmavaliku ravimid (traneksaamhape, hormonaalsed kontratseptiivid, emakasisesed rasestumisvastased vahendid) on ebaefektiivsed või talumatud.
1752409	ribotsikliib, 200mg	L01EF02	KISQALI, õhukese polümeerikattega tablett, 42TK	Novartis Europharm Limited	100	C50-C50	Onkoloog				kombinatsioonis aromataasi inhibiitoriga varajase rinnavähi adjuvantraviks patsiendile, kellel on hormoonretseptor-positiivne (HR+), inimese epidermaalse kasvufaktori retseptor 2 (HER2)-negatiivne ja kõrge retsidiveerumisriskiga varajane rinnavähk. Ravi kestab kuni kolm aastat või kuni haiguse progresseerumiseni ja/või vastuvõetamatu toksilisuse tekkimiseni
					100	C50-C50	Onkoloog				hormoonretseptor (HR)-positiivse, inimese epidermaalse kasvufaktori retseptor 2 (HER2)-negatiivse, lokaalselt kaugelearenenud või metastaatilise rinnavähi I rea raviks kombinatsioonis aromataasi inhibiitoriga patsiendile kuni haiguse progresseerumiseni ning kombinatsioonis fulvestrandiga I rea raviks kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle haigus on adjuvantse või neoadjuvantse aromataasi inhibiitori foonil või 12 kuud pärast selle lõpetamist progresseerunud ning kombinatsioonis fulvestrandiga II rea raviks kuni haiguse progresseerumiseni patsientidele, kes ei ole varasemalt ravi CDK-4/6 inibiitoritega saanud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1752410	ribotsikliib, 200mg	L01EF02	KISQALI, õhukese polümeerikattega tablett, 63TK	Novartis Europharm Limited	100	C50-C50	Onkoloog				hormoonretseptor (HR)-positiivse, inimese epidermaalse kasvufaktori retseptor 2 (HER2)-negatiivse, lokaalselt kaugelearenenud või metastaatilise rinnavähi I rea raviks kombinatsioonis aromataasi inhibiitoriga patsiendile kuni haiguse progresseerumiseni ning kombinatsioonis fulvestrandiga I rea raviks kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle haigus on adjuvantse või neoadjuvantse aromataasi inhibiitori foonil või 12 kuud pärast selle lõpetamist progresseerunud ning kombinatsioonis fulvestrandiga II rea raviks kuni haiguse progresseerumiseni patsientidele, kes ei ole varasemalt ravi CDK-4/6 inibiitoritega saanud
					100	C50-C50	Onkoloog				kombinatsioonis aromataasi inhibiitoriga varajase rinnavähi adjuvantraviks patsiendile, kellel on hormoonretseptor-positiivne (HR+), inimese epidermaalse kasvufaktori retseptor 2 (HER2)-negatiivne ja kõrge retsidiveerumisriskiga varajane rinnavähk. Ravi kestab kuni kolm aastat või kuni haiguse progresseerumiseni ja/või vastuvõetamatu toksilisuse tekkimiseni
1035289	rilusool, 50mg	N07XX02	RILUTEK, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Sanofi Winthrop Industrie	50						
					100	G12.2-G12.2	Neuroloog	esmane			mehhaanilise ventilatsiooni vajaduseta patsientidele
3092295	rilusool, 50mg	N07XX02	RILUTEK, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Sanofi Winthrop Industrie	50						
					100	G12.2-G12.2	Neuroloog	esmane			mehhaanilise ventilatsiooni vajaduseta patsientidele
3146677	rilusool, 50mg	N07XX02	RILUTEK, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Sanofi Winthrop Industrie	100	G12.2-G12.2	Neuroloog	esmane			mehhaanilise ventilatsiooni vajaduseta patsientidele
					50						
1882144	rimegepant, 75mg	N02CD06	VYDURA, suukaudne lüofilisaat, 8TK	Pfizer Europe MA EEIG	75	G43-G43					auraga või aurata migreeni akuutseks raviks täiskasvanutel, kellel on ebaõnnestunud 2 või enam triptaanravi
1882155	rimegepant, 75mg	N02CD06	VYDURA, suukaudne lüofilisaat, 2TK	Pfizer Europe MA EEIG	75	G43-G43					auraga või aurata migreeni akuutseks raviks täiskasvanutel, kellel on ebaõnnestunud 2 või enam triptaanravi

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1644375	riotsiguaat, 0,5mg	C02KX05	ADEMPAS, õhukese polümeerikattega tablett, 42TK	Bayer AG	100	I27.0-I27.0	Kardioloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater, Pulmonoloog, Reumatoloog, Pediaater kardioloogi lisapädevusega				konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel kroonilise trombemboolilise pulmonaalhüpertensiooniga patsiendile, kellel kirurgiline ravi ei ole teostatav või kellel haigus kirurgilise ravi järel püsib või taastekib ning kelle seisund vastab NYHA III-IV funktsionaalsele klassile
1644432	riotsiguaat, 1,5mg	C02KX05	ADEMPAS, õhukese polümeerikattega tablett, 42TK	Bayer AG	100	I27.0-I27.0	Reumatoloog, Pulmonoloog, Pediaater kardioloogi lisapädevusega, Kardioloog, Pediaater, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega				konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel kroonilise trombemboolilise pulmonaalhüpertensiooniga patsiendile, kellel kirurgiline ravi ei ole teostatav või kellel haigus kirurgilise ravi järel püsib või taastekib ning kelle seisund vastab NYHA III-IV funktsionaalsele klassile
1644409	riotsiguaat, 1mg	C02KX05	ADEMPAS, õhukese polümeerikattega tablett, 42TK	Bayer AG	100	I27.0-I27.0	Reumatoloog, Pediaater kardioloogi lisapädevusega, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater, Pulmonoloog, Kardioloog				konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel kroonilise trombemboolilise pulmonaalhüpertensiooniga patsiendile, kellel kirurgiline ravi ei ole teostatav või kellel haigus kirurgilise ravi järel püsib või taastekib ning kelle seisund vastab NYHA III-IV funktsionaalsele klassile

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3042953	riotsiguaat, 1mg	C02KX05	ADEMPAS, õhukese polümeerikattega tablett, 42TK	Bayer AG	100	I27.0-I27.0	Kardioloog, Pediaater kardioloogi lisapädevusega, Reumatoloog, Pulmonoloog, Pediaater, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega				konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel kroonilise trombemboolilise pulmonaalhüpertensiooniga patsiendile, kellel kirurgiline ravi ei ole teostatav või kellel haigus kirurgilise ravi järel püsib või taastekib ning kelle seisund vastab NYHA III-IV funktsionaalsele klassile
1644498	riotsiguaat, 2,5mg	C02KX05	ADEMPAS, õhukese polümeerikattega tablett, 42TK	Bayer AG	100	I27.0-I27.0	Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater, Reumatoloog, Pulmonoloog, Pediaater kardioloogi lisapädevusega, Kardioloog				konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel kroonilise trombemboolilise pulmonaalhüpertensiooniga patsiendile, kellel kirurgiline ravi ei ole teostatav või kellel haigus kirurgilise ravi järel püsib või taastekib ning kelle seisund vastab NYHA III-IV funktsionaalsele klassile
3042942	riotsiguaat, 2,5mg	C02KX05	ADEMPAS, õhukese polümeerikattega tablett, 42TK	Bayer AG	100	I27.0-I27.0	Kardioloog, Pediaater, Pediaater kardioloogi lisapädevusega, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pulmonoloog, Reumatoloog				konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel kroonilise trombemboolilise pulmonaalhüpertensiooniga patsiendile, kellel kirurgiline ravi ei ole teostatav või kellel haigus kirurgilise ravi järel püsib või taastekib ning kelle seisund vastab NYHA III-IV funktsionaalsele klassile

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1644465	riotsiguaat, 2mg	C02KX05	ADEMPAS, õhukese polümeerikattega tablett, 42TK	Bayer AG	100	I27.0-I27.0	Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater kardioloogi lisapädevusega, Reumatoloog, Pediaater, Pulmonoloog, Kardioloog				konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel kroonilise trombemboolilise pulmonaalhüpertensiooniga patsiendile, kellel kirurgiline ravi ei ole teostatav või kellel haigus kirurgilise ravi järel püsib või taastekib ning kelle seisund vastab NYHA III-IV funktsionaalsele klassile
3042931	riotsiguaat, 2mg	C02KX05	ADEMPAS, õhukese polümeerikattega tablett, 42TK	Bayer AG	100	I27.0-I27.0	Pediaater, Pulmonoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Kardioloog, Pediaater kardioloogi lisapädevusega, Reumatoloog				konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel kroonilise trombemboolilise pulmonaalhüpertensiooniga patsiendile, kellel kirurgiline ravi ei ole teostatav või kellel haigus kirurgilise ravi järel püsib või taastekib ning kelle seisund vastab NYHA III-IV funktsionaalsele klassile
1848438	risankizumab, 150mg 1ml	L04AC18	SKYRIZI, süstelahus pen-süstlis, 1ml 1TK	AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG	100	L40-L40	Pediaater, Dermatovenereloog				patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus L40 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori ja ustekinumabi kasutamine vastunäidustatud
					100	M07.0-M07.3	Reumatoloog, Pediaater, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega				ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus M07.0-3 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori ja ustekinumabi kasutamine vastunäidustatud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1845446	risdiplaam, 0,75mg 1ml	M09AX10	EVRYSDI, suukaudse lahuse pulber, 80ml 1TK	Roche Registration GmbH	100	G12.0-G12.0, G12.1-G12.1	Pediaater neuroloogi lisapädevusega, Neuroloog				geneetiliselt kinnitatud 5q spinaalse lihasatroofia raviks patsiendile, kellel on määratud kuni 4 SMN2 geenikoopiat ja diagnoositud I, II või III tüüpi SMA ning kes on ravi alustamisel alla 26-aastane ning ei vaja püsiventilatsiooni. Ravi alustamise ja lõpetamise otsuse on langetanud arstide eksperdikomisjon (kaks lasteneuroloogi või neuroloogi ja geneetik) ning patsient on SMA ravimise kogemusega lasteneuroloogi või neuroloogi jälgimisel. Ravivastuse hindamine toimub iga kolme kuu tagant. Ravi lõpetatakse püsiventilatsiooni vajaduse tekkel või kui ilmneb motoorsete funktsioonide kliiniliselt oluline halvenemine mõõdetuna motoorsete funktsioonide hindamise skaalal (I tüübi korral HINE-2 või CHOP-INTEND ning II-III tüübi korral MFM32, RULM või HFMSE alusel)
3120545	risdiplaam, 5mg	M09AX10	EVRYSDI, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Roche Registration GmbH	100	G12.0-G12.0, G12.1-G12.1	Neuroloog, Pediaater neuroloogi lisapädevusega				geneetiliselt kinnitatud 5q spinaalse lihasatroofia raviks patsiendile, kellel on määratud kuni 4 SMN2 geenikoopiat ja diagnoositud I, II või III tüüpi SMA ning kes on ravi alustamisel alla 26-aastane ning ei vaja püsiventilatsiooni. Ravi alustamise ja lõpetamise otsuse on langetanud arstide eksperdikomisjon (kaks lasteneuroloogi või neuroloogi ja geneetik) ning patsient on SMA ravimise kogemusega lasteneuroloogi või neuroloogi jälgimisel. Ravivastuse hindamine toimub iga kolme kuu tagant. Ravi lõpetatakse püsiventilatsiooni vajaduse tekkel või kui ilmneb motoorsete funktsioonide kliiniliselt oluline halvenemine mõõdetuna motoorsete funktsioonide hindamise skaalal (I tüübi korral HINE-2 või CHOP-INTEND ning II-III tüübi korral MFM32, RULM või HFMSE alusel)
1060456	risperidoon, 1mg	N05AX08	RISPOLEPT 1 mg, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Johnson & Johnson UAB	100	F32.3-F32.3, F33.3-F33.3	Psühhiaater	esmane			
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1271258	risperidoon, 1mg	N05AX08	MEDORISPER, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Medochemie Limited	100	F32.3-F32.3, F33.3-F33.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
1041028	risperidoon, 1mg 1ml	N05AX08	RISPOLEPT, suukaudne lahus, 100ml 1TK	Johnson & Johnson UAB	100	F20-F29	Psühhiaater				
					100	F32.3-F32.3, F33.3-F33.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1151974	risperidoon, 2mg	N05AX08	RISPERIDON ACTAVIS 2MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Teva B.V.	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					100	F32.3-F32.3, F33.3-F33.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1271337	risperidoon, 2mg	N05AX08	MEDORISPER, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Medochemie Limited	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					100	F32.3-F32.3, F33.3-F33.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1067521	risperidoon, 3mg	N05AX08	RISPOLEPT 3 mg, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Johnson & Johnson UAB	100	F32.3-F32.3, F33.3-F33.3	Psühhiaater	esmane			
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					50						
1271416	risperidoon, 3mg	N05AX08	MEDORISPER, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Medochemie Limited	100	F32.3-F32.3, F33.3-F33.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
1152010	risperidoon, 4mg	N05AX08	RISPERIDON ACTAVIS 4MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Teva B.V.	100	F32.3-F32.3, F33.3-F33.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1381665	rivaroksabaan, 10mg	B01AF01	XARELTO, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Bayer AG	75	I80-I82, M16-M17, S72.7-S72.7, S72.0-S72.2, I67.6-I67.6, I26-I26					
					100	I26-I26, I67.6-I67.6, I80-I82					kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
					50						
1381676	rivaroksabaan, 10mg	B01AF01	XARELTO, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Bayer AG	75	I80-I82, M16-M17, S72.7-S72.7, S72.0-S72.2, I67.6-I67.6, I26-I26					
					100	I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6					kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
					50						
1729818	rivaroksabaan, 10mg	B01AF01	RUNAPLAX, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	100	I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6					kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
					50						
					75	I80-I82, M16-M17, S72.7-S72.7, S72.0-S72.2, I67.6-I67.6, I26-I26					
1791828	rivaroksabaan, 10mg	B01AF01	RIVAROXABAN TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva GmbH	100	I26-I26, I67.6-I67.6, I80-I82					kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
					75	I80-I82, M16-M17, S72.7-S72.7, S72.0-S72.2, I67.6-I67.6, I26-I26					
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1793448	rivaroksabaan, 10mg	B01AF01	XERDOXO, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	75	I80-I82, M16-M17, S72.7-S72.7, S72.0-S72.2, I67.6-I67.6, I26-I26					
					100	I26-I26, I67.6-I67.6, I80-I82					kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
					50						
1813182	rivaroksabaan, 10mg	B01AF01	RIVAROXABAN G.L. PHARMA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	G.L. Pharma GmbH	100	I26-I26, I67.6-I67.6, I80-I82					kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
					50						
					75	I80-I82, M16-M17, S72.7-S72.7, S72.0-S72.2, I67.6-I67.6, I26-I26					
1844366	rivaroksabaan, 10mg	B01AF01	RIVAROXABAN STADA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Stada Arzneimittel AG	100	I80-I82, I26-I26, I67.6-I67.6					kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
					50						
					75	I80-I82, M16-M17, S72.7-S72.7, S72.0-S72.2, I67.6-I67.6, I26-I26					
1850341	rivaroksabaan, 10mg	B01AF01	KARDATUXAN, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Gedeon Richter Plc.	75	I80-I82, M16-M17, S72.7-S72.7, S72.0-S72.2, I67.6-I67.6, I26-I26					
					50						
					100	I80-I82, I26-I26, I67.6-I67.6					kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3055621	rivaroksabaan, 10mg	B01AF01	RIVAROXABAN VIATRIS, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Viatris Limited	75	I80-I82, M16-M17, S72.7-S72.7, S72.0-S72.2, I67.6-I67.6, I26-I26					
					50						
					100	I26-I26, I67.6-I67.6, I80-I82					kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
1552621	rivaroksabaan, 15mg	B01AF01	XARELTO, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Bayer AG	50						
					100	I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6					kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
					75	I48-I48, I67.6-I67.6, I80-I82, I26-I26					
1552632	rivaroksabaan, 15mg	B01AF01	XARELTO, õhukese polümeerikattega tablett, 42TK	Bayer AG	100	I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6					kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
					50						
					75	I48-I48, I67.6-I67.6, I80-I82, I26-I26					
1729908	rivaroksabaan, 15mg	B01AF01	RUNAPLAX, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					100	I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6					kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
					75	I48-I48, I67.6-I67.6, I80-I82, I26-I26					
1791918	rivaroksabaan, 15mg	B01AF01	RIVAROXABAN TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Teva GmbH	50						
					75	I48-I48, I67.6-I67.6, I80-I82, I26-I26					
					100	I26-I26, I67.6-I67.6, I80-I82					kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1793561	rivaroksabaan, 15mg	B01AF01	XERDOXO, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	75	I48-I48, I67.6-I67.6, I80-I82, I26-I26					
					50						
					100	I80-I82, I26-I26, I67.6-I67.6					kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
1813306	rivaroksabaan, 15mg	B01AF01	RIVAROXABAN G.L. PHARMA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	G.L. Pharma GmbH	50						
					75	I48-I48, I67.6-I67.6, I80-I82, I26-I26					
					100	I80-I82, I26-I26, I67.6-I67.6					kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
1832903	rivaroksabaan, 15mg	B01AF01	RIVAROXABAN ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare S.L.U.	75	I48-I48, I67.6-I67.6, I80-I82, I26-I26					
					50						
					100	I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6					kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
1835704	rivaroksabaan, 15mg	B01AF01	RIVAROXABAN ORION, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Orion Corporation	75	I48-I48, I67.6-I67.6, I80-I82, I26-I26					
					100	I80-I82, I67.6-I67.6, I26-I26					kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
					50						
1844568	rivaroksabaan, 15mg	B01AF01	RIVAROXABAN STADA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Stada Arzneimittel AG	50						
					75	I48-I48, I67.6-I67.6, I80-I82, I26-I26					
					100	I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6					kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1844669	rivaroksabaan, 15mg	B01AF01	RIVAROXABAN STADA, õhukese polümeerikattega tablett, 98TK	Stada Arzneimittel AG	50						
					75	I48-I48, I67.6-I67.6, I80-I82, I26-I26					
					100	I26-I26, I67.6-I67.6, I80-I82					kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
1850486	rivaroksabaan, 15mg	B01AF01	KARDATUXAN, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Gedeon Richter Plc.	75	I48-I48, I67.6-I67.6, I80-I82, I26-I26					
					50						
					100	I26-I26, I67.6-I67.6, I80-I82					kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
1896262	rivaroksabaan, 15mg	B01AF01	RIVAROXABAN VIATRIS, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Viatris Limited	75	I48-I48, I67.6-I67.6, I80-I82, I26-I26					
					100	I26-I26, I67.6-I67.6, I80-I82					kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
					50						
3053247	rivaroksabaan, 15mg	B01AF01	RIVAROXABAN OLPHA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Olpha AS	50						
					75	I48-I48, I67.6-I67.6, I80-I82, I26-I26					
					100	I80-I82, I26-I26, I67.6-I67.6					kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
1844906	rivaroksabaan, 15mg/20mg	B01AF01	RIVAROXABAN STADA, õhukese polümeerikattega tablett, 42TK / 7TK	Stada Arzneimittel AG	100	I80-I82, I26-I26, I67.6-I67.6					kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
					75	I48-I48, I67.6-I67.6, I80-I82, I26-I26					
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1552687	rivaroksabaan, 20mg	B01AF01	XARELTO, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Bayer AG	75	I48-I48, I67.6-I67.6, I80-I82, I26-I26					
					100	I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6					kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
					50						
1730001	rivaroksabaan, 20mg	B01AF01	RUNAPLAX, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	I48-I48, I67.6-I67.6, I80-I82, I26-I26					
					100	I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6					kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
					50						
1792010	rivaroksabaan, 20mg	B01AF01	RIVAROXABAN TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Teva GmbH	100	I26-I26, I67.6-I67.6, I80-I82					kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
					50						
					75	I48-I48, I67.6-I67.6, I80-I82, I26-I26					
1793673	rivaroksabaan, 20mg	B01AF01	XERDOXO, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	100	I26-I26, I67.6-I67.6, I80-I82					kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
					50						
					75	I48-I48, I67.6-I67.6, I80-I82, I26-I26					
1813429	rivaroksabaan, 20mg	B01AF01	RIVAROXABAN G.L. PHARMA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	G.L. Pharma GmbH	100	I80-I82, I26-I26, I67.6-I67.6					kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
					50						
					75	I48-I48, I67.6-I67.6, I80-I82, I26-I26					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1833016	rivaroksabaan, 20mg	B01AF01	RIVAROXABAN ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare S.L.U.	75	I48-I48, I67.6-I67.6, I80-I82, I26-I26					
					100	I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6					kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
					50						
1835760	rivaroksabaan, 20mg	B01AF01	RIVAROXABAN ORION, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Orion Corporation	100	I80-I82, I67.6-I67.6, I26-I26					kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
					50						
					75	I48-I48, I67.6-I67.6, I80-I82, I26-I26					
1844760	rivaroksabaan, 20mg	B01AF01	RIVAROXABAN STADA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Stada Arzneimittel AG	50						
					75	I48-I48, I67.6-I67.6, I80-I82, I26-I26					
					100	I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6					kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
1844861	rivaroksabaan, 20mg	B01AF01	RIVAROXABAN STADA, õhukese polümeerikattega tablett, 98TK	Stada Arzneimittel AG	100	I80-I82, I67.6-I67.6, I26-I26					kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
					50						
					75	I48-I48, I67.6-I67.6, I80-I82, I26-I26					
1850622	rivaroksabaan, 20mg	B01AF01	KARDATUXAN, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Gedeon Richter Plc.	75	I48-I48, I67.6-I67.6, I80-I82, I26-I26					
					100	I26-I26, I67.6-I67.6, I80-I82					kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1897027	rivaroksabaan, 20mg	B01AF01	RIVAROXABAN VIATRIS, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Viatris Limited	100	I80-I82, I26-I26, I67.6-I67.6					kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
					50						
					75	I48-I48, I67.6-I67.6, I80-I82, I26-I26					
3053270	rivaroksabaan, 20mg	B01AF01	RIVAROXABAN OLPHA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Olpha AS	75	I48-I48, I67.6-I67.6, I80-I82, I26-I26					
					50						
					100	I80-I82, I26-I26, I67.6-I67.6					kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
1225741	ropinirool, 2mg	N04BC04	REQUIP-MODUTAB, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK	GlaxoSmithKline Trading Services Limited	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						
1436598	ropinirool, 2mg	N04BC04	ROLPRYNA SR 2MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1225796	ropinirool, 4mg	N04BC04	REQUIP-MODUTAB, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK	GlaxoSmithKline Trading Services Limited	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						
1436633	ropinirool, 4mg	N04BC04	ROLPRYNA SR 4MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
3078570	ropinirool, 4mg	N04BC04	ROLPRYNA SR 4MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK	Ideal Trade Links UAB	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						
1225819	ropinirool, 8mg	N04BC04	REQUIP-MODUTAB, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK	GlaxoSmithKline Trading Services Limited	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1436677	ropinirool, 8mg	N04BC04	ROLPRYNA SR 8MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK	KRKA, d.d., Novo mesto	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						
3078604	ropinirool, 8mg	N04BC04	ROLPRYNA SR 8MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK	Ideal Trade Links UAB	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1106053	rosuvastatiin, 10mg	C10AA07	CRESTOR, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Gruenenthal GmbH	75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
					50						
					100	N18-N18					
1384758	rosuvastatiin, 10mg	C10AA07	ROXARDIO, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
					100	N18-N18					
1384792	rosuvastatiin, 10mg	C10AA07	ROXARDIO, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
					100	N18-N18					
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1396874	rosuvastatiin, 10mg	C10AA07	ROSUCARD 10MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Zentiva k.s.	100	N18-N18					
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
					50						
1396896	rosuvastatiin, 10mg	C10AA07	ROSUCARD 10MG, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Zentiva k.s.	100	N18-N18					
					50						
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
1477267	rosuvastatiin, 10mg	C10AA07	ROSUVASTATIN TAD 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	TAD Pharma GmbH	100	N18-N18					
					50						
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
1477975	rosuvastatiin, 10mg	C10AA07	ROSWERA 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	50						
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
					100	N18-N18					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1477997	rosuvastatiin, 10mg	C10AA07	ROSWERA 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
					100	N18-N18					
					50						
1587360	rosuvastatiin, 10mg	C10AA07	ROVASYN, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Medochemie Limited	50						
					75	E78-E78					kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l
					75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel
					100	N18-N18					alates III staadiumist
					75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66					
1654219	rosuvastatiin, 10mg	C10AA07	ROSUVASTATIN ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Accord Healthcare B.V.	100	N18-N18					
					50						
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1684638	rosuvastatiin, 10mg	C10AA07	ROSUVASTATIN TEVA PHARMA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Teva B.V.	75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
					100	N18-N18					
					50						
1397099	rosuvastatiin, 20mg	C10AA07	ROSUCARD 20MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Zentiva k.s.	100	N18-N18					
					50						
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
1397112	rosuvastatiin, 20mg	C10AA07	ROSUCARD 20MG, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Zentiva k.s.	75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
					100	N18-N18					
					50						
1473476	rosuvastatiin, 20mg	C10AA07	ROXARDIO, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
					50						
					100	N18-N18					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1473511	rosuvastatiin, 20mg	C10AA07	ROXARDIO, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	100	N18-N18					
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
					50						
1477481	rosuvastatiin, 20mg	C10AA07	ROSUVASTATIN TAD 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	TAD Pharma GmbH	50						
					100	N18-N18					
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
1478190	rosuvastatiin, 20mg	C10AA07	ROSWERA 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	50						
					100	N18-N18					
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
1478213	rosuvastatiin, 20mg	C10AA07	ROSWERA 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
					100	N18-N18					
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1587517	rosuvastatiin, 20mg	C10AA07	ROVASYN, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Medochemie Limited	75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
					50						
					100	N18-N18					
1684773	rosuvastatiin, 20mg	C10AA07	ROSUVASTATIN TEVA PHARMA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Teva B.V.	100	N18-N18					
					50						
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
1477863	rosuvastatiin, 5mg	C10AA07	ROSWERA 5 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
					50						
					100	N18-N18					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1620964	rosuvastatiin+ezetimiib, 10mg+10mg	C10BA06	DELIPID PLUS, kõvakapsel, 30TK	Egis Pharmaceuticals PLC	50						
					75	E10-E11, E13-E14					kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					100	N18-N18					patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	I70.2-I70.2, Z45-Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95					
1757921	rosuvastatiin+ezetimiib, 10mg+10mg	C10BA06	ROSAZIMIB, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	E10-E11, E13-E14					kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	I70.2-I70.2, Z45-Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95					
					100	N18-N18					patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1789870	rosuvastatiin+ezetimiib, 10mg+10mg	C10BA06	ROZESTA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Zentiva k.s.	50						
					75	E10-E11, E13-E14					kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	I70.2-I70.2, Z45-Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95					
					100	N18-N18					patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
1885428	rosuvastatiin+ezetimiib, 10mg+10mg	C10BA06	ROSUVASTATIN/ EZETIMIBE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva B.V.	75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					50						
					100	N18-N18					patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	I70.2-I70.2, Z45-Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95					
					75	E13-E14, E10-E11					kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1621044	rosuvastatiin+eseti miib, 20mg+10mg	C10BA06	DELIPID PLUS, kõvakapsel, 30TK	Egis Pharmaceuticals PLC	75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	E13-E14, E10-E11					kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	I70.2-I70.2, Z45-Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95					
					50						
					100	N18-N18					patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
1758102	rosuvastatiin+eseti miib, 20mg+10mg	C10BA06	ROSAZIMIB, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	50						
					75	I70.2-I70.2, Z45-Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95					
					75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	E10-E11, E13-E14					kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					100	N18-N18					patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1789926	rosuvastatiin+eseti miib, 20mg+10mg	C10BA06	ROZESTA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Zentiva k.s.	75	E10-E11, E13-E14					kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					50						
					75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	I70.2-I70.2, Z45-Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95					
					100	N18-N18					patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
1879803	rosuvastatiin+eseti miib, 20mg+10mg	C10BA06	DELIPID PLUS, kõvakapsel, 30TK	Ideal Trade Links UAB	100	N18-N18					patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					50						
					75	I70.2-I70.2, Z45-Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95					
					75	E10-E11, E13-E14					kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1885462	rosuvastatiin+eseti miib, 20mg+10mg	C10BA06	ROSUVASTATIN/ EZETIMIBE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva B.V.	75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					100	N18-N18					patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					50						
					75	E13-E14, E10-E11					kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	I70.2-I70.2, Z45-Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95					
1888386	rosuvastatiin+eseti miib, 20mg+10mg	C10BA06	DELIPID PLUS, kõvakapsel, 30TK	Lex Ano UAB	100	N18-N18					patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					50						
					75	I70.2-I70.2, Z45-Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95					
					75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	E13-E14, E10-E11					kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3113558	rosuvastatiin+ezetimiib, 20mg+10mg	C10BA06	ROSAZIMIB, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Lex Ano UAB	75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					100	N18-N18					patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	E13-E14, E10-E11					kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	I70.2-I70.2, Z45-Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95					
					50						
1621112	rosuvastatiin+ezetimiib, 40mg+10mg	C10BA06	DELIPID PLUS, kõvakapsel, 30TK	Egis Pharmaceuticals PLC	100	N18-N18					patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					50						
					75	I70.2-I70.2, Z45-Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95					
					75	E13-E14, E10-E11					kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1758191	rosuvastatiin+eseti miib, 40mg+10mg	C10BA06	ROSAZIMIB, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	50						
					75	E10-E11, E13-E14					kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	I70.2-I70.2, Z45-Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95					
					75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					100	N18-N18					patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
1789959	rosuvastatiin+eseti miib, 40mg+10mg	C10BA06	ROZESTA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Zentiva k.s.	50						
					100	N18-N18					patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	E10-E11, E13-E14					kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	I70.2-I70.2, Z45-Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95					
					75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3113705	rosuvastatiin+ezetimiib, 40mg+10mg	C10BA06	ROSAZIMIB, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Lex Ano UAB	100	N18-N18					patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	E13-E14, E10-E11					kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					50						
					75	I70.2-I70.2, Z45-Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95					
1731136	rosuvastatiin+perindopriil+indapamiid, 10mg+4mg+1,25mg	C10BX13	ROXIPER, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					kui samaaegselt on täidetud rosuvastatiini kõrgema soodusmääraga (75% või 100%) väljakirjutamise tingimused
					50						
1731259	rosuvastatiin+perindopriil+indapamiid, 10mg+8mg+2,5mg	C10BX13	ROXIPER, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					kui samaaegselt on täidetud rosuvastatiini kõrgema soodusmääraga (75% või 100%) väljakirjutamise tingimused
1731192	rosuvastatiin+perindopriil+indapamiid, 20mg+4mg+1,25mg	C10BX13	ROXIPER, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					kui samaaegselt on täidetud rosuvastatiini kõrgema soodusmääraga (75% või 100%) väljakirjutamise tingimused
1731316	rosuvastatiin+perindopriil+indapamiid, 20mg+8mg+2,5mg	C10BX13	ROXIPER, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					kui samaaegselt on täidetud rosuvastatiini kõrgema soodusmääraga (75% või 100%) väljakirjutamise tingimused

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1666021	ruksolitiniib, 10mg	L01EJ01	JAKAVI, tablett, 56TK	Novartis Europharm Limited	100	D45-D45	Hematoloog, Onkoloog	esmane			täiskasvanud patsientidele, kes on resistentsed või ei talu hüdroksüuureat
					100	Z94.8-Z94.8, T86.0-T86.0	Hematoloog				kroonilise siirik-peremehe-vastu haiguse patsientidele, kellel on ebapiisav ravivastus kortikosteroididele või teistele süsteemsetele ravimitele
1632901	ruksolitiniib, 15mg	L01EJ01	JAKAVI, tablett, 56TK	Novartis Europharm Limited	100	D47.1-D47.1	Hematoloog				konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) otsuse alusel primaarse või sekundaarse müelofibroosi raviks keskmise-2 või kõrge riskiga (IPSS>=2) patsientidele, kellel eelnev ravi hüdroksüuureaga (annuses vähemalt 2 g päevas vähemalt 3 kuu jooksul) on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks
1632934	ruksolitiniib, 20mg	L01EJ01	JAKAVI, tablett, 56TK	Novartis Europharm Limited	100	D47.1-D47.1	Hematoloog				konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) otsuse alusel primaarse või sekundaarse müelofibroosi raviks keskmise-2 või kõrge riskiga (IPSS>=2) patsientidele, kellel eelnev ravi hüdroksüuureaga (annuses vähemalt 2 g päevas vähemalt 3 kuu jooksul) on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks
1632877	ruksolitiniib, 5mg	L01EJ01	JAKAVI, tablett, 56TK	Novartis Europharm Limited	100	D47.1-D47.1	Hematoloog				konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) otsuse alusel primaarse või sekundaarse müelofibroosi raviks keskmise-2 või kõrge riskiga (IPSS>=2) patsientidele, kellel eelnev ravi hüdroksüuureaga (annuses vähemalt 2 g päevas vähemalt 3 kuu jooksul) on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks
					100	Z94.8-Z94.8, T86.0-T86.0	Hematoloog				kroonilise siirik-peremehe-vastu haiguse patsientidele, kellel on ebapiisav ravivastus kortikosteroididele või teistele süsteemsetele ravimitele
					100	D45-D45	Hematoloog, Onkoloog	esmane			täiskasvanud patsientidele, kes on resistentsed või ei talu hüdroksüuureat
1725522	saksagliptiin+dapagliflosiin, 5mg+10mg	A10BD21	QTERN, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Astrazeneca AB	50						
					75	E11-E11, E14-E14					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1031308	salbutamool, 200mcg 1annus	R03AC02	VENTOLIN DISKUS, inhalatsioonipulber, 60annus 1TK	GlaxoSmithKline Trading Services Limited	50						
					75	J44-J44, J43-J43	Pulmonoloog	esmane			
					75	J45-J45					
1004319	salbutamool, 400mcg 1ml	R03CC02	VENTOLIN SYRUP, siirup, 150ml 1TK	GlaxoSmithKline Trading Services Limited	50						
					75	J45-J45					
					75	J44-J44, J43-J43	Pulmonoloog	esmane			
1004948	salbutamool, 5000mcg 1ml	R03AC02	VENTOLIN, nebuliseeritav lahus, 20ml 1TK	GlaxoSmithKline Trading Services Limited	50						
					75	J45-J45					
					75	J44-J44, J43-J43	Pulmonoloog	esmane			
1007907	salmeterool, 50mcg 1annus	R03AC12	SEREVENT DISKUS 50 MCG, inhalatsioonipulber, 60annus 1TK	GlaxoSmithKline Trading Services Limited	75	J45-J45					
					50						
					75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			
1107346	salmeterool+flutikasoon, 25mcg+125mcg 1annus	R03AK06	SERETIDE INHALER, inhalatsiooniaerosool, suspensioon, 120annus 1TK	GlaxoSmithKline Trading Services Limited	50						
					75	J45-J45					
1107357	salmeterool+flutikasoon, 25mcg+250mcg 1annus	R03AK06	SERETIDE INHALER, inhalatsiooniaerosool, suspensioon, 120annus 1TK	GlaxoSmithKline Trading Services Limited	50						
					75	J45-J45					
1107335	salmeterool+flutikasoon, 25mcg+50mcg 1annus	R03AK06	SERETIDE INHALER, inhalatsiooniaerosool, suspensioon, 120annus 1TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	75	J45-J45					
					50						
1037607	salmeterool+flutikasoon, 50mcg+100mcg 1annus	R03AK06	SERETIDE DISKUS 100, annustatud inhalatsioonipulber, 60annus 1TK	GlaxoSmithKline Trading Services Limited	50						
					75	J45-J45					
1636466	salmeterool+flutikasoon, 50mcg+250mcg	R03AK06	AIRFLUSAL FORSPIRO, annustatud inhalatsioonipulber, 60annus 1TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	J45-J45					
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1037595	salmeterool+flutikasoon, 50mcg+250mcg 1annus	R03AK06	SERETIDE DISKUS 250, annustatud inhalatsioonipulber, 60annus 1TK	GlaxoSmithKline Trading Services Limited	75	J45-J45					
					50						
1636512	salmeterool+flutikasoon, 50mcg+500mcg	R03AK06	AIRFLUSAL FORSPIRO, annustatud inhalatsioonipulber, 60annus 1TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	J45-J45					
					75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			C-D staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel eosinofiilide arv perifeerses veres on >=100 rakku/mikroliitris ning kellel on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasid ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga
1153167	salmeterool+flutikasoon, 50mcg+500mcg 1annus	R03AK06	SERETIDE DISKUS 500, annustatud inhalatsioonipulber, 60annus 1TK	GlaxoSmithKline Trading Services Limited	75	J45-J45					
					50						
					75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			C-D staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel eosinofiilide arv perifeerses veres on >=100 rakku/mikroliitris ning kellel on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasid ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga
1391789	sapropteriin, 100mg	A16AX07	KUVAN, lahustuv tablett, 120TK	BioMarin International Limited	100	E70.0-E70.1				18,00	konsiiliumi (vähemalt 2 pediaatri või meditsiinigeneetiku ühise) otsuse alusel järgmistel tingimustel: tegemist on biopteriinitundliku haigusvormiga ning dieedi järgimine ei ole taganud ravijuhendi kohase vere fenüülalaniini taseme eesmärkväärtuse saavutamist; ravi võib jätkata kuni 18. eluaastani patsiendil, kellel ravimi kasutamisega püsib fenüülalaniini tase eesmärkväärtuste piires
1875887	sapropteriin, 100mg	A16AX07	SAPROPTERIN DIPHARMA, lahustuv tablett, 120TK	Dipharma Arzneimittel GmbH	100	E70.0-E70.1				18,00	konsiiliumi (vähemalt 2 pediaatri või meditsiinigeneetiku ühise) otsuse alusel järgmistel tingimustel: tegemist on biopteriinitundliku haigusvormiga ning dieedi järgimine ei ole taganud ravijuhendi kohase vere fenüülalaniini taseme eesmärkväärtuse saavutamist; ravi võib jätkata kuni 18. eluaastani patsiendil, kellel ravimi kasutamisega püsib fenüülalaniini tase eesmärkväärtuste piires

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3106965	sapropteriin, 100mg	A16AX07	SAPROPTERIN DIPHARMA, suukaudse lahuse pulber, 30TK	Dipharma Arzneimittel GmbH	100	E70.0-E70.1				18,00	konsiiliumi (vähemalt 2 pediaatri või meditsiinigeneetiku ühise) otsuse alusel järgmistel tingimustel: tegemist on biopteriinitundliku haigusvormiga ning dieedi järgimine ei ole taganud ravijuhendi kohase vere fenüülalaniini taseme eesmärkväärtuse saavutamist; ravi võib jätkata kuni 18. eluaastani patsiendil, kellel ravimi kasutamisega püsib fenüülalaniini tase eesmärkväärtuste piires
3106987	sapropteriin, 500mg	A16AX07	SAPROPTERIN DIPHARMA, suukaudse lahuse pulber, 30TK	Dipharma Arzneimittel GmbH	100	E70.0-E70.1				18,00	konsiiliumi (vähemalt 2 pediaatri või meditsiinigeneetiku ühise) otsuse alusel järgmistel tingimustel: tegemist on biopteriinitundliku haigusvormiga ning dieedi järgimine ei ole taganud ravijuhendi kohase vere fenüülalaniini taseme eesmärkväärtuse saavutamist; ravi võib jätkata kuni 18. eluaastani patsiendil, kellel ravimi kasutamisega püsib fenüülalaniini tase eesmärkväärtuste piires

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1675649	sekukinumab, 150mg 1ml	L04AC10	COSENTYX, süstelahus pen-süstlis, 1ml 1TK	Novartis Europharm Limited	100	M07.0-M07.3	Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus M07.0-3 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori ja ustekinumabi kasutamine vastunäidustatud
					100	L40-L40	Pediaater, Dermatovenerol oog				patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus L40 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori ja ustekinumabi kasutamine vastunäidustatud
					100	M45-M45, M46-M46	Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus M45 ja M46 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud.

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1833960	sekukinumab, 300mg 2ml	L04AC10	COSENTYX, süstelahus pen-süstlis, 2ml 1TK	Novartis Europharm Limited	100	M45-M45, M46-M46	Reumatoloog, Pediaater, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega				ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus M45 ja M46 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud.
					100	L40-L40	Dermatovenerol oog, Pediaater				patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus L40 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori ja ustekinumabi kasutamine vastunäidustatud
					100	M07.0-M07.3	Pediaater, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus M07.0-3 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori ja ustekinumabi kasutamine vastunäidustatud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1857034	sekukinumab, 75mg 0.5ml	L04AC10	COSENTYX, süstelahus süstlis, 0.5ml 1TK	Novartis Europharm Limited	100	M07.0-M07.3	Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus M07.0-3 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori ja ustekinumabi kasutamine vastunäidustatud
					100	L40-L40	Pediaater, Dermatovenerol oog				patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus L40 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori ja ustekinumabi kasutamine vastunäidustatud
					100	M45-M45, M46-M46	Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus M45 ja M46 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud.
1719031	seleksipaag, 1000mcg	B01AC27	UPTRAVI, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Janssen - Cilag International	100	I27.0-I27.0	Pediaater kardioloogi lisapädevusega, Pulmonoloog, Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Kardioloog, Pediaater				NYHA III kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni kombineeritud raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui haiguse kontrolli all hoidmiseks ei piisa endoteliiniretseptori antagonistist (ERA) ja 5. tüüpi fosfodiesteraasi (PDE5) inhibiitorist

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1719042	seleksipaag, 1200mcg	B01AC27	UPTRAVI, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Janssen - Cilag International	100	I27.0-I27.0	Pediaater kardioloogi lisapädevusega, Kardioloog, Pulmonoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater, Reumatoloog				NYHA III kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni kombineeritud raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui haiguse kontrolli all hoidmiseks ei piisa endoteliiniretseptori antagonistist (ERA) ja 5. tüüpi fosfodiesteraasi (PDE5) inhibiitorist
1719053	seleksipaag, 1400mcg	B01AC27	UPTRAVI, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Janssen - Cilag International	100	I27.0-I27.0	Pulmonoloog, Kardioloog, Pediaater, Pediaater kardioloogi lisapädevusega, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog				NYHA III kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni kombineeritud raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui haiguse kontrolli all hoidmiseks ei piisa endoteliiniretseptori antagonistist (ERA) ja 5. tüüpi fosfodiesteraasi (PDE5) inhibiitorist
1719064	seleksipaag, 1600mcg	B01AC27	UPTRAVI, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Janssen - Cilag International	100	I27.0-I27.0	Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Kardioloog, Pediaater, Pediaater kardioloogi lisapädevusega, Reumatoloog, Pulmonoloog				NYHA III kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni kombineeritud raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui haiguse kontrolli all hoidmiseks ei piisa endoteliiniretseptori antagonistist (ERA) ja 5. tüüpi fosfodiesteraasi (PDE5) inhibiitorist

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1718973	seleksipaag, 200mcg	B01AC27	UPTRAVI, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Janssen - Cilag International	100	I27.0-I27.0	Kardioloog, Reumatoloog, Pediaater kardioloogi lisapädevusega, Pulmonoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater				NYHA III kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni kombineeritud raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui haiguse kontrolli all hoidmiseks ei piisa endoteliiniretseptori antagonistist (ERA) ja 5. tüüpi fosfodiesteraasi (PDE5) inhibiitorist
1718984	seleksipaag, 200mcg	B01AC27	UPTRAVI, õhukese polümeerikattega tablett, 140TK	Janssen - Cilag International	100	I27.0-I27.0	Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater, Reumatoloog, Pulmonoloog, Kardioloog, Pediaater kardioloogi lisapädevusega				NYHA III kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni kombineeritud raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui haiguse kontrolli all hoidmiseks ei piisa endoteliiniretseptori antagonistist (ERA) ja 5. tüüpi fosfodiesteraasi (PDE5) inhibiitorist
1719008	seleksipaag, 400mcg	B01AC27	UPTRAVI, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Janssen - Cilag International	100	I27.0-I27.0	Pulmonoloog, Kardioloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog, Pediaater kardioloogi lisapädevusega, Pediaater				NYHA III kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni kombineeritud raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui haiguse kontrolli all hoidmiseks ei piisa endoteliiniretseptori antagonistist (ERA) ja 5. tüüpi fosfodiesteraasi (PDE5) inhibiitorist

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1719019	seleksipaag, 600mcg	B01AC27	UPTRAVI, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Janssen - Cilag International	100	I27.0-I27.0	Pulmonoloog, Pediaater, Kardioloog, Pediaater kardioloogi lisapädevusega, Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega				NYHA III kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni kombineeritud raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui haiguse kontrolli all hoidmiseks ei piisa endoteliiniretseptori antagonistist (ERA) ja 5. tüüpi fosfodiesteraasi (PDE5) inhibiitorist
1719020	seleksipaag, 800mcg	B01AC27	UPTRAVI, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Janssen - Cilag International	100	I27.0-I27.0	Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Kardioloog, Reumatoloog, Pulmonoloog, Pediaater, Pediaater kardioloogi lisapädevusega				NYHA III kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni kombineeritud raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui haiguse kontrolli all hoidmiseks ei piisa endoteliiniretseptori antagonistist (ERA) ja 5. tüüpi fosfodiesteraasi (PDE5) inhibiitorist
1851476	selumetiniib, 10mg	L01EE04	KOSELUGO, kõvakapsel, 60TK	AstraZeneca AB	100	Q85.0-Q85.0	Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega, Pediaater neuroloogi lisapädevusega, Hematoloog, Neuroloog				monoteraapiana sümptomaatiliste mitte-opereeritavate pleksiformsete neurofibroomide raviks 3-aastastel ja vanematel lastel, kellel on 1. tüüpi neurofibromatoos
1851487	selumetiniib, 25mg	L01EE04	KOSELUGO, kõvakapsel, 60TK	AstraZeneca AB	100	Q85.0-Q85.0	Neuroloog, Neurokirurg, Pediaater neuroloogi lisapädevusega, Hematoloog, Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega				monoteraapiana sümptomaatiliste mitte-opereeritavate pleksiformsete neurofibroomide raviks 3-aastastel ja vanematel lastel, kellel on 1. tüüpi neurofibromatoos

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1788509	semaglutiid, 0,25mg 1annus	A10BJ06	OZEMPIC, süstelahus pen-süstlis, 4annus 1TK	Novo Nordisk A/S	50	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi raviks juhul, kui ravi suukaudsete diabeediravimitega ei ole efektiivne või on vastunäidustatud
					75	E11-E11, E14-E14					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks rasvumusega patsientidel (KMI>=30kg/m2); kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea prepararaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud tingimusel, et eelnev ravi SGLT-2 inhibiitoriga maksimaalses talutavas annuses ei ole andnud rahuldavat efekti või on vastunäidustatud. Patsiendid, kelle ravi semaglutiidiga on alustatud enne 01.01.2023, võivad jätkata ravi tuginedes kuni 31.12.2022 kehtinud rakendustingimustele.
1788510	semaglutiid, 0,5mg 1annus	A10BJ06	OZEMPIC, süstelahus pen-süstlis, 4annus 1TK	Novo Nordisk A/S	75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks rasvumusega patsientidel (KMI>=30kg/m2); kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea prepararaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud tingimusel, et eelnev ravi SGLT-2 inhibiitoriga maksimaalses talutavas annuses ei ole andnud rahuldavat efekti või on vastunäidustatud. Patsiendid, kelle ravi semaglutiidiga on alustatud enne 01.01.2023, võivad jätkata ravi tuginedes kuni 31.12.2022 kehtinud rakendustingimustele.
					50	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi raviks juhul, kui ravi suukaudsete diabeediravimitega ei ole efektiivne või on vastunäidustatud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3101465	semaglutiid, 0,5mg 1annus	A10BJ06	OZEMPIC, süstelahus pen-süstlis, 4annus 1TK	Novo Nordisk A/S	75	E11-E11, E14-E14					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks rasvumusega patsientidel (KMI>=30kg/m2); kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea prepararaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud tingimusel, et eelnev ravi SGLT-2 inhibiitoriga maksimaalses talutavas annuses ei ole andnud rahuldavat efekti või on vastunäidustatud. Patsiendid, kelle ravi semaglutiidiga on alustatud enne 01.01.2023, võivad jätkata ravi tuginedes kuni 31.12.2022 kehtinud rakendustingimustele.
					50	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi raviks juhul, kui ravi suukaudsete diabeediravimitega ei ole efektiivne või on vastunäidustatud
3082508	semaglutiid, 1,5mg	A10BJ06	RYBELSUS, tablett, 30TK	Novo Nordisk A/S	75	E11-E11, E14-E14					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks patsientidel, kellel metformiin ja SGLT-2 inhibiitor ei ole andnud rahuldavat efekti või on vastunäidustatud.
					50	E11-E11, E14-E14					kombinatsioonraviks või monoraviks, kui metformiin on vastunäidustatud
1815892	semaglutiid, 14mg	A10BJ06	RYBELSUS, tablett, 30TK	Novo Nordisk A/S	50	E11-E11, E14-E14					kombinatsioonraviks või monoraviks, kui metformiin on vastunäidustatud
					75	E11-E11, E14-E14					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks patsientidel, kellel metformiin ja SGLT-2 inhibiitor ei ole andnud rahuldavat efekti või on vastunäidustatud.
1788521	semaglutiid, 1mg 1annus	A10BJ06	OZEMPIC, süstelahus pen-süstlis, 4annus 1TK	Novo Nordisk A/S	75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks rasvumusega patsientidel (KMI>=30kg/m2); kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea prepararaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud tingimusel, et eelnev ravi SGLT-2 inhibiitoriga maksimaalses talutavas annuses ei ole andnud rahuldavat efekti või on vastunäidustatud. Patsiendid, kelle ravi semaglutiidiga on alustatud enne 01.01.2023, võivad jätkata ravi tuginedes kuni 31.12.2022 kehtinud rakendustingimustele.
					50	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi raviks juhul, kui ravi suukaudsete diabeediravimitega ei ole efektiivne või on vastunäidustatud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1815825	semaglutiid, 3mg	A10BJ06	RYBELSUS, tablett, 30TK	Novo Nordisk A/S	75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks patsientidel, kellel metformiin ja SGLT-2 inhibiitor ei ole andnud rahuldavat efekti või on vastunäidustatud.
					50	E14-E14, E11-E11					kombinatsioonraviks või monoraviks, kui metformiin on vastunäidustatud
3082553	semaglutiid, 4mg	A10BJ06	RYBELSUS, tablett, 30TK	Novo Nordisk A/S	50	E11-E11, E14-E14					kombinatsioonraviks või monoraviks, kui metformiin on vastunäidustatud
					75	E11-E11, E14-E14					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks patsientidel, kellel metformiin ja SGLT-2 inhibiitor ei ole andnud rahuldavat efekti või on vastunäidustatud.
1815869	semaglutiid, 7mg	A10BJ06	RYBELSUS, tablett, 30TK	Novo Nordisk A/S	75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks patsientidel, kellel metformiin ja SGLT-2 inhibiitor ei ole andnud rahuldavat efekti või on vastunäidustatud.
					50	E14-E14, E11-E11					kombinatsioonraviks või monoraviks, kui metformiin on vastunäidustatud
3082609	semaglutiid, 9mg	A10BJ06	RYBELSUS, tablett, 30TK	Novo Nordisk A/S	75	E11-E11, E14-E14					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks patsientidel, kellel metformiin ja SGLT-2 inhibiitor ei ole andnud rahuldavat efekti või on vastunäidustatud.
					50	E14-E14, E11-E11					kombinatsioonraviks või monoraviks, kui metformiin on vastunäidustatud
1027066	sertindool, 12mg	N05AE03	SERDOLECT, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	H. Lundbeck A/S	100	F20-F29	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
					50						
1027077	sertindool, 16mg	N05AE03	SERDOLECT, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	H. Lundbeck A/S	50						
					100	F20-F29	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
1027088	sertindool, 20mg	N05AE03	SERDOLECT, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	H. Lundbeck A/S	50						
					100	F20-F29	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
1027055	sertindool, 4mg	N05AE03	SERDOLECT, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	H. Lundbeck A/S	100	F20-F29	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
					50						
1013746	sertraliin, 100mg	N06AB06	ASENTRA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1160615	sertraliin, 100mg	N06AB06	SERTRALINE LANNACHER, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	G.L. Pharma GmbH	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
1669989	sertraliin, 100mg	N06AB06	SERTRALINE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
1897612	sertraliin, 100mg	N06AB06	ASENTRA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Ideal Trade Links UAB	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1008638	sertraliin, 50mg	N06AB06	ZOLOFT, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Viatris SIA	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1143100	sertraliin, 50mg	N06AB06	ASENTRA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1160569	sertraliin, 50mg	N06AB06	SERTRALINE LANNACHER, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	G.L. Pharma GmbH	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1239218	sertraliin, 50mg	N06AB06	SERTRALINE-TEVA 50 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
1669888	sertraliin, 50mg	N06AB06	SERTRALINE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1831968	sertraliin, 50mg	N06AB06	ZOLOFT, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Lex Ano UAB	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
3073980	sertraliin, 50mg	N06AB06	ZOLOFT, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Ideal Trade Links UAB	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1484984	sevelameer, 800mg	V03AE02	SEVELAMER AUXILIA, õhukese polümeerikattega tablett, 180TK	Auxilia Pharma OÜ	100	N18-N18	Pediaater nefroloogi lisapädevusega, Nefroloog, Pediaater				juhul, kui kaltsiumipõhine fosforisiduja on vastunäidustatud (seerumi kaltsiumisisaldus >2,54 mmol/l)
					50						
1221039	sildenafiil, 20mg	G04BE03	REVATIO, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Upjohn EESV	100	I27.0-I27.0	Pediaater, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater kardioloogi lisapädevusega, Pulmonoloog, Kardioloog, Reumatoloog				NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel
					50	I27.0-I27.0	Pulmonoloog, Reumatoloog, Kardioloog, Pediaater, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater kardioloogi lisapädevusega				

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1702987	sildenafiil, 20mg	G04BE03	SILDENAFIL TEVA PHARMA, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Teva Pharma B.V.	100	I27.0-I27.0	Pulmonoloog, Pediaater kardioloogi lisapädevusega, Pediaater, Reumatoloog, Kardioloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega				NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel
					50	I27.0-I27.0	Pulmonoloog, Kardioloog, Pediaater, Pediaater kardioloogi lisapädevusega, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog				

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1734117	sildenafiil, 20mg	G04BE03	GRANPIDAM, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	I27.0-I27.0	Kardioloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater kardioloogi lisapädevusega, Pulmonoloog, Reumatoloog, Pediaater				NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel
					50	I27.0-I27.0	Pediaater kardioloogi lisapädevusega, Kardioloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog, Pediaater, Pulmonoloog				

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1755378	sildenafiil, 20mg	G04BE03	SILUNGO, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Norameda UAB	100	I27.0-I27.0	Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog, Pulmonoloog, Pediaater kardioloogi lisapädevusega, Pediaater, Kardioloog				NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel
					50	I27.0-I27.0	Pediaater kardioloogi lisapädevusega, Pulmonoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Kardioloog, Pediaater, Reumatoloog				

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1856910	sildenafiil, 20mg	G04BE03	SILDENAFIL G.L. PHARMA, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	G.L. Pharma GmbH	100	I27.0-I27.0	Kardioloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pulmonoloog, Pediaater kardioloogi lisapädevusega, Reumatoloog, Pediaater				NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel
					50	I27.0-I27.0	Pediaater kardioloogi lisapädevusega, Kardioloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pulmonoloog, Reumatoloog, Pediaater				

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3116562	sildenafiil, 20mg	G04BE03	SILDENAFIL TEVA PHARMA, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Lex Ano UAB	50	I27.0-I27.0	Pediaater kardioloogi lisapädevusega, Kardioloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater, Reumatoloog, Pulmonoloog				
					100	I27.0-I27.0	Pediaater, Pulmonoloog, Kardioloog, Pediaater kardioloogi lisapädevusega, Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega				NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel
1080166	simvastatiin, 10mg	C10AA01	SIMVACOR, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Hexal AG	50						
					100	N18-N18					
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
1594447	simvastatiin, 10mg	C10AA01	VASILIP, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	100	N18-N18					
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1010260	simvastatiin, 20mg	C10AA01	VASILIP, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	50						
					100	N18-N18					
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
1080177	simvastatiin, 20mg	C10AA01	SIMVACOR, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Hexal AG	50						
					100	N18-N18					
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
1083956	simvastatiin, 20mg	C10AA01	SIMVASTATIN-RATIOPHARM, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Ratiopharm GmbH	75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
					50						
					100	N18-N18					
1594458	simvastatiin, 20mg	C10AA01	VASILIP, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	100	N18-N18					
					50						
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1621493	simvastatiin, 20mg	C10AA01	SIMVACOR, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Hexal AG	75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
					50						
					100	N18-N18					
1083978	simvastatiin, 40mg	C10AA01	SIMVASTATIN-RATIOPHARM, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Ratiopharm GmbH	100	N18-N18					
					50						
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
1129700	simvastatiin, 40mg	C10AA01	SIMVACOR, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Hexal AG	75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
					50						
					100	N18-N18					
1594469	simvastatiin, 40mg	C10AA01	VASILIP, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
					50						
					100	N18-N18					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3108158	simvastatiin, 40mg	C10AA01	SIMVACOR, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Lex Ano UAB	50						
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
					100	N18-N18					
1809873	siponimood, 0,25mg	L04AE03	MAYZENT, õhukese polümeerikattega tablett, 12TK	Novartis Europharm Limited	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel sekundaarse progresseeruva hulgiskleroosi aktiivse vormi, mida kinnitavad ägenemiste esinemise või piltdiagnostikal ilmnev põletikuline aktiivsus, raviks täiskasvanud patsientidele
1875810	siponimood, 1mg	L04AE03	MAYZENT, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Novartis Europharm Limited	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel sekundaarse progresseeruva hulgiskleroosi aktiivse vormi, mida kinnitavad ägenemiste esinemise või piltdiagnostikal ilmnev põletikuline aktiivsus, raviks täiskasvanud patsientidele
1809895	siponimood, 2mg	L04AE03	MAYZENT, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Novartis Europharm Limited	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel sekundaarse progresseeruva hulgiskleroosi aktiivse vormi, mida kinnitavad ägenemiste esinemise või piltdiagnostikal ilmnev põletikuline aktiivsus, raviks täiskasvanud patsientidele
1107739	siroliimus, 1mg	L04AH01	RAPAMUNE, kaetud tablett, 30TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	Z94-Z94, T86-T86					
					100	D18.1-D18.1	Pulmonoloog				lümfangioleiomüomatoosi näidustusel
1680869	sitagliptiin, 100mg	A10BH01	SITAGLIPTIN TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Teva B.V.	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1817603	sitagliptiin, 100mg	A10BH01	JUZINA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Gedeon Richter Plc.	50						
					75	E11-E11, E14-E14					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1829707	sitagliptiin, 100mg	A10BH01	SITAGLIPTIN SANDOZ, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	E11-E11, E14-E14					
1831801	sitagliptiin, 100mg	A10BH01	SITAGLIPTIN GRINDEKS, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Grindeks AS	75	E11-E11, E14-E14					
					50						
1874640	sitagliptiin, 100mg	A10BH01	SITAGLIPTIN ZENTIVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Zentiva k.s.	75	E14-E14, E11-E11					
					50						
3044078	sitagliptiin, 100mg	A10BH01	SITAGLIPTIN OLPHA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Olpha AS	75	E14-E14, E11-E11					
					50						
1831744	sitagliptiin, 25mg	A10BH01	SITAGLIPTIN GRINDEKS, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Grindeks AS	75	E11-E11, E14-E14					
					50						
1820719	sitagliptiin, 50mg	A10BH01	JAZETA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Zentiva k.s.	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1829538	sitagliptiin, 50mg	A10BH01	SITAGLIPTIN SANDOZ, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	E11-E11, E14-E14					
1831777	sitagliptiin, 50mg	A10BH01	SITAGLIPTIN GRINDEKS, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Grindeks AS	50						
					75	E11-E11, E14-E14					
1874572	sitagliptiin, 50mg	A10BH01	SITAGLIPTIN ZENTIVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Zentiva k.s.	75	E11-E11, E14-E14					
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3043954	sitagliptiin, 50mg	A10BH01	SITAGLIPTIN OLPHA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Olpha AS	50						
					75	E11-E11, E14-E14					
1725825	sofosbuviir+velpatasviir, 400mg+100mg	J05AP55	EPCLUSA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Gilead Sciences Ireland Unlimited Company	100	B18.2-B18.2	Infektsionist, Gastroenteroloog				kroonilise progresseeruva C-viirushepatiidi raviks
1751015	sofosbuviir+velpatasviir+voksilapreviir, 400mg+100mg+100mg	J05AP56	VOSEVI, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Gilead Sciences Ireland Unlimited Company	100	B18.2-B18.2	Infektsionist, Gastroenteroloog				kroonilise progresseeruva C-viirushepatiidi kordusraviks tingimusel, et patsient ei ole eelneva otsese toimega viirusvastase raviga saavutanud püsivat viroloogilist ravivastust
1597440	solifenatsiin, 10mg	G04BD08	SOLIFENACIN PMCS 10MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Pro.Med.Cs Praha a.s.	50						
1686517	solifenatsiin, 10mg	G04BD08	TAMISTEN, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Medochemie Limited	50						
1597372	solifenatsiin, 5mg	G04BD08	SOLIFENACIN PMCS 5MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Pro.Med.Cs Praha a.s.	50						
1685932	solifenatsiin, 5mg	G04BD08	TAMISTEN, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Medochemie Limited	50						
1875900	somatrogoon, 24mg	H01AC08	NGENLA, süstelahus pen-süstlis, 1TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	E23-E23, E89.3-E89.3	Pediaater endokrinoloogi lisapädevusega, Endokrinoloog				kuni kasvutsoonide sulgumiseni
1875911	somatrogoon, 60mg	H01AC08	NGENLA, süstelahus pen-süstlis, 1TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	E23-E23, E89.3-E89.3	Endokrinoloog, Pediaater endokrinoloogi lisapädevusega				kuni kasvutsoonide sulgumiseni

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1041185	somatropiin, 12mg	H01AC01	GENOTROPIN, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Pfizer Europe MA EEIG	50						
					100	E89.3-E89.3, E23-E23, Q96-Q96, Q87.1-Q87.1, P05.1-P05.1, N18-N18	Endokrinoloog, Pediaater endokrinoloogi lisapädevusega				kuni kasvutsoonide sulgumiseni
					100	Q87.1-Q87.1, Q96-Q96, E23.0-E23.0, E23.1-E23.1, E89.3-E89.3, E23.3-E23.3	Endokrinoloog				
1369009	somatropiin, 3,3mg 1ml	H01AC01	OMNITROPE, süstelahus, 1.5ml 5TK	Sandoz GmbH	100	E89.3-E89.3, E23-E23, Q96-Q96, Q87.1-Q87.1, P05.1-P05.1, N18-N18	Pediaater endokrinoloogi lisapädevusega, Endokrinoloog				kuni kasvutsoonide sulgumiseni
					50						
					100	Q87.1-Q87.1, Q96-Q96, E23.0-E23.0, E23.1-E23.1, E89.3-E89.3, E23.3-E23.3	Endokrinoloog				
1022072	somatropiin, 5,3mg	H01AC01	GENOTROPIN, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	E89.3-E89.3, E23-E23, Q96-Q96, Q87.1-Q87.1, P05.1-P05.1, N18-N18	Endokrinoloog, Pediaater endokrinoloogi lisapädevusega				kuni kasvutsoonide sulgumiseni
					50						
					100	Q87.1-Q87.1, Q96-Q96, E23.0-E23.0, E23.1-E23.1, E89.3-E89.3, E23.3-E23.3	Endokrinoloog				

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1415528	somatropiin, 5,83mg 1ml	H01AC01	SAIZEN 5,83 MG/ML, süstelahus kolbampullis, 1.03ml 1TK	Merck Serono S.p.A.	50						
					100	Q87.1-Q87.1, Q96-Q96, E23.0-E23.0, E23.1-E23.1, E89.3-E89.3, E23.3-E23.3	Endokrinoloog				
					100	E89.3-E89.3, E23-E23, Q96-Q96, Q87.1-Q87.1, P05.1-P05.1, N18-N18	Pediaater endokrinoloogi lisapädevusega, Endokrinoloog				kuni kasvutsoonide sulgumiseni
1369032	somatropiin, 6,7mg 1ml	H01AC01	OMNITROPE, süstelahus, 1.5ml 1TK	Sandoz GmbH	50						
					100	Q87.1-Q87.1, Q96-Q96, E23.0-E23.0, E23.1-E23.1, E89.3-E89.3, E23.3-E23.3	Endokrinoloog				
					100	E89.3-E89.3, E23-E23, Q96-Q96, Q87.1-Q87.1, P05.1-P05.1, N18-N18	Endokrinoloog, Pediaater endokrinoloogi lisapädevusega				kuni kasvutsoonide sulgumiseni

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1415540	somatropiin, 8mg 1ml	H01AC01	SAIZEN 8 MG/ML, süstelahus kolbampullis, 1.5ml 1TK	Merck Serono S.p.A.	50		Endokrinoloog, Pediaater endokrinoloogi lisapädevusega				
					100	E89.3-E89.3, E23-E23, Q96-Q96, Q87.1-Q87.1, P05.1-P05.1, N18-N18	Pediaater endokrinoloogi lisapädevusega, Endokrinoloog				kuni kasvutsoonide sulgumiseni
					100	Q96-Q96, Q87-Q87, E23.0-E23.0, E23.1-E23.1, E89.3-E89.3, E23.3-E23.3	Endokrinoloog				
1249938	sorafeniib, 200mg	L01EX02	NEXAVAR, õhukese polümeerikattega tablett, 112TK	Bayer AG	100	C22-C22	Onkoloog				kuni haiguse progresseerumiseni, kui ravi alustamise sorafeniibiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 3 onkoloogi) vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud kaugelearenenud hepatotsellulaarne kartsinoom, patsiendi üldseisund on hea (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi) ning maksa funktsioon ei ole oluliselt häiritud.
					100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumis heledarakulise neeru kartsinoomi teise rea ravina pärast interferooni sisaldava ravi ebaõnnestumist patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine sorafeniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1, haiguse prognoos Hengi kriteeriumide järgi hea või keskmine ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena.

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1756852	sorafeniib, 200mg	L01EX02	SORAFENIB TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 112TK	Teva B.V.	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumis heledarakulise neeru kartsinoomi teise rea ravina pärast interferooni sisaldava ravi ebaõnnestumist patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine sorafeniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1, haiguse prognoos Hengi kriteeriumide järgi hea või keskmine ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena.
					100	C22-C22	Onkoloog				kuni haiguse progresseerumiseni, kui ravi alustamise sorafeniibiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 3 onkoloogi) vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud kaugelearenenud hepatotsellulaarne kartsinoom, patsiendi üldseisund on hea (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi) ning maksa funktsioon ei ole oluliselt häiritud.
1794359	sorafeniib, 200mg	L01EX02	SORAFENIB SANDOZ, õhukese polümeerikattega tablett, 112TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumis heledarakulise neeru kartsinoomi teise rea ravina pärast interferooni sisaldava ravi ebaõnnestumist patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine sorafeniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1, haiguse prognoos Hengi kriteeriumide järgi hea või keskmine ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena.
					100	C22-C22	Onkoloog				kuni haiguse progresseerumiseni, kui ravi alustamise sorafeniibiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 3 onkoloogi) vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud kaugelearenenud hepatotsellulaarne kartsinoom, patsiendi üldseisund on hea (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi) ning maksa funktsioon ei ole oluliselt häiritud.

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1806791	sorafeniib, 200mg	L01EX02	SORAFENIB ZENTIVA, õhukese polümeerikattega tablett, 112TK	Zentiva k.s.	100	C22-C22	Onkoloog				kuni haiguse progresseerumiseni, kui ravi alustamise sorafeniibiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 3 onkoloogi) vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud kaugelearenenud hepatotsellulaarne kartsinoom, patsiendi üldseisund on hea (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi) ning maksa funktsioon ei ole oluliselt häiritud.
					100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumis heledarakulise neeru kartsinoomi teise rea ravina pärast interferooni sisaldava ravi ebaõnnestumist patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine sorafeniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1, haiguse prognoos Hengi kriteeriumide järgi hea või keskmine ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena.
1890839	sorafeniib, 200mg	L01EX02	SORAFENIB ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 112TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumis heledarakulise neeru kartsinoomi teise rea ravina pärast interferooni sisaldava ravi ebaõnnestumist patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine sorafeniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1, haiguse prognoos Hengi kriteeriumide järgi hea või keskmine ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena.
					100	C22-C22	Onkoloog				kuni haiguse progresseerumiseni, kui ravi alustamise sorafeniibiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 3 onkoloogi) vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud kaugelearenenud hepatotsellulaarne kartsinoom, patsiendi üldseisund on hea (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi) ning maksa funktsioon ei ole oluliselt häiritud.
1071863	sotalool, 80mg	C07AA07	SOTAHEXAL 80 MG, tablett, 50TK	Hexal AG	75	I47-I49					
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1001091	spironolaktoon, 100mg	C03DA01	SPIRIX, tablett, 20TK	Orifarm Healthcare A/S	75	I10-I13					
					75	I50-I50					
					50						
					75	I15-I15					
					100	I27.0-I27.0					
1689060	spironolaktoon, 100mg	C03DA01	SPIRONOLACTONE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	Accord Healthcare B.V.	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					100	I27.0-I27.0					
					50						
1689071	spironolaktoon, 100mg	C03DA01	SPIRONOLACTONE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare B.V.	100	I27.0-I27.0					
					50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1000944	spironolaktoon, 25mg	C03DA01	SPIRIX, tablett, 20TK	Orifarm Healthcare A/S	100	I27.0-I27.0					
					75	I50-I50					
					50						
					75	I10-I13					
					75	I15-I15					
1688946	spironolaktoon, 25mg	C03DA01	SPIRONOLACTONE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	Accord Healthcare B.V.	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
					100	I27.0-I27.0					
1688957	spironolaktoon, 25mg	C03DA01	SPIRONOLACTONE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare B.V.	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
					100	I27.0-I27.0					
1001013	spironolaktoon, 50mg	C03DA01	SPIRIX, tablett, 20TK	Orifarm Healthcare A/S	75	I15-I15					
					50						
					100	I27.0-I27.0					
					75	I10-I13					
					75	I50-I50					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1042018	spironolaktoon, 50mg	C03DA01	VEROSPIRON, kõvakapsel, 30TK	Gedeon Richter Plc.	100	I27.0-I27.0					
					50						
					75	I50-I50					
					75	I15-I15					
					75	I10-I13					
1071650	spironolaktoon, 50mg	C03DA01	SPIRIX, tablett, 100TK	Orifarm Healthcare A/S	75	I15-I15					
					100	I27.0-I27.0					
					75	I50-I50					
					75	I10-I13					
					50						
1689004	spironolaktoon, 50mg	C03DA01	SPIRONOLACTONE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	Accord Healthcare B.V.	100	I27.0-I27.0					
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1689015	spironolaktoon, 50mg	C03DA01	SPIRONOLACTONE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					100	I27.0-I27.0					
1280056	stiripentool, 250mg	N03AX17	DIACOMIT, kõvakapsel, 60TK	Biocodex	100	G40-G40	Neuroloog				koos klobasaami ja valproaadiga väikelapse raske müokloonilise epilepsia (SMEI, Dravet sündroom) korral, kui kombinatsioonravi klobasaami ja valproaadiga on osutunud ebapiisavaks ning topiramaat ja levetiratsetaam on ebaefektiivsed või vastunäidustatud
1280146	stiripentool, 250mg	N03AX17	DIACOMIT, suukaudse suspensiooni pulber, 60TK	Biocodex	100	G40-G40	Neuroloog				koos klobasaami ja valproaadiga väikelapse raske müokloonilise epilepsia (SMEI, Dravet sündroom) korral, kui kombinatsioonravi klobasaami ja valproaadiga on osutunud ebapiisavaks ning topiramaat ja levetiratsetaam on ebaefektiivsed või vastunäidustatud
1280089	stiripentool, 500mg	N03AX17	DIACOMIT, kõvakapsel, 60TK	Biocodex	100	G40-G40	Neuroloog				koos klobasaami ja valproaadiga väikelapse raske müokloonilise epilepsia (SMEI, Dravet sündroom) korral, kui kombinatsioonravi klobasaami ja valproaadiga on osutunud ebapiisavaks ning topiramaat ja levetiratsetaam on ebaefektiivsed või vastunäidustatud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1280113	stiripentool, 500mg	N03AX17	DIACOMIT, suukaudse suspensiooni pulber, 60TK	Biocodex	100	G40-G40	Neuroloog				koos klobasaami ja valproaadiga väikelapse raske müokloonilise epilepsia (SMEI, Dravet sündroom) korral, kui kombinatsioonravi klobasaami ja valproaadiga on osutunud ebapiisavaks ning topiramaat ja levetiratsetaam on ebaefektiivsed või vastunäidustatud
1008818	sulfametoksasool+ trimetoprim, 40mg+8mg 1ml	J01EE01	BACTRIM, siirup, 100ml 1TK	Eumedica Pharmaceuticals GmbH	100	Z21-Z21, Z20.6-Z20.6, B20-B24	Infektsionist				
					50						
1023455	sulfasalasiin, 500mg	A07EC01	SALAZOPYRIN EN, gastroresistentne tablett, 100TK	Pfizer Europe MA EEIG	75	K51-K51, K50-K50	Pediaater gastroenteroloogi lisapädevusega, Pediaater, Gastroenteroloog				
					75	M05-M08, M45-M46, M02-M03, M13-M13	Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater, Reumatoloog	esmane			
					50						
1705115	sulpiriid, 100mg	N05AL01	BETAMAKS, tablett, 30TK	Grindeks AS	100	F20-F29	Psühhiaater				
					50						
1705126	sulpiriid, 200mg	N05AL01	BETAMAKS, tablett, 30TK	Grindeks AS	50						
					100	F20-F29	Psühhiaater				
1705081	sulpiriid, 50mg	N05AL01	BETAMAKS, tablett, 30TK	Grindeks AS	100	F20-F29	Psühhiaater				
					50						
1018482	sultamitsilliin, 375mg	J01CR04	UNASYN, õhukese polümeerikattega tablett, 12TK	Pfizer Europe MA EEIG	50						
1139914	sumatriptaan, 100mg	N02CC01	IMIGRAN FDT, õhukese polümeerikattega tablett, 2TK	GlaxoSmithKline Trading Services Limited	50						
					75	G43-G43					
1139947	sumatriptaan, 100mg	N02CC01	IMIGRAN FDT, õhukese polümeerikattega tablett, 6TK	GlaxoSmithKline Trading Services Limited	50						
					75	G43-G43					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1234213	sumatriptaan, 100mg	N02CC01	CINIE 100 MG, tablett, 6TK	Zentiva k.s.	75	G43-G43					
					50						
1234505	sumatriptaan, 100mg	N02CC01	SUMATRIPTAN STADA, tablett, 6TK	Stada Arzneimittel AG	75	G43-G43					
					50						
1278053	sumatriptaan, 100mg	N02CC01	SUMATRIPTAN ACTAVIS, kaetud tablett, 6TK	Teva B.V.	50						
					75	G43-G43					
1139880	sumatriptaan, 50mg	N02CC01	IMIGRAN FDT, õhukese polümeerikattega tablett, 2TK	GlaxoSmithKline Trading Services Limited	50						
					75	G43-G43					
1139903	sumatriptaan, 50mg	N02CC01	IMIGRAN FDT, õhukese polümeerikattega tablett, 6TK	GlaxoSmithKline Trading Services Limited	50						
					75	G43-G43					
1234156	sumatriptaan, 50mg	N02CC01	CINIE 50 MG, tablett, 6TK	Zentiva k.s.	75	G43-G43					
					50						
1277995	sumatriptaan, 50mg	N02CC01	SUMATRIPTAN ACTAVIS, kaetud tablett, 6TK	Teva B.V.	75	G43-G43					
					50						
1835805	sumatriptaan+naprokseen, 85mg+500mg	N02CC51	MIGSUN, õhukese polümeerikattega tablett, 9TK	Orion Corporation	75	G43-G43					
					50						
1725263	sunitiniib, 12,5mg	L01EX01	SUNITINIB TEVA, kõvakapsel, 28TK	Teva B.V.	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks
1759103	sunitiniib, 12,5mg	L01EX01	SUNITINIB SANDOZ, kõvakapsel, 28TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks
1776854	sunitiniib, 12,5mg	L01EX01	SUNITINIB VIATRIS, kõvakapsel, 28TK	Viatris Limited	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks
1842397	sunitiniib, 12,5mg	L01EX01	SUNITINIB ACCORD, kõvakapsel, 28TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks
1842409	sunitiniib, 12,5mg	L01EX01	SUNITINIB ACCORD, kõvakapsel, 28TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks
1842421	sunitiniib, 25mg	L01EX01	SUNITINIB ACCORD, kõvakapsel, 28TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1842432	sunitiniib, 25mg	L01EX01	SUNITINIB ACCORD, kõvakapsel, 28TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks
1725308	sunitiniib, 50mg	L01EX01	SUNITINIB TEVA, kõvakapsel, 28TK	Teva B.V.	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks
1759169	sunitiniib, 50mg	L01EX01	SUNITINIB SANDOZ, kõvakapsel, 28TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks
1842487	sunitiniib, 50mg	L01EX01	SUNITINIB ACCORD, kõvakapsel, 28TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks
1842498	sunitiniib, 50mg	L01EX01	SUNITINIB ACCORD, kõvakapsel, 28TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks
3129881	zanubrutiniib, 160mg	L01EL03	BRUKINSA, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Beone Medicines Ireland Limited	100	C88.0-C88.0	Hematoloog				monoteraapiana patsientidele, kes on saanud vähemalt ühte eelnevat ravi, või esmavaliku ravimina patsientidele, kellele ei sobi kemoimmunoteraapia
					100	C91.1-C91.1	Hematoloog				monoteraapiana patsientidele, kellel esineb 17p deletsioon, TP53 mutatsioon või 11q deletsioon ja kes ei ole eelnevalt ravi saanud. Monoteraapiana patsientidele, kes on saanud vähemalt ühte eelnevat ravi
1867798	zanubrutiniib, 80mg	L01EL03	BRUKINSA, kõvakapsel, 120TK	Beone Medicines Ireland Limited	100	C88.0-C88.0	Hematoloog				monoteraapiana patsientidele, kes on saanud vähemalt ühte eelnevat ravi, või esmavaliku ravimina patsientidele, kellele ei sobi kemoimmunoteraapia
					100	C91.1-C91.1	Hematoloog				monoteraapiana patsientidele, kellel esineb 17p deletsioon, TP53 mutatsioon või 11q deletsioon ja kes ei ole eelnevalt ravi saanud. Monoteraapiana patsientidele, kes on saanud vähemalt ühte eelnevat ravi
1113422	zidovudiin, 10mg 1ml	J05AF01	RETROVIR, suukaudne lahus, 200ml 1TK	Viiv Healthcare B.V.	50		Infektsionist				HIV-nakkuse profülaktikaks, v a tööülesannete täitmisega seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1005815	zuklopentiksool, 10mg	N05AF05	CISORDINOL, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	H. Lundbeck A/S	50						
					100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
1006232	zuklopentiksool, 200mg 1ml	N05AF05	CISORDINOL DEPOT, süstelahus, 1ml 1TK	H. Lundbeck A/S	50						
					100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1065226	zuklopentiksool, 200mg 1ml	N05AF05	CISORDINOL DEPOT, süstelahus, 1ml 10TK	H. Lundbeck A/S	50						
					100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
1006322	zuklopentiksool, 50mg 1ml	N05AF05	CISORDINOL-ACUTARD, süstelahus, 1ml 10TK	H. Lundbeck A/S	100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1679036	tadalafiil, 20mg	G04BE08	TADALAFIL ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Accord Healthcare B.V.	100	I27.0-I27.0	Reumatoloog, Kardioloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pulmonoloog, Pediaater, Pediaater kardioloogi lisapädevusega				NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel
					50	I27.0-I27.0	Kardioloog, Pediaater kardioloogi lisapädevusega, Pediaater, Pulmonoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog				

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1849282	tadalafiil, 20mg	G04BE08	ZENAVIL, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Medochemie Limited	50	I27.0-I27.0	Pediaater, Pediaater kardioloogi lisapädevusega, Kardioloog, Reumatoloog, Pulmonoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega				
					100	I27.0-I27.0	Kardioloog, Pediaater kardioloogi lisapädevusega, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog, Pulmonoloog, Pediaater				NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel
1811630	tafamidis, 61mg	N07XX08	VYNDAQEL, pehmekapsel, 30TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	E85.4-E85.4, E85.0-E85.0	Kardioloog				ravi alustamine vähemalt kahest kardioloogist, kellest üks peab olema PERH-,TÜK-i või ITK kardioloog, koosneva konsiiliumi otsuse alusel patsiendile, kellel on dokumenteeritud kardiomüopaatia, mis on seotud transtüretiiniga amüloidoosiga ning kellel esineb NYHA I–III klassi südamepuudulikkus
1753703	tafluprost, 0,015mg 1ml	S01EE05	TAFLOTAN, silmatilgad, lahus, 3ml 1TK	Santen Oy	100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			kui ravi jätkamine teiste glaukoomiravimitega on meditsiiniliselt vastunäidustatud bensalkooniumkloriidile tekkinud tõendatud ülitundlikkuse või olulise toksilise toime tõttu silma eesmisele osale
1870051	tafluprost, 0,015mg 1ml	S01EE05	TAFLOTAN, silmatilgad, lahus, 7ml 1TK	Santen Oy	100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			kui ravi jätkamine teiste glaukoomiravimitega on meditsiiniliselt vastunäidustatud bensalkooniumkloriidile tekkinud tõendatud ülitundlikkuse või olulise toksilise toime tõttu silma eesmisele osale
1179840	takroliimus, 0,3mg 1g	D11AH01	PROTOPIC, salv, 30g 1TK	LEO Pharma A/S	50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1294646	takroliimus, 0,5mg	L04AD02	ADVAGRAF, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 50TK	Astellas Pharma Europe B.V.	100	Z94-Z94, T86-T86					patsientidele, kellel esineb kõrge immunoloogiline risk (PRA >20%), korduvsiirdamise puhul, maksa- või kopsusiirdamise pihul, steroidresistentse ägeda äratõukereaktsiooni ravi järgselt ning müokardiinfarkti või müokardi revaskulariseeriva protseduuri järgselt
1776618	takroliimus, 0,5mg	L04AD02	DAILIPORT, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 50TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	100	Z94-Z94, T86-T86					patsientidele, kellel esineb kõrge immunoloogiline risk (PRA >20%), korduvsiirdamise puhul, maksa- või kopsusiirdamise pihul, steroidresistentse ägeda äratõukereaktsiooni ravi järgselt ning müokardiinfarkti või müokardi revaskulariseeriva protseduuri järgselt
1661105	takroliimus, 0,75mg	L04AD02	ENVARSUS, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Chiesi Farmaceutici S.p.A.	100	Z94-Z94, T86-T86					patsientidele, kellel esineb kõrge immunoloogiline risk (PRA >20%), korduvsiirdamise puhul, maksa- või kopsusiirdamise pihul, steroidresistentse ägeda äratõukereaktsiooni ravi järgselt ning müokardiinfarkti või müokardi revaskulariseeriva protseduuri järgselt
1294680	takroliimus, 1mg	L04AD02	ADVAGRAF, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 50TK	Astellas Pharma Europe B.V.	100	Z94-Z94, T86-T86					patsientidele, kellel esineb kõrge immunoloogiline risk (PRA >20%), korduvsiirdamise puhul, maksa- või kopsusiirdamise pihul, steroidresistentse ägeda äratõukereaktsiooni ravi järgselt ning müokardiinfarkti või müokardi revaskulariseeriva protseduuri järgselt
1661149	takroliimus, 1mg	L04AD02	ENVARSUS, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	Chiesi Farmaceutici S.p.A.	100	Z94-Z94, T86-T86					patsientidele, kellel esineb kõrge immunoloogiline risk (PRA >20%), korduvsiirdamise puhul, maksa- või kopsusiirdamise pihul, steroidresistentse ägeda äratõukereaktsiooni ravi järgselt ning müokardiinfarkti või müokardi revaskulariseeriva protseduuri järgselt
1776652	takroliimus, 1mg	L04AD02	DAILIPORT, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 50TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	100	Z94-Z94, T86-T86					patsientidele, kellel esineb kõrge immunoloogiline risk (PRA >20%), korduvsiirdamise puhul, maksa- või kopsusiirdamise pihul, steroidresistentse ägeda äratõukereaktsiooni ravi järgselt ning müokardiinfarkti või müokardi revaskulariseeriva protseduuri järgselt
1179851	takroliimus, 1mg 1g	D11AH01	PROTOPIC, salv, 30g 1TK	LEO Pharma A/S	50						
1665277	takroliimus, 1mg 1g	D11AH01	LEBSANAN, salv, 30g 1TK	Norameda UAB	50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1488337	takroliimus, 3mg	L04AD02	ADVAGRAF, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 50TK	Astellas Pharma Europe B.V.	100	Z94-Z94, T86-T86					patsientidele, kellel esineb kõrge immunoloogiline risk (PRA >20%), korduvsiirdamise puhul, maksa- või kopsusiirdamise pihul, steroidresistentse ägeda äratõukereaktsiooni ravi järgselt ning müokardiinfarkti või müokardi revaskulariseeriva protseduuri järgselt
1776731	takroliimus, 3mg	L04AD02	DAILIPORT, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 50TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	100	Z94-Z94, T86-T86					patsientidele, kellel esineb kõrge immunoloogiline risk (PRA >20%), korduvsiirdamise puhul, maksa- või kopsusiirdamise pihul, steroidresistentse ägeda äratõukereaktsiooni ravi järgselt ning müokardiinfarkti või müokardi revaskulariseeriva protseduuri järgselt
1661161	takroliimus, 4mg	L04AD02	ENVARSUS, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Chiesi Farmaceutici S.p.A.	100	Z94-Z94, T86-T86					patsientidele, kellel esineb kõrge immunoloogiline risk (PRA >20%), korduvsiirdamise puhul, maksa- või kopsusiirdamise pihul, steroidresistentse ägeda äratõukereaktsiooni ravi järgselt ning müokardiinfarkti või müokardi revaskulariseeriva protseduuri järgselt
1294668	takroliimus, 5mg	L04AD02	ADVAGRAF, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 50TK	Astellas Pharma Europe B.V.	100	Z94-Z94, T86-T86					patsientidele, kellel esineb kõrge immunoloogiline risk (PRA >20%), korduvsiirdamise puhul, maksa- või kopsusiirdamise pihul, steroidresistentse ägeda äratõukereaktsiooni ravi järgselt ning müokardiinfarkti või müokardi revaskulariseeriva protseduuri järgselt
1776775	takroliimus, 5mg	L04AD02	DAILIPORT, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 50TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	100	Z94-Z94, T86-T86					patsientidele, kellel esineb kõrge immunoloogiline risk (PRA >20%), korduvsiirdamise puhul, maksa- või kopsusiirdamise pihul, steroidresistentse ägeda äratõukereaktsiooni ravi järgselt ning müokardiinfarkti või müokardi revaskulariseeriva protseduuri järgselt
1347230	talidomiid, 50mg	L04AX02	THALIDOMIDE BMS, kõvakapsel, 28TK	Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG	100	C90.0-C90.0	Hematoloog				ravimi väljakirjutamise õigus hulgimüeloomi suukaudseks mono- või kombinatsioonraviks
1015704	tamoksifeen, 20mg	L02BA01	TAMOXIFEN "EBEWE", tablett, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	100	C50-C50	Günekoloog, Üldkirurg				günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks
					100	D18.1-D18.1	Pulmonoloog, Onkoloog				
					50						
					100	C00-D48	Onkoloog				

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1188143	tamsulosiin, 0,4mg	G04CA02	FLOSIN 0,4MG, toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	50						
1188378	tamsulosiin, 0,4mg	G04CA02	TAMSULOSIN AUXILIA, toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	Auxilia Pharma OÜ	50						
1188402	tamsulosiin, 0,4mg	G04CA02	TAMSULOSIN AUXILIA, toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel, 60TK	Auxilia Pharma OÜ	50						
1188480	tamsulosiin, 0,4mg	G04CA02	TAMSULOSIN LANNACHER, toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	G.L. Pharma GmbH	50						
1195826	tamsulosiin, 0,4mg	G04CA02	OMSAL, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	Gedeon Richter Plc.	50						
1436015	tamsulosiin, 0,4mg	G04CA02	TANYZ ERAS 0.4MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	KRKA d.d. Novo mesto	50						
3041558	tamsulosiin, 0,4mg	G04CA02	FLOSIN 0,4MG, toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	Lex Ano UAB	50						
3073845	tamsulosiin, 0,4mg	G04CA02	FLOSIN 0,4MG, toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel, 100TK	Lex Ano UAB	50						
1390463	tamsulosiin+dutasteriid, 0,4mg+0,5mg	G04CA52	COMBODART, kõvakapsel, 30TK	GlaxoSmithKline Trading Services Limited	50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1769609	tamsulosiin+dutasteriid, 0,4mg+0,5mg	G04CA52	DUTASTERIDE/TAMSULOSIN OLPHA, kõvakapsel, 30TK	Olpha AS	50						
1769744	tamsulosiin+dutasteriid, 0,4mg+0,5mg	G04CA52	DUTROZEN, kõvakapsel, 30TK	Zentiva k.s.	50						
1776821	tamsulosiin+dutasteriid, 0,4mg+0,5mg	G04CA52	DUTASTERIDE/TAMSULOSIN TEVA, kõvakapsel, 30TK	Teva B.V.	50						
1782660	tamsulosiin+dutasteriid, 0,4mg+0,5mg	G04CA52	TADUSTA, kõvakapsel, 30TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	50						
1782671	tamsulosiin+dutasteriid, 0,4mg+0,5mg	G04CA52	TADUSTA, kõvakapsel, 90TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	50						
3000496	tamsulosiin+solifenatsiin, 0,4mg+6mg	G04CA53	SOLITOMBO, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 60TK	Adamed Pharma S.A.	50						
1046292	telmisartaan, 40mg	C09CA07	MICARDIS, tablett, 28TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1395424	telmisartaan, 40mg	C09CA07	TELMISARTAN-RATIOPHARM 40MG, tablett, 28TK	Ratiopharm GmbH	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1430233	telmisartaan, 40mg	C09CA07	TELMISARTAN SANDOZ 40 MG, tablett, 28TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1482263	telmisartaan, 40mg	C09CA07	TOLURA, tablett, 30TK	KRKA d.d. Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1482274	telmisartaan, 40mg	C09CA07	TOLURA, tablett, 56TK	KRKA d.d. Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15					
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1046258	telmisartaan, 80mg	C09CA07	MICARDIS, tablett, 28TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1395569	telmisartaan, 80mg	C09CA07	TELMISARTAN-RATIOPHARM 80MG, tablett, 28TK	Ratiopharm GmbH	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1430389	telmisartaan, 80mg	C09CA07	TELMISARTAN SANDOZ 80 MG, tablett, 28TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1482331	telmisartaan, 80mg	C09CA07	TOLURA, tablett, 30TK	KRKA d.d. Novo mesto	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1482342	telmisartaan, 80mg	C09CA07	TOLURA, tablett, 56TK	KRKA d.d. Novo mesto	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1499452	telmisartaan+amlodipiin, 80mg+10mg	C09DB04	TWYNSTA, tablett, 28TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1643161	telmisartaan+amlodipiin, 80mg+10mg	C09DB04	MIXOR, tablett, 28TK	Zentiva k.s.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1707049	telmisartaan+amlodipiin, 80mg+10mg	C09DB04	TELDIPIN, tablett, 28TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1499384	telmisartaan+amlodipiin, 80mg+5mg	C09DB04	TWYNSTA, tablett, 28TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1643071	telmisartaan+amlodipiin, 80mg+5mg	C09DB04	MIXOR, tablett, 28TK	Zentiva k.s.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1706969	telmisartaan+amlodipiin, 80mg+5mg	C09DB04	TELDIPIN, tablett, 28TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1609613	telmisartaan+hüdroklorotiasiid, 40mg+12,5mg	C09DA85	TOLUCOMBI, tablett, 56TK	KRKA d.d. Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15					
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1114793	telmisartaan+hüdroklorotiasiid, 80mg+12,5mg	C09DA85	MICARDISPLUS, tablett, 28TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1566615	telmisartaan+hüdroklorotiasiid, 80mg+12,5mg	C09DA85	TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TAD, tablett, 30TK	TAD Pharma GmbH	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1567267	telmisartaan+hüdroklorotiasiid, 80mg+12,5mg	C09DA85	TELMISARTAN /HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ, kaetud tablett, 28TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1609691	telmisartaan+hüdroklorotiasiid, 80mg+12,5mg	C09DA85	TOLUCOMBI, tablett, 56TK	KRKA d.d. Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1612910	telmisartaan+hüdroklorotiasiid, 80mg+12,5mg	C09DA85	TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA PHARMA, tablett, 28TK	Teva B.V.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1367524	telmisartaan+hüdroklorotiasiid, 80mg+25mg	C09DA85	MICARDISPLUS, tablett, 28TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1566705	telmisartaan+hüdroklorotiasiid, 80mg+25mg	C09DA85	TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TAD, tablett, 30TK	TAD Pharma GmbH	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1567379	telmisartaan+hüdroklorotiasiid, 80mg+25mg	C09DA85	TELMISARTAN /HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ, kaetud tablett, 28TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1609770	telmisartaan+hüdroklorotiasiid, 80mg+25mg	C09DA85	TOLUCOMBI, tablett, 56TK	KRKA d.d. Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1613045	telmisartaan+hüdroklorotiasiid, 80mg+25mg	C09DA85	TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA PHARMA, tablett, 28TK	Teva B.V.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1677045	telmisartaan+hüdroklorotiasiid, 80mg+25mg	C09DA85	TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ACCORD, tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
3037913	telmisartaan+indapamiid, 40mg+1,5mg	C09DA87	TOLURINDO, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 30TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
3037777	telmisartaan+indapamiid, 80mg+1,5mg	C09DA87	TOLURINDO, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 30TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1458963	temosolomiid, 100mg	L01AX03	TEMOZOLOMIDE TEVA, kõvakapsel, 5TK	Teva B.V.	50						
					100	C71-C71	Onkoloog, Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega				konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel heas üldseisundis patsiendile (funktsionaalne klass 0…1 WHO järgi)
1462115	temosolomiid, 100mg	L01AX03	TEMOZOLOMIDE ACCORD, kõvakapsel, 5TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	C71-C71	Onkoloog, Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega				konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel heas üldseisundis patsiendile (funktsionaalne klass 0…1 WHO järgi)
					50						
1534676	temosolomiid, 100mg	L01AX03	BLASTOMAT 100 MG, kõvakapsel, 5TK	Zentiva k.s.	100	C71-C71	Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega, Onkoloog				konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel heas üldseisundis patsiendile (funktsionaalne klass 0…1 WHO järgi)
					50						
1462137	temosolomiid, 140mg	L01AX03	TEMOZOLOMIDE ACCORD, kõvakapsel, 5TK	Accord Healthcare S.L.U.	50						
					100	C71-C71	Onkoloog, Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega				konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel heas üldseisundis patsiendile (funktsionaalne klass 0…1 WHO järgi)

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1534698	temosolomiid, 140mg	L01AX03	BLASTOMAT 140 MG, kõvakapsel, 5TK	Zentiva k.s.	50						
					100	C71-C71	Onkoloog, Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega				konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel heas üldseisundis patsiendile (funktsionaalne klass 0…1 WHO järgi)
1458941	temosolomiid, 20mg	L01AX03	TEMOZOLOMIDE TEVA, kõvakapsel, 5TK	Teva B.V.	50						
					100	C71-C71	Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega, Onkoloog				konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel heas üldseisundis patsiendile (funktsionaalne klass 0…1 WHO järgi)
1462092	temosolomiid, 20mg	L01AX03	TEMOZOLOMIDE ACCORD, kõvakapsel, 5TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	C71-C71	Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega, Onkoloog				konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel heas üldseisundis patsiendile (funktsionaalne klass 0…1 WHO järgi)
					50						
1462171	temosolomiid, 250mg	L01AX03	TEMOZOLOMIDE ACCORD, kõvakapsel, 5TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	C71-C71	Onkoloog, Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega				konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel heas üldseisundis patsiendile (funktsionaalne klass 0…1 WHO järgi)
					50						
1736513	tenofoviiralafenamiid, 25mg	J05AF13	VEMLIDY, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Gilead Sciences Ireland Unlimited Company	100	B18.0-B18.1	Gastroenteroloog, Infektsionist				kroonilise progresseeruva kuluga B-viirushepatiidi raviks
1734825	tenofoviirdisoproksiil, 245mg	J05AF07	TENOFOVIR DISOPROXIL VIATRIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Viatris Limited	100	B18.0-B18.1	Infektsionist, Gastroenteroloog				kroonilise progresseeruva kuluga B-viirushepatiidi raviks

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1678541	tenofoviirdisoproksiil+emtritsitabiin, 245mg+200mg	J05AR03	EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva B.V.	100	Z20.6-Z20.6	Infektsionist				kokkupuute-järgseks (PEP) profülaktiliseks raviks HIV-infektsiooni nakatumise vältimiseks kuni 30-päevaks v.a tööülesannete täitmisega seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega
					50	Z29.2-Z29.2	Infektsionist, Dermatovenerol oog, uroloogia androloogia lisapädevusega , sünnitusabi ja günekoloogia				kuni kolmeks kuuks kokkupuute-eelseks (PrEP) profülaktiliseks raviks HIV-infektsiooni nakatumise vältimiseks HIV-negatiivsele isikule
1760217	tenofoviirdisoproksiil+emtritsitabiin, 245mg+200mg	J05AR03	EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL ACCORDPHARMA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare B.V.	100	Z20.6-Z20.6	Infektsionist				kokkupuute-järgseks (PEP) profülaktiliseks raviks HIV-infektsiooni nakatumise vältimiseks kuni 30-päevaks v.a tööülesannete täitmisega seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega
					50	Z29.2-Z29.2	Dermatovenerol oog, sünnitusabi ja günekoloogia, uroloogia androloogia lisapädevusega , Infektsionist				kuni kolmeks kuuks kokkupuute-eelseks (PrEP) profülaktiliseks raviks HIV-infektsiooni nakatumise vältimiseks HIV-negatiivsele isikule
3027079	teofülliin, 200mg	R03DA04	TEOTARD, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 100TK	Ideal Trade Links UAB	50						
					75	J45-J45					
					75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			
3039836	teofülliin, 200mg	R03DA04	TEOTARD, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 100TK	First Pharma OÜ	75	J45-J45					
					75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			
					50						
1158757	terbinafiin, 250mg	D01BA02	TERBINAFINE SANDOZ 250 MG, tablett, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
1176319	terbinafiin, 250mg	D01BA02	TERBINAFIN ACTAVIS, tablett, 28TK	Teva B.V.	50						
1176353	terbinafiin, 250mg	D01BA02	TERBINAFIN ACTAVIS, tablett, 56TK	Teva B.V.	50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1681501	terbinafiin, 250mg	D01BA02	TERBINAFIN ACTAVIS, tablett, 28TK	First Pharma OÜ	50						
1873469	terbinafiin, 250mg	D01BA02	LAMISIL, tablett, 14TK	Ideal Trade Links UAB	50						
1880670	terbinafiin, 250mg	D01BA02	TERBINAFINE SANDOZ 250 MG, tablett, 30TK	Ideal Trade Links UAB	50						
1882964	terbinafiin, 250mg	D01BA02	TERBINAFINE SANDOZ 250 MG, tablett, 30TK	Lex Ano UAB	50						
1624092	teriflunomiid, 14mg	L04AK02	AUBAGIO, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Sanofi Winthrop Industrie	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel (ägenemiste ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks
1857315	teriflunomiid, 14mg	L04AK02	TIFAY, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Stada Arzneimittel AG	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel (ägenemiste ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks
1858013	teriflunomiid, 14mg	L04AK02	TEREBYO, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel (ägenemiste ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks
1858147	teriflunomiid, 14mg	L04AK02	TERIFLUNOMIDE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Teva B.V.	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel (ägenemiste ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks
1858697	teriflunomiid, 14mg	L04AK02	TERIFLUNOMIDE ZENTIVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Zentiva k.s.	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel (ägenemiste ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks
1861129	teriflunomiid, 14mg	L04AK02	BOXARID, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Gedeon Richter Plc.	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel (ägenemiste ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks
1890851	teriflunomiid, 14mg	L04AK02	TERIFLUNOMIDE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel (ägenemiste ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1891267	teriflunomiid, 14mg	L04AK02	TERIFLUNOMIDE VIATRIS, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Viatris Limited	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel (ägenemiste ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks
3097481	teriflunomiid, 14mg	L04AK02	TERIFLUNOMIDE TEVAPHARM, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Teva B.V.	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel (ägenemiste ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks
1736995	teriparatiid, 20mcg 80mcl	H05AA02	MOVYMIA, süstelahus, 2.4ml 1TK	Stada Arzneimittel AG	75	M80-M80	Reumatoloog				patsientidele, kellel on anamneesis 2 lülimurdu või glükokortikosteroidravi foonil tekkinud 1 lülimurd või bisfosfonaatravi foonil tekkinud uus haprusmurd. Ravi maksimaalne kestvus on 2 aastat.
1798274	teriparatiid, 20mcg 80mcl	H05AA02	MOVYMIA, süstelahus, 2.4ml 1TK	Stada Arzneimittel AG	75	M80-M80	Reumatoloog				patsientidele, kellel on anamneesis 2 lülimurdu või glükokortikosteroidravi foonil tekkinud 1 lülimurd või bisfosfonaatravi foonil tekkinud uus haprusmurd. Ravi maksimaalne kestvus on 2 aastat.
1877632	teriparatiid, 20mcg 80mcl	H05AA02	SONDELBAY, süstelahus pen-süstlis, 2.4ml 1TK	Accord Healthcare S.L.U.	75	M80-M80	Reumatoloog				patsientidele, kellel on anamneesis 2 lülimurdu või glükokortikosteroidravi foonil tekkinud 1 lülimurd või bisfosfonaatravi foonil tekkinud uus haprusmurd. Ravi maksimaalne kestvus on 2 aastat.
3053539	tesepelumab, 210mg 1.91ml	R03DX11	TEZSPIRE, süstelahus pen-süstlis, 1.91ml 1TK	AstraZeneca AB	100	J45-J45	Pulmonoloog				vähemalt kolmest pulmonoloogist või allergoloog-immunoloogist koosneva eksperdikomisjoni otsusel 2. tüüpi põletikust juhitud astmaga patsiendile, kelle astma on vaatamata eelnevale pikaajalisele kolmikravile (inhaleeritav glükokortikosteroid ja pikatoimeline beeta-2-agonist koos antileukotrieeni või pikatoimelise teofülliinpreparaadi või pikatoimelise antikoliinergilise ainega) puudulikult kontrollitud. Kui 3 kuu möödumisel ravi alustamisest ei ole ekspertkomisjoni hinnangul astma ravi tulemused kliiniliselt oluliselt paranenud, lõpetatakse ravi selle preparaadiga

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1022623	testosteroon, 250mg 1ml	G03BA03	SUSTANON, süstelahus, 1ml 1TK	Aspen Pharma Trading Limited	100	C00-D48	Hematoloog, Onkoloog				
					50						
					100	E29.1-E29.1, E89.5-E89.5, E23-E23, Q98-Q98	Pediaater endokrinoloogi lisapädevusega, uroloogia androloogia lisapädevusega , Günekoloog, Endokrinoloog				
1343898	tetrabenasiin, 25mg	N07XX06	TETMODIS, tablett, 112TK	Walter Ritter GmbH & Co. KG	100	G10-G10	Neuroloog	esmane			hüperkineetiliste motoorsete häiretega Huntingtoni tõve raviks
1436835	tianeptiin, 12,5mg	N06AX14	SALYMBRA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
1436846	tianeptiin, 12,5mg	N06AX14	SALYMBRA, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
1891065	tianeptiin, 12,5mg	N06AX14	COAXIL, kaetud tablett, 90TK	Ideal Trade Links UAB	50						
3012758	tikagreloor, 60mg	B01AC24	TICAGRELOR OLPHA, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Olpha AS	50						
					75	I25.2-I25.2, I21-I22, Z95-Z95	Sisearst, Kardioloog	esmane			müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12 kuu vältel
1506585	tikagreloor, 90mg	B01AC24	BRILIQUE, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Astrazeneca AB	75	Z95-Z95, I21-I22, I25.2-I25.2	Kardioloog, Sisearst	esmane			müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12 kuu vältel
					50						
1798375	tikagreloor, 90mg	B01AC24	TILOBRASTIL, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	I21-I22, I25.2-I25.2, Z95-Z95	Sisearst, Kardioloog	esmane			müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12 kuu vältel

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1808467	tikagreloor, 90mg	B01AC24	ATIXARSO, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	75	Z95-Z95, I21-I22, I25.2-I25.2	Sisearst, Kardioloog	esmane			müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12 kuu vältel
					50						
1813597	tikagreloor, 90mg	B01AC24	TICAGRELOR VIATRIS, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Viatris Limited	75	I25.2-I25.2, I21-I22, Z95-Z95	Sisearst, Kardioloog	esmane			müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12 kuu vältel
					50						
1837324	tikagreloor, 90mg	B01AC24	TICAGRELOR ZENTIVA, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Zentiva k.s.	50						
					75	I21-I22, I25.2-I25.2, Z95-Z95	Kardioloog, Sisearst	esmane			müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12 kuu vältel
1862973	tikagreloor, 90mg	B01AC24	KOGAVANT, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Gedeon Richter Plc.	75	I25.2-I25.2, I21-I22, Z95-Z95	Sisearst, Kardioloog	esmane			müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12 kuu vältel
					50						
1876473	tikagreloor, 90mg	B01AC24	TICAGRELOR ELVIM, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	SIA Elvim	75	I21-I22, I25.2-I25.2, Z95-Z95	Kardioloog, Sisearst	esmane			müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12 kuu vältel
					50						
1886823	tikagreloor, 90mg	B01AC24	LACRAT, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Medochemie Limited	75	I25.2-I25.2, I21-I22, Z95-Z95	Kardioloog, Sisearst	esmane			müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12 kuu vältel
					50						
3012804	tikagreloor, 90mg	B01AC24	TICAGRELOR OLPHA, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Olpha AS	50						
					75	Z95-Z95, I21-I22, I25.2-I25.2	Sisearst, Kardioloog	esmane			müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12 kuu vältel
3012815	tikagreloor, 90mg	B01AC24	TICAGRELOR OLPHA, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Olpha AS	75	I25.2-I25.2, I21-I22, Z95-Z95	Sisearst, Kardioloog	esmane			müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12 kuu vältel
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3057229	tikagreloor, 90mg	B01AC24	TICAGRELOR TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Teva B.V.	75	Z95-Z95, I21-I22, I25.2-I25.2	Sisearst, Kardioloog	esmane			müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12 kuu vältel
					50						
1038956	timolool, 1mg 1g	S01ED01	TIMOSAN, silmageel, 5g 1TK	Santen Oy	100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
					50						
1252976	timolool+bimatoprost, 5mg+0,3mg 1ml	S01ED82	GANFORT, silmatilgad, lahus, 3ml 1TK	AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG	100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
					50						
1720134	timolool+bimatoprost, 5mg+0,3mg 1ml	S01ED82	BIMATOPROST/TIMOLOL TEVA, silmatilgad, lahus, 3ml 1TK	Teva B.V.	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
1720145	timolool+bimatoprost, 5mg+0,3mg 1ml	S01ED82	BIMATOPROST/TIMOLOL TEVA, silmatilgad, lahus, 3ml 3TK	Teva B.V.	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
1801561	timolool+bimatoprost, 5mg+0,3mg 1ml	S01ED82	BIMATOPROST/TIMOLOL ZENTIVA, silmatilgad, lahus, 3ml 1TK	Zentiva k.s.	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
1843084	timolool+bimatoprost, 5mg+0,3mg 1ml	S01ED82	BIMATOPROST/TIMOLOL ELVIM, silmatilgad, lahus, 3ml 1TK	SIA Elvim	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
1392207	timolool+brinsolamiid, 5mg+10mg 1ml	S01ED83	AZARGA, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK	Novartis Europharm Limited	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
1039799	timolool+dorsolamiid, 5mg+20mg 1ml	S01ED80	COSOPT, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK	Santen Oy	100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
					50						
1420243	timolool+dorsolamiid, 5mg+20mg 1ml	S01ED80	DORZOLAMIDE/TIMOLOL ELVIM, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK	SIA Elvim	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
1755503	timolool+dorsolamiid, 5mg+20mg 1ml	S01ED80	VIZIDOR DUO, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK	Bausch + Lomb Ireland Limited	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
1088254	timolool+latanoprost, 5mg+50mcg 1ml	S01ED84	XALACOM, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK	Upjohn EESV	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1445161	timolool+latanoprost, 5mg+50mcg 1ml	S01ED84	LATIRA, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK	Ratiopharm GmbH	100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
					50						
1445172	timolool+latanoprost, 5mg+50mcg 1ml	S01ED84	LATIRA, silmatilgad, lahus, 2.5ml 3TK	Ratiopharm GmbH	100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
					50						
1791255	timolool+latanoprost, 5mg+50mcg 1ml	S01ED84	LATANOPROST/TIMOLOL ELVIM, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK	SIA Elvim	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
3121917	timolool+latanoprost, 5mg+50mcg 1ml	S01ED84	XALACOM, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK	Lex Ano UAB	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
1618141	timolool+tafluprost, 5mg+15mcg 1ml	S01ED85	TAPTIQOM, silmatilgad, lahus üheannuselises konteineris, 0.3ml 30TK	Santen Oy	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			kui ravi jätkamine teiste glaukoomiravimitega on meditsiiniliselt vastunäidustatud bensalkooniumkloriidile tekkinud tõendatud ülitundlikkuse või olulise toksilise toime tõttu silma eesmisele osale ning monoteraapia säilitusainevaba prostaglandiini analoogiga ei ole langetanud piisavalt silma siserõhku
1792289	timolool+tafluprost, 5mg+15mcg 1ml	S01ED85	TAPTIQOM SINE, silmatilgad, lahus, 7ml 1TK	Santen Oy	100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			kui ravi jätkamine teiste glaukoomiravimitega on meditsiiniliselt vastunäidustatud bensalkooniumkloriidile tekkinud tõendatud ülitundlikkuse või olulise toksilise toime tõttu silma eesmisele osale ning monoteraapia säilitusainevaba prostaglandiini analoogiga ei ole langetanud piisavalt silma siserõhku
					50						
1243763	timolool+travoprost, 5mg+40mcg 1ml	S01ED81	DUOTRAV, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK	Novartis Europharm Limited	100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
					50						
1716656	timolool+travoprost, 5mg+40mcg 1ml	S01ED81	TRAVOPROST/TIMOLOL VIATRIS, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK	Viatris Limited	100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
					50						
1832453	timolool+travoprost, 5mg+40mcg 1ml	S01ED81	TRAVOPROST/TIMOLOL ELVIM, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK	SIA Elvim	100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
					50						
1004375	tioguaniin, 40mg	L01BB03	LANVIS, tablett, 25TK	Aspen Pharma Trading Limited	50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1111341	tiokthape, 600mg	A16AX01	THIOCTACID HR, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Viatris SIA	50						
1303276	tiokthape, 600mg	A16AX01	THIOGAMMA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Woerwag Pharma GmbH & Co. KG	50						
3112546	tiokthape, 600mg	A16AX01	THIOCTACID HR, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Lex Ano UAB	50						
1511301	tiotroopium, 2,5mcg 1annus	R03BB04	SPIRIVA RESPIMAT, inhalatsioonilahus, 60annus 1TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	50						
					75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			
1173822	tisanidiin, 2mg	M03BX02	SIRDALUD, tablett, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	G82-G82, G81-G81					
					50						
1839191	tisanidiin, 2mg	M03BX02	SIRDALUD, tablett, 30TK	Lex Ano UAB	75	G82-G82, G81-G81					
					50						
1865550	tisanidiin, 2mg	M03BX02	SIRDALUD, tablett, 30TK	Ideal Trade Links UAB	50						
					75	G82-G82, G81-G81					
3081507	tisanidiin, 2mg	M03BX02	SIRDALUD, tablett, 30TK	Lex Ano UAB	75	G81-G81, G82-G82					
					50						
1211599	tisanidiin, 4mg	M03BX02	SIRDALUD, tablett, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	G82-G82, G81-G81					
1854952	tisanidiin, 4mg	M03BX02	SIRDALUD, tablett, 30TK	Ideal Trade Links UAB	50						
					75	G82-G82, G81-G81					
1553880	tobramütsiin, 28mg	J01GB01	TOBI PODHALER, inhalatsioonipulber kõvakapslis, 224TK	VIATRIS HEALTHCARE Limited	100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater				Pseudomonas aeruginosa põhjustatud kroonilise kopsuinfektsiooni supressiivseks raviks tsüstilise fibroosiga patsientidel

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1646827	tobramütsiin, 300mg 5ml	J01GB01	TOBRAMYCIN VIA PHARMA, nebuliseeritav lahus, 5ml 56TK	Via Pharma UAB	100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater				Pseudomonas aeruginosa põhjustatud kroonilise kopsuinfektsiooni supressiivseks raviks tsüstilise fibroosiga patsientidel
1012543	tobramütsiin, 3mg 1g	S01AA12	TOBREX, silmasalv, 3.5g 1TK	Novartis Baltics SIA	50						
1809075	tofatsitiniib, 11mg	L04AF01	XELJANZ, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	K51-K51	Pediaater gastroenteroloogi lisapädevusega, Gastroenteroloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt kahe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud
					100	M05-M06, M08-M08	Reumatoloog, Pediaater, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega				ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt kahe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud
					100	M45-M46	Pediaater, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud
					100	M07.0-M07.3	Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus M07.0–3 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori ja ustekinumabi kasutamine vastunäidustatud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1859991	tofatsitiniib, 1mg 1ml	L04AF01	XELJANZ, suukaudne lahus, 240ml 1TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	M05-M05, M08-M08	Reumatoloog, Pediaater, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega				ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt kahe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud
					100	M07.0-M07.3	Pediaater, Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega				ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus M07.0–3 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori ja ustekinumabi kasutamine vastunäidustatud
					100	K51-K51	Pediaater gastroenteroloogi lisapädevusega, Gastroenteroloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt kahe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud
					100	M45-M46	Reumatoloog, Pediaater, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega				ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1742497	tofatsitiniib, 5mg	L04AF01	XELJANZ, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	M05-M06, M08-M08	Pediaater, Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega				ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt kahe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud
					100	M07.0-M07.3	Pediaater, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus M07.0–3 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori ja ustekinumabi kasutamine vastunäidustatud
					100	K51-K51	Pediaater, Pediaater gastroenteroloogi lisapädevusega, Gastroenteroloog				ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt kahe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud
					100	M45-M46	Pediaater, Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega				ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud
7000119	toitained ilma fenüülalaniinita,		PHLEXY-10 DRINK MIX , pulber, 20g N30	SHS International	50						
					100	E70.0-E70.1					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
7000131	toitained ilma fenüülalaniinita,		XP MAXAMAID (ORANGE FLAVOURED) pulber, pulber, 500g N4	SHS International	100	E70.0-E70.1					
					50						
7000142	toitained ilma fenüülalaniinita,		XP MAXAMAID (UNFLAVOURED) pulber, pulber, 500g N4	SHS International	50						
					100	E70.0-E70.1					
7000153	toitained ilma fenüülalaniinita,		XP MAXAMUM (ORANGE FLAVOURED) pulber, pulber, 500g N4	SHS International	100	E70.0-E70.1					
					50						
7000164	toitained ilma fenüülalaniinita,		XP MAXAMUM (UNFLAVOURED) pulber, pulber, 500g N4	SHS International	100	E70.0-E70.1					
					50						
7000186	toitained ilma fenüülalaniinita,		DUOCAL Supersoluble , pulber, 400 g	SHS	100	E70.0-E70.1					
					50						
7002504	toitained ilma fenüülalaniinita,		PKU-EXPRESS, pulber, 25g N30	Vitaflo International Ltd.	100	E70.0-E70.1					
7002515	toitained ilma fenüülalaniinita,		PKU-GEL, pulber, 20g N30	Vitaflo International Ltd.	100	E70.0-E70.1					
7002896	toitained ilma fenüülalaniinita,		PKU ANAMIX INFANT, pulber, 400g	SHS International Ltd	100	E70.1-E70.1, E70.0-E70.0					
7015744	toitained ilma fenüülalaniinita,		PKU Lophlex LQ Juicy berries 20, suukaudne lahus, 125ml N30	SHS International Ltd	100	E70.0-E70.1					
7015755	toitained ilma fenüülalaniinita,		PKU Lophlex LQ Juicy berries 10, suukaudne lahus, 62,5ml N60	SHS International Ltd	100	E70.0-E70.1					
7017982	toitained ilma fenüülalaniinita,		Milupa PKU 2-mix , pulber, 400g x 2	Nutricia Cuijk bv	100	E70.0-E70.0, E70.1-E70.1					
7015777	toitained ilma fenüülalaniinita,		PKU Lophlex LQ Juicy tropical 10, suukaudne lahus, 62,5ml N60	SHS International Ltd	100	E70.0-E70.1					
7017599	toitained ilma fenüülalaniinita,		COMIDA PKU B Formula Orange, pulber, 500g N1	Vitaflo International Ltd.	100	E70.1-E70.1, E70.0-E70.0					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
7017577	toitained ilma fenüülalaniinita,		COMIDA PKU A Formula, pulber, 400g N1	Vitaflo International Ltd.	100	E70.1-E70.1, E70.0-E70.0					
7017588	toitained ilma fenüülalaniinita,		COMIDA PKU B Formula, pulber, 500g N1	Vitaflo International Ltd.	100	E70.1-E70.1, E70.0-E70.0					
7015766	toitained ilma fenüülalaniinita,		PKU Lophlex LQ Juicy tropical 20, suukaudne lahus, 125ml N30	SHS International Ltd	100	E70.0-E70.1					
7004922	toitained ilma fenüülalaniinita,		PKU Squeezie, suukaudne pasta, 85 g manustamisvalmis toitainesegu kotikeses, ühes karbis on 30 kotikest (2550 g)	Vitaflo International Ltd.	100	E70.0-E70.1					
1371248	tokofersolaan, 50mg 1ml	A11HA08	VEDROP, suukaudne lahus, 60ml 1TK	Recordati Rare Diseases	100	E84-E84, Q44-Q44	Pediaater			19,00	raske kroonilise kolestaasi raviks kuni 18-aastastele patsientidele konsiiliumi (vähemalt 2 pediaatri ühise) otsuse alusel
1430086	tokofersolaan, 50mg 1ml	A11HA08	VEDROP, suukaudne lahus, 20ml 1TK	Recordati Rare Diseases	100	E84-E84, Q44-Q44	Pediaater			19,00	raske kroonilise kolestaasi raviks kuni 18-aastastele patsientidele konsiiliumi (vähemalt 2 pediaatri ühise) otsuse alusel
1284498	tolterodiin, 2mg	G04BD07	UROFLOW 2 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Zentiva k.s.	50						
1795877	tolterodiin, 2mg	G04BD07	UROFLOW 2 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	First Pharma OÜ	50						
3132021	tolterodiin, 2mg	G04BD07	UROFLOW 2 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Ideal Trade Links UAB	50						
3136621	tolterodiin, 2mg	G04BD07	UROFLOW 2 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Lex Ano UAB	50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1503762	tolterodiin, 4mg	G04BD07	UROFLOW 4MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 28TK	Zentiva k.s.	50						
3092677	tolterodiin, 4mg	G04BD07	UROFLOW 4MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 28TK	First Pharma OÜ	50						
1076778	topiramaat, 100mg	N03AX11	TOPAMAX, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Johnson & Johnson UAB	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					75	G43-G43					
1309878	topiramaat, 100mg	N03AX11	TOPIRAMATE ORION, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Orion Corporation	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50						
					75	G43-G43					
1456488	topiramaat, 100mg	N03AX11	TOPIRAMATE ELVIM, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	SIA Elvim	75	G43-G43					
					50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
1076846	topiramaat, 200mg	N03AX11	TOPAMAX, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Johnson & Johnson UAB	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					75	G43-G43					
					50						
1076688	topiramaat, 25mg	N03AX11	TOPAMAX, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Johnson & Johnson UAB	75	G43-G43					
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50						
1309812	topiramaat, 25mg	N03AX11	TOPIRAMATE ORION, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Orion Corporation	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50						
					75	G43-G43					
1456444	topiramaat, 25mg	N03AX11	TOPIRAMATE ELVIM, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	SIA Elvim	50						
					75	G43-G43					
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1076734	topiramaat, 50mg	N03AX11	TOPAMAX, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Johnson & Johnson UAB	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50						
					75	G43-G43					
1309834	topiramaat, 50mg	N03AX11	TOPIRAMATE ORION, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Orion Corporation	50						
					75	G43-G43					
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
1456466	topiramaat, 50mg	N03AX11	TOPIRAMATE ELVIM, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	SIA Elvim	75	G43-G43					
					50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
1158050	torasemiid, 100mg	C03CA04	TORASEMIDE HEXAL 100 MG, tablett, 30TK	Hexal AG	50						
1771332	torasemiid, 100mg	C03CA04	TORASEMIDE HEXAL 100 MG, tablett, 30TK	First Pharma OÜ	50						
1843769	torasemiid, 100mg	C03CA04	TORASEMIDE HEXAL 100 MG, tablett, 30TK	Lex Ano UAB	50						
1852512	torasemiid, 100mg	C03CA04	TORASEMIDE HEXAL 100 MG, tablett, 30TK	Ideal Trade Links UAB	50						
1032332	torasemiid, 10mg	C03CA04	TRIFAS 10 MG, tablett, 30TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	50						
1166015	torasemiid, 10mg	C03CA04	TORASEMIDE TEVA, tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	50						
1422717	torasemiid, 10mg	C03CA04	TORASEMIDE HEXAL, tablett, 30TK	Hexal AG	50						
1770892	torasemiid, 10mg	C03CA04	TORASEMIDE HEXAL, tablett, 30TK	First Pharma OÜ	50						
1770904	torasemiid, 10mg	C03CA04	TORASEMIDE HEXAL, tablett, 50TK	First Pharma OÜ	50						
1866461	torasemiid, 10mg	C03CA04	TORASEMIDE HEXAL, tablett, 30TK	Lex Ano UAB	50						
1873852	torasemiid, 10mg	C03CA04	TRIFAS 10 MG, tablett, 60TK	Ideal Trade Links UAB	50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1888454	torasemiid, 10mg	C03CA04	TRIFAS 10 MG, tablett, 30TK	Lex Ano UAB	50						
3002511	torasemiid, 10mg	C03CA04	TORASEMIDE ZENTIVA, tablett, 30TK	Zentiva k.s.	50						
3093061	torasemiid, 10mg	C03CA04	TORASEMIDE HEXAL, tablett, 30TK	Ideal Trade Links UAB	50						
1032321	torasemiid, 200mg	C03CA04	TRIFAS 200 MG, tablett, 30TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	50						
1158106	torasemiid, 200mg	C03CA04	TORASEMIDE HEXAL 200 MG, tablett, 30TK	Hexal AG	50						
1854985	torasemiid, 200mg	C03CA04	TORASEMIDE HEXAL 200 MG, tablett, 30TK	Ideal Trade Links UAB	50						
1861927	torasemiid, 200mg	C03CA04	TORASEMIDE HEXAL 200 MG, tablett, 30TK	First Pharma OÜ	50						
1165957	torasemiid, 5mg	C03CA04	TORASEMIDE TEVA, tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	50						
1043525	tramadool, 100mg	N02AX02	TRAMADOL KRKA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
1075665	tramadool, 100mg	N02AX02	TRAMADOL LANNACHER 100 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	G.L. Pharma GmbH	50						
1174621	tramadool, 100mg	N02AX02	MABRON RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Medochemie Ltd	50						
1085857	tramadool, 150mg	N02AX02	TRAMADOL LANNACHER 150MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	G.L. Pharma GmbH	50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1174632	tramadool, 150mg	N02AX02	MABRON RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Medochemie Ltd	50						
1759743	tramadool, 150mg	N02AX02	OLTERON, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	KRKA d.d. Novo mesto	50						
1085879	tramadool, 200mg	N02AX02	TRAMADOL LANNACHER 200 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	G.L. Pharma GmbH	50						
1174643	tramadool, 200mg	N02AX02	MABRON RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Medochemie Ltd	50						
1759822	tramadool, 200mg	N02AX02	OLTERON, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	KRKA d.d. Novo mesto	50						
1015580	tramadool, 50mg	N02AX02	TRAMADOL KRKA, kõvakapsel, 20TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	50						
1032679	tramadool, 50mg	N02AX02	TRAMADOL LANNACHER, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	G.L. Pharma GmbH	50						
1656952	trametiniib, 0,5mg	L01EE01	MEKINIST, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Novartis Europharm Limited	100	C43-C43	Onkoloog				konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) otsuse alusel BRAF V600 mutatsiooniga kaugelearenenud mitteresetseeritava või metastaatilise (IIIc-IV st) melanoomi raviks juhul, kui patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1 ja 3-kuulise intervalliga hinnatuna püsib haigus vähemalt stabiilsena (KT- või/ja muu asjakohase uuringu alusel hinnatuna haiguse progressiooni ei esine)

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1656985	trametiniib, 2mg	L01EE01	MEKINIST, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Novartis Europharm Limited	100	C43-C43	Onkoloog				konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) otsuse alusel BRAF V600 mutatsiooniga kaugelearenenud mitteresetseeritava või metastaatilise (IIIc-IV st) melanoomi raviks juhul, kui patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1 ja 3-kuulise intervalliga hinnatuna püsib haigus vähemalt stabiilsena (KT- või/ja muu asjakohase uuringu alusel hinnatuna haiguse progressiooni ei esine)
1074765	trandolapriil, 2mg	C09AA10	GOPTEN, kõvakapsel, 28TK	Viatris SIA	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1327520	trandolapriil, 4mg	C09AA10	GOPTEN, kõvakapsel, 28TK	Viatris SIA	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1233290	trandolapriil+verapamiil, 2mg+180mg	C09BB10	TARKA, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 28TK	Viatris SIA	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1377660	trandolapriil+verapamiil, 4mg+240mg	C09BB10	TARKA, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 28TK	Viatris SIA	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1083316	traneksaamhape, 500mg	B02AA02	CYKLOKAPRON, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	Viatris SIA	50						
3033447	traneksaamhape, 500mg	B02AA02	CYKLOKAPRON, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Ideal Trade Links UAB	50						
1130454	travoprost, 40mcg 1ml	S01EE04	TRAVATAN, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK	Novartis Europharm Limited	100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
					50						
1608027	travoprost, 40mcg 1ml	S01EE04	TRAVOPROST ZENTIVA, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK	Zentiva k.s.	100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
					50						
1798050	travoprost, 40mcg 1ml	S01EE04	TRAVOPROST ELVIM, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK	SIA Elvim	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
1799433	travoprost, 40mcg 1ml	S01EE04	VIZITRAV, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK	Bausch + Lomb Ireland Limited	100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1815634	treprostiniil, 10mg 1ml	B01AC21	TREPULMIX, infusioonilahus, 10ml 1TK	Scipharm S.a.r.l.	100	I27.0-I27.0	Kardioloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater kardioloogi lisapädevusega, Pediaater, Reumatoloog, Pulmonoloog				konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel kroonilise trombemboolilise pulmonaalhüpertensiooniga patsiendile, kellel kirurgiline ravi ei ole teostatav või kellel haigus kirurgilise ravi järel püsib või taastekib ning kelle seisund vastab NYHA III-IV funktsionaalsele klassile
1186040	treprostiniil, 1mg 1ml	B01AC21	REMODULIN, infusioonilahus, 20ml 1TK	Ferrer Internacional S.A.	100	I27.0-I27.0	Kardioloog, Pediaater kardioloogi lisapädevusega, Pulmonoloog, Pediaater				NYHA III või IV kl idiopaatilise või päriliku pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel patsiendile, kellel muud ravivõimalused on ebapiisavad või ravimvormi tõttu sobimatud
1815601	treprostiniil, 1mg 1ml	B01AC21	TREPULMIX, infusioonilahus, 10ml 1TK	Scipharm S.a.r.l.	100	I27.0-I27.0	Pulmonoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater kardioloogi lisapädevusega, Pediaater, Kardioloog, Reumatoloog				konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel kroonilise trombemboolilise pulmonaalhüpertensiooniga patsiendile, kellel kirurgiline ravi ei ole teostatav või kellel haigus kirurgilise ravi järel püsib või taastekib ning kelle seisund vastab NYHA III-IV funktsionaalsele klassile
1186062	treprostiniil, 2,5mg 1ml	B01AC21	REMODULIN, infusioonilahus, 20ml 1TK	Ferrer Internacional S.A.	100	I27.0-I27.0	Pulmonoloog, Kardioloog, Pediaater, Pediaater kardioloogi lisapädevusega				NYHA III või IV kl idiopaatilise või päriliku pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel patsiendile, kellel muud ravivõimalused on ebapiisavad või ravimvormi tõttu sobimatud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1815612	treprostiniil, 2,5mg 1ml	B01AC21	TREPULMIX, infusioonilahus, 10ml 1TK	Scipharm S.a.r.l.	100	I27.0-I27.0	Pediaater kardioloogi lisapädevusega, Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pulmonoloog, Kardioloog, Pediaater				konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel kroonilise trombemboolilise pulmonaalhüpertensiooniga patsiendile, kellel kirurgiline ravi ei ole teostatav või kellel haigus kirurgilise ravi järel püsib või taastekib ning kelle seisund vastab NYHA III-IV funktsionaalsele klassile
1186073	treprostiniil, 5mg 1ml	B01AC21	REMODULIN, infusioonilahus, 20ml 1TK	Ferrer Internacional S.A.	100	I27.0-I27.0	Kardioloog, Pulmonoloog, Pediaater, Pediaater kardioloogi lisapädevusega				NYHA III või IV kl idiopaatilise või päriliku pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel patsiendile, kellel muud ravivõimalused on ebapiisavad või ravimvormi tõttu sobimatud
1815623	treprostiniil, 5mg 1ml	B01AC21	TREPULMIX, infusioonilahus, 10ml 1TK	Scipharm S.a.r.l.	100	I27.0-I27.0	Pediaater kardioloogi lisapädevusega, Pulmonoloog, Pediaater, Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Kardioloog				konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel kroonilise trombemboolilise pulmonaalhüpertensiooniga patsiendile, kellel kirurgiline ravi ei ole teostatav või kellel haigus kirurgilise ravi järel püsib või taastekib ning kelle seisund vastab NYHA III-IV funktsionaalsele klassile
1008425	triamtsinoloon, 40mg 1ml	H02AB08	KENALOG, süstesuspensioon, 1ml 5TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1752959	trientiin, 150mg	A16AX12	CUPRIOR, õhukese polümeerikattega tablett, 72TK	Orphalan	100	E83.0-E83.0	Pediaater neuroloogi lisapädevusega, Pediaater gastroenteroloogi lisapädevusega, Pediaater, Neuroloog, Gastroenteroloog				Wilsoni tõve raviks patsientidele, kes ei talu D-penitsillamiini ravi või kellel on risk D-penitsillamiinist tingitud toksilisuse tekkeks (kaasuv neeruhaigus või raske trombotsütopeenia (trombotsüütide arv <= 40 E9/L)
1716319	trifluridiin+tipiratsiil, 15mg+6,14mg	L01BC83	LONSURF, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	Les Laboratoires Servier	100	C18-C20	Onkoloog				III ravireas kuni haiguse progressioonini metastaatilise kolorektaalvähiga täiskasvanud patsientidele, keda on eelnevalt ravitud olemasolevate ravimeetoditega sealhulgas fluoropürimidiini, oksaliplatiini ja irinotekaanipõhiste kemoteraapiatega, anti-VEGF raviga või kellele need ravimeetodid on vastunäidustatud või osutunud talumatuks
1716331	trifluridiin+tipiratsiil, 15mg+6,14mg	L01BC83	LONSURF, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Les Laboratoires Servier	100	C18-C20	Onkoloog				III ravireas kuni haiguse progressioonini metastaatilise kolorektaalvähiga täiskasvanud patsientidele, keda on eelnevalt ravitud olemasolevate ravimeetoditega sealhulgas fluoropürimidiini, oksaliplatiini ja irinotekaanipõhiste kemoteraapiatega, anti-VEGF raviga või kellele need ravimeetodid on vastunäidustatud või osutunud talumatuks
1716342	trifluridiin+tipiratsiil, 20mg+8,19mg	L01BC83	LONSURF, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	Les Laboratoires Servier	100	C18-C20	Onkoloog				III ravireas kuni haiguse progressioonini metastaatilise kolorektaalvähiga täiskasvanud patsientidele, keda on eelnevalt ravitud olemasolevate ravimeetoditega sealhulgas fluoropürimidiini, oksaliplatiini ja irinotekaanipõhiste kemoteraapiatega, anti-VEGF raviga või kellele need ravimeetodid on vastunäidustatud või osutunud talumatuks
1716364	trifluridiin+tipiratsiil, 20mg+8,19mg	L01BC83	LONSURF, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Les Laboratoires Servier	100	C18-C20	Onkoloog				III ravireas kuni haiguse progressioonini metastaatilise kolorektaalvähiga täiskasvanud patsientidele, keda on eelnevalt ravitud olemasolevate ravimeetoditega sealhulgas fluoropürimidiini, oksaliplatiini ja irinotekaanipõhiste kemoteraapiatega, anti-VEGF raviga või kellele need ravimeetodid on vastunäidustatud või osutunud talumatuks

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1014422	triheksüfenidüül, 2mg	N04AA01	CYCLODOL, tablett, 50TK	Grindeks AS	50						
1109641	trimetasidiin, 35mg	C01EB15	PREDUCTAL MR, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 60TK	Les Laboratoires Servier	50						
1293162	trimetasidiin, 35mg	C01EB15	TRIMETAZIDINE TEVA 35MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	Teva Pharma B.V.	50						
1016312	trimetoprim, 100mg	J01EA01	TRIMETOP 100MG, tablett, 30TK	Vitabalans Oy	50						
1400421	triptoreliin, 11,25mg	L02AE04	DIPHERELINE 11,25 MG, toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahusti, 1TK	Ipsen Pharma	75	E22.8-E22.8	Endokrinoloog, Pediaater endokrinoloogi lisapädevusega, Pediaater				
					100	N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks
					75	D25-D25	Günekoloog	esmane			mõõdukate kuni raskete sümptomitega patsientidele, kellel esmavaliku ravimid (traneksaamhape, hormonaalsed kontratseptiivid, emakasisesed rasestumisvastased vahendid) on ebaefektiivsed või talumatud.
					75	N80-N80	Günekoloog				III-IV astme endometrioosi põdevatele patsientidele
					50						
					100	C61-C61	Uroloog, Onkoloog				lokaalse või lokaalselt levinud kõrge riskiga (kliiniline staadium >=T2c või Gleasoni skoor 8-10 või PSA >=20 ng/ml või regionaalsete lümfisõlmede haaratus või positiivne resektsioonipiir) multimodaalse ravi osana kuni 2 aasta vältel ning metastaseerunud eesnäärmevähiga patsientidele

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1818604	triptoreliin, 22,5mg	L02AE04	DIPHERELINE 22,5 MG, toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahusti, 1TK	Ipsen Pharma	75	D25-D25	Günekoloog	esmane			mõõdukate kuni raskete sümptomitega patsientidele, kellel esmavaliku ravimid (traneksaamhape, hormonaalsed kontratseptiivid, emakasisesed rasestumisvastased vahendid) on ebaefektiivsed või talumatud.
					50						
					75	E22.8-E22.8	Endokrinoloog, Pediaater endokrinoloogi lisapädevusega, Pediaater				
					75	N80-N80	Günekoloog				III-IV astme endometrioosi põdevatele patsientidele
					100	N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks
					100	C61-C61	Onkoloog, Uroloog				lokaalse või lokaalselt levinud kõrge riskiga (kliiniline staadium >=T2c või Gleasoni skoor 8-10 või PSA >=20 ng/ml või regionaalsete lümfisõlmede haaratus või positiivne resektsioonipiir) multimodaalse ravi osana kuni 2 aasta vältel ning metastaseerunud eesnäärmevähiga patsientidele

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1040397	triptoreliin, 3,75mg	L02AE04	DIPHERELINE 3,75 MG, toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahusti, 1TK	Ipsen Pharma	50						
					100	N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks
					75	D25-D25	Günekoloog	esmane			mõõdukate kuni raskete sümptomitega patsientidele, kellel esmavaliku ravimid (traneksaamhape, hormonaalsed kontratseptiivid, emakasisesed rasestumisvastased vahendid) on ebaefektiivsed või talumatud.
					75	E22.8-E22.8	Endokrinoloog, Pediaater, Pediaater endokrinoloogi lisapädevusega				
					75	N80-N80	Günekoloog				III-IV astme endometrioosi põdevatele patsientidele
					100	C61-C61	Uroloog, Onkoloog				lokaalse või lokaalselt levinud kõrge riskiga (kliiniline staadium >=T2c või Gleasoni skoor 8-10 või PSA >=20 ng/ml või regionaalsete lümfisõlmede haaratus või positiivne resektsioonipiir) multimodaalse ravi osana kuni 2 aasta vältel ning metastaseerunud eesnäärmevähiga patsientidele
1090189	trospiumkloriid, 15mg	G04BD09	SPASMED 15, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Pro.Med.Cs Praha a.s.	50						
1025064	tsefadroksiil, 1g	J01DB05	DURACEF, lahustuv tablett, 10TK	Bausch Health Ireland Limited	50						
1027134	tsefadroksiil, 500mg	J01DB05	DURACEF, kõvakapsel, 12TK	Bausch Health Ireland Limited	50						
1067318	tsefadroksiil, 50mg 1ml	J01DB05	DURACEF, suukaudse suspensiooni pulber, 100ml 1TK	Bausch Health Ireland Limited	50						
3030466	tsefadroksiil, 50mg 1ml	J01DB05	DURACEF, suukaudse suspensiooni pulber, 60ml 1TK	Ideal Trade Links UAB	50						
1068320	tsefprosiil, 250mg	J01DC10	CEFZIL, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Bausch Health Ireland Limited	50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1068375	tsefprosiil, 500mg	J01DC10	CEFZIL, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Bausch Health Ireland Limited	50						
1028506	tsefprosiil, 50mg 1ml	J01DC10	CEFZIL, suukaudse suspensiooni pulber, 60ml 1TK	Bausch Health Ireland Limited	50						
1007110	tsefuroksiim, 250mg	J01DC02	ZINNAT, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
1438387	tsefuroksiim, 250mg	J01DC02	AXETINE, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Medochemie Limited	50						
1659922	tsefuroksiim, 250mg	J01DC02	FUROCEF, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	50						
1841307	tsefuroksiim, 250mg	J01DC02	ZINNAT, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Ideal Trade Links UAB	50						
1137350	tsefuroksiim, 25mg 1ml	J01DC02	ZINNAT, suukaudse suspensiooni graanulid, 100ml 1TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
3091924	tsefuroksiim, 25mg 1ml	J01DC02	ZINNAT, suukaudse suspensiooni graanulid, 50ml 2TK	Ideal Trade Links UAB	50						
1007143	tsefuroksiim, 500mg	J01DC02	ZINNAT, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
1287840	tsefuroksiim, 500mg	J01DC02	ZINNAT, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
1438398	tsefuroksiim, 500mg	J01DC02	AXETINE, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Medochemie Limited	50						
1580947	tsefuroksiim, 500mg	J01DC02	AXETINE, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Medochemie Limited	50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1659988	tsefuroksiim, 500mg	J01DC02	FUROCEF, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	50						
1660003	tsefuroksiim, 500mg	J01DC02	FUROCEF, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	50						
1841318	tsefuroksiim, 500mg	J01DC02	ZINNAT, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Ideal Trade Links UAB	50						
1862827	tsefuroksiim, 500mg	J01DC02	ZINNAT, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Lex Ano UAB	50						
3048117	tsefuroksiim, 500mg	J01DC02	ZINNAT, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Lex Ano UAB	50						
3073733	tsefuroksiim, 500mg	J01DC02	ZINNAT, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Ideal Trade Links UAB	50						
1073641	tselekoksiib, 100mg	M01AH01	CELEBREX, kõvakapsel, 20TK	Upjohn EESV	50						
1596719	tselekoksiib, 100mg	M01AH01	ACLEXA, kõvakapsel, 30TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	50						
1819335	tselekoksiib, 100mg	M01AH01	CELECOXIB ACCORD, kõvakapsel, 30TK	Accord Healthcare B.V.	50						
1596797	tselekoksiib, 200mg	M01AH01	ACLEXA, kõvakapsel, 30TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	50						
1815443	tselekoksiib, 200mg	M01AH01	ACLEXA, kõvakapsel, 30TK	First Pharma OÜ	50						
1819425	tselekoksiib, 200mg	M01AH01	CELECOXIB ACCORD, kõvakapsel, 30TK	Accord Healthcare B.V.	50						
1861365	tselekoksiib, 200mg	M01AH01	ACLEXA, kõvakapsel, 30TK	Ideal Trade Links UAB	50						
3110959	tselekoksiib, 200mg	M01AH01	ACLEXA, kõvakapsel, 30TK	Lex Ano UAB	50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1684560	tseritiniib, 150mg	L01ED02	ZYKADIA, kõvakapsel, 150TK	Novartis Europharm Limited	100	C34-C34	Onkoloog				anaplastilise lümfoomkinaas-positiivse kaugelearenenud varem ravimata mitteväikerakk-kopsuvähi raviks heas üldseisundis (ECOG 0-2) täiskasvanud patsientidele. Ravi alektiniibiga kestab kuni haiguse retsidiveerumiseni või vastuvõetamatu toksilisuse tekkimiseni
1077836	tsetirisiin, 10mg	R06AE07	ZYRTEC, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	UCB Pharma Oy Finland	50						
1098918	tsetirisiin, 10mg	R06AE07	CETIRIZIN ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva B.V.	50						
1430750	tsetirisiin, 10mg	R06AE07	CETRIX 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Vitabalans Oy	50						
1430772	tsetirisiin, 10mg	R06AE07	CETRIX 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Vitabalans Oy	50						
1828537	tsetirisiin, 10mg	R06AE07	ZYRTEC, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Lex Ano UAB	50						
1829909	tsetirisiin, 10mg	R06AE07	ZYRTEC, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Ideal Trade Links UAB	50						
1022869	tsetirisiin, 10mg 1ml	R06AE07	ZYRTEC, suukaudsed tilgad, lahus, 20ml 1TK	UCB Pharma Oy Finland	50						
1826580	tsetirisiin, 10mg 1ml	R06AE07	ZYRTEC, suukaudsed tilgad, lahus, 20ml 1TK	Lex Ano UAB	50						
1895799	tsetirisiin, 10mg 1ml	R06AE07	ZYRTEC, suukaudsed tilgad, lahus, 20ml 1TK	Ideal Trade Links UAB	50						
1043356	tsetroreliks, 0,25mg	H01CC02	CETROTIDE, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Merck Europe B.V.	100	N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks
					50						
1788442	tsiklopiroks, 80mg 1g	D01AE14	CICLOPIROX AUXILIA, ravimküünelakk, 6g 1TK	Nassington Limited	50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1604843	tsilostasool, 100mg	B01AC23	CILOZEK, tablett, 60TK	Adamed Pharma S.A.	50	I70-I79					
1815656	tsinakaltseet, 30mg	H05BX01	CINACALCET ACCORDPHARMA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	N18-N18	Nefroloog, Pediaater, Pediaater nefroloogi lisapädevusega				hemo- või peritoneaaldialüüsil olevatele patsientidele, kelle ravi vitamiin D analoogidega on ebaõnnestunud (seerumi parathormooni taseme eesmärkväärtust <=300 pg/ml ei saavutata) või kellele on vitamiin D analoogid vastunäidustatud
					50						
1815689	tsinakaltseet, 60mg	H05BX01	CINACALCET ACCORDPHARMA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	N18-N18	Nefroloog, Pediaater nefroloogi lisapädevusega, Pediaater				hemo- või peritoneaaldialüüsil olevatele patsientidele, kelle ravi vitamiin D analoogidega on ebaõnnestunud (seerumi parathormooni taseme eesmärkväärtust <=300 pg/ml ei saavutata) või kellele on vitamiin D analoogid vastunäidustatud
					50						
1815713	tsinakaltseet, 90mg	H05BX01	CINACALCET ACCORDPHARMA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	N18-N18	Pediaater, Pediaater nefroloogi lisapädevusega, Nefroloog				hemo- või peritoneaaldialüüsil olevatele patsientidele, kelle ravi vitamiin D analoogidega on ebaõnnestunud (seerumi parathormooni taseme eesmärkväärtust <=300 pg/ml ei saavutata) või kellele on vitamiin D analoogid vastunäidustatud
					50						
1196388	tsink, 25mg	A16AX05	WILZIN, kõvakapsel, 250TK	Recordati Rare Diseases	100	E83.0-E83.0	Pediaater gastroenteroloogi lisapädevusega, Gastroenteroloog, Pediaater, Neuroloog, Pediaater neuroloogi lisapädevusega	esmane			

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1196377	tsink, 50mg	A16AX05	WILZIN, kõvakapsel, 250TK	Recordati Rare Diseases	100	E83.0-E83.0	Gastroenteroloog, Neuroloog, Pediaater neuroloogi lisapädevusega, Pediaater gastroenteroloogi lisapädevusega, Pediaater	esmane			
1005488	tsiprofloksatsiin, 250mg	J01MA02	CIPRINOL, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater				
					100	D60-D64	Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega, Hematoloog, Pediaater				
					50						
1042827	tsiprofloksatsiin, 3mg 1ml	S01AE03	CILOXAN, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK	Novartis Baltics SIA	50						
3113738	tsiprofloksatsiin, 3mg 1ml	S01AE03	CILOXAN, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK	Ideal Trade Links UAB	50						
1005545	tsiprofloksatsiin, 500mg	J01MA02	CIPRINOL, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	100	E84-E84	Pediaater, Pulmonoloog				
					100	D60-D64	Pediaater, Hematoloog, Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega				
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1223929	tsiprofloksatsiin, 500mg	J01MA02	CIPROFLOXACIN SANDOZ 500MG, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	100	E84-E84	Pediaater, Pulmonoloog				
					50						
					100	D60-D64	Pediaater, Hematoloog, Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega				
1500994	tsiprofloksatsiin, 500mg	J01MA02	CIPROFLOXACIN OLPHA, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Olpha AS	100	D60-D64	Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega, Hematoloog, Pediaater				
					50						
					100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater				
1218361	tsitalopraam, 10mg	N06AB04	CITALOPRAM - TEVA 10MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1083563	tsitalopraam, 20mg	N06AB04	CITALEC 20, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Zentiva k.s.	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1112937	tsitalopraam, 20mg	N06AB04	CIRAL 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1185409	tsitalopraam, 20mg	N06AB04	CITALOPRAM ACTAVIS 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Actavis Group Ptc ehf.	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
1218462	tsitalopraam, 20mg	N06AB04	CITALOPRAM - TEVA 20MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1443631	tsitalopraam, 20mg	N06AB04	CITALOPRAM VITABALANS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Vitabalans Oy	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1021790	tsüklofosfamiid, 50mg	L01AA01	ENDOXAN, kaetud tablett, 50TK	OÜ Baxter Estonia	100	C00-D48	Hematoloog, Onkoloog				
					75	N00-N08	Pediaater nefroloogi lisapädevusega, Nefroloog, Pediaater				
					75	M45-M46, M08-M08, M30-M35, M05-M06	Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater				
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1008559	tsüklosporiin, 100mg	L04AD01	SANDIMMUN NEORAL, pehmekapsel, 50TK	Novartis Baltics SIA	100	Z94-Z94, T86-T86					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					75	L40-L40	Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega, Reumatoloog, Pediaater, Dermatovenerol oog				

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					75	N00-N08	Pediaater nefroloogi lisapädevusega, Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega, Pediaater, Nefroloog	esmane			

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					75	H30.2-H30.2, H20.0-H20.0, H30.0-H30.0, H30.8-H30.8, H20.1-H20.1, H30.9-H30.9, H30.1-H30.1	Oftalmoloog				
					75	L63-L63, L66-L66	Dermatovenerol oog				
					75	M05-M08, M30-M35, M45-M46	Reumatoloog, Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater	esmane			
					100	D46-D46	Hematoloog				
					100	D60-D64	Pediaater, Hematoloog, Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega				
					75	L20-L20	Dermatovenerol oog				
					50						
					75	L50.1-L50.5, L50.8-L50.9					
					75	L43-L43	Dermatovenerol oog, Pediaater, Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega				

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1098840	tsüklosporiin, 100mg	L04AD01	EQUORAL 100 MG, pehmekapsel, 50TK	Teva B.V.	100	D60-D64	Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega, Pediaater, Hematoloog				

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					75	L50.1-L50.5, L50.8-L50.9					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					75	H30.2-H30.2, H20.0-H20.0, H30.0-H30.0, H30.8-H30.8, H20.1-H20.1, H30.9-H30.9, H30.1-H30.1	Oftalmoloog				

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					75	L40-L40	Reumatoloog, Pediaater, Dermatovenerol oog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega				

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	Z94-Z94, T86-T86					
					100	D46-D46	Hematoloog				
					75	N00-N08	Pediaater nefroloogi lisapädevusega, Pediaater, Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega, Nefroloog	esmane			
					75	L63-L63, L66-L66	Dermatovenerol oog				
					75	M45-M46, M05-M08, M30-M35	Pediaater, Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega, Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega	esmane			
					75	L20-L20	Dermatovenerol oog				
					75	L43-L43	Pediaater, Dermatovenerol oog, Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega				
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1683097	tsüklosporiin, 1mg 1ml	S01XA18	IKERVIS, silmatilgad, emulsioon, 0.3ml 30TK	Santen Oy	75	M35.0-M35.0, H19.3-H19.3, H04.1-H04.1, H11.1-H11.1	Oftalmoloog				raske kuiva silma sündroomiga patsientidele, kellel on vaatamata vähemalt kolm kuud kestnud ravile niisutavate tilkadega punktkeratopaatia või konjunktiivi punktitaoline värvumine. Ravivastust hinnatakse peale kolme ravikuud alates esimese soodusretsepti kirjutamist ning soodustusega väljakirjutamise õigus jätkub patsientidele, kellel raviarsti hinnangul on dokumenteeritult sarvkesta ja/või konjunktiivi värvumine ravi mõjul oluliselt paranenud või subjektiivsed kaebused oluliselt vähenenud.

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1008526	tsüklosporiin, 25mg	L04AD01	SANDIMMUN NEORAL, pehmekapsel, 50TK	Novartis Baltics SIA	100	D46-D46	Hematoloog				

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	D60-D64	Pediaater, Hematoloog, Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega				

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					75	L43-L43	Pediaater, Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega, Dermatovenerol oog				

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	Z94-Z94, T86-T86					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					75	M45-M46, M05-M08, M30-M35	Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega, Reumatoloog, Pediaater	esmane			

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					75	N00-N08	Pediaater nefroloogi lisapädevusega, Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega, Nefroloog, Pediaater	esmane			
					75	L50.1-L50.5, L50.8-L50.9					
					75	L63-L63, L66-L66	Dermatovenerol oog				
					75	L40-L40	Pediaater, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega, Reumatoloog, Dermatovenerol oog				
					75	L20-L20	Dermatovenerol oog				
					75	H30.2-H30.2, H20.0-H20.0, H30.0-H30.0, H30.8-H30.8, H20.1-H20.1, H30.9-H30.9, H30.1-H30.1	Oftalmoloog				

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1008548	tsüklosporiin, 50mg	L04AD01	SANDIMMUN NEORAL, pehmekapsel, 50TK	Novartis Baltics SIA	75	L20-L20	Dermatovenerloog				

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	D60-D64	Pediaater, Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega, Hematoloog				

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	D46-D46	Hematoloog				

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					75	H30.2-H30.2, H20.0-H20.0, H30.0-H30.0, H30.8-H30.8, H20.1-H20.1, H30.9-H30.9, H30.1-H30.1	Oftalmoloog				

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					75	N00-N08	Nefroloog, Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega, Pediaater nefroloogi lisapädevusega, Pediaater	esmane			

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					75	L40-L40	Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega, Pediaater, Dermatovenerol oog				
					75	L50.1-L50.5, L50.8-L50.9					
					75	L63-L63, L66-L66	Dermatovenerol oog				
					100	Z94-Z94, T86-T86					
					75	L43-L43	Dermatovenerol oog, Pediaater, Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega				
					50						
					75	M45-M46, M05-M08, M30-M35	Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog, Pediaater, Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega	esmane			
1820179	tsüproteroon+östrogeen, 2mg+0,035mg	G03HB01	DIANE, kaetud tablett, 21TK	Lex Ano UAB	50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1891391	tsüproteroon+östrogeen, 2mg+0,035mg	G03HB01	DIANE, kaetud tablett, 21TK	Ideal Trade Links UAB	50						
1891414	tsüproteroon+östrogeen, 2mg+0,035mg	G03HB01	DIANE, kaetud tablett, 63TK	Ideal Trade Links UAB	50						
1646940	umeklidiinium, 55mcg 1mõõtannus	R03BB07	INCRUSE ELLIPTA, annustatud inhalatsioonipulber, 30mõõtannus 1TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50						
					75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1808951	upadatsitiniib, 15mg	L04AF03	RINVOQ, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK	AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG	100	K50-K50	Pediaater, Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega				ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt kahe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori ja ustekinumabi kasutamine vastunäidustatud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	K51-K51	Gastroenteroloog, Pediaater, Pediaater gastroenteroloogi lisapädevusega				ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt kahe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M07.0-M07.3	Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus M07.0–3 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori ja ustekinumabi kasutamine vastunäidustatud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M05-M06	Pediaater, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt kahe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	L20.8-L20.8, L20.9-L20.9	Dermatovenerol oog, Pediaater allergoloogi lisapädevusega, Allergoloog-immunoloog, Pediaater				mõõduka või raske haigusega (EASI>=16, DLQI>=10) patsiendile, kes ei allu süsteemsele konventsionaalsele ravile tsüklosporiiniga 8–12 nädala jooksul või kellele see on vastunäidustatud või põhjustanud talumatuid kõrvaltoimeid
					100	M31.5-M31.6	Pediaater, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog				vähemalt kolmest reumatoloogist koosneva ekspertkomisjoni otsuse alusel patsiendile, kellel hiidrakuline arteriit on tõendatud biopsia ja/või piltdiagnostikaga ning on täidetud üks järgnevatest kriteeriumitest: esineb ravirefraktaarne hiidrakuline arteriit, st vaatamata vähemalt ühe kuu kestnud optimaalsele standardravile glükokortikosteroidide maksimaalsete lubatud annustega ei saavutata remissiooni või on glükokortikosteroidravi suure tüsistuste riski tõttu vastunäidustatud; esineb taastekkiv hiidrakuline arteriit, st kindel ja tõendatud haigustunnuste või isheemiliste komplikatsioonide taastekkimine koos põletikumarkerite tõusuga varem hästi toiminud glükokortikosteroidravi foonil. Ravi upadatsitiniibiga lõpetatakse juhul, kui 12 nädala möödumisel bioloogilise ravi alustamisest ei ole saavutatud positiivset dünaamikat põletikumarkerites ja/või kliinilist paranemist
					100	M45-M46	Pediaater, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1860588	upadatsitiniib, 30mg	L04AF03	RINVOQ, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK	AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG	100	L20.8-L20.8, L20.9-L20.9	Pediaater, Pediaater allergoloogi lisapädevusega, Dermatovenerol oog, Allergoloog-immunoloog				mõõduka või raske haigusega (EASI>=16, DLQI>=10) patsiendile, kes ei allu süsteemsele konventsionaalsele ravile tsüklosporiiniga 8–12 nädala jooksul või kellele see on vastunäidustatud või põhjustanud talumatuid kõrvaltoimeid
					100	K50-K50	Reumatoloog, Pediaater, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega				ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt kahe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori ja ustekinumabi kasutamine vastunäidustatud
					100	K51-K51	Gastroenteroloog, Pediaater, Pediaater gastroenteroloogi lisapädevusega				ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt kahe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1887857	upadatsitiniib, 45mg	L04AF03	RINVOQ, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK	AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG	100	K51-K51	Pediaater, Gastroenteroloog, Pediaater gastroenteroloogi lisapädevusega				ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt kahe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud
					100	K50-K50	Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt kahe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori ja ustekinumabi kasutamine vastunäidustatud
1016985	ursodeoksükoolhape, 250mg	A05AA02	URSOSAN, kõvakapsel, 50TK	Pro.Med.Cs Praha a.s.	75	K73-K73, K74-K74	Gastroenteroloog, Pediaater gastroenteroloogi lisapädevusega, Pediaater	esmane			
					50						
1709401	ursodeoksükoolhape, 250mg	A05AA02	URSOGRIX, kõvakapsel, 50TK	Grindeks AS	50						
					75	K74-K74, K73-K73	Pediaater gastroenteroloogi lisapädevusega, Gastroenteroloog, Pediaater	esmane			

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3040669	ustekinumab, 45mg 0.5ml	L04AC05	STELARA, süstelahus pen-süstlis, 0.5ml 1TK	Janssen - Cilag International	100	L40-L40	Dermatovenerloog, Pediaater				haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor >=10 ja/või DLQI>=10 ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas)
					100	M07.0-M07.3	Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.
3062977	ustekinumab, 45mg 0.5ml	L04AC05	UZPRUVO, süstelahus süstlis, 0.5ml 1TK	Stada Arzneimittel AG	100	L40-L40	Dermatovenerloog, Pediaater				haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor >=10 ja/või DLQI>=10 ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas)
					100	M07.0-M07.3	Reumatoloog, Pediaater, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3072923	ustekinumab, 45mg 0.5ml	L04AC05	PYZCHIVA, süstelahus süstlis, 0.5ml 1TK	Samsung Bioepis NL B.V.	100	L40-L40	Pediaater, Dermatovenerol oog				haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor >=10 ja/või DLQI>=10 ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas)
					100	M07.0-M07.3	Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.
3090585	ustekinumab, 45mg 0.5ml	L04AC05	OTULFI, süstelahus süstlis, 0.5ml 1TK	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	100	L40-L40	Pediaater, Dermatovenerol oog				haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor >=10 ja/või DLQI>=10 ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas)
					100	M07.0-M07.3	Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3101779	ustekinumab, 45mg 0.5ml	L04AC05	IMULDOSA, süstelahus süstlis, 0.5ml 1TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	M07.0-M07.3	Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.
					100	L40-L40	Pediaater, Dermatovenerol oog				haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor >=10 ja/või DLQI>=10 ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas)
3126271	ustekinumab, 45mg 0.5ml	L04AC05	PYZCHIVA, süstelahus pen-süstlis, 0.5ml 1TK	Samsung Bioepis NL B.V.	100	L40-L40	Dermatovenerol oog, Pediaater				haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor >=10 ja/või DLQI>=10 ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas)
					100	M07.0-M07.3	Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3040670	ustekinumab, 90mg 1ml	L04AC05	STELARA, süstelahus pen-süstlis, 1ml 1TK	Janssen - Cilag International	100	L40-L40	Dermatovenerloog, Pediaater				haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor >=10 ja/või DLQI>=10 ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas)
					100	M07.0-M07.3	Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.
					100	K50-K50	Pediaater, Pediaater gastroenteroloogi lisapädevusega, Gastroenteroloog				ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeta, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeta

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3062988	ustekinumab, 90mg 1ml	L04AC05	UZPRUVO, süstelahus süstlis, 1ml 1TK	Stada Arzneimittel AG	100	M07.0-M07.3	Pediaater, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.
					100	L40-L40	Pediaater, Dermatovenerol oog				haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor >=10 ja/või DLQI>=10 ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas)
					100	K50-K50	Gastroenteroloog, Pediaater, Pediaater gastroenteroloogi lisapädevusega				ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeta, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeta

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3072934	ustekinumab, 90mg 1ml	L04AC05	PYZCHIVA, süstelahus süstlis, 1ml 1TK	Samsung Bioepis NL B.V.	100	M07.0-M07.3	Pediaater, Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.
					100	K50-K50	Pediaater gastroenteroloogi lisapädevusega, Pediaater, Gastroenteroloog				ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeta, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeta
					100	L40-L40	Pediaater, Dermatoveneroloog				haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor >=10 ja/või DLQI>=10 ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas)

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3090653	ustekinumab, 90mg 1ml	L04AC05	OTULFI, süstelahus süstlis, 1ml 1TK	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	100	K50-K50	Pediaater, Gastroenteroloog, Pediaater gastroenteroloogi lisapädevusega				ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeta, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeta
					100	M07.0-M07.3	Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.
					100	L40-L40	Pediaater, Dermatoveneroloog				haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor >=10 ja/või DLQI>=10 ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas)

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3101780	ustekinumab, 90mg 1ml	L04AC05	IMULDOSA, süstelahus süstlis, 1ml 1TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	M07.0-M07.3	Pediaater, Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.
					100	L40-L40	Dermatovenerol oog, Pediaater				haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor >=10 ja/või DLQI>=10 ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas)
					100	K50-K50	Pediaater gastroenteroloog i lisapädevusega, Pediaater, Gastroenteroloo g				ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeta, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeta

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3126282	ustekinumab, 90mg 1ml	L04AC05	PYZCHIVA, süstelahus pen-süstlis, 1ml 1TK	Samsung Bioepis NL B.V.	100	K50-K50	Pediaater, Pediaater gastroenteroloogi lisapädevusega, Gastroenteroloog				ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeta, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeta
					100	L40-L40	Pediaater, Dermatoveneroloog				haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor >=10 ja/või DLQI>=10 ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas)
					100	M07.0-M07.3	Reumatoloog, Pediaater, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.
1301094	valatsikloviir, 1000mg	J05AB11	VALACICLOVIR ACTAVIS 1000MG, õhukese polümeerikattega tablett, 21TK	Teva B.V.	50						
1016301	valatsikloviir, 500mg	J05AB11	VALTREX, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	GlaxoSmithKline Trading Services Limited	50						
1300936	valatsikloviir, 500mg	J05AB11	VALACICLOVIR ACTAVIS 500MG, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Teva B.V.	50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1831003	valatsikloviir, 500mg	J05AB11	VALTREX, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Ideal Trade Links UAB	50						
1888904	valatsikloviir, 500mg	J05AB11	VALTREX, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Lex Ano UAB	50						
3028025	valatsikloviir, 500mg	J05AB11	VALTREX, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Lex Ano UAB	50						
3093184	valatsikloviir, 500mg	J05AB11	VALTREX, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Ideal Trade Links UAB	50						
1076419	valproehape, 150mg	N03AG01	ORFIRIL LONG 150 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 100TK	Desitin Arzneimittel GmbH	100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1108246	valproehape, 150mg	N03AG01	ORFIRIL 150, gastroresistentne tablett, 100TK	Desitin Arzneimittel GmbH	100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50						
1043604	valproehape, 300mg	N03AG01	CONVULEX 300 MG, gastroresistentne pehmekapsel, 100TK	G.L. Pharma GmbH	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1077308	valproehape, 300mg	N03AG01	ORFIRIL LONG 300 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 100TK	Desitin Arzneimittel GmbH	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
1086555	valproehape, 300mg	N03AG01	DEPAKINE CHRONO 300 mg, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	Sanofi Winthrop Industrie	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1108257	valproehape, 300mg	N03AG01	ORFIRIL 300, gastroresistentne tablett, 100TK	Desitin Arzneimittel GmbH	50						
					100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
1128934	valproehape, 300mg	N03AG01	CONVULEX RETARD 300MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	G.L. Pharma GmbH	50						
					100	F10.4-F10.7, F20-F29, F17.4-F17.7, F00-F09, F30-F31, F70-F79, F12.4-F12.7, F15.4-F15.7, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F14.4-F14.7, F19.4-F19.7, F16.4-F16.7, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F32.2-F32.3, F33.2-F33.3	Psühhiaater	esmane			
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1076341	valproehape, 500mg	N03AG01	ORFIRIL LONG 500 MG, toimeainet prolongeeritult vabastavad graanulid, 100TK	Desitin Arzneimittel GmbH	100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50						
1086544	valproehape, 500mg	N03AG01	DEPAKINE CHRONO 500 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Sanofi Winthrop Industrie	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1128945	valproehape, 500mg	N03AG01	CONVULEX RETARD 500MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 50TK	G.L. Pharma GmbH	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					100	F10.4-F10.7, F20-F29, F17.4-F17.7, F00-F09, F30-F31, F70-F79, F12.4-F12.7, F15.4-F15.7, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F14.4-F14.7, F19.4-F19.7, F16.4-F16.7, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F32.2-F32.3, F33.2-F33.3	Psühhiaater	esmane			
1224672	valproehape, 500mg	N03AG01	VALPROATE SODIUM SANDOZ 500MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1836109	valproehape, 500mg	N03AG01	DEPAKINE CHRONO 500 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Ideal Trade Links UAB	100	F11.4-F11.7, F60.3-F60.3, F32.2-F32.3, F15.4-F15.7, F13.4-F13.7, F12.4-F12.7, F20-F29, F16.4-F16.7, F00-F09, F70-F79, F10.4-F10.7, F19.4-F19.7, F30-F31, F18.4-F18.7, F33.2-F33.3, F17.4-F17.7, F14.4-F14.7	Psühhiaater	esmane			
					50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
1043581	valproehape, 50mg 1ml	N03AG01	CONVULEX, siirup, 100ml 1TK	G.L. Pharma GmbH	100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1108268	valproehape, 600mg	N03AG01	ORFIRIL 600, gastroresistentne tablett, 50TK	Desitin Arzneimittel GmbH	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50						
					100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
1025536	valproehape, 60mg 1ml	N03AG01	ORFIRIL SAFT, suukaudne lahus, 250ml 1TK	Desitin Arzneimittel GmbH	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
					50						
1092844	valsartaan, 160mg	C09CA03	DIOVAN, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Novartis Baltics SIA	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1250378	valsartaan, 160mg	C09CA03	VALSACOR, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1250389	valsartaan, 160mg	C09CA03	VALSACOR, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1421233	valsartaan, 320mg	C09CA03	VALSACOR, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1250323	valsartaan, 80mg	C09CA03	VALSACOR, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1675324	valsartaan+amlodipiin, 160mg+10mg	C09DB01	WAMLOX, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1675234	valsartaan+amlodipiin, 160mg+5mg	C09DB01	WAMLOX, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1324314	valsartaan+hüdroklorotiasiid, 160mg+12,5mg	C09DA82	VALSACOMBI, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1324235	valsartaan+hüdroklorotiasiid, 160mg+25mg	C09DA82	VALSACOMBI, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1457557	valsartaan+hüdroklorotiasiid, 320mg+12,5mg	C09DA82	VALSACOMBI, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1324156	valsartaan+hüdroklorotiasiid, 80mg+12,5mg	C09DA82	VALSACOMBI, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15					
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1704181	valsartaan+sakubitriil, 103mg+97mg	C09DX04	ENTRESTO, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Novartis Europharm Limited	75	I50-I50					ravimi väljakirjutamise õigus patsientidele, kes vastavad kõigile järgnevatele kriteeriumitele: kellel on vähenenud vasaku vatsakese väljutusfraktsioon (LVEF<=40%), kes kuuluvad NYHA II-IV funktsionaalklassi, kellel ravikoostöö on hea, keda on eelnevalt vähemalt 3 kuud püsivalt ravitud AKE-inhibiitori või ARB eesmärkannusega (selle dokumenteeritud talumatuse korral vähemalt keskmise annusega või maksimaalselt talutava annusega), kombinatsioonis maksimaalses talutavas annuses beetablokaatoriga ning kellel kaksikravile mineralokortikoidiretseptori antagonisti lisamise järgselt südamepuudulikkuse sümptomid endiselt püsivad või süvenevad
1704147	valsartaan+sakubitriil, 26mg+24mg	C09DX04	ENTRESTO, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Novartis Europharm Limited	75	I50-I50					ravimi väljakirjutamise õigus patsientidele, kes vastavad kõigile järgnevatele kriteeriumitele: kellel on vähenenud vasaku vatsakese väljutusfraktsioon (LVEF<=40%), kes kuuluvad NYHA II-IV funktsionaalklassi, kellel ravikoostöö on hea, keda on eelnevalt vähemalt 3 kuud püsivalt ravitud AKE-inhibiitori või ARB eesmärkannusega (selle dokumenteeritud talumatuse korral vähemalt keskmise annusega või maksimaalselt talutava annusega), kombinatsioonis maksimaalses talutavas annuses beetablokaatoriga ning kellel kaksikravile mineralokortikoidiretseptori antagonisti lisamise järgselt südamepuudulikkuse sümptomid endiselt püsivad või süvenevad
1704169	valsartaan+sakubitriil, 51mg+49mg	C09DX04	ENTRESTO, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Novartis Europharm Limited	75	I50-I50					ravimi väljakirjutamise õigus patsientidele, kes vastavad kõigile järgnevatele kriteeriumitele: kellel on vähenenud vasaku vatsakese väljutusfraktsioon (LVEF<=40%), kes kuuluvad NYHA II-IV funktsionaalklassi, kellel ravikoostöö on hea, keda on eelnevalt vähemalt 3 kuud püsivalt ravitud AKE-inhibiitori või ARB eesmärkannusega (selle dokumenteeritud talumatuse korral vähemalt keskmise annusega või maksimaalselt talutava annusega), kombinatsioonis maksimaalses talutavas annuses beetablokaatoriga ning kellel kaksikravile mineralokortikoidiretseptori antagonisti lisamise järgselt südamepuudulikkuse sümptomid endiselt püsivad või süvenevad

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1008335	varfariin, 3mg	B01AA03	MAREVAN, tablett, 100TK	Orion Corporation	50						
					100	I80-I82, Z95.2-Z95.2, I26-I26, T82-T82, I67.6-I67.6, I27.0-I27.0					
					75	I47-I49					
1847831	varfariin, 3mg	B01AA03	MAREVAN, tablett, 100TK	Ideal Trade Links UAB	100	I80-I82, Z95.2-Z95.2, I26-I26, T82-T82, I67.6-I67.6, I27.0-I27.0					
					50						
					75	I47-I49					
3086805	varfariin, 3mg	B01AA03	MAREVAN, tablett, 100TK	Lex Ano UAB	100	I80-I82, Z95.2-Z95.2, I26-I26, T82-T82, I67.6-I67.6, I27.0-I27.0					
					50						
					75	I47-I49					
1008368	varfariin, 5mg	B01AA03	MAREVAN FORTE, tablett, 100TK	Orion Corporation	75	I47-I49					
					50						
					100	I80-I82, Z95.2-Z95.2, I26-I26, T82-T82, I67.6-I67.6, I27.0-I27.0					
3078514	varfariin, 5mg	B01AA03	MAREVAN FORTE, tablett, 100TK	Ideal Trade Links UAB	50						
					100	I80-I82, Z95.2-Z95.2, I26-I26, T82-T82, I67.6-I67.6, I27.0-I27.0					
					75	I47-I49					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1734421	venetoklaks, 100mg	L01XX52	VENCLYXTO, õhukese polümeerikattega tablett, 7TK	AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG	100	C91.1-C91.1	Hematoloog				kombinatsioonis ibrutiniibiga patsientidele, kes ei ole eelnevalt ravi saanud. Kombinatsioonravi pikkus on 15 tsüklit. Lisaks kombinatsioonis obinutuzumabiga eelnevalt ravimata patsientidele, kellele ravi fludarabiinil baseeruvate skeemidega on vastunäidustatud ning kombinatsioonis rituksimabiga patsientidele, kes on eelnevalt saanud vähemalt ühte ravi. Soodustus kehtib kõikidele kombinatsioonidele alates 5. ravinädalast.
1734432	venetoklaks, 100mg	L01XX52	VENCLYXTO, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG	100	C91.1-C91.1	Hematoloog				kombinatsioonis ibrutiniibiga patsientidele, kes ei ole eelnevalt ravi saanud. Kombinatsioonravi pikkus on 15 tsüklit. Lisaks kombinatsioonis obinutuzumabiga eelnevalt ravimata patsientidele, kellele ravi fludarabiinil baseeruvate skeemidega on vastunäidustatud ning kombinatsioonis rituksimabiga patsientidele, kes on eelnevalt saanud vähemalt ühte ravi. Soodustus kehtib kõikidele kombinatsioonidele alates 5. ravinädalast.
1734443	venetoklaks, 100mg	L01XX52	VENCLYXTO, õhukese polümeerikattega tablett, 112TK	AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG	100	C92-C92	Onkoloog, Hematoloog				kombinatsioonis hüpometüüliva ainega äsja diagnoositud ägeda müeloidleukeemiaga patsientidele, kellele ei sobi intensiivne keemiaravi
					100	C91.1-C91.1	Hematoloog				kombinatsioonis ibrutiniibiga patsientidele, kes ei ole eelnevalt ravi saanud. Kombinatsioonravi pikkus on 15 tsüklit. Lisaks kombinatsioonis obinutuzumabiga eelnevalt ravimata patsientidele, kellele ravi fludarabiinil baseeruvate skeemidega on vastunäidustatud ning kombinatsioonis rituksimabiga patsientidele, kes on eelnevalt saanud vähemalt ühte ravi. Soodustus kehtib kõikidele kombinatsioonidele alates 5. ravinädalast.
1734397	venetoklaks, 10mg	L01XX52	VENCLYXTO, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG	100	C91.1-C91.1	Hematoloog				kombinatsioonis ibrutiniibiga patsientidele, kes ei ole eelnevalt ravi saanud. Kombinatsioonravi pikkus on 15 tsüklit. Lisaks kombinatsioonis obinutuzumabiga eelnevalt ravimata patsientidele, kellele ravi fludarabiinil baseeruvate skeemidega on vastunäidustatud ning kombinatsioonis rituksimabiga patsientidele, kes on eelnevalt saanud vähemalt ühte ravi. Soodustus kehtib kõikidele kombinatsioonidele alates 5. ravinädalast.

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1734410	venetoklaks, 50mg	L01XX52	VENCLYXTO, õhukese polümeerikattega tablett, 7TK	AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG	100	C91.1-C91.1	Hematoloog				kombinatsioonis ibrutiniibiga patsientidele, kes ei ole eelnevalt ravi saanud. Kombinatsioonravi pikkus on 15 tsüklit. Lisaks kombinatsioonis obinutuzumabiga eelnevalt ravimata patsientidele, kellele ravi fludarabiinil baseeruvate skeemidega on vastunäidustatud ning kombinatsioonis rituksimabiga patsientidele, kes on eelnevalt saanud vähemalt ühte ravi. Soodustus kehtib kõikidele kombinatsioonidele alates 5. ravinädalast.
1232468	venlafaksiin, 150mg	N06AX16	ALVENTA, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 28TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	50						
					75	G43-G43					
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
1238510	venlafaksiin, 150mg	N06AX16	VENLAFAXINE WÖRWAG PHARMA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Woerwag Pharma GmbH & Co. KG	75	G43-G43					
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1306325	venlafaksiin, 150mg	N06AX16	VENLAGAMMA 150 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	Woerwag Pharma GmbH & Co. KG	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
					75	G43-G43					
1435205	venlafaksiin, 150mg	N06AX16	VENLAFAXINE ELVIM, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 28TK	SIA Elvim	75	G43-G43					
					50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
1786833	venlafaksiin, 150mg	N06AX16	ALVENTA, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	First Pharma OÜ	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					75	G43-G43					
					50						
1853805	venlafaksiin, 150mg	N06AX16	ALVENTA, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	Ideal Trade Links UAB	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					75	G43-G43					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3092655	venlafaksiin, 150mg	N06AX16	ALVENTA, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	Lex Ano UAB	75	G43-G43					
					50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
1232266	venlafaksiin, 37,5mg	N06AX16	ALVENTA, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 28TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
					75	G43-G43					
1232367	venlafaksiin, 75mg	N06AX16	ALVENTA, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 28TK	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto	50						
					75	G43-G43					
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
1238419	venlafaksiin, 75mg	N06AX16	VENLAFAXINE WÖRWAG PHARMA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Woerwag Pharma GmbH & Co. KG	75	G43-G43					
					50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
1306246	venlafaksiin, 75mg	N06AX16	VENLAGAMMA 75 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	Woerwag Pharma GmbH & Co. KG	75	G43-G43					
					50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
1435182	venlafaksiin, 75mg	N06AX16	VENLAFAXINE ELVIM, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 28TK	SIA Elvim	75	G43-G43					
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1853759	venlafaksiin, 75mg	N06AX16	ALVENTA, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	Ideal Trade Links UAB	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
					75	G43-G43					
3092385	venlafaksiin, 75mg	N06AX16	ALVENTA, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	Lex Ano UAB	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					75	G43-G43					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1073157	verapamiil, 120mg	C08DA01	ISOPTIN RETARD 120 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	Viatris SIA	75	I47-I49	Pediaater kardioloogi lisapädevusega, Kardioloog, Pediaater	esmane			
					75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1073405	verapamiil, 80mg	C08DA01	VERAPAMIL-RATIOPHARM 80 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	Ratiopharm GmbH	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
					75	I47-I49	Pediaater kardioloogi lisapädevusega, Kardioloog, Pediaater	esmane			
1856044	veritsiguaat, 10mg	C01DX22	VERQUVO, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Bayer AG	75	I50-I50					sümptomaatilise kroonilise südamepuudulikkusega patsiendile, kellel on vähenenud vasaku vatsakese väljutusfraktsioon (LVEF<=40%), kes kuulub NYHA II-IV funktsionaalklassi, kes juba saab ravi eesmärkannuses või maksimaalses talutavas annuses AKE/ARB/ARNI ja beeta-blokaatori ja mineralokortikoidretseptori antagonisti ja SGLT-2 inhibiitoriga ning kes on viimase 6 kuu jooksul vaatamata eelnevale optimaalsele südamepuudulikkuse ravile hospitaliseeritud südamepuudulikkuse dekompensatsiooni tõttu ja vajanud dekompensatsiooni tõttu intravenoosset ravi diureetikumi, vasodilataatori või inotroopse ravimiga
1855919	veritsiguaat, 2,5mg	C01DX22	VERQUVO, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Bayer AG	75	I50-I50					sümptomaatilise kroonilise südamepuudulikkusega patsiendile, kellel on vähenenud vasaku vatsakese väljutusfraktsioon (LVEF<=40%), kes kuulub NYHA II-IV funktsionaalklassi, kes juba saab ravi eesmärkannuses või maksimaalses talutavas annuses AKE/ARB/ARNI ja beeta-blokaatori ja mineralokortikoidretseptori antagonisti ja SGLT-2 inhibiitoriga ning kes on viimase 6 kuu jooksul vaatamata eelnevale optimaalsele südamepuudulikkuse ravile hospitaliseeritud südamepuudulikkuse dekompensatsiooni tõttu ja vajanud dekompensatsiooni tõttu intravenoosset ravi diureetikumi, vasodilataatori või inotroopse ravimiga

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1855975	veritsiguaat, 5mg	C01DX22	VERQUVO, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Bayer AG	75	I50-I50					sümptomaatilise kroonilise südamepuudulikkusega patsiendile, kellel on vähenenud vasaku vatsakese väljutusfraktsioon (LVEF<=40%), kes kuulub NYHA II-IV funktsionaalklassi, kes juba saab ravi eesmärkannuses või maksimaalses talutavas annuses AKE/ARB/ARNI ja beeta-blokaatori ja mineralokortikoidretseptori antagonisti ja SGLT-2 inhibiitoriga ning kes on viimase 6 kuu jooksul vaatamata eelnevale optimaalsele südamepuudulikkuse ravile hospitaliseeritud südamepuudulikkuse dekompensatsiooni tõttu ja vajanud dekompensatsiooni tõttu intravenoosset ravi diureetikumi, vasodilataatori või inotroopse ravimiga
1780332	vigabatriin, 500mg	N03AG04	KIGABEQ, lahustuv tablett, 50TK	Orphelia Pharma	100	G40.0-G40.0, G40.8-G40.8, G40.5-G40.5, G40.2-G40.2, G40.1-G40.1	Neuroloog, Pediaater neuroloogi lisapädevusega				imikutele ja lastele vanuses 1 kuu kuni 7 aastat kombinatsioonis teiste epilepsiaravimitega raviresistentse partsiaalse epilepsia (fokaalne epileptiline hoog) raviks, kui kõik muud sobivad ravimikombinatsioonid on osutunud ebapiisavaks või ei ole olnud talutavad.
					100	G40.4-G40.4	Neuroloog, Pediaater neuroloogi lisapädevusega				imikutele ja lastele vanuses 1 kuu kuni 7 aastat infantiilsete spasmide (Westi sündroom) raviks
1552856	VIII hüübimisfaktor, 1000RÜ	B02BD02	ADVATE, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Takeda Manufacturing Austria AG	100	D66-D66	Hematoloog, Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega, Pediaater				
1657593	VIII hüübimisfaktor, 1000RÜ	B02BD02	NUWIQ, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Octapharma AB	100	D66-D66	Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega, Pediaater, Hematoloog				

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1704260	VIII hüübimisfaktor, 1000RÜ	B02BD02	ELOCTA, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)	100	D66-D66	Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega, Hematoloog, Pediaater				
1762499	VIII hüübimisfaktor, 1000RÜ	B02BD02	ADYNOVI, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Baxalta Innovations GmbH	100	D66-D66	Hematoloog, Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega, Pediaater				
1783100	VIII hüübimisfaktor, 1000RÜ	B02BD02	JIVI, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Bayer AG	100	D66-D66	Hematoloog, Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega, Pediaater				
1798577	VIII hüübimisfaktor, 1000RÜ	B02BD02	ESPEROCT, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Novo Nordisk A/S	100	D66-D66	Pediaater, Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega, Hematoloog				
1799309	VIII hüübimisfaktor, 1000RÜ	B02BD02	BERIATE, süste-/infusioonilahuse pulber ja lahusti, 1TK	CSL Behring GmbH	100	D66-D66	Pediaater, Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega, Hematoloog				
3084320	VIII hüübimisfaktor, 1000RÜ	B02BD02	ALTUVOCT, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)	100	D66-D66	Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega, Pediaater, Hematoloog				

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1552867	VIII hüübimisfaktor, 1500RÜ	B02BD02	ADVATE, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Takeda Manufacturing Austria AG	100	D66-D66	Pediaater, Hematoloog, Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega				
1704271	VIII hüübimisfaktor, 1500RÜ	B02BD02	ELOCTA, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)	100	D66-D66	Pediaater, Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega, Hematoloog				
1704282	VIII hüübimisfaktor, 2000RÜ	B02BD02	ELOCTA, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)	100	D66-D66	Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega, Pediaater, Hematoloog				
1762501	VIII hüübimisfaktor, 2000RÜ	B02BD02	ADYNOVI, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Baxalta Innovations GmbH	100	D66-D66	Hematoloog, Pediaater, Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega				
1783111	VIII hüübimisfaktor, 2000RÜ	B02BD02	JIVI, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Bayer AG	100	D66-D66	Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega, Hematoloog, Pediaater				
1798601	VIII hüübimisfaktor, 2000RÜ	B02BD02	ESPEROCT, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Novo Nordisk A/S	100	D66-D66	Pediaater, Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega, Hematoloog				

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1799310	VIII hüübimisfaktor, 2000RÜ	B02BD02	BERIATE, süste-/infusioonilahuse pulber ja lahusti, 1TK	CSL Behring GmbH	100	D66-D66	Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega, Hematoloog, Pediaater				
3084331	VIII hüübimisfaktor, 2000RÜ	B02BD02	ALTUVOCT, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)	100	D66-D66	Hematoloog, Pediaater, Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega				
1552834	VIII hüübimisfaktor, 250RÜ	B02BD02	ADVATE, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Takeda Manufacturing Austria AG	100	D66-D66	Pediaater, Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega, Hematoloog				
1657571	VIII hüübimisfaktor, 250RÜ	B02BD02	NUWIQ, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Octapharma AB	100	D66-D66	Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega, Hematoloog, Pediaater				
1704237	VIII hüübimisfaktor, 250RÜ	B02BD02	ELOCTA, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)	100	D66-D66	Pediaater, Hematoloog, Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega				
3084230	VIII hüübimisfaktor, 250RÜ	B02BD02	ALTUVOCT, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)	100	D66-D66	Pediaater, Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega, Hematoloog				

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1704293	VIII hüübimisfaktor, 3000RÜ	B02BD02	ELOCTA, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)	100	D66-D66	Hematoloog, Pediaater, Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega				
1783122	VIII hüübimisfaktor, 3000RÜ	B02BD02	JIVI, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Bayer AG	100	D66-D66	Hematoloog, Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega, Pediaater				
3084342	VIII hüübimisfaktor, 3000RÜ	B02BD02	ALTUVOCT, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)	100	D66-D66	Hematoloog, Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega, Pediaater				
3084353	VIII hüübimisfaktor, 4000RÜ	B02BD02	ALTUVOCT, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)	100	D66-D66	Pediaater, Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega, Hematoloog				
1552845	VIII hüübimisfaktor, 500RÜ	B02BD02	ADVATE, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Takeda Manufacturing Austria AG	100	D66-D66	Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega, Hematoloog, Pediaater				
1657582	VIII hüübimisfaktor, 500RÜ	B02BD02	NUWIQ, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Octapharma AB	100	D66-D66	Hematoloog, Pediaater, Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega				

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1704248	VIII hüübimisfaktor, 500RÜ	B02BD02	ELOCTA, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)	100	D66-D66	Hematoloog, Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega, Pediaater				
1762477	VIII hüübimisfaktor, 500RÜ	B02BD02	ADYNOVI, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Baxalta Innovations GmbH	100	D66-D66	Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega, Pediaater, Hematoloog				
1783098	VIII hüübimisfaktor, 500RÜ	B02BD02	JIVI, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Bayer AG	100	D66-D66	Pediaater, Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega, Hematoloog				
1798566	VIII hüübimisfaktor, 500RÜ	B02BD02	ESPEROCT, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Novo Nordisk A/S	100	D66-D66	Pediaater, Hematoloog, Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega				
1799297	VIII hüübimisfaktor, 500RÜ	B02BD02	BERIATE, süste-/infusioonilahuse pulber ja lahusti, 1TK	CSL Behring GmbH	100	D66-D66	Hematoloog, Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega, Pediaater				
3084241	VIII hüübimisfaktor, 500RÜ	B02BD02	ALTUVOCT, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)	100	D66-D66	Hematoloog, Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega, Pediaater				

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1632361	vilanterool+flutikasoonfuroaat, 22mcg+184mcg 1mõõtannus	R03AK10	RELVAR ELLIPTA, annustatud inhalatsioonipulber, 30mõõtannus 1TK	GlaxoSmithKline Trading Services Limited	75	J45-J45					
					50						
1632338	vilanterool+flutikasoonfuroaat, 22mcg+92mcg 1mõõtannus	R03AK10	RELVAR ELLIPTA, annustatud inhalatsioonipulber, 30mõõtannus 1TK	GlaxoSmithKline Trading Services Limited	75	J45-J45					
					75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			C-D staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel eosinofiilide arv perifeerses veres on >=100 rakku/mikroliitris ning kellel on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasid ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga
					50						
1649224	vilanterool+umeklidiinium, 22mcg+55mcg 1mõõtannus	R03AL03	ANORO ELLIPTA, annustatud inhalatsioonipulber, 30mõõtannus 1TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			
					50						
1756436	vilanterool+umeklidiinium+flutikasoonfuroaat, 22mcg+55mcg+92mcg 1mõõtannus	R03AL08	TRELEGY ELLIPTA, annustatud inhalatsioonipulber, 30mõõtannus 1TK	GlaxoSmithKline Trading Services Limited	75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			patsiendile, kelle eosinofiilide arv perifeerses veres on >=100 rakku ning IKS/LABA või LAMA/LABA kaksikravil on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasid ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga; või kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsiendile, kes saab IKS+LAMA+LABA toimeaineid avatud kombinatsioonis (e. kolmikravi erinevatest inhalaatoritest); või kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsiendile, kelle eosinofiilide arv perifeerses veres on >=300 rakku ning LABA või LAMA monoteraapial on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasid ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga
					50						
1316326	vildagliptiin, 50mg	A10BH02	GALVUS, tablett, 60TK	Novartis Europharm Limited	50						
					75	E11-E11, E14-E14					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1712438	vildagliptiin, 50mg	A10BH02	SAXOTIN, tablett, 60TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	E11-E11, E14-E14					
1714160	vildagliptiin, 50mg	A10BH02	DALMEVIN, tablett, 60TK	Medochemie Limited	50						
					75	E11-E11, E14-E14					
3061213	vildagliptiin, 50mg	A10BH02	VILDAGLIPTIN OLPHA, tablett, 60TK	Olpha AS	75	E14-E14, E11-E11					
					50						
3040681	voklosporiin, 7,9mg	L04AD03	LUPKYNIS, pehmekapsel, 180TK	Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.	100	M32.1-M32.1	Reumatoloog				kombinatsioonis mükofenolaatmofetiiliga III, IV või V klassi (sh III/V ja IV/V segaklassi) aktiivse luupusnefriidi raviks täiskasvanud patsientidel, kellel on UPCR >500 mg/g (>50 mg/mmol) või UACR >300 mg/g (>30 mg/mmol)
1503605	von Willebrandi faktor+VIII hüübimisfaktor, 1000RÜ+1000RÜ	B02BD06	WILATE 1000, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Octapharma (Ip)	100	D68.0-D68.0, D66-D66, D68.4-D68.4	Hematoloog, Pediaater, Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega				
1038091	von Willebrandi faktor+VIII hüübimisfaktor, 375RÜ+500RÜ	B02BD06	IMMUNATE 500 RÜ/375 RÜ, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Baxalta Innovations GmbH	100	D66-D66, D68.4-D68.4, D68.0-D68.0	Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega, Hematoloog, Pediaater				
1503593	von Willebrandi faktor+VIII hüübimisfaktor, 500RÜ+500RÜ	B02BD06	WILATE 500, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Octapharma (Ip)	100	D68.0-D68.0, D66-D66, D68.4-D68.4	Pediaater, Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega, Hematoloog				

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1349232	von Willebrandi faktor+VIII hüübimisfaktor, 750RÜ+1000RÜ	B02BD06	IMMUNATE 1000 RÜ/750 RÜ, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Baxalta Innovations GmbH	100	D68.0-D68.0, D66-D66, D68.4-D68.4	Pediaater, Hematoloog, Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega				
1107975	vorikonasool, 200mg	J02AC03	VFEND, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	B45-B45, B48.2-B48.2, B48.8-B48.8, B37-B37					väljakirjutamise õigus kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks, kui muud suukaudsed seenevastased ravimid on ebaefektiivsed või vastunäidustatud
					100	B44-B44					patsientidele, kellel invasiivse seeninfektsiooni ravi on alustatud haiglas
1561823	vorikonasool, 200mg	J02AC03	VORICONAZOLE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Teva Pharma B.V.	100	B45-B45, B48.2-B48.2, B48.8-B48.8, B37-B37					väljakirjutamise õigus kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks, kui muud suukaudsed seenevastased ravimid on ebaefektiivsed või vastunäidustatud
					100	B44-B44					patsientidele, kellel invasiivse seeninfektsiooni ravi on alustatud haiglas
1615902	vorikonasool, 200mg	J02AC03	VORICONAZOLE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	B44-B44					patsientidele, kellel invasiivse seeninfektsiooni ravi on alustatud haiglas
					100	B45-B45, B48.2-B48.2, B48.8-B48.8, B37-B37					väljakirjutamise õigus kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks, kui muud suukaudsed seenevastased ravimid on ebaefektiivsed või vastunäidustatud
3106695	vorikonasool, 200mg	J02AC03	VORICONAZOLE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	B45-B45, B48.2-B48.2, B48.8-B48.8, B37-B37					väljakirjutamise õigus kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks, kui muud suukaudsed seenevastased ravimid on ebaefektiivsed või vastunäidustatud
					100	B44-B44					patsientidele, kellel invasiivse seeninfektsiooni ravi on alustatud haiglas

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1861152	vosoritiid, 0,4mg	M05BX07	VOXZOGO, süstelahuse pulber ja lahusti, 10TK	BioMarin International Limited	100	Q77.4-Q77.4	Pediaater endokrinoloogi lisapädevusega, Pediaater				akondroplaasia raviks 4 kuu vanustel ja vanematel patsientidel, kellel ei ole epifüüsid sulgunud. Akondroplaasia diagnoos peab olema kinnitatud asjakohaste geneetiliste analüüsidega.
1861163	vosoritiid, 0,56mg	M05BX07	VOXZOGO, süstelahuse pulber ja lahusti, 10TK	BioMarin International Limited	100	Q77.4-Q77.4	Pediaater, Pediaater endokrinoloogi lisapädevusega				akondroplaasia raviks 4 kuu vanustel ja vanematel patsientidel, kellel ei ole epifüüsid sulgunud. Akondroplaasia diagnoos peab olema kinnitatud asjakohaste geneetiliste analüüsidega.
1861174	vosoritiid, 1,2mg	M05BX07	VOXZOGO, süstelahuse pulber ja lahusti, 10TK	BioMarin International Limited	100	Q77.4-Q77.4	Pediaater endokrinoloogi lisapädevusega, Pediaater				akondroplaasia raviks 4 kuu vanustel ja vanematel patsientidel, kellel ei ole epifüüsid sulgunud. Akondroplaasia diagnoos peab olema kinnitatud asjakohaste geneetiliste analüüsidega.
1031746	östradiool, 100mcg 1g	G03CA03	LINOLADIOL N, kreem, 25g 1TK	Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel	50						
3017393	östradiool, 100mcg 1g	G03CA03	LINOLADIOL N, kreem, 25g 1TK	Ideal Trade Links UAB	50						
3129836	östradiool, 100mcg 1g	G03CA03	LINOLADIOL N, kreem, 25g 1TK	Lex Ano UAB	50						
1380721	östradiool, 10mcg	G03CA03	VAGIFEM, vaginaaltablett, 18TK	Novo Nordisk A/S	50						
1794113	östradiool, 10mcg	G03CA03	VAGIRUX, vaginaaltablett, 18TK	Gedeon Richter Plc.	50						
1030442	östradiool, 1mg	G03CA03	ESTROFEM, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Novo Nordisk A/S	100	E89.4-E89.4, E28.3-E28.3, E23.0-E23.0, Q96-Q97	Endokrinoloog, Pediaater endokrinoloogi lisapädevusega, Günekoloog	esmane		50,00	haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient on alla 50. eluaasta vana
					50						
3078503	östradiool, 1mg	G03CA03	ESTROFEM, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Lex Ano UAB	50						
					100	E89.4-E89.4, E28.3-E28.3, E23.0-E23.0, Q96-Q97	Günekoloog, Endokrinoloog, Pediaater endokrinoloogi lisapädevusega	esmane		50,00	haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient on alla 50. eluaasta vana

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1063415	östradiool, 1mg 1g	G03CA03	DIVIGEL, transdermaalne geel, 1g 28TK	Orion Corporation	50						
1030431	östradiool, 2mg	G03CA03	ESTROFEM, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Novo Nordisk A/S	100	E89.4-E89.4, E28.3-E28.3, E23.0-E23.0, Q96-Q97	Günekoloog, Endokrinoloog, Pediaater endokrinoloogi lisapädevusega	esmane		50,00	haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient on alla 50. eluaasta vana
					50						
1829752	östradiool, 2mg	G03CA03	ESTROFEM, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Lex Ano UAB	50						
					100	E89.4-E89.4, E28.3-E28.3, E23.0-E23.0, Q96-Q97	Günekoloog, Endokrinoloog, Pediaater endokrinoloogi lisapädevusega	esmane		50,00	haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient on alla 50. eluaasta vana
3104626	östradiool, 2mg	G03CA03	ESTROFEM, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Ideal Trade Links UAB	100	E89.4-E89.4, E28.3-E28.3, E23.0-E23.0, Q96-Q97	Pediaater endokrinoloogi lisapädevusega, Endokrinoloog, Günekoloog	esmane		50,00	haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient on alla 50. eluaasta vana
					50						
1031735	östradiool+prednisoloon, 0,05mg+4mg 1g	G03CA80	LINOLADIOL-H N, kreem, 25g 1TK	Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel	50						
3129847	östradiool+prednisoloon, 0,05mg+4mg 1g	G03CA80	LINOLADIOL-H N, kreem, 25g 1TK	Lex Ano UAB	50						
1022634	östriool, 500mcg	G03CA04	OVESTIN, vaginaalsuposiit, 15TK	Aspen Pharma Trading Limited	50						
3074262	östriool, 500mcg	G03CA04	OVESTIN, vaginaalsuposiit, 15TK	Ideal Trade Links UAB	50						