

## TERVISEKASSA RAVIMITE LOETELU

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1734768	abirateroon, 500mg	L02BX0 3	ZYTIGA, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Janssen - Cilag International	100	C61-C61	Onkoloog, Uroloog				metastaatilise hormoonsensitiivse eesnäärmevähi raviks ning metastaatilise kastratsioonresistentse eesnäärmevähi raviks patsientidele, kes ei ole enne haiguse metastaseerumist saanud ravi teise põlvkonna androgeenireseptori inhibiitoriga ja patsientidele, kelle haigus on dotsetakseelil põhineva kemoterapia ajal või järgselt progresseerunud. Ravimi kasutamisele ei või eelneda metastaatilise haiguse ravi apalutamiidi, darolutamiidi, ensalutamiidi või abiraterooniga varasemas ravireas, kuid lubatud on ravimi vahetus talumatute kõrvaltoimete ilmnemisel

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1801022	abirateroon, 500mg	L02BX0 3	ABIRATERONE NORAMEDA, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Norameda UAB	100	C61-C61	Uroloog, Onkoloog				metastaatilise hormoonsensitiivse eesnäärmevähi raviks ning metastaatilise kastratsioonresistentse eesnäärmevähi raviks patsientidele, kes ei ole enne haiguse metastaseerumist saanud ravi teise põlvkonna androgeenireseptori inhibiitoriga ja patsientidele, kelle haigus on dotsetakseelil põhineva kemoterapia ajal või järgselt progresseerunud. Ravimi kasutamisele ei või eelneda metastaatilise haiguse ravi apalutamiidi, darolutamiidi, ensalutamiidi või abiraterooniga varasemas ravireas, kuid lubatud on ravimi vahetus talumatute kõrvaltoimete ilmnemisel
1801055	abirateroon, 500mg	L02BX0 3	ABIRATERONE G.L. PHARMA, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	G.L. Pharma GmbH	100	C61-C61	Uroloog, Onkoloog				metastaatilise hormoonsensitiivse eesnäärmevähi raviks ning metastaatilise kastratsioonresistentse eesnäärmevähi raviks patsientidele, kes ei ole enne haiguse metastaseerumist saanud ravi teise põlvkonna androgeenireseptori inhibiitoriga ja patsientidele, kelle haigus on dotsetakseelil põhineva kemoterapia ajal või järgselt progresseerunud. Ravimi kasutamisele ei või eelneda metastaatilise haiguse ravi apalutamiidi, darolutamiidi, ensalutamiidi või abiraterooniga varasemas ravireas, kuid lubatud on ravimi vahetus talumatute kõrvaltoimete ilmnemisel
1801673	abirateroon, 500mg	L02BX0 3	ABIRATERONE RICHTER, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Gedeon Richter Plc.	100	C61-C61	Uroloog, Onkoloog				metastaatilise hormoonsensitiivse eesnäärmevähi raviks ning metastaatilise kastratsioonresistentse eesnäärmevähi raviks patsientidele, kes ei ole enne haiguse metastaseerumist saanud ravi teise põlvkonna androgeenireseptori inhibiitoriga ja patsientidele, kelle haigus on dotsetakseelil põhineva kemoterapia ajal või järgselt progresseerunud. Ravimi kasutamisele ei või eelneda metastaatilise haiguse ravi apalutamiidi, darolutamiidi, ensalutamiidi või abiraterooniga varasemas ravireas, kuid lubatud on ravimi vahetus talumatute kõrvaltoimete ilmnemisel

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1827952	abirateroon, 500mg	L02BX0 3	ABIRATERONE VIASANA, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Viasana UAB	100	C61-C61	Onkoloog, Uroloog				metastaatilise hormoonsensitiivse eesnäärmevähi raviks ning metastaatilise kastratsioonresistentse eesnäärmevähi raviks patsientidele, kes ei ole enne haiguse metastaseerumist saanud ravi teise põlvkonna androgeenireseptori inhibiitoriga ja patsientidele, kelle haigus on dotsetakseelil põhineva kemoterapia ajal või järgselt progresseerunud. Ravimi kasutamisele ei või eelneda metastaatilise haiguse ravi apalutamiidi, darolutamiidi, ensalutamiidi või abiraterooniga varasemas ravireas, kuid lubatud on ravimi vahetus talumatute kõrvaltoimete ilmnemisel
1829998	abirateroon, 500mg	L02BX0 3	ABIRATERONE ZENTIVA, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Zentiva k.s.	100	C61-C61	Onkoloog, Uroloog				metastaatilise hormoonsensitiivse eesnäärmevähi raviks ning metastaatilise kastratsioonresistentse eesnäärmevähi raviks patsientidele, kes ei ole enne haiguse metastaseerumist saanud ravi teise põlvkonna androgeenireseptori inhibiitoriga ja patsientidele, kelle haigus on dotsetakseelil põhineva kemoterapia ajal või järgselt progresseerunud. Ravimi kasutamisele ei või eelneda metastaatilise haiguse ravi apalutamiidi, darolutamiidi, ensalutamiidi või abiraterooniga varasemas ravireas, kuid lubatud on ravimi vahetus talumatute kõrvaltoimete ilmnemisel
1847426	abirateroon, 500mg	L02BX0 3	ABIRATERONE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Accord Healthcare S.L.	100	C61-C61	Onkoloog, Uroloog				metastaatilise hormoonsensitiivse eesnäärmevähi raviks ning metastaatilise kastratsioonresistentse eesnäärmevähi raviks patsientidele, kes ei ole enne haiguse metastaseerumist saanud ravi teise põlvkonna androgeenireseptori inhibiitoriga ja patsientidele, kelle haigus on dotsetakseelil põhineva kemoterapia ajal või järgselt progresseerunud. Ravimi kasutamisele ei või eelneda metastaatilise haiguse ravi apalutamiidi, darolutamiidi, ensalutamiidi või abiraterooniga varasemas ravireas, kuid lubatud on ravimi vahetus talumatute kõrvaltoimete ilmnemisel

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1880580	abirateroon, 500mg	L02BX0 3	ABIRATERONE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Teva B.V.	100	C61-C61	Onkoloog, Uroloog				metastaatilise hormoonsensitiivse eesnäärmevähi raviks ning metastaatilise kastratsioonresistentse eesnäärmevähi raviks patsientidele, kes ei ole enne haiguse metastaseerumist saanud ravi teise põlvkonna androgeenireseptori inhibiitoriga ja patsientidele, kelle haigus on dotsetakseelil põhineva kemoterapia ajal või järgselt progresseerunud. Ravimi kasutamisele ei või eelneda metastaatilise haiguse ravi apalutamiidi, darolutamiidi, ensalutamiidi või abiraterooniga varasemas ravireas, kuid lubatud on ravimi vahetus talumatute kõrvaltoimete ilmnemisel
1881514	abirateroon, 500mg	L02BX0 3	ABIRATERONE STADA, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Stada Arzneimittel AG	100	C61-C61	Uroloog, Onkoloog				metastaatilise hormoonsensitiivse eesnäärmevähi raviks ning metastaatilise kastratsioonresistentse eesnäärmevähi raviks patsientidele, kes ei ole enne haiguse metastaseerumist saanud ravi teise põlvkonna androgeenireseptori inhibiitoriga ja patsientidele, kelle haigus on dotsetakseelil põhineva kemoterapia ajal või järgselt progresseerunud. Ravimi kasutamisele ei või eelneda metastaatilise haiguse ravi apalutamiidi, darolutamiidi, ensalutamiidi või abiraterooniga varasemas ravireas, kuid lubatud on ravimi vahetus talumatute kõrvaltoimete ilmnemisel
1887633	abirateroon, 500mg	L02BX0 3	ABIRATERONE MYLAN, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Mylan Ireland Limited	100	C61-C61	Uroloog, Onkoloog				metastaatilise hormoonsensitiivse eesnäärmevähi raviks ning metastaatilise kastratsioonresistentse eesnäärmevähi raviks patsientidele, kes ei ole enne haiguse metastaseerumist saanud ravi teise põlvkonna androgeenireseptori inhibiitoriga ja patsientidele, kelle haigus on dotsetakseelil põhineva kemoterapia ajal või järgselt progresseerunud. Ravimi kasutamisele ei või eelneda metastaatilise haiguse ravi apalutamiidi, darolutamiidi, ensalutamiidi või abiraterooniga varasemas ravireas, kuid lubatud on ravimi vahetus talumatute kõrvaltoimete ilmnemisel
1868474	abrotsitiniib, 100mg	D11AH0 8	CIBINQO, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	L20.8-L20.8, L20.9-L20.9	Dermatovenerol oog, Pediaater, Allergoloog- immunoloog				mõõduka või raske haigusega (EASI $\geq$ 16, DLQI $\geq$ 10) patsiendile, kes ei allu süsteemsele konventsionaalsele ravile tsüklosporiiniga 8–12 nädala jooksul või kellele see on vastunäidustatud või põhjustanud talumatuid kõrvaltoimeid

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1868520	abrotsitiniib, 200mg	D11AH0 8	CIBINQO, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	L20.8-L20.8, L20.9-L20.9	Pediaater, Dermatovenerol oog, Allergoloog- immunoloog				mõõduka või raske haigusega (EASI $\geq$ 16, DLQI $\geq$ 10) patsiendile, kes ei allu süsteemsele konventsionaalsele ravile tsüklosporiiniga 8–12 nädala jooksul või kellele see on vastunäidustatud või põhjustanud talumatuid kõrvaltoimeid
1868429	abrotsitiniib, 50mg	D11AH0 8	CIBINQO, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	L20.8-L20.8, L20.9-L20.9	Dermatovenerol oog, Allergoloog- immunoloog, Pediaater				mõõduka või raske haigusega (EASI $\geq$ 16, DLQI $\geq$ 10) patsiendile, kes ei allu süsteemsele konventsionaalsele ravile tsüklosporiiniga 8–12 nädala jooksul või kellele see on vastunäidustatud või põhjustanud talumatuid kõrvaltoimeid

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1766662	adalimumab, 20mg 0.2ml	L04AB04	HUMIRA, süstelahus süstlis, 0.2ml 2TK	AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG	100	K51-K51, K50-K50	Pediaater, Gastroenteroloog				ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeta, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeta

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	L40-L40	Dermatovenerol oog, Pediaater				patsient vastab järgmistele tingimustele: haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor >=10 ja/või DLQI>=10 ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen + UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas)

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M46-M46, M45-M45, M07.0-M07.3	Reumatoloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.
					100	M05-M05, M08-M08, M06-M06	Reumatoloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks
					100	H20.1-H20.1, H44.1-H44.1, H20.0-H20.0, H35.0-H35.0, H30-H30	Oftalmoloog				ekspertkomisjoni otsusel mitteinfektsioosse intermediaalse, posterioorse ja panuveidi raviks täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveidi raviks lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav, kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus immunosupressantidele (tsüklosporiin, asatiopriin, metotreksaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või on need vastunäidustatud
					100	L73.2-L73.2	Dermatovenerol oog				ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimusel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamütsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitretiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud
					100	M08-M08	Reumatoloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav



Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1816398	adalimumab, 20mg 0.4ml	L04AB04	HYRIMOZ, süstelahus süstlis, 0.4ml 2TK	Sandoz GmbH	100	H20.1-H20.1, H44.1-H44.1, H20.0-H20.0, H35.0-H35.0, H30-H30	Oftalmoloog				ekspertkomisjoni otsusel mitteinfektsioosse intermediaalse, posterioorse ja panuveiidi raviks täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveiidi raviks lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav, kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus immunosupressantidele (tsüklosporiin, asatiopriin, metotreksaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või on need vastunäidustatud

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M08-M08	Pediaater, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	L40-L40	Pediaater, Dermatovenerol oog				patsient vastab järgmistele tingimustele: haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor $\geq 10$ ja/või DLQI $\geq 10$ ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitreiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen + UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas)
					100	K51-K51, K50-K50	Gastroenteroloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeteta, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeteta
					100	M05-M05, M08-M08, M06-M06	Reumatoloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks
					100	M45-M45, M46-M46, M07.0-M07.3	Reumatoloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.
					100	L73.2-L73.2	Dermatovenerol oog				ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimusel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamütsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitreiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1715251	adalimumab, 40mg 0.4ml	L04AB04	HUMIRA, süstelahus pen-süstlis, 0.4ml 2TK	AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG	100	H20.1-H20.1, H44.1-H44.1, H20.0-H20.0, H35.0-H35.0, H30-H30	Oftalmoloog				ekspertkomisjoni otsusel mitteinfektsioosse intermediaalse, posterioorse ja panuveiidi raviks täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveiidi raviks lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav, kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus immunosupressantidele (tsüklosporiin, asatiopriin, metotreksaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või on need vastunäidustatud

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	L40-L40	Pediaater, Dermatovenerol oog				patsient vastab järgmistele tingimustele: haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor >=10 ja/või DLQI>=10 ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitreiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen + UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas)

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M05-M05, M08-M08, M06-M06	Reumatoloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks
					100	M45-M45, M46-M46	Pediaater, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.
					100	M07.0-M07.3	Pediaater, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.
					100	L73.2-L73.2	Dermatovenerol oog				ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimusel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamüsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitreiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud
					100	K51-K51, K50-K50	Pediaater, Gastroenteroloog				ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeta, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeta
					100	M08-M08	Pediaater, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1867608	adalimumab, 40mg 0.4ml	L04AB0 4	HUKYNDRA, süstelahus süstlis, 0.4ml 2TK	Stada Arzneimittel AG	100	L40-L40	Dermatovenerol oog, Pediaater				patsient vastab järgmistele tingimustele: haigus on võldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor >=10 ja/või DLQI>=10 ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitreiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen + UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas)

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	H20.1-H20.1, H44.1-H44.1, H20.0-H20.0, H35.0-H35.0, H30-H30	Oftalmoloog				ekspertkomisjoni otsusel mitteinfektsioosse intermediaalse, posterioorse ja panuveiidi raviks täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveiidi raviks lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav, kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus immunosupressantidel e (tsüklosporiin, asatiopriin, metotreksaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või on need vastunäidustatud



Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M07.0-M07.3	Reumatoloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.
					100	M08-M08	Pediaater, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav
					100	M45-M45, M46-M46	Reumatoloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.
					100	M05-M05, M08-M08, M06-M06	Pediaater, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks
					100	K51-K51, K50-K50	Pediaater, Gastroenteroloog				ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeteta, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeteta
					100	L73.2-L73.2	Dermatoveneroloog				ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimusel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamütsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitreiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1867631	adalimumab, 40mg 0.4ml	L04AB0 4	HUKYNDRA, süstelahus pen-süstlis, 0.4ml 2TK	Stada Arzneimittel AG	100	M05-M05, M08- M08, M06-M06	Reumatoloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	L40-L40	Pediaater, Dermatovenerol oog				patsient vastab järgmistele tingimustele: haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor >=10 ja/või DLQI>=10 ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitreiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen + UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas)

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	H44.1-H44.1, H30.0-H30.0, H35.0-H35.0, H20.1-H20.1, H20.0-H20.0	Oftalmoloog				ekspertkomisjoni otsusel mitteinfektsioosse intermediaalse, posterioorse ja panuveiidi raviks täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveiidi raviks lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav, kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus immunosupressantidel e (tsüklosporiin, asatiopriin, metotreksaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või on need vastunäidustatud

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	K51-K51, K50-K50	Gastroenteroloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeta, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeta
					100	M07.0-M07.3	Pediaater, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.
					100	L73.2-L73.2	Dermatoveneroloog				ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimusel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamütsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitreiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud
					100	M08-M08	Pediaater, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav
					100	M45-M45, M46-M46	Reumatoloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3070921	adalimumab, 40mg 0.4ml	L04AB0 4	IMRALDI, süstelahus pen-süstlis, 0.4ml 2TK	Samsung Bioepis NL B.V.	100	M05-M05, M08- M08, M06-M06	Pediaater, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M07.0-M07.3	Pediaater, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	H44.1-H44.1, H30.0-H30.0, H35.0-H35.0, H20.1-H20.1, H20.0-H20.0	Oftalmoloog				ekspertkomisjoni otsusel mitteinfektsioosse intermediaalse, posterioorse ja panuveiidi raviks täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveiidi raviks lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav, kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus immunosupressantidel e (tsüklosporiin, asatiopriin, metotreksaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või on need vastunäidustatud



Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M45-M45, M46-M46	Reumatoloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.
					100	K51-K51, K50-K50	Gastroenteroloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimetu, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimetu
					100	L40-L40	Pediaater, Dermatoveneroloog				patsient vastab järgmistele tingimustele: haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor $\geq 10$ ja/või DLQI $\geq 10$ ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitreiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen + UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas)
					100	M08-M08	Pediaater, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav
					100	L73.2-L73.2	Dermatoveneroloog				ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimusel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamütsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitreiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1742251	adalimumab, 40mg 0.8ml	L04AB0 4	AMGEVITA, süstelahus süstlis, 0.8ml 2TK	Amgen Europe B.V.	100	M45-M45, M46- M46	Pediaater, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	K51-K51, K50- K50	Gastroenteroloo g, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeta, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeta

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M07.0-M07.3	Pediaater, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M05-M05, M08-M08, M06-M06	Reumatoloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks
					100	M08-M08	Pediaater, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav
					100	L40-L40	Pediaater, Dermatovenerol oog				patsient vastab järgmistele tingimustele: haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor $\geq 10$ ja/või DLQI $\geq 10$ ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitreiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen + UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas)
					100	H20.1-H20.1, H44.1-H44.1, H20.0-H20.0, H35.0-H35.0, H30-H30	Oftalmoloog				ekspertkomisjoni otsusel mitteinfektsioosse intermediaalse, posterioorse ja panuveiidi raviks täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveiidi raviks lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav, kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus immunosupressantidele (tsüklosporiin, asatiopriin, metotreksaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või on need vastunäidustatud
					100	L73.2-L73.2	Dermatovenerol oog				ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimusel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamütsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitreiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1742295	adalimumab, 40mg 0.8ml	L04AB0 4	AMGEVITA, süstelahus pen-süstlis, 0.8ml 2TK	Amgen Europe B.V.	100	M08-M08	Reumatoloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotrektsaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	L73.2-L73.2	Dermatovenerol oog				ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimusel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamütsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitreiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M05-M05, M08-M08, M06-M06	Reumatoloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks



Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	H20.1-H20.1, H44.1-H44.1, H20.0-H20.0, H35.0-H35.0, H30-H30	Oftalmoloog				ekspertkomisjoni otsusel mitteinfektsioosse intermediaalse, posterioorse ja panuveidi raviks täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveidi raviks lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav, kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus immunosupressantidele (tsüklosporiin, asatiopriin, metotreksaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või on need vastunäidustatud
					100	K51-K51, K50-K50	Gastroenteroloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeta, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeta
					100	L40-L40	Dermatoveneroloog, Pediaater				patsient vastab järgmistele tingimustele: haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor $\geq 10$ ja/või DLQI $\geq 10$ ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen + UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas)
					100	M07.0-M07.3	Reumatoloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.
					100	M45-M45, M46-M46	Reumatoloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1777305	adalimumab, 40mg 0.8ml	L04AB0 4	HYRIMOZ, süstelahus süstlis, 0.8ml 2TK	Sandoz GmbH	100	M05-M05, M08- M08, M06-M06	Pediaater, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi  sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M45-M45, M07.0-M07.3, M46-M46	Reumatoloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	L73.2-L73.2	Dermatovenerol oog				ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimusel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamütsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitreiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	K51-K51, K50-K50	Pediaater, Gastroenteroloog				ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeta, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeta
					100	H20.1-H20.1, H44.1-H44.1, H20.0-H20.0, H35.0-H35.0, H30-H30	Oftalmoloog				ekspertkomisjoni otsusel mitteinfektsioosse intermediaalse, posterioorse ja panuveiidi raviks täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveiidi raviks lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav, kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus immunosupressantidele (tsüklosporiin, asatiopriin, metotreksaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või on need vastunäidustatud
					100	M08-M08	Pediaater, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav
					100	L40-L40	Pediaater, Dermatoveneroloog				patsient vastab järgmistele tingimustele: haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor $\geq 10$ ja/või DLQI $\geq 10$ ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen + UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas)

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1777338	adalimumab, 40mg 0.8ml	L04AB0 4	HYRIMOZ, süstelahus pen-süstlis, 0.8ml 2TK	Sandoz GmbH	100	L40-L40	Pediaater, Dermatovenerol oog				patsient vastab järgmistele tingimustele: haigus on võldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor >=10 ja/või DLQI>=10 ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitreiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen + UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas)

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M08-M08	Reumatoloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav
					100	L73.2-L73.2	Dermatovenerol oog				ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimusel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamütsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitreiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud
					100	M07.0-M07.3, M45-M45, M46- M46	Reumatoloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.
					100	K51-K51, K50- K50	Pediaater, Gastroenteroloog				ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeta, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeta
					100	M05-M05, M08- M08, M06-M06	Pediaater, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks
					100	H20.1-H20.1, H44.1-H44.1, H20.0-H20.0, H35.0-H35.0, H30-H30	Oftalmoloog				ekspertkomisjoni otsusel mitteinfektsioosse intermediaalse, posterioorse ja panuveiidi raviks täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveiidi raviks lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav, kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus immunosupressantidele (tsüklosporiin, asatiopriin, metotreksaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või on need vastunäidustatud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1792571	adalimumab, 40mg 0.8ml	L04AB04	IDACIO, süstelahus pen-süstlis, 0.8ml 2TK	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	100	L73.2-L73.2	Dermatovenerol oog				ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimusel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamütsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitreiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud



Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	K51-K51, K50- K50	Pediaater, Gastroenteroloo g				ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeta, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeta

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M05-M05, M08-M08, M06-M06	Pediaater, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks
					100	L40-L40	Dermatoveneroloog, Pediaater				patsient vastab järgmistele tingimustele: haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor $\geq 10$ ja/või DLQI $\geq 10$ ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen + UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasivorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas)
					100	M45-M45, M46-M46	Reumatoloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.
					100	M08-M08	Pediaater, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav
					100	M07.0-M07.3	Pediaater, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.
					100	H20.1-H20.1, H44.1-H44.1, H20.0-H20.0, H35.0-H35.0, H30-H30	Oftalmoloog				ekspertkomisjoni otsusel mitteinfektsioosse intermediaalse, posterioorse ja panuveiidi raviks täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveiidi raviks lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav, kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus immunosupressantidele (tsüklosporiin, asatiopriin, metotreksaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või on need vastunäidustatud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1867653	adalimumab, 80mg 0.8ml	L04AB04	HUKYNDRA, süstelahus süstlis, 0.8ml 1TK	Stada Arzneimittel AG	100	L40-L40	Dermatovenerol oog, Pediaater				patsient vastab järgmistele tingimustele: haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor >=10 ja/või DLQI>=10 ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitreiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen + UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasivorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas)

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M08-M08	Pediaater, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M07.0-M07.3	Pediaater, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.
					100	L73.2-L73.2	Dermatovenerol oog				ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimusel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamütsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitreiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud
					100	H20.1-H20.1, H44.1-H44.1, H20.0-H20.0, H35.0-H35.0, H30-H30	Oftalmoloog				ekspertkomisjoni otsusel mitteinfektsioosse intermediaalse, posterioorse ja panuveidi raviks täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveidi raviks lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav, kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus immunosupressantidel e (tsüklosporiin, asatiopriin, metotreksaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või on need vastunäidustatud
					100	M05-M05, M08- M08, M06-M06	Reumatoloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks
					100	M45-M45, M46- M46	Pediaater, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.
					100	K51-K51, K50- K50	Pediaater, Gastroenteroloog				ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeteta, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeteta

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1412334	agomelatiin, 25mg	N06AX2 2	VALDOXAN, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Les Laboratoires Servier	50 100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
1738469	agomelatiin, 25mg	N06AX2 2	ZILBEA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Zentiva k.s.	100 50	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
1763872	agomelatiin, 25mg	N06AX2 2	LAMEGOM, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA, d.d., Novo mesto	100 50	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
1831946	akalabrutiniib, 100mg	L01EL02	CALQUENCE, kõvakapsel, 60TK	Astrazeneca AB	100	C91.1-C91.1	Hematoloog				monoteraapiana patsientidele, kellel esineb 17p deletsioon või TP53 mutatsioon, kes ei ole eelnevalt ravi saanud või kes on eelnevalt saanud vähemalt ühe ravikuuri ja haigus ei ole ravile allunud või on taastekkinud lühema aja kui 36 kuu jooksul eelneva ravi alustamisest alates ning patsientidele, kellel esineb 11q deletsioon, kes ei ole eelnevalt ravi saanud või kes on eelnevalt saanud vähemalt ühe ravikuuri ja haigus ei ole ravile allunud või on taastekkinud. Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi akalabrutiniibiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 01.07.2022.
1891863	akalabrutiniib, 100mg	L01EL02	CALQUENCE, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Astrazeneca AB	100	C91.1-C91.1	Hematoloog				monoteraapiana patsientidele, kellel esineb 17p deletsioon või TP53 mutatsioon, kes ei ole eelnevalt ravi saanud või kes on eelnevalt saanud vähemalt ühe ravikuuri ja haigus ei ole ravile allunud või on taastekkinud lühema aja kui 36 kuu jooksul eelneva ravi alustamisest alates ning patsientidele, kellel esineb 11q deletsioon, kes ei ole eelnevalt ravi saanud või kes on eelnevalt saanud vähemalt ühe ravikuuri ja haigus ei ole ravile allunud või on taastekkinud. Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi akalabrutiniibiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 01.07.2022.
1590106	aklidiinium, 322mcg 1mõõttannus	R03BB0 5	BRETARIS GENUAIR, inhalatsioonipulber, 60mõõttannus 1TK	Covis Pharma Europe B.V.	50 75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1593312	aksitiniib, 1mg	L01EK0 1	INLYTA, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumis heledarakulise neeru kartsinoomi teise rea ravina pärast esimese rea sunitiniib- või pasopaniibravi patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine aksitiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt kahe onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1, haiguse prognoos Hengi kriteeriumide järgi hea või keskmine ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena
1593345	aksitiniib, 5mg	L01EK0 1	INLYTA, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumis heledarakulise neeru kartsinoomi teise rea ravina pärast esimese rea sunitiniib- või pasopaniibravi patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine aksitiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt kahe onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1, haiguse prognoos Hengi kriteeriumide järgi hea või keskmine ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena
1739437	alektiniib, 150mg	L01ED0 3	ALECENSA, kõvakapsel, 224TK	Roche Registration GmbH	100	C34-C34	Onkoloog				anaplastilise lümfoomkinaas-positiivse kaugelearenenud varem ravimata mitteväikerakk-kopsuvähi raviks heas üldseisundis (ECOG 0-2) täiskasvanud patsientidele
1300026	alendroonhape, 70mg	M05BA0 4	ALENDRONIC ACID ACCORD 70MG, tablett, 4TK	Accord Healthcare B.V.	75	M80-M80					patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna
					50						
1835401	alendroonhape, 70mg	M05BA0 4	SEDRON, õhukese polümeerikattega tablett, 4TK	Ideal Trade Links UAB	75	M80-M80					patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna
					50						
1339141	alendroonhape+ko lekaltsiferool, 70mg+5600RÜ	M05BB0 3	FOSAVANCE, tablett, 4TK	Organon N.V.	50						
					75	M80-M80					patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna
1695067	alendroonhape+ko lekaltsiferool, 70mg+5600RÜ	M05BB0 3	ALENDRONIC ACID/COLECALCIFER OL ZENTIVA, tablett, 4TK	Zentiva k.s.	75	M80-M80					patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1207493	alfadarbepoetiin, 100mcg 0.5ml	B03XA0 2	ARANESP, süstelahus süstlis, 0.5ml 1TK	Amgen Europe B.V.	50						
					100	D63-D63, T86- T86	Uroloog, Nefroloog, Pediaater				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
					100	D46-D46, D47.1-D47.1	Hematoloog				
1207527	alfadarbepoetiin, 150mcg 0.3ml	B03XA0 2	ARANESP, süstelahus süstlis, 0.3ml 1TK	Amgen Europe B.V.	100	D46-D46, D47.1-D47.1	Hematoloog				
					50						
					100	D63-D63, T86- T86	Pediaater, Uroloog, Nefroloog				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
1176218	alfadarbepoetiin, 20mcg 0.5ml	B03XA0 2	ARANESP, süstelahus süstlis, 0.5ml 1TK	Amgen Europe B.V.	100	D46-D46, D47.1-D47.1	Hematoloog				
					100	D63-D63, T86- T86	Pediaater, Nefroloog, Uroloog				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
					50						
1207314	alfadarbepoetiin, 30mcg 0.3ml	B03XA0 2	ARANESP, süstelahus süstlis, 0.3ml 1TK	Amgen Europe B.V.	50						
					100	D63-D63, T86- T86	Nefroloog, Uroloog, Pediaater				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
					100	D46-D46, D47.1-D47.1	Hematoloog				
1207370	alfadarbepoetiin, 40mcg 0.4ml	B03XA0 2	ARANESP, süstelahus süstlis, 0.4ml 1TK	Amgen Europe B.V.	50						
					100	D46-D46, D47.1-D47.1	Hematoloog				
					100	D63-D63, T86- T86	Pediaater, Uroloog, Nefroloog				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral



Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1207415	alfadarbepoetiin, 50mcg 0.5ml	B03XA0 2	ARANESP, süstelahus süstlis, 0.5ml 1TK	Amgen Europe B.V.	50						
					100	D63-D63, T86- T86	Pediaater, Uroloog, Nefroloog				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
					100	D46-D46, D47.1-D47.1	Hematoloog				
1207437	alfadarbepoetiin, 60mcg 0.3ml	B03XA0 2	ARANESP, süstelahus süstlis, 0.3ml 1TK	Amgen Europe B.V.	50						
					100	D46-D46, D47.1-D47.1	Hematoloog				
					100	D63-D63, T86- T86	Nefroloog, Uroloog, Pediaater				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
1207471	alfadarbepoetiin, 80mcg 0.4ml	B03XA0 2	ARANESP, süstelahus süstlis, 0.4ml 1TK	Amgen Europe B.V.	100	D63-D63, T86- T86	Nefroloog, Pediaater, Uroloog				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
					100	D46-D46, D47.1-D47.1	Hematoloog				
					50						
1022960	alfadornaas, 1mg 1ml	R05CB1 3	PULMOZYME, nebuliseeritav lahus, 2.5ml 6TK	Roche Eesti Osaühing	50						
					100	E84-E84	Pediaater, Pulmonoloog	esmane			
1644904	alfafollitropiin, 150RÜ 0.25ml	G03GA0 5	BEMFOLA, süstelahus pen-süstlis, 0.25ml 1TK	Gedeon Richter Plc.	50						
					100	N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks
1644915	alfafollitropiin, 225RÜ 0.375ml	G03GA0 5	BEMFOLA, süstelahus pen-süstlis, 0.375ml 1TK	Gedeon Richter Plc.	100	N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks
					50						
1173855	alfafollitropiin, 300RÜ 0.5ml	G03GA0 5	GONAL-F, süstelahus pen-süstlis, 0.5ml 1TK	Merck Europe B.V.	50						
					100	N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks
1628636	alfafollitropiin, 300RÜ 0.5ml	G03GA0 5	OVALEAP, süstelahus, 0.5ml 1TK	Theramex Ireland Limited	50						
					100	N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1644926	alfafollitropiin, 300RÜ 0.5ml	G03GA0 5	BEMFOLA, süstelahus pen-süstlis, 0.5ml 1TK	Gedeon Richter Plc.	100	N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks
					50						
1213513	alfafollitropiin, 450RÜ 0.75ml	G03GA0 5	GONAL-F, süstelahus pen-süstlis, 0.75ml 1TK	Merck Europe B.V.	100	N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks
					50						
1628647	alfafollitropiin, 450RÜ 0.75ml	G03GA0 5	OVALEAP, süstelahus, 0.75ml 1TK	Theramex Ireland Limited	50						
					100	N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks
1644937	alfafollitropiin, 450RÜ 0.75ml	G03GA0 5	BEMFOLA, süstelahus pen-süstlis, 0.75ml 1TK	Gedeon Richter Plc.	50						
					100	N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks
1644892	alfafollitropiin, 75RÜ 0.125ml	G03GA0 5	BEMFOLA, süstelahus pen-süstlis, 0.125ml 1TK	Gedeon Richter Plc.	100	N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks
					50						
1173866	alfafollitropiin, 900RÜ 1.5ml	G03GA0 5	GONAL-F, süstelahus pen-süstlis, 1.5ml 1TK	Merck Europe B.V.	50						
					100	N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks
1628658	alfafollitropiin, 900RÜ 1.5ml	G03GA0 5	OVALEAP, süstelahus, 1.5ml 1TK	Theramex Ireland Limited	100	N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks
					50						
1745007	alfafollitropiin+alfalutropiin, 450RÜ+225RÜ 0.72ml	G03GA3 0	PERGOVERIS, süstelahus pen-süstlis, 0.72ml 1TK	Merck Europe B.V.	50						
					100	N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks
1745018	alfafollitropiin+alfalutropiin, 900RÜ+450RÜ 1.44ml	G03GA3 0	PERGOVERIS, süstelahus pen-süstlis, 1.44ml 1TK	Merck Europe B.V.	100	N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks
					50						
1580969	alfakooriongonadotropiin, 250mcg 0.5ml	G03GA0 8	OVITRELLE, süstelahus pen-süstlis, 0.5ml 1TK	Merck Europe B.V.	100	N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks
					50						
1046810	alfalutropiin, 75RÜ	G03GA0 7	LUVERIS, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Merck Europe B.V.	50						
					100	N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1064247	alfusosiin, 10mg	G04CA01	XATRAL SR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Sanofi Winthrop Industrie	50						
1278176	alfusosiin, 10mg	G04CA01	ALFUZOSIN-TEVA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	50						
1698127	alirokumab, 150mg 1ml	C10AX14	PRALUENT, süstelahus pen-süstlis, 1ml 2TK	Sanofi-Aventis Groupe	100	E78.0-E78.0	Kardioloog	esmane			kroonilise perekondliku hüperkolesteroleemia raviks dokumenteeritud ateroskleroosiga patsientidele, kui varasem ravi maksimaalselt talutavas annuses statiini ja esetimiibiga on osutunud ebapiisavaks või on need ravimid olnud vastunäidustatud ning patsiendi LDL-C väärtus on $\geq 3,0$ mmol/L
					100	I25.2-I25.2, I21- I21, I22-I22	Kardioloog	esmane			ravi alustamine ägeda südameelihase infarkti järgselt (möödunud $\leq 12$ kuud) kombinatsioonis statiini ja esetimiibiga patsientidel, kellel vaatamata 1-3 kuud kestnud ravile maksimaalses talutavas annuses statiini ja esetimiibiga ei ole saavutatud LDL-kolesterooli eesmärgväärtust ( $< 1,4$ mmol/L) ning patsiendi LDL-C väärtus on seejuures $\geq 3,0$ mmol/L või kellele statiin/esetimiib on vastunäidustatud ning patsiendi LDL-C väärtus on seejuures $\geq 3,0$ mmol
1698150	alirokumab, 75mg 1ml	C10AX14	PRALUENT, süstelahus pen-süstlis, 1ml 2TK	Sanofi-Aventis Groupe	100	E78.0-E78.0	Kardioloog	esmane			kroonilise perekondliku hüperkolesteroleemia raviks dokumenteeritud ateroskleroosiga patsientidele, kui varasem ravi maksimaalselt talutavas annuses statiini ja esetimiibiga on osutunud ebapiisavaks või on need ravimid olnud vastunäidustatud ning patsiendi LDL-C väärtus on $\geq 3,0$ mmol/L
					100	I25.2-I25.2, I21- I21, I22-I22	Kardioloog	esmane			ravi alustamine ägeda südamelihase infarkti järgselt (möödunud $\leq 12$ kuud) kombinatsioonis statiini ja esetimiibiga patsientidel, kellel vaatamata 1-3 kuud kestnud ravile maksimaalses talutavas annuses statiini ja esetimiibiga ei ole saavutatud LDL-kolesterooli eesmärgväärtust ( $< 1,4$ mmol/L) ning patsiendi LDL-C väärtus on seejuures $\geq 3,0$ mmol/L või kellele statiin/esetimiib on vastunäidustatud ning patsiendi LDL-C väärtus on seejuures $\geq 3,0$ mmol

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1001619	allopurinool, 100mg	M04AA0 1	ALLOPURINOL ORIFARM, tablett, 50TK	Orifarm Healthcare A/S	50						
					75	M10-M10, N20- N23					
1685505	allopurinool, 100mg	M04AA0 1	ALLOPURINOL SANDOZ, tablett, 50TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	M10-M10, N20- N23					
1001686	allopurinool, 300mg	M04AA0 1	ALLOPURINOL ORIFARM, tablett, 50TK	Orifarm Healthcare A/S	75	M10-M10, N20- N23					
					50						
1685628	allopurinool, 300mg	M04AA0 1	ALLOPURINOL SANDOZ, tablett, 100TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	M10-M10, N20- N23					
1754131	allopurinool, 300mg	M04AA0 1	ALLOPURINOL ACCORD, tablett, 50TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					75	M10-M10, N20- N23					
1064517	amantadiin, 100mg	N04BB0 1	AMANTADIN- RATIOPHARM 100 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Ratiopharm GmbH	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						
1349872	ambrisentaan, 10mg	C02KX0 2	VOLIBRIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50						
					100	I27.0-I27.0	Pulmonoloog, Reumatoloog, Pediaater, Kardioloog				NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafili ja bosentaan on vastunäidustatud, osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid
1775011	ambrisentaan, 10mg	C02KX0 2	AMBRISENTAN NORAMEDA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Norameda UAB	100	I27.0-I27.0	Kardioloog, Pediaater, Pulmonoloog, Reumatoloog				NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafili ja bosentaan on vastunäidustatud, ostunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1797071	ambrisentaan, 10mg	C02KX0 2	AMBRISENTAN ZENTIVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Zentiva k.s.	50						
					100	I27.0-I27.0	Pediaater, Reumatoloog, Kardioloog, Pulmonoloog				NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafiliil ja bosentaan on vastunäidustatud, ostunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid
1798555	ambrisentaan, 10mg	C02KX0 2	AMBRISENTAN MYLAN, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Mylan Pharmaceuticals Limited	50						
					100	I27.0-I27.0	Kardioloog, Pediaater, Pulmonoloog, Reumatoloog				NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafiliil ja bosentaan on vastunäidustatud, ostunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid
1349850	ambrisentaan, 5mg	C02KX0 2	VOLIBRIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	100	I27.0-I27.0	Pulmonoloog, Pediaater, Reumatoloog, Kardioloog				NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafiliil ja bosentaan on vastunäidustatud, osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid
					50						
1774975	ambrisentaan, 5mg	C02KX0 2	AMBRISENTAN NORAMEDA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Norameda UAB	50						
					100	I27.0-I27.0	Kardioloog, Pediaater, Reumatoloog, Pulmonoloog				NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafiliil ja bosentaan on vastunäidustatud, osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1797060	ambrisentaan, 5mg	C02KX0 2	AMBRISENTAN ZENTIVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Zentiva k.s.	100	I27.0-I27.0	Pulmonoloog, Pediaater, Reumatoloog, Kardioloog				NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafili ja bosentaan on vastunäidustatud, ostunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid
					50						
1798533	ambrisentaan, 5mg	C02KX0 2	AMBRISENTAN MYLAN, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Mylan Pharmaceuticals Limited	100	I27.0-I27.0	Pediaater, Reumatoloog, Kardioloog, Pulmonoloog				NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafili ja bosentaan on vastunäidustatud, ostunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid
					50						
7017959	aminohapped,		Neocate Junior, pulber, 400g N6	Nutrimedical OÜ	75	K52.2-K52.2, L27.2-L27.2, L50-L50, T78.1- T78.1, K22.8- K22.8, K90.4- K90.4, T78.2- T78.2, L20.8- L20.8, T78.0- T78.0	Pediaater		1,00	2,00	lehmapiimavalgu talumatusega 1-2- aastastele lastele, kes on esimesel eluaastal tarvitanud aminohapete segu ning kes täielikult hüdrolyüsitud piimasegu ei talu. Jätkuv vajadus aminohapete segule peab olema tõestatud preparaadi esmasel määramisel ja 6 kuu möödudes
1016244	amiodaroon, 200mg	C01BD0 1	CORDARONE 200 MG, tablett, 30TK	Sanofi Winthrop Industrie	50						
					75	I47-I49	Pediaater, Kardioloog	esmane			
1044616	amiodaroon, 200mg	C01BD0 1	AMIOKORDIN, tablett, 60TK	KRKA d.d. Novo mesto	75	I47-I49	Pediaater, Kardioloog	esmane			
					50						
1041141	amisulpriid, 200mg	N05AL0 5	SOLIAN, tablett, 30TK	Sanofi Winthrop Industrie	100	F20-F29, F30- F31	Psühhiaater				
					50						
1342213	amisulpriid, 200mg	N05AL0 5	AMISAN 200 MG, tablett, 30TK	Pro.Med.Cs Praha a.s.	50						
					100	F20-F29, F30- F31	Psühhiaater				

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1343438	amisulpriid, 400mg	N05AL05	AMISAN 400 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Pro.Med.Cs Praha a.s.	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					50						
1107391	amitriptülin, 10mg	N06AA09	AMITRIPTYLINE-GRINDEKS, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	Grindeks AS	50						
					75	G63-G63, G43-G43, G62.0-G62.0					
					100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1012475	amitriptülin, 25mg	N06AA09	AMITRIPTYLINE-GRINDEKS, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	Grindeks AS	100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
					75	G63-G63, G43-G43, G62.0-G62.0					
					50						
1109900	amlodipiin, 10mg	C08CA01	AGEN 10MG, tablett, 30TK	Zentiva k.s.	50						
					75	I15-I15, I10-I13, I20-I20					
1122972	amlodipiin, 10mg	C08CA01	HIPRES, tablett, 30TK	KRKA d.d. Novo mesto	75	I15-I15, I10-I13, I20-I20					
					50						
1147003	amlodipiin, 10mg	C08CA01	AMLODIPIN-RATIOPHARM 10 MG, tablett, 30TK	Ratiopharm GmbH	50						
					75	I15-I15, I10-I13, I20-I20					
1241514	amlodipiin, 10mg	C08CA01	AMLODIGAMMA 10MG, tablett, 30TK	Woerwag Pharma GmbH & Co. KG	50						
					75	I15-I15, I10-I13, I20-I20					
1243088	amlodipiin, 10mg	C08CA01	AMLOCARD 10MG, tablett, 60TK	Hexal AG	50						
					75	I15-I15, I10-I13, I20-I20					



Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1445396	amlodipiin, 10mg	C08CA01	AMLODIPINE VITABALANS, tablett, 30TK	Vitabalans Oy	75	I15-I15, I10-I13, I20-I20					
					50						
1445408	amlodipiin, 10mg	C08CA01	AMLODIPINE VITABALANS, tablett, 60TK	Vitabalans Oy	75	I15-I15, I10-I13, I20-I20					
					50						
1445419	amlodipiin, 10mg	C08CA01	AMLODIPINE VITABALANS, tablett, 100TK	Vitabalans Oy	75	I15-I15, I10-I13, I20-I20					
					50						
1551406	amlodipiin, 10mg	C08CA01	HIPRES, tablett, 60TK	KRKA d.d. Novo mesto	75	I15-I15, I10-I13, I20-I20					
					50						
1865718	amlodipiin, 10mg	C08CA01	AMLODIPINE VITABALANS, tablett, 90TK	Vitabalans Oy	50						
					75	I15-I15, I10-I13, I20-I20					
1087871	amlodipiin, 5mg	C08CA01	AMLOCARD 5 MG, tablett, 30TK	Hexal AG	50						
					75	I15-I15, I10-I13, I20-I20					
1109775	amlodipiin, 5mg	C08CA01	AMLODIPIN- RATIOPHARM 5 MG, tablett, 30TK	Ratiopharm GmbH	50						
					75	I15-I15, I10-I13, I20-I20					
1109887	amlodipiin, 5mg	C08CA01	AGEN 5MG, tablett, 30TK	Zentiva k.s.	50						
					75	I15-I15, I10-I13, I20-I20					
1122961	amlodipiin, 5mg	C08CA01	HIPRES, tablett, 30TK	KRKA d.d. Novo mesto	75	I15-I15, I10-I13, I20-I20					
					50						
1241424	amlodipiin, 5mg	C08CA01	AMLODIGAMMA 5MG, tablett, 30TK	Woerwag Pharma GmbH & Co. KG	75	I15-I15, I10-I13, I20-I20					
					50						
1242863	amlodipiin, 5mg	C08CA01	AMLOCARD 5 MG, tablett, 60TK	Hexal AG	50						
					75	I15-I15, I10-I13, I20-I20					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1445307	amlodipiin, 5mg	C08CA01	AMLODIPINE VITABALANS, tablett, 100TK	Vitabalans Oy	50						
					75	I15-I15, I10-I13, I20-I20					
1551383	amlodipiin, 5mg	C08CA01	HIPRES, tablett, 60TK	KRKA d.d. Novo mesto	75	I15-I15, I10-I13, I20-I20					
					50						
1865707	amlodipiin, 5mg	C08CA01	AMLODIPINE VITABALANS, tablett, 90TK	Vitabalans Oy	75	I15-I15, I20-I20, I10-I13					
					50						
1008919	amoksitsilliin, 1000mg	J01CA04	AMOXICILLIN- RATIOPHARM 1000 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Ratiopharm GmbH	50						
					75	H65-H67, J13- J18				16,00	
1066463	amoksitsilliin, 1000mg	J01CA04	AMOXICILLIN- RATIOPHARM 1000 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	Ratiopharm GmbH	50						
					75	H65-H67, J13- J18				16,00	
1306921	amoksitsilliin, 1000mg	J01CA04	OSPAMOX, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	H65-H67, J13- J18				16,00	
1000382	amoksitsilliin, 50mg 1ml	J01CA04	AMOXICILLIN- RATIOPHARM TS, suukaudse suspensiooni pulber, 100ml 1TK	Ratiopharm GmbH	75	H65-H67, J13- J18				16,00	
					50						
1000450	amoksitsilliin, 750mg	J01CA04	AMOXICILLIN- RATIOPHARM 750 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Ratiopharm GmbH	75	H65-H67, J13- J18				16,00	
					50						
1066722	amoksitsilliin+klav ulaanhape, 500mg+125mg	J01CR02	AMOKSIKLAV, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	H65-H67, J13- J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliiniga
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1066711	amoksitsilliin+klav ulaanhape, 80mg+11,4mg 1ml	J01CR0 2	AMOKSIKLAV, suukaudse suspensiooni pulber, 70ml 1TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	H65-H67, J13- J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliiniga
					50						
1701155	amoksitsilliin+klav ulaanhape, 80mg+11,4mg 1ml	J01CR0 2	MEDOCLAV, suukaudse suspensiooni pulber, 70ml 1TK	Medochemie Limited	75	H65-H67, J13- J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliiniga
					50						
1718333	amoksitsilliin+klav ulaanhape, 80mg+11,4mg 1ml	J01CR0 2	AUGMENTIN FRUIT, suukaudse suspensiooni pulber, 70ml 1TK	GlaxoSmithKline Trading Services Limited	75	H65-H67, J13- J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliiniga
					50						
1822700	amoksitsilliin+klav ulaanhape, 80mg+11,4mg 1ml	J01CR0 2	AUGMENTIN FRUIT, suukaudse suspensiooni pulber, 70ml 1TK	First Pharma OÜ	50						
					75	H65-H67, J13- J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliiniga
1840722	amoksitsilliin+klav ulaanhape, 80mg+11,4mg 1ml	J01CR0 2	AUGMENTIN FRUIT, suukaudse suspensiooni pulber, 70ml 1TK	Ideal Trade Links UAB	75	H65-H67, J13- J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliiniga
					50						
1066700	amoksitsilliin+klav ulaanhape, 875mg+125mg	J01CR0 2	AMOKSIKLAV, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	H65-H67, J13- J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliiniga
					50						
1066733	amoksitsilliin+klav ulaanhape, 875mg+125mg	J01CR0 2	AUGMENTIN, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	75	H65-H67, J13- J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliiniga
					50						
1175431	amoksitsilliin+klav ulaanhape, 875mg+125mg	J01CR0 2	AMOKSIKLAV, dispergeeruv tablett, 14TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	H65-H67, J13- J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliiniga
1635230	amoksitsilliin+klav ulaanhape, 875mg+125mg	J01CR0 2	BETAKLAV, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	KRKA, d.d., Novo mesto	75	H65-H67, J13- J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliiniga
					50						
1660474	amoksitsilliin+klav ulaanhape, 875mg+125mg	J01CR0 2	AMOXICILLIN/CLAVUL ANIC ACID ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Teva B.V.	50						
					75	H65-H67, J13- J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliiniga
1723092	amoksitsilliin+klav ulaanhape, 875mg+125mg	J01CR0 2	AUGMENTIN, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	First Pharma OÜ	50						
					75	H65-H67, J13- J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliiniga

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1743971	amoksitsilliin+klav ulaanhape, 875mg+125mg	J01CR0 2	MEDOCLAV, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Medochemie Limited	75	H65-H67, J13- J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliiniga
					50						
1840700	amoksitsilliin+klav ulaanhape, 875mg+125mg	J01CR0 2	AUGMENTIN, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Ideal Trade Links UAB	75	H65-H67, J13- J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliiniga
					50						
1009572	amorolfiin, 50mg 1ml	D01AE1 6	LOCERYL, ravimküünelakk, 2.5ml 1TK	Galderma International	50						
1736580	amorolfiin, 50mg 1ml	D01AE1 6	EXOLORFIN, ravimküünelakk, 2.5ml 1TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
1860555	amorolfiin, 50mg 1ml	D01AE1 6	LOCERYL, ravimküünelakk, 2.5ml 1TK	Ideal Trade Links UAB	50						
1765649	anagreliid, 0,5mg	L01XX3 5	ANAGRELIDE VIATRIS, kõvakapsel, 100TK	Viatriis Limited	100	D47.3-D47.3	Hematoloog				patsientidele, kellel ravi alustamine on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: esmavaliku ravi (hüdroksüürea annuses vähemalt 2g päevas vähemalt 3 kuu jooksul või alfainterferoon) on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks ning esineb trombotsütoos 1000x109/l või on ilmnenud trombohemorraagilised juhud
1033546	anastrosool, 1mg	L02BG0 3	ARIMIDEX, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Laboratoires Juvise Pharmaceuticals	100	C50-C50	Günekoloog, Üldkirurg, Onkoloog				günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks
					50						
1240490	anastrosool, 1mg	L02BG0 3	ANASTROZOLE SANOSWISS 1 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Sanoswiss UAB	100	C50-C50	Üldkirurg, Günekoloog, Onkoloog				günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks
					50						
1244438	anastrosool, 1mg	L02BG0 3	ANASTROZOLE-TEVA 1MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Teva Pharma B.V.	50						
					100	C50-C50	Üldkirurg, Onkoloog, Günekoloog				günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1293870	anastrosool, 1mg	L02BG03	ANASTROZOLE ACCORD 1MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	100	C50-C50	Üldkirurg, Günekoloog, Onkoloog				günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks
					50						
1299023	anastrosool, 1mg	L02BG03	AXASTROL, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Grindeks AS	50						
					100	C50-C50	Günekoloog, Onkoloog, Üldkirurg				günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks
1825365	anastrosool, 1mg	L02BG03	ANASTROZOLE ELVIM, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	SIA Elvim	100	C50-C50	Günekoloog, Onkoloog, Üldkirurg				günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks
					50						
1836705	anastrosool, 1mg	L02BG03	ANASTROZOLE ACCORD 1MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Ideal Trade Links UAB	100	C50-C50	Günekoloog, Onkoloog, Üldkirurg				günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks
					50						
3043235	apalutamiid, 240mg	L02BB05	ERLEADA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Janssen - Cilag International	100	C61-C61	Onkoloog, Uroloog				metastaatilise hormoonsensitiivse eesnäärmevähi raviks. Kõrge riskiga haiguse korral võib apalutamiidi määrata patsientidele, kellel abirateroon on vastunäidustatud või abiraterooni kasutamisel esinevad talumatud kõrvaltoimeid. Patsient ei tohi olla varasemalt saanud ravi teise põlvkonna androgeenireseptori inhibiitoriga, v.a. juhul, kui ravi on katkestatud kõrvaltoimete tõttu. Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi apalutamiidiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 01.01.2023
1787441	apalutamiid, 60mg	L02BB05	ERLEADA, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Janssen - Cilag International	100	C61-C61	Uroloog, Onkoloog				metastaatilise hormoonsensitiivse eesnäärmevähi raviks. Kõrge riskiga haiguse korral võib apalutamiidi määrata patsientidele, kellel abirateroon on vastunäidustatud või abiraterooni kasutamisel esinevad talumatud kõrvaltoimeid. Patsient ei tohi olla varasemalt saanud ravi teise põlvkonna androgeenireseptori inhibiitoriga, v.a. juhul, kui ravi on katkestatud kõrvaltoimete tõttu. Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi apalutamiidiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 01.01.2023

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1531448	apiksabaan, 2,5mg	B01AF0 2	ELIQUIS, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG	75	M16-M17, S72.0-S72.2, S72.7-S72.7					kuni 30 päevaks
					100	I67.6-I67.6, I80- I82, I26-I26					kaasuva pahaloolumulise kasvaja esinemisel
					75	I48-I48					
					50						
1603741	apiksabaan, 5mg	B01AF0 2	ELIQUIS, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG	50						
					75	I48-I48					
					100	I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6					kaasuva pahaloolumulise kasvaja esinemisel
1504808	apomorfiin, 10mg 1ml	N04BC0 7	APO-GO, süstelahus pen-süstlis, 3ml 5TK	Stada Arzneimittel AG	100	G20-G20	Neuroloog				konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellel esineb vaatamata optimaalsele suukaudsele ravile raskekujuline motoorikahäire kestvate või sagedaste mootorsete fluktuatsioonidega (MDS UPDRS III skoor off-perioodis on >40 punkti, off-perioodi kestus >25% ärkvelolekuajast) ning ravivastus apomorfiinile on hea (MDS-UPDRS III skoor paraneb >40%)
1649796	aripiprasool, 10mg	N05AX1 2	ZYKALOR, tablett, 30TK	Medochemie Limited	50						
					100	F20-F29, F30- F31	Psühhiaater				
					100	F32.3-F32.3, F33.3-F33.3	Psühhiaater	esmane			
1649819	aripiprasool, 10mg	N05AX1 2	ZYKALOR, tablett, 60TK	Medochemie Limited	50						
					100	F32.3-F32.3, F33.3-F33.3	Psühhiaater	esmane			
					100	F20-F29, F30- F31	Psühhiaater				
1203578	aripiprasool, 15mg	N05AX1 2	ABILIFY, tablett, 28TK	Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.	100	F32.3-F32.3, F33.3-F33.3	Psühhiaater	esmane			
					100	F20-F29, F30- F31	Psühhiaater				
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1649651	aripiprasool, 15mg	N05AX1 2	ARIPIPRAZOLE TEVA, tablett, 28TK	Teva B.V.	100	F20-F29, F30- F31	Psühhiaater				
					50						
					100	F32.3-F32.3, F33.3-F33.3	Psühhiaater	esmane			
1649853	aripiprasool, 15mg	N05AX1 2	ZYKALOR, tablett, 30TK	Medochemie Limited	100	F32.3-F32.3, F33.3-F33.3	Psühhiaater	esmane			
					100	F20-F29, F30- F31	Psühhiaater				
					50						
1650271	aripiprasool, 15mg	N05AX1 2	ARISPPA, tablett, 60TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
					100	F32.3-F32.3, F33.3-F33.3	Psühhiaater	esmane			
					100	F20-F29, F30- F31	Psühhiaater				
1703630	aripiprasool, 15mg	N05AX1 2	ARIPIPRAZOLE ACCORD, tablett, 28TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	F20-F29, F30- F31	Psühhiaater				
					50						
					100	F32.3-F32.3, F33.3-F33.3	Psühhiaater	esmane			
1650349	aripiprasool, 30mg	N05AX1 2	ARISPPA, tablett, 30TK	KRKA, d.d., Novo mesto	100	F32.3-F32.3, F33.3-F33.3	Psühhiaater	esmane			
					100	F20-F29, F30- F31	Psühhiaater				
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1004500	asatiopriin, 50mg	L04AX01	IMURAN, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Aspen Pharma Trading Limited	75	K50-K51, K73-K74	Pediaater, Gastroenteroloog				
					75	L12-L12, L13.0-L13.0, L10-L10	Allergoloog-immunoloog, Dermatoveneroloog, Pediaater				
					75	L20-L20	Dermatoveneroloog				
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46	Pediaater, Reumatoloog				
					75	L40-L40	Dermatoveneroloog, Pediaater				
					100	Z94-Z94, T86-T86					
					50						
					75	N00-N08	Pediaater, Nefroloog				
					100	G70-G70	Neuroloog, Pediaater	esmane			



Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1667325	asatiopriin, 50mg	L04AX01	ATSIMUTIN, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Bausch Health Ireland Limited	75	L20-L20	Dermatoveneroloog				
					75	L12-L12, L13.0-L13.0, L10-L10	Allergoloog-immunoloog, Dermatoveneroloog, Pediaater				
					75	L40-L40	Dermatoveneroloog, Pediaater				
					50						
					75	N00-N08	Pediaater, Nefroloog				
					100	Z94-Z94, T86-T86					
					100	G70-G70	Pediaater, Neuroloog	esmane			
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46	Pediaater, Reumatoloog				
					75	K50-K51, K73-K74	Gastroenteroloog, Pediaater				

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1865099	asatiopriin, 50mg	L04AX0 1	IMURAN, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Ideal Trade Links UAB	75	M45-M46, M05- M08, M30-M35	Pediaater, Reumatoloog				
					100	G70-G70	Neuroloog, Pediaater	esmane			
					75	N00-N08	Pediaater, Nefroloog				
					75	L40-L40	Dermatovenerol oog, Pediaater				
					100	Z94-Z94, T86- T86					
					75	L10-L10, L13.0- L13.0, L12-L12	Pediaater, Allergoloog- immunoloog, Dermatovenerol oog				
					75	L20-L20	Dermatovenerol oog				
					75	K50-K51, K73- K74	Pediaater, Gastroenteroloog				
					50						
1005736	aselaiinhape, 200mg 1g	D10AX0 3	SKINOREN, kreem, 30g 1TK	LEO Pharma A/S	50						
1831979	aselaiinhape, 200mg 1g	D10AX0 3	SKINOREN, kreem, 30g 1TK	Lex Ano UAB	50						
1850060	aselaiinhape, 200mg 1g	D10AX0 3	SKINOREN, kreem, 30g 1TK	Ideal Trade Links UAB	50						
1019775	asitromütsiin, 250mg	J01FA10	SUMAMED, kõvakapsel, 6TK	Teva Pharma B.V.	50						
					100	E84-E84	Pediaater, Pulmonoloog	esmane			
1614439	asitromütsiin, 250mg	J01FA10	AZITHROMYCIN KRKA, õhukese polümeerikattega tablett, 6TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
					100	E84-E84	Pediaater, Pulmonoloog	esmane			

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1267309	asitromütsiin, 40mg 1ml	J01FA10	SUMAMED FORTE, suukaudse suspensiooni pulber, 30ml 1TK	Teva Pharma B.V.	50						
					100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater	esmane			
1019797	asitromütsiin, 500mg	J01FA10	SUMAMED, õhukese polümeerikattega tablett, 3TK	Teva Pharma B.V.	100	E84-E84	Pediaater, Pulmonoloog	esmane			
					50						
1113398	asitromütsiin, 500mg	J01FA10	AZITROX 500 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 3TK	Zentiva k.s.	100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater	esmane			
					50						
1184992	asitromütsiin, 500mg	J01FA10	AZITHROMYCIN SANDOZ 500MG, õhukese polümeerikattega tablett, 3TK	Sandoz GmbH	50						
					100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater	esmane			
1549548	asitromütsiin, 500mg	J01FA10	AZITHROMYCIN GRINDEKS, õhukese polümeerikattega tablett, 3TK	Grindeks AS	50						
					100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater	esmane			
1563342	asitromütsiin, 500mg	J01FA10	ZYLUMIT, õhukese polümeerikattega tablett, 3TK	Rivopharm Limited	50						
					100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater	esmane			
1614451	asitromütsiin, 500mg	J01FA10	AZITHROMYCIN KRKA, õhukese polümeerikattega tablett, 3TK	KRKA, d.d., Novo mesto	100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater	esmane			
					50						
1045796	aspart-insuliin, 100ühik 1ml	A10AB0 5	NOVORAPID PENFILL, süstelahus kolbampullis, 3ml 5TK	Novo Nordisk A/S	50						
					100	O24-O24, E13- E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1					
1084788	aspart-insuliin, 100ühik 1ml	A10AD0 5	NOVOMIX 30 FLEXPEN, süstesuspensioon pen- süstlis, 3ml 5TK	Novo Nordisk A/S	50						
					100	O24-O24, E13- E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1092541	aspart-insuliin, 100ühik 1ml	A10AB0 5	NOVORAPID FLEXPEN, süstelahus pen-süstlis, 3ml 5TK	Novo Nordisk A/S	50						
					100	O24-O24, E13- E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1					
1736917	aspart-insuliin, 100ühik 1ml	A10AB0 5	FIASP, süstelahus pen- süstlis, 3ml 5TK	Novo Nordisk A/S	50						
					100	O24-O24, E13- E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1					
1736940	aspart-insuliin, 100ühik 1ml	A10AB0 5	FIASP, süstelahus kolbampullis, 3ml 5TK	Novo Nordisk A/S	50						
					100	O24-O24, E13- E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1					
1888735	astsiminiib, 20mg	L01EA0 6	SCSEMBLIX, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Novartis Europharm Limited	100	C92.1-C92.1	Hematoloog				konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi ja kelle eelnev ravi kahe või enama türosiinikinaasi inhibiitoriga on ebaõnnestunud
1888757	astsiminiib, 40mg	L01EA0 6	SCSEMBLIX, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Novartis Europharm Limited	100	C92.1-C92.1	Hematoloog				konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi ja kelle eelnev ravi kahe või enama türosiinikinaasi inhibiitoriga on ebaõnnestunud
1007851	atenolool, 100mg	C07AB0 3	ATENOLOL- RATIOPHARM 100MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Ratiopharm GmbH	50						
					75	I10-I13, I15-I15, I20-I20, I47-I49					
1007895	atenolool, 25mg	C07AB0 3	ATENOLOL- RATIOPHARM 25MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Ratiopharm GmbH	75	I10-I13, I15-I15, I20-I20, I47-I49					
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1007873	atenolool, 50mg	C07AB03	ATENOLOL- RATIOPHARM 50MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Ratiopharm GmbH	50						
					75	I10-I13, I15-I15, I20-I20, I47-I49					
1610536	atomoksetiin, 10mg	N06BA09	ATOMINEX 10MG, kõvakapsel, 56TK	Zentiva k.s.	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater – laste- ja noorukitepsühhiaater	esmane	6,00	20,00	ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (2 Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti 2 erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, CGAS skoor ≤50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega;
					75	F90.0-F90.1	Psühhiaater – laste- ja noorukitepsühhiaater, Psühhiaater	esmane	20,00		ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: esineb mõõdukas kuni raske funktsionaalne kahjustus vähemalt kahes olukorras (sotsiaalne, akadeemiline ja/või tööalane tegevus), haigus mõjutab konkreetse inimese elu mitmeid aspekte ning viide haiguse esinemisele on tõendatult tuvastatav lapseeest. Ravimi väljakirjutamise õigus esmavalikuna on kaasuva sõltuvushäire esinemisel ning teise valikuna kaasuva sõltuvushäire puudumisel, kui metüülfenidaat on olnud ebaefektiivne või talumatu. Ravi efektiivsus on hinnatav 6-nädalase perioodi jooksul kasutamisel adekvaatses annuses.

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1610615	atomoksetiin, 18mg	N06BA0 9	ATOMINEX 18MG, kõvakapsel, 56TK	Zentiva k.s.	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater – laste- ja noorukitepsühhi aater	esmane	6,00	20,00	ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (2 Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed- eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti 2 erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, CGAS skoor ≤50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega;
					75	F90.0-F90.1	Psühhiaater – laste- ja noorukitepsühhi aater, Psühhiaater	esmane	20,00		ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: esineb mõõdukas kuni raske funktsionaalne kahjustus vähemalt kahes olukorras (sotsiaalne, akadeemiline ja/või tööalane tegevus), haigus mõjutab konkreetse inimese elu mitmeid aspekte ning viide haiguse esinemisele on tõendatult tuvastatav lapseeas. Ravimi väljakirjutamise õigus esmavalikuna on kaasuva sõltuvushäire esinemisel ning teise valikuna kaasuva sõltuvushäire puudumisel, kui metüülfenidaat on olnud ebaefektiivne või talumatu. Ravi efektiivsus on hinnatav 6-nädalase perioodi jooksul kasutamisel adekvaatses annuses.

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1610693	atomoksetiin, 25mg	N06BA0 9	ATOMINEX 25 MG, kõvakapsel, 56TK	Zentiva k.s.	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater – laste- ja noorukitepsühhi aater	esmane	6,00	20,00	ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (2 Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed- eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti 2 erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, CGAS skoor ≤50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega;
					75	F90.0-F90.1	Psühhiaater, Psühhiaater – laste- ja noorukitepsühhi aater	esmane	20,00		ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: esineb mõõdukas kuni raske funktsionaalne kahjustus vähemalt kahes olukorras (sotsiaalne, akadeemiline ja/või tööalane tegevus), haigus mõjutab konkreetse inimese elu mitmeid aspekte ning viide haiguse esinemisele on tõendatult tuvastatav lapseast. Ravimi väljakirjutamise õigus esmavalikuna on kaasuva sõltuvushäire esinemisel ning teise valikuna kaasuva sõltuvushäire puudumisel, kui metüülfenidaat on olnud ebaefektiivne või talumatu. Ravi efektiivsus on hinnatav 6-nädalase perioodi jooksul kasutamisel adekvaatses annuses.

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1610772	atomoksetiin, 40mg	N06BA0 9	ATOMINEX 40 MG, kõvakapsel, 56TK	Zentiva k.s.	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater – laste- ja noorukitepsühhi aater	esmane	6,00	20,00	ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (2 Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed- eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti 2 erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, CGAS skoor ≤50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega;
					75	F90.0-F90.1	Psühhiaater – laste- ja noorukitepsühhi aater, Psühhiaater	esmane	20,00		ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: esineb mõõdukas kuni raske funktsionaalne kahjustus vähemalt kahes olukorras (sotsiaalne, akadeemiline ja/või tööalane tegevus), haigus mõjutab konkreetse inimese elu mitmeid aspekte ning viide haiguse esinemisele on tõendatult tuvastatav lapseeas. Ravimi väljakirjutamise õigus esmavalikuna on kaasuva sõltuvushäire esinemisel ning teise valikuna kaasuva sõltuvushäire puudumisel, kui metüülfenidaat on olnud ebaefektiivne või talumatu. Ravi efektiivsus on hinnatav 6-nädalase perioodi jooksul kasutamisel adekvaatses annuses.



Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1610851	atomoksetiin, 60mg	N06BA0 9	ATOMINEX 60 MG, kõvakapsel, 56TK	Zentiva k.s.	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater – laste- ja noorukitepsühhi aater	esmane	6,00	20,00	ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (2 Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed- eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti 2 erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, CGAS skoor ≤50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega;
					75	F90.0-F90.1	Psühhiaater, Psühhiaater – laste- ja noorukitepsühhi aater	esmane	20,00		ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: esineb mõõdukas kuni raske funktsionaalne kahjustus vähemalt kahes olukorras (sotsiaalne, akadeemiline ja/või tööalane tegevus), haigus mõjutab konkreetse inimese elu mitmeid aspekte ning viide haiguse esinemisele on tõendatult tuvastatav lapseeast. Ravimi väljakirjutamise õigus esmavalikuna on kaasuva sõltuvushäire esinemisel ning teise valikuna kaasuva sõltuvushäire puudumisel, kui metüülfenidaat on olnud ebaefektiivne või talumatu. Ravi efektiivsus on hinnatav 6-nädalase perioodi jooksul kasutamisel adekvaatses annuses.
1138047	atorvastatiin, 10mg	C10AA0 5	ATORIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	KRKA d.d. Novo mesto	100	N18-N18					
					50						
					75	I21-I22, Z45- Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10- E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78- E78, I11-I12					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1180213	atorvastatiin, 10mg	C10AA0 5	TORVACARD 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Zentiva k.s.	75	I21-I22, Z45- Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10- E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78- E78, I11-I12					
					50						
					100	N18-N18					
1397741	atorvastatiin, 10mg	C10AA0 5	TULIP 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	100	N18-N18					
					75	I21-I22, Z45- Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10- E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78- E78, I11-I12					
					50						
1410657	atorvastatiin, 10mg	C10AA0 5	ATORVASTATIN TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	50						
					75	I21-I22, Z45- Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10- E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78- E78, I11-I12					
					100	N18-N18					
1541911	atorvastatiin, 10mg	C10AA0 5	ATORVASTATIN TAD, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	TAD Pharma GmbH	75	I21-I22, Z45- Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10- E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78- E78, I11-I12					
					50						
					100	N18-N18					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1707892	atorvastatiin, 10mg	C10AA0 5	ATORVASTATIN ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					100	N18-N18					
					75	I21-I22, Z45- Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10- E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78- E78, I11-I12					
1878880	atorvastatiin, 10mg	C10AA0 5	SORTIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Ideal Trade Links UAB	100	N18-N18					
					75	I21-I22, Z45- Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10- E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78- E78, I11-I12					
					50						
1138058	atorvastatiin, 20mg	C10AA0 5	ATORIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	KRKA d.d. Novo mesto	50						
					100	N18-N18					
					75	I21-I22, Z45- Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10- E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78- E78, I11-I12					
1180235	atorvastatiin, 20mg	C10AA0 5	TORVACARD 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Zentiva k.s.	75	I21-I22, Z45- Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10- E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78- E78, I11-I12					
					50						
					100	N18-N18					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1397909	atorvastatiin, 20mg	C10AA0 5	TULIP 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	I21-I22, Z45- Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10- E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78- E78, I11-I12					
					50						
					100	N18-N18					
1397932	atorvastatiin, 20mg	C10AA0 5	TULIP 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	100	N18-N18					
					50						
					75	I21-I22, Z45- Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10- E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78- E78, I11-I12					
1410792	atorvastatiin, 20mg	C10AA0 5	ATORVASTATIN TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	100	N18-N18					
					50						
					75	I21-I22, Z45- Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10- E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78- E78, I11-I12					
1542057	atorvastatiin, 20mg	C10AA0 5	ATORVASTATIN TAD, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	TAD Pharma GmbH	100	N18-N18					
					75	I21-I22, Z45- Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10- E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78- E78, I11-I12					
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1626140	atorvastatiin, 20mg	C10AA0 5	ATORVASTATIN ZENTIVA 20MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Zentiva k.s.	100	N18-N18					
					50						
					75	I21-I22, Z45- Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10- E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78- E78, I11-I12					
1626184	atorvastatiin, 20mg	C10AA0 5	ATORVASTATIN ZENTIVA 20MG, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Zentiva k.s.	50						
					75	E10-E11, Z45- Z45, I63-I63, Z95-Z95, I21- I21, I65-I66, I25- I25, E13-E14, E78-E78, I70.2- I70.2, I11-I12					
					100	N18-N18					
1708062	atorvastatiin, 20mg	C10AA0 5	ATORVASTATIN ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare B.V.	100	N18-N18					
					50						
					75	I21-I22, Z45- Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10- E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78- E78, I11-I12					
1879027	atorvastatiin, 20mg	C10AA0 5	SORTIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Ideal Trade Links UAB	100	N18-N18					
					75	I21-I22, Z45- Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10- E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78- E78, I11-I12					
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1220993	atorvastatiin, 40mg	C10AA0 5	ATORIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	KRKA d.d. Novo mesto	50						
					75	I21-I22, Z45- Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10- E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78- E78, I11-I12					
					100	N18-N18					
1410927	atorvastatiin, 40mg	C10AA0 5	ATORVASTATIN TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	100	N18-N18					
					75	I21-I22, Z45- Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10- E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78- E78, I11-I12					
					50						
1542192	atorvastatiin, 40mg	C10AA0 5	ATORVASTATIN TAD, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	TAD Pharma GmbH	75	I21-I22, Z45- Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10- E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78- E78, I11-I12					
					50						
					100	N18-N18					
1708220	atorvastatiin, 40mg	C10AA0 5	ATORVASTATIN ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare B.V.	100	N18-N18					
					75	I21-I22, Z45- Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10- E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78- E78, I11-I12					
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1124996	atorvastatiin, 80mg	C10AA0 5	SORTIS 80 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Upjohn EESV	100	N18-N18					
					50						
					75	I21-I22, Z45- Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10- E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78- E78, I11-I12					
1768316	atorvastatiin+eseti miib, 10mg+10mg	C10BA0 5	TORZELIP, tablett, 30TK	Zentiva k.s.	75	E13-E14, E10- E11					kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					100	N18-N18					patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	I70.2-I70.2, Z45- Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95					
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3029419	atorvastatiin+eseti miib, 10mg+10mg	C10BA0 5	TORZELIP, tablett, 30TK	Ideal Trade Links UAB	75	E13-E14, E10- E11					kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	I70.2-I70.2, Z45- Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95					
					100	N18-N18					patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					50						
					75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
1768349	atorvastatiin+eseti miib, 20mg+10mg	C10BA0 5	TORZELIP, tablett, 30TK	Zentiva k.s.	100	N18-N18					patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					50						
					75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	I70.2-I70.2, Z45- Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95					
					75	E13-E14, E10- E11					kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust



Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3029486	atorvastatiin+eseti miib, 20mg+10mg	C10BA0 5	TORZELIP, tablett, 30TK	Ideal Trade Links UAB	75	E10-E11, E13- E14					kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					100	N18-N18					patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					50						
					75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	I70.2-I70.2, Z45- Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95					
1768372	atorvastatiin+eseti miib, 40mg+10mg	C10BA0 5	TORZELIP, tablett, 30TK	Zentiva k.s.	75	E13-E14, E10- E11					kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	I70.2-I70.2, Z45- Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95					
					100	N18-N18					patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3029587	atorvastatiin+eseti miib, 40mg+10mg	C10BA0 5	TORZELIP, tablett, 30TK	Ideal Trade Links UAB	75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärgväärtust
					50						
					75	I70.2-I70.2, Z45- Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95					
					100	N18-N18					patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärgväärtust
					75	E10-E11, E13- E14					kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärgväärtust
1768406	atorvastatiin+eseti miib, 80mg+10mg	C10BA0 5	TORZELIP, tablett, 30TK	Zentiva k.s.	75	E10-E11, E13- E14					kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärgväärtust
					75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärgväärtust
					75	I70.2-I70.2, Z45- Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95					
					100	N18-N18					patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärgväärtust
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3029598	atorvastatiin+eseti miib, 80mg+10mg	C10BA0 5	TORZELIP, tablett, 30TK	Ideal Trade Links UAB	100	N18-N18					patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	I70.2-I70.2, Z45- Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95					
					50						
					75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	E13-E14, E10- E11					kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
1039250	atsetüülsüsteiin, 600mg	R05CB0 1	ACC LONG, kihisev tablett, 10TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50	J84-J84					
					100	E84-E84	Pediaater, Pulmonoloog	esmane			
1515248	atsetüülsüsteiin, 600mg	R05CB0 1	MUCOVIT, kihisev tablett, 12TK	PharmaEstica Manufacturing OÜ	50	J84-J84					
					100	E84-E84	Pediaater, Pulmonoloog	esmane			
1778542	atsikloviir, 30mg 1g	S01AD0 3	ACICLOVIR AGEPHA, silmasalv, 4.5g 1TK	AGEPHA Pharma s.r.o.	50						
1165384	atsikloviir, 400mg	J05AB01	ACIC 400 MG, tablett, 35TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	100	D60-D64	Hematoloog, Pediaater				
					50						
					100	Z94-Z94, T86- T86					
1836413	atsikloviir, 400mg	J05AB01	ACIC 400 MG, tablett, 35TK	Lex Ano UAB	100	Z94-Z94, T86- T86					
					100	D60-D64	Hematoloog, Pediaater				
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1889196	atsikloviir, 400mg	J05AB01	ACIC 400 MG, tablett, 35TK	Ideal Trade Links UAB	100	Z94-Z94, T86-T86					
					100	D60-D64	Hematoloog, Pediaater				
					50						
1000731	atsitreiin, 10mg	D05BB02	NEOTIGASON, kõvakapsel, 30TK	Teva B.V.	50						
					75	L40-L40, Q82.8-Q82.8, L86-L86, M07-M07, Q80-Q80, L43-L43	Pediaater, Dermatoveneroloog				
1834365	atsitreiin, 10mg	D05BB02	NEOTIGASON, kõvakapsel, 30TK	First Pharma OÜ	75	L40-L40, Q82.8-Q82.8, L86-L86, M07-M07, Q80-Q80, L43-L43	Pediaater, Dermatoveneroloog				
					50						
1890895	atsitreiin, 10mg	D05BB02	NEOTIGASON, kõvakapsel, 30TK	Ideal Trade Links UAB	50						
					75	L40-L40, Q82.8-Q82.8, L86-L86, M07-M07, Q80-Q80, L43-L43	Dermatoveneroloog, Pediaater				
1798678	avatrombopaag, 20mg	B02BX08	DOPTLET, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)	100	D69.4-D69.4					patsientidele, kelle ravi alustamine on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele - muu suukaudne ravi (kortikosteroidi, immuunsupressandiga) on osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud, splenektomia on osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud (sh splenektomia ettevalmistamiseks, kui intravenoosne immuunglobuliin ei ole piisavalt tõhus) ning esineb trombotsütopeenia <20 000/μl

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1798689	avatrombopaag, 20mg	B02BX0 8	DOPTLET, õhukese polümeerikattega tablett, 15TK	Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)	100	D69.4-D69.4					patsientidele, kelle ravi alustamine on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele - muu suukaudne ravi (kortikosteroidi, immuunsupressandiga) on osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud, splenektomia on osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud (sh splenektomia ettevalmistamiseks, kui intravenoosne immuunglobuliin ei ole piisavalt tõhus) ning esineb trombotsütopeenia <20 000/μl
1888533	avatrombopaag, 20mg	B02BX0 8	DOPTLET, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)	100	D69.4-D69.4					patsientidele, kelle ravi alustamine on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele - muu suukaudne ravi (kortikosteroidi, immuunsupressandiga) on osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud, splenektomia on osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud (sh splenektomia ettevalmistamiseks, kui intravenoosne immuunglobuliin ei ole piisavalt tõhus) ning esineb trombotsütopeenia <20 000/μl
1739190	baritsitiniib, 2mg	L04AF02	OLUMIANT, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Eli Lilly Nederland B.V.	100	M05-M06	Reumatoloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt kahe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud
					100	L20.8-L20.8, L20.9-L20.9	Allergoloog- immunoloog, Dermatovenerol oog, Pediaater				mõõduka või raske haigusega (EASI≥16, DLQI≥10) patsiendile, kes ei allu süsteemsele konventsionaalsele ravile tsüklosporiiniga 8–12 nädala jooksul või kellele see on vastunäidustatud või põhjustanud talumatuid kõrvaltoimeid

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1739257	barisitiiniib, 4mg	L04AF02	OLUMIANT, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Eli Lilly Nederland B.V.	100	L20.8-L20.8, L20.9-L20.9	Dermatovenerol oog, Pediaater, Allergoloog- immunoloog				mõõduka või raske haigusega (EASI≥16, DLQI≥10) patsiendile, kes ei allu süsteemsele konventsionaalsele ravile tsüklosporiiniga 8–12 nädala jooksul või kellele see on vastunäidustatud või põhjustanud talumatuid kõrvaltoimeid
					100	M05-M06	Pediaater, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt kahe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud
1019483	batsitratsiin+neom ütsiin, 250RÜ+5000RÜ 1g	D06AX8 0	BANEOCIN, salv, 20g 1TK	Sandoz GmbH	50						
1591286	beeta-1a- interferoon, 30mcg 0.5ml	L03AB0 7	AVONEX, süstelahus pen-süstlis, 0.5ml 4TK	Biogen Netherlands B.V.	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel hulgiskleroosi raviks
1117640	beeta-1a- interferoon, 44mcg 0.5ml	L03AB0 7	REBIF, süstelahus süstlis, 0.5ml 12TK	Merck Europe B.V.	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel hulgiskleroosi raviks
1430671	beeta-1a- interferoon, 44mcg 0.5ml	L03AB0 7	REBIF, süstelahus kolbampullis, 1.5ml 4TK	Merck Europe B.V.	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel hulgiskleroosi raviks
1657953	beeta-1a- peginterferoon, 125mcg 0.5ml	L03AB1 3	PLEGRIDY, süstelahus, 0.5ml 2TK	Biogen Netherlands B.V.	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel (ägenemiste ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks
1657975	beeta-1a- peginterferoon, 63mcg/94mcg 0.5ml	L03AB1 3	PLEGRIDY, süstelahus, 1TK / 1TK	Biogen Netherlands B.V.	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel (ägenemiste ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks
1071245	beeta-1b- interferoon, 250mcg 1ml	L03AB0 8	BETAFERON, süstelahuse pulber ja lahusti, 1.2ml 15TK	Bayer AG	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel hulgiskleroosi raviks

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1361393	beeta-1b- interferoon, 250mcg 1ml	L03AB0 8	EXTAVIA, süstelahuse pulber ja lahusti, 1.2ml 15TK	Novartis Europharm Limited	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel hulgiskleroosi raviks
1236912	beetahistiin, 16mg	N07CA0 1	BETAHISTINE ACTAVIS, tablett, 60TK	Teva B.V.	50	H81-H81					
1480878	beetahistiin, 16mg	N07CA0 1	VERTIMED 16MG, tablett, 60TK	Medochemie Limited	50	H81-H81					
1115738	beetahistiin, 24mg	N07CA0 1	BETASERC, tablett, 50TK	Viartis SIA	50	H81-H81					
1480957	beetahistiin, 24mg	N07CA0 1	VERTIMED 24MG, tablett, 50TK	Medochemie Limited	50	H81-H81					
1515833	beetahistiin, 24mg	N07CA0 1	BETAHISTINE ACTAVIS, tablett, 50TK	Teva B.V.	50	H81-H81					
1620245	beetahistiin, 24mg	N07CA0 1	BETASERC, suus dispergeeruv tablett, 60TK	VIATRIS HEALTHCARE Limited	50	H81-H81					
1741834	beetahistiin, 24mg	N07CA0 1	BETAHISTINE ACCORD, tablett, 50TK	Accord Healthcare B.V.	50	H81-H81					
1827064	beetahistiin, 24mg	N07CA0 1	BETASERC, tablett, 60TK	Lex Ano UAB	50	H81-H81					
1861781	beetahistiin, 24mg	N07CA0 1	BETASERC, tablett, 60TK	Ideal Trade Links UAB	50	H81-H81					
1004870	beetametasoon, 1mg 1g	D07AC0 1	BETNOVATE CREAM, kreem, 15g 1TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50						
1862861	beetametasoon, 1mg 1g	D07AC0 1	BETNOVATE, kreem, 30g 1TK	Lex Ano UAB	50						
1007514	beetametasoon+fu sidiinhape, 1mg+20mg 1g	D07CC8 0	FUCICORT, kreem, 15g 1TK	LEO Pharma A/S	50						
3030905	beetametasoon+fu sidiinhape, 1mg+20mg 1g	D07CC8 0	FUCICORT, kreem, 20g 1TK	Ideal Trade Links UAB	50						
1006041	beetametasoon+s alitsüülhape, 0,5mg+20mg 1g	D07BC8 0	DIPROSALIC, nahalahus, 30ml 1TK	Organon N.V.	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1865123	beetametasoon+s alitsüülhape, 0,5mg+20mg 1g	D07BC8 0	DIPROSALIC, nahalahus, 30ml 1TK	Lex Ano UAB	50						
1880816	beetametasoon+s alitsüülhape, 0,5mg+20mg 1g	D07BC8 0	DIPROSALIC, nahalahus, 30ml 2TK	Ideal Trade Links UAB	50						
1847437	berotralstaat, 150mg	B06AC0 6	ORLADEYO, kõvakapsel, 28TK	BioCryst Ireland Limited	100	D84.1-D84.1	Allergoloog- immunoloog				ekspertkomisjoni (kuhu kuulub vähemalt 3 HAE-ravi kogemusega spetsialisti, kellest 2 on allergoloog-immunoloogid) otsuse alusel päriliku angioödeemi korduvate hoogude rutiinseks ennetamiseks täiskasvanutel ja vähemalt 12-aastastel noorukitel, kellel on ≥2 kliiniliselt olulist akuutset ravi vajavat haigushoogu kuus. Ravivastust hinnatakse 3 kuud peale ravi alustamist, seejärel iga kuue kuu tagant ning ravi lõpetatakse, kui ravi on ebaefektiivne (akuutsete atakkide arv ei vähene või suureneb võrreldes patsiendi ravieelsete atakkide arvuga).
1286197	betaiin, 1g 1g	A16AA0 6	CYSTADANE, suukaudne pulber, 180g 1TK	Recordati Rare Diseases	100	E72.1-E72.1	Endokrinoloog, Sisearst, Pediaater, Kardioloog, Neuroloog	esmane			lisaraviks tsüstatiini beetasüntaasi, 5,10-metüleentetrahydrofolaadi reduktaasi, kobalamiini kofaktori metabolismi puudulikkuse korral patsientidele, kelle ravi vitamiin B6, foolhappe, vitamiin B12 ja eridieediga pole piisav
1034042	betaksolool, 2,5mg 1ml	S01ED0 2	BETOPTIC S, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK	Immedica Pharma AB	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
1012194	bikalutamiid, 150mg	L02BB0 3	CASODEX, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Laboratoires Juvise Pharmaceuticals	100	C61-C61	Onkoloog, Uroloog				juhul, kui haigus on pärast kirurgilist või medikamentoosset kastratsiooni progresseerunud, metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravi alustamisel LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul, kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest või medikamentoosset kastratsioonist)
					50						



Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1258017	bikalutamiid, 150mg	L02BB0 3	BICALUTAMIDE - TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Teva Pharma B.V.	100	C61-C61	Onkoloog, Uroloog				juhul, kui haigus on pärast kirurgilist või medikamentoosset kastratsiooni progresseerunud, metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravi alustamisel LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul, kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest või medikamentoosset kastratsioonist)
					50						
1266173	bikalutamiid, 150mg	L02BB0 3	BICALUTAMID ACTAVIS 150MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Actavis Group Ptc ehf.	50						
					100	C61-C61	Uroloog, Onkoloog				juhul, kui haigus on pärast kirurgilist või medikamentoosset kastratsiooni progresseerunud, metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravi alustamisel LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul, kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest või medikamentoosset kastratsioonist)
1776900	bikalutamiid, 150mg	L02BB0 3	BICALUTAMIDE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					100	C61-C61	Onkoloog, Uroloog				juhul, kui haigus on pärast kirurgilist või medikamentoosset kastratsiooni progresseerunud, metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravi alustamisel LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest või medikamentoosset kastratsioonist)
1026560	bikalutamiid, 50mg	L02BB0 3	CASODEX, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Laboratoires Juvisé Pharmaceuticals	50						
					100	C61-C61	Uroloog, Onkoloog				juhul, kui haigus on pärast kirurgilist või medikamentoosset kastratsiooni progresseerunud, metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravi alustamisel LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul, kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest või medikamentoosset kastratsioonist)
1257803	bikalutamiid, 50mg	L02BB0 3	BICALUTAMIDE - TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Teva Pharma B.V.	50						
					100	C61-C61	Onkoloog, Uroloog				juhul, kui haigus on pärast kirurgilist või medikamentoosset kastratsiooni progresseerunud, metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravi alustamisel LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul, kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest või medikamentoosset kastratsioonist)

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1265891	bikalutamiid, 50mg	L02BB03	BICALUTAMID ACTAVIS 50MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Actavis Group Ptc ehf.	50						
					100	C61-C61	Onkoloog, Uroloog				juhul, kui haigus on pärast kirurgilist või medikamentoosset kastratsiooni progresseerunud, metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravi alustamisel LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul, kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest või medikamentoossest kastratsioonist)
1293791	bikalutamiid, 50mg	L02BB03	BICALUTAMIDE ACCORD 50MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					100	C61-C61	Onkoloog, Uroloog				juhul, kui haigus on pärast kirurgilist või medikamentoosset kastratsiooni progresseerunud, metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravi alustamisel LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul, kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest või medikamentoossest kastratsioonist)
1258983	bisoprolol, 10mg	C07AB07	BISOPROLOL VITABALANS, tablett, 30TK	Vitabalans Oy	75	I10-I13, I15-I15, I20-I20, I47-I49					
					50						
1259029	bisoprolol, 10mg	C07AB07	BISOPROLOL VITABALANS, tablett, 100TK	Vitabalans Oy	75	I10-I13, I15-I15, I20-I20, I47-I49					
					50						
1596427	bisoprolol, 10mg	C07AB07	SOBYCOR, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	KRKA d.d. Novo mesto	50						
					75	I10-I13, I15-I15, I20-I20, I47-I49					
1683952	bisoprolol, 10mg	C07AB07	BISOPROLOL ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					75	I10-I13, I15-I15, I20-I20, I47-I49					
1804115	bisoprolol, 10mg	C07AB07	BISOPROLOL ZENTIVA, tablett, 30TK	Zentiva k.s.	50						
					75	I10-I13, I15-I15, I20-I20, I47-I49					
1865606	bisoprolol, 10mg	C07AB07	BISOPROLOL VITABALANS, tablett, 90TK	Vitabalans Oy	75	I10-I13, I15-I15, I20-I20, I47-I49					
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1683794	bisoprolol, 2,5mg	C07AB07	BISOPROLOL ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare B.V.	75	I10-I13, I15-I15, I20-I20, I47-I49					
					50						
1258905	bisoprolol, 5mg	C07AB07	BISOPROLOL VITABALANS, tablett, 30TK	Vitabalans Oy	75	I10-I13, I15-I15, I20-I20, I47-I49					
					50						
1258949	bisoprolol, 5mg	C07AB07	BISOPROLOL VITABALANS, tablett, 100TK	Vitabalans Oy	50						
					75	I10-I13, I15-I15, I20-I20, I47-I49					
1596326	bisoprolol, 5mg	C07AB07	SOBYCOR, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	KRKA d.d. Novo mesto	50						
					75	I10-I13, I15-I15, I20-I20, I47-I49					
1683873	bisoprolol, 5mg	C07AB07	BISOPROLOL ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare B.V.	75	I10-I13, I15-I15, I20-I20, I47-I49					
					50						
1804058	bisoprolol, 5mg	C07AB07	BISOPROLOL ZENTIVA, tablett, 30TK	Zentiva k.s.	50						
					75	I10-I13, I15-I15, I20-I20, I47-I49					
1865594	bisoprolol, 5mg	C07AB07	BISOPROLOL VITABALANS, tablett, 90TK	Vitabalans Oy	75	I10-I13, I15-I15, I20-I20, I47-I49					
					50						
1586718	bosentaan, 125mg	C02KX01	BOSENTAN NORAMEDA 125 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Norameda UAB	50						
					100	I27.0-I27.0	Reumatoloog, Kardioloog, Pediaater, Pulmonoloog				NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenaafil on vastunäidustatud, osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1628759	bosentaan, 125mg	C02KX0 1	BOSENTAN ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Accord Healthcare B.V.	100	I27.0-I27.0	Reumatoloog, Pediaater, Pulmonoloog, Kardioloog				NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafil on vastunäidustatud, osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid
					50						
1586684	bosentaan, 62,5mg	C02KX0 1	BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Norameda UAB	50						
					100	I27.0-I27.0	Reumatoloog, Pediaater, Pulmonoloog, Kardioloog				NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafil on vastunäidustatud, osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid
1628737	bosentaan, 62,5mg	C02KX0 1	BOSENTAN ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					100	I27.0-I27.0	Kardioloog, Pediaater, Reumatoloog, Pulmonoloog				NYHA III-IV kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafil on vastunäidustatud, osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid
1612055	bosutiniib, 100mg	L01EA0 4	BOSULIF, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	C92.1-C92.1	Hematoloog				konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi, eelnev ravi imatiniibiga annuses 600mg on ebaõnnestunud või osutunud talumatuks (imatiniibravi on põhjustanud III või IV astme kõrvaltoime või üle 3 kuu püsinud II astme kõrvaltoime CTC klassifikatsiooni järgi) ning ravi alustatakse kuni kolmanda rea ravina; ravi võib jätkata kuni hematoloogilise ravivastuse püsimiseni (haigus ei progresseeru bosutiniibravi foonil). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi bosutiniibiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1.07.2016. a.

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1612077	bosutiniib, 500mg	L01EA0 4	BOSULIF, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	C92.1-C92.1	Hematoloog				konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi, eelnev ravi imatiniibiga annuses 600mg on ebaõnnestunud või osutunud talumatuks (imatiniibravi on põhjustanud III või IV astme kõrvaltoime või üle 3 kuu püsinud II astme kõrvaltoime CTC klassifikatsiooni järgi) ning ravi alustatakse kuni kolmanda rea ravina; ravi võib jätkata kuni hematoloogilise ravivastuse püsimiseni (haigus ei progresseeru bosutiniibravi foonil). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi bosutiniibiga on ravimootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1.07.2016. a.
1783289	brigatiniib, 180mg	L01ED0 4	ALUNBRIG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Takeda Pharma A/S	100	C34-C34	Onkoloog				anaplastilise lümfoomkinaaspositiivse kaugelearenenud varem ravimata mitteväikerakkopsuvähi raviks heas üldseisundis (ECOG 0- 2) täiskasvanud patsientidele
1806870	brigatiniib, 30mg	L01ED0 4	ALUNBRIG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Takeda Pharma A/S	100	C34-C34	Onkoloog				anaplastilise lümfoomkinaaspositiivse kaugelearenenud varem ravimata mitteväikerakkopsuvähi raviks heas üldseisundis (ECOG 0- 2) täiskasvanud patsientidele
1783256	brigatiniib, 90mg	L01ED0 4	ALUNBRIG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Takeda Pharma A/S	100	C34-C34	Onkoloog				anaplastilise lümfoomkinaas-positiivse kaugelearenenud varem ravimata mitteväikerakk-kopsuvähi raviks heas üldseisundis (ECOG 0-2) täiskasvanud patsientidele
1042782	brinsolamiid, 10mg 1ml	S01EC0 4	AZOPT, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK	Novartis Europharm Limited	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
1581230	brinsolamiid, 10mg 1ml	S01EC0 4	BRINZOLAMIDE ELVIM, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK	SIA Elvim	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
1723047	brinsolamiid, 10mg 1ml	S01EC0 4	BRINZOLAMIDE SANDOZ, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
					50						
1657694	brinsolamiid+brimo nidiin, 10mg+2mg 1ml	S01EC8 0	SIMBRINZA, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK	Novartis Europharm Limited	100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
					50						
1531459	bromofenak, 0,9mg 1ml	S01BC1 1	YELLOX, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK	Bausch + Lomb Ireland Limited	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1008098	bromokriptiin, 2,5mg	G02CB0 1	BROMOCRIPTIN- RICHTER, tablett, 30TK	Gedeon Richter Plc.	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					100	E24-E24, E22- E22	Endokrinoloog, Pediaater	esmane			
					50						
1038316	budesoniid, 0,25mg 1ml	R03BA0 2	PULMICORT, nebuliseeritav suspensioon, 2ml 20TK	Astrazeneca AB	50						
					75	J45-J45					
1875078	budesoniid, 0,5mg 2ml	R03BA0 2	BUDESONIDE TEVA, nebuliseeritav suspensioon, 2ml 20TK	Teva B.V.	50						
					75	J45-J45					
1124390	budesoniid, 200mcg	R03BA0 2	MIFLONIDE BREEZHALER, inhalatsioonipulber kõvakapslis, 60TK	Novartis Baltics SIA	75	J45-J45					
					50						
1174160	budesoniid, 200mcg 1annus	R03BA0 2	GIONA EASYHALER, inhalatsioonipulber, 200annus 1TK	Orion Corporation	50						
					75	J45-J45					
1124413	budesoniid, 400mcg	R03BA0 2	MIFLONIDE BREEZHALER, inhalatsioonipulber kõvakapslis, 60TK	Novartis Baltics SIA	50						
					75	J45-J45					
1174182	budesoniid, 400mcg 1annus	R03BA0 2	GIONA EASYHALER, inhalatsioonipulber, 100annus 1TK	Orion Corporation	50						
					75	J45-J45					
1643655	budesoniid, 9mg	A07EA0 6	BUDESONIDE FERRING, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Ferring GmbH	75	K52.8-K52.8	Pediaater, Gastroenteroloog				remissiooni induktsiooniks aktiivse mikroskoopilise koliidiga patsiendile
1232660	bupropioon, 150mg	N06AX1 2	ELONTRIL, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 30TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50	F33-F33, F32- F32					
1232693	bupropioon, 300mg	N06AX1 2	ELONTRIL, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 30TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50	F33-F33, F32- F32					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1005006	busulfaan, 2mg	L01AB01	MYLERAN, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Aspen Pharma Trading Limited	50						
					100	C00-D48	Pediaater, Hematoloog, Onkoloog				
1343382	dabigatraaneteksil aat, 110mg	B01AE07	PRADAXA, kõvakapsel, 10TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	50						
					75	S72.0-S72.2, S72.7-S72.7, M16-M17					kuni 30 päevaks
1343393	dabigatraaneteksil aat, 110mg	B01AE07	PRADAXA, kõvakapsel, 30TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	100	I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6					kaasuva pahaloolumulise kasvaja esinemisel
					75	I48-I48					
					75	S72.7-S72.7, M16-M17, S72.0-S72.2					kuni 30 päevaks
					50						
1343405	dabigatraaneteksil aat, 110mg	B01AE07	PRADAXA, kõvakapsel, 60TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	75	S72.7-S72.7, S72.0-S72.2, M16-M17					kuni 30 päevaks
					75	I48-I48					
					50						
					100	I26-I26, I67.6-I67.6, I80-I82					kaasuva pahaloolumulise kasvaja esinemisel
1850813	dabigatraaneteksil aat, 110mg	B01AE07	TELEXER, kõvakapsel, 60TK	Gedeon Richter Plc.	75	S72.0-S72.2, S72.7-S72.7, M16-M17					kuni 30 päevaks
					50						
					75	I48-I48					
					100	I80-I82, I26-I26, I67.6-I67.6					kaasuva pahaloolumulise kasvaja esinemisel

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1869330	dabigatraaneteksil aat, 110mg	B01AE0 7	DANENGO, kõvakapsel, 60TK	TAD Pharma GmbH	75	M16-M17, S72.0-S72.2, S72.7-S72.7					kuni 30 päevaks
					100	I80-I82, I26-I26, I67.6-I67.6					kaasuva pahaloolumulise kasvaja esinemisel
					50						
					75	I48-I48					
1898523	dabigatraaneteksil aat, 110mg	B01AE0 7	DABIGATRAN ETEXILATE ACCORD, kõvakapsel, 30TK	Accord Healthcare S.L.U.	75	I48-I48					
					75	S72.7-S72.7, S72.0-S72.2, M16-M17					kuni 30 päevaks
					100	I26-I26, I67.6- I67.6, I80-I82					kaasuva pahaloolumulise kasvaja esinemisel
					50						
1898534	dabigatraaneteksil aat, 110mg	B01AE0 7	DABIGATRAN ETEXILATE ACCORD, kõvakapsel, 60TK	Accord Healthcare S.L.U.	75	M16-M17, S72.0-S72.2, S72.7-S72.7					kuni 30 päevaks
					50						
					100	I26-I26, I67.6- I67.6, I80-I82					kaasuva pahaloolumulise kasvaja esinemisel
					75	I48-I48					
1538759	dabigatraaneteksil aat, 150mg	B01AE0 7	PRADAXA, kõvakapsel, 60TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	75	I48-I48					
					100	I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6					kaasuva pahaloolumulise kasvaja esinemisel
					50						
1850891	dabigatraaneteksil aat, 150mg	B01AE0 7	TELEXER, kõvakapsel, 60TK	Gedeon Richter Plc.	100	I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6					kaasuva pahaloolumulise kasvaja esinemisel
					50						
					75	I48-I48					
1869396	dabigatraaneteksil aat, 150mg	B01AE0 7	DANENGO, kõvakapsel, 60TK	TAD Pharma GmbH	75	I48-I48					
					100	I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6					kaasuva pahaloolumulise kasvaja esinemisel
					50						



Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1898635	dabigatraaneteksil aat, 150mg	B01AE0 7	DABIGATRAN ETEXILATE ACCORD, kõvakapsel, 60TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	I80-I82, I26-I26, I67.6-I67.6					kaasuva pahaloolumulise kasvaja esinemisel
					75	I48-I48					
					50						
1343360	dabigatraaneteksil aat, 75mg	B01AE0 7	PRADAXA, kõvakapsel, 30TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	75	S72.0-S72.2, S72.7-S72.7, M16-M17					kuni 30 päevaks
					50						
1898444	dabigatraaneteksil aat, 75mg	B01AE0 7	DABIGATRAN ETEXILATE ACCORD, kõvakapsel, 30TK	Accord Healthcare S.L.U.	75	S72.7-S72.7, M16-M17, S72.0-S72.2					kuni 30 päevaks
					50						
1624160	dabrafeniib, 75mg	L01EC0 2	TAFINLAR, kõvakapsel, 120TK	Novartis Europharm Limited	100	C43-C43	Onkoloog				konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) otsuse alusel BRAF V600 mutatsiooniga kaugelearenenud mitteresetseeritava või metastaatilise (IIIc-IV st) melanoomi raviks juhul, kui patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1 ja 3-kuulise intervalliga hinnatuna püsib haigus vähemalt stabiilsena (KT- või/ja muu asjakohase uuringu alusel hinnatuna haiguse progressiooni ei esine)
1598654	dapaglifloosiin, 10mg	A10BK0 1	FORXIGA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Astrazeneca AB	75	N18-N18					lisatuna standardravile (AKE- inhibiitor või ARB) või standardravi vastunäidustuse korral monoteeraapiana
					75	I50-I50					patsiendile, kes kuulub NYHA II-IV funktsionaalklassi, kellel ravikoostöö on hea ning kellel AKE-inhibiitor või ARB ja beetablokaatori kaksikravitl südamepuudulikkuse sümptomid endiselt püsivad või süvenevad
					50						
					75	E14-E14, E11- E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks või monoraviks, kui metformiin on vastunäidustatud või kaasuvana esineb sümptomaatiline südamepuudulikkus või krooniline neeruhaigus

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1598609	dapaglifloosin, 5mg	A10BK01	FORXIGA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Astrazeneca AB	75	E11-E11, E14-E14					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks või monoraviks, kui metformiin on vastunäidustatud või kaasuvana esineb sümptomaatiline südamepuudulikkus või krooniline neeruhaigus
					75	I50-I50					patsiendile, kes kuulub NYHA II-IV funktsionaalklassi, kellel ravikoostöö on hea ning kellel AKE-inhibiitor või ARB ja beetablokaatori kaksikraviga südamepuudulikkuse sümptomid endiselt püsivad või süvenevad
					50						
1814699	darolutamiid, 300mg	L02BB06	NUBEQA, õhukese polümeerikattega tablett, 112TK	Bayer AG	100	C61-C61	Uroloog, Onkoloog				mittemetastaatilise kastratsioonresistentse eesnäärmevähi raviks heas üldseisundis (ECOG 0-1) patsientidele, kellel on kõrge risk (PSADT<=10 kuud) metastaatilise haiguse tekkeks. Metastaatilise hormoonsensitiivse eesnäärmevähi raviks, kõrge riskiga haiguse korral võib ravi määrata patsientidele, kellel abirateroon on vastunäidustatud või abiraterooni kasutamisel esinevad talumatud kõrvaltoimeid. Kummagi näidustuse korral ei tohi patsient olla varasemalt saanud ravi teise põlvkonna androgeenireseptori inhibiitoriga, v.a. juhul, kui ravi on katkestatud kõrvaltoimete tõttu
1275768	dasatiniib, 50mg	L01EA02	SPRYCEL, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG	100	C92.1-C92.1	Hematoloog				konsiiliumi(vähemalt 3 hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele,kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi, eelnev ravi imatiniibiga annuses 600mg on ebaõnnestunud või osutunud talumatuks (imatiniibri ravi on põhjustanud III või IV astme kõrvaltoime või üle 3 kuu püsinud II astme kõrvaltoime CTC klassifikatsiooni järgi) ning ravi alustatakse kuni kolmanda rea ravina; ravi võib jätkata kuni hematoloogilise ravivastuse püsimiseni (haigus ei progresseeru dasatiniibri ravi foonil).

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1755569	dasatiniib, 50mg	L01EA0 2	DASATINIB TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Teva B.V.	100	C92.1-C92.1	Hematoloog				konsiiliumi(vähemalt 3 hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele,kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi, eelnev ravi imatiniibiga annuses 600mg on ebaõnnestunud või osutunud talumatuks (imatiniibravi on põhjustanud III või IV astme kõrvaltoime või üle 3 kuu püsinud II astme kõrvaltoime CTC klassifikatsiooni järgi) ning ravi alustatakse kuni kolmanda rea ravina; ravi võib jätkata kuni hematoloogilise ravivastuse püsimiseni (haigus ei progresseeru dasatiniibravi foonil).
1781276	dasatiniib, 50mg	L01EA0 2	DASATINIB NORAMEDA, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Norameda UAB	100	C92.1-C92.1	Hematoloog				konsiiliumi(vähemalt 3 hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele,kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi, eelnev ravi imatiniibiga annuses 600mg on ebaõnnestunud või osutunud talumatuks (imatiniibravi on põhjustanud III või IV astme kõrvaltoime või üle 3 kuu püsinud II astme kõrvaltoime CTC klassifikatsiooni järgi) ning ravi alustatakse kuni kolmanda rea ravina; ravi võib jätkata kuni hematoloogilise ravivastuse püsimiseni (haigus ei progresseeru dasatiniibravi foonil).
1781467	dasatiniib, 50mg	L01EA0 2	DASATINIB ZENTIVA, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Zentiva k.s.	100	C92.1-C92.1	Hematoloog				konsiiliumi(vähemalt 3 hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele,kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi, eelnev ravi imatiniibiga annuses 600mg on ebaõnnestunud või osutunud talumatuks (imatiniibravi on põhjustanud III või IV astme kõrvaltoime või üle 3 kuu püsinud II astme kõrvaltoime CTC klassifikatsiooni järgi) ning ravi alustatakse kuni kolmanda rea ravina; ravi võib jätkata kuni hematoloogilise ravivastuse püsimiseni (haigus ei progresseeru dasatiniibravi foonil).

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1781478	dasatiniib, 50mg	L01EA0 2	DASATINIB VIATRIS, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Viartis Limited	100	C92.1-C92.1	Hematoloog				konsiiliumi(vähemalt 3 hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele,kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi, eelnev ravi imatiniibiga annuses 600mg on ebaõnnestunud või osutunud talumatuks (imatiniibravi on põhjustanud III või IV astme kõrvaltoime või üle 3 kuu püsinud II astme kõrvaltoime CTC klassifikatsiooni järgi) ning ravi alustatakse kuni kolmanda rea ravina; ravi võib jätkata kuni hematoloogilise ravivastuse püsimiseni (haigus ei progresseeru dasatiniibravi foonil).
1713956	deferasiroks, 180mg	V03AC0 3	EXJADE, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Novartis Europharm Limited	100	D57-D57, D47.1-D47.1, D56-D56, D60- D61, C81-C96, D46-D46	Hematoloog				konsiiliumi (vähemasti 3 hematoloogi) otsuse alusel järgmistele kriteeriumidele vastavate patsientide raviks: seerumi ferritiinitase on >1000 mcg/l; esineb jätkuv regulaarne vereülekannete vajadus (vähemasti 1 aasta jooksul on manustatud vähemasti 2 erütrotsüütide doosi kuu kohta ning sarnane vereülekannete vajadus püsib) või plaanitakse vereloome tüvirakkude siirdamist; müelodüsplastilise sündroomi või müelofibroosiga (D46, D47.1) patsientide riskiskoor on madal või madal-mõõdukas (IPSS 0-1)
1809570	deferasiroks, 180mg	V03AC0 3	DEFERASIROX ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	D57-D57, D47.1-D47.1, D56-D56, D60- D61, C81-C96, D46-D46	Hematoloog				konsiiliumi (vähemasti 3 hematoloogi) otsuse alusel järgmistele kriteeriumidele vastavate patsientide raviks: seerumi ferritiinitase on >1000mcg/l; esineb jätkuv regulaarne vereülekannete vajadus (vähemasti 1 aasta jooksul on manustatud vähemasti 2 erütrotsüütide doosi kuu kohta ning sarnane vereülekannete vajadus püsib) või plaanitakse vereloome tüvirakkude siirdamist; müelodüsplastilise sündroomi või müelofibroosiga (D46, D47.1) patsientide riskiskoor on madal või madal-mõõdukas (IPSS 0-1)

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1713989	deferasiroks, 360mg	V03AC03	EXJADE, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Novartis Europharm Limited	100	D57-D57, D47.1-D47.1, D56-D56, D60- D61, C81-C96, D46-D46	Hematoloog				konsiiliumi (vähemasti 3 hematoloogi) otsuse alusel järgmistele kriteeriumidele vastavate patsientide raviks: seerumi ferritiinitase on >1000 mcg/l; esineb jätkuv regulaarne vereülekannete vajadus (vähemasti 1 aasta jooksul on manustatud vähemasti 2 erütrotsüütide doosi kuu kohta ning sarnane vereülekannete vajadus püsib) või plaanitakse vereloome tüvirakkude siirdamist; müelodüsplastilise sündroomi või müelofibroosiga (D46, D47.1) patsientide riskiskoor on madal või madal-mõõdukas (IPSS 0-1)
1809615	deferasiroks, 360mg	V03AC03	DEFERASIROX ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	D57-D57, D47.1-D47.1, D56-D56, D60- D61, C81-C96, D46-D46	Hematoloog				konsiiliumi (vähemasti 3 hematoloogi) otsuse alusel järgmistele kriteeriumidele vastavate patsientide raviks: seerumi ferritiinitase on >1000mcg/l; esineb jätkuv regulaarne vereülekannete vajadus (vähemasti 1 aasta jooksul on manustatud vähemasti 2 erütrotsüütide doosi kuu kohta ning sarnane vereülekannete vajadus püsib) või plaanitakse vereloome tüvirakkude siirdamist; müelodüsplastilise sündroomi või müelofibroosiga (D46, D47.1) patsientide riskiskoor on madal või madal-mõõdukas (IPSS 0-1)
1605574	degludek-insuliin, 100ühik 1ml	A10AE06	TRESIBA, süstelahus pen-süstlis, 3ml 5TK	Novo Nordisk A/S	100	O24-O24, E13- E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1					
1605619	degludek-insuliin, 200ühik 1ml	A10AE06	TRESIBA, süstelahus pen-süstlis, 3ml 3TK	Novo Nordisk A/S	100	O24-O24, E13- E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1					
1607295	degludek- insuliin+aspart- insuliin, 70ühik+30ühik 1ml	A10AD06	RYZODEG, süstelahus, 3ml 5TK	Novo Nordisk A/S	100	E10-E11, E13- E14					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1014972	deksametasoon, 0,5mg	H02AB0 2	DEXAMETHASON KRKA, tablett, 10TK	KRKA d.d. Novo mesto	100	Z94-Z94, T86- T86					
					100	E89.6-E89.6, E27-E27, E89.3- E89.3, E23-E23, E25-E25	Endokrinoloog, Pediaater	esmane			
					50						
					75	L12-L12, L23- L23, L13.0- L13.0, L10-L10, L20-L20	Pediaater, Dermatovenerol oog, Allergoloog- immunoloog				
					100	C00-D48					
1647143	deksametasoon, 0,985mg 1g	S01BA0 1	DEXAGEL, silmageel, 5g 1TK	Bausch + Lomb Ireland Limited	50						
1007479	deksametasoon, 1mg 1ml	S01BA0 1	OFTAN DEXA, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK	Santen Oy	50						
1124288	deksametasoon, 1mg 1ml	S01BA0 1	MAXIDEX, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK	Novartis Baltics SIA	50						
1671780	deksametasoon, 20mg	H02AB0 2	DEXAMETHASON KRKA, tablett, 20TK	KRKA, d.d., Novo mesto	100	Z94-Z94, T86- T86					
					75	L12-L12, L23- L23, L13.0- L13.0, L10-L10, L20-L20	Allergoloog- immunoloog, Pediaater, Dermatovenerol oog				
					100	E89.6-E89.6, E27-E27, E89.3- E89.3, E23-E23, E25-E25	Endokrinoloog, Pediaater	esmane			
					50						
					100	C00-D48					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1792874	deksametasoon, 20mg	H02AB0 2	DEXAMETHASON KRKA, tablett, 20TK	First Pharma OÜ	75	L12-L12, L23- L23, L13.0- L13.0, L10-L10, L20-L20	Allergoloog- immunoloog, Pediaater, Dermatovenerol oog				
					50						
					100	Z94-Z94, T86- T86					
					100	C00-D48					
					100	E89.6-E89.6, E27-E27, E89.3- E89.3, E23-E23, E25-E25	Endokrinoloog, Pediaater	esmane			
1808748	deksametasoon, 20mg	H02AB0 2	NODEXON, tablett, 20TK	Norameda UAB	100	T86-T86, C00- D48, Z94-Z94					
					75	L12-L12, L23- L23, L13.0- L13.0, L10-L10, L20-L20	Allergoloog- immunoloog, Pediaater, Dermatovenerol oog				
					50						
					100	E89.6-E89.6, E27-E27, E89.3- E89.3, E23-E23, E25-E25	Pediaater, Endokrinoloog	esmane			

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1889231	deksametasoon, 20mg	H02AB0 2	DEXAMETHASON KRKA, tablett, 20TK	Ideal Trade Links UAB	75	L12-L12, L23- L23, L13.0- L13.0, L10-L10, L20-L20	Dermatovenerol oog, Pediaater, Allergoloog- immunoloog				
					100	Z94-Z94, T86- T86					
					100	E89.6-E89.6, E27-E27, E89.3- E89.3, E23-E23, E25-E25	Endokrinoloog, Pediaater	esmane			
					50						
					100	C00-D48					
1671667	deksametasoon, 4mg	H02AB0 2	DEXAMETHASON KRKA, tablett, 20TK	KRKA, d.d., Novo mesto	100	E89.6-E89.6, E27-E27, E89.3- E89.3, E23-E23, E25-E25	Pediaater, Endokrinoloog	esmane			
					50						
					75	L12-L12, L23- L23, L13.0- L13.0, L10-L10, L20-L20	Dermatovenerol oog, Pediaater, Allergoloog- immunoloog				
					100	C00-D48					
					100	Z94-Z94, T86- T86					



Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1792773	deksametasoon, 4mg	H02AB0 2	DEXAMETHASON KRKA, tablett, 20TK	First Pharma OÜ	100	Z94-Z94, T86- T86					
					50						
					75	L12-L12, L23- L23, L13.0- L13.0, L10-L10, L20-L20	Pediaater, Allergoloog- immunoloog, Dermatovenerol oog				
					100	C00-D48					
					100	E89.6-E89.6, E27-E27, E89.3- E89.3, E23-E23, E25-E25	Endokrinoloog, Pediaater	esmane			
1808669	deksametasoon, 4mg	H02AB0 2	NODEXON, tablett, 20TK	Norameda UAB	100	E89.6-E89.6, E27-E27, E89.3- E89.3, E23-E23, E25-E25	Endokrinoloog, Pediaater	esmane			
					50						
					100	T86-T86, C00- D48, Z94-Z94					
					75	L12-L12, L23- L23, L13.0- L13.0, L10-L10, L20-L20	Pediaater, Dermatovenerol oog, Allergoloog- immunoloog				
1862669	deksametasoon, 4mg	H02AB0 2	DEXAMETHASON KRKA, tablett, 20TK	Lex Ano UAB	100	E89.6-E89.6, E27-E27, E89.3- E89.3, E23-E23, E25-E25	Pediaater, Endokrinoloog	esmane			
					50						
					75	L12-L12, L23- L23, L13.0- L13.0, L10-L10, L20-L20	Allergoloog- immunoloog, Pediaater, Dermatovenerol oog				
					100	T86-T86, C00- D48, Z94-Z94					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1889376	deksametasoon, 4mg	H02AB0 2	DEXAMETHASON KRKA, tablett, 20TK	Ideal Trade Links UAB	100	Z94-Z94, T86- T86					
					75	L12-L12, L23- L23, L13.0- L13.0, L10-L10, L20-L20	Dermatovenerol oog, Allergoloog- immunoloog, Pediaater				
					100	E89.6-E89.6, E27-E27, E89.3- E89.3, E23-E23, E25-E25	Pediaater, Endokrinoloog	esmane			
					100	C00-D48					
					50						
1008414	deksametasoon, 4mg 1ml	H02AB0 2	DEXAMETHASON KRKA, süstelahus, 1ml 25TK	KRKA d.d. Novo mesto	100	C00-D48					
					50						
1808704	deksametasoon, 8mg	H02AB0 2	NODEXON, tablett, 20TK	Norameda UAB	50						
					100	E89.6-E89.6, E27-E27, E89.3- E89.3, E23-E23, E25-E25	Endokrinoloog, Pediaater	esmane			
					75	L12-L12, L23- L23, L13.0- L13.0, L10-L10, L20-L20	Pediaater, Allergoloog- immunoloog, Dermatovenerol oog				
					100	T86-T86, C00- D48, Z94-Z94					
1044379	deksametasoon+kl ooramfenikool, 1mg+2mg 1g	S01CA8 2	OFTAN DEXA- CHLORA, silmasalv, 3.5g 1TK	Santen Oy	50						
1044368	deksametasoon+kl ooramfenikool, 1mg+2mg 1ml	S01CA8 2	OFTAN DEXA- CHLORA, silmatilgad, lahus, 10ml 1TK	Santen Oy	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1124301	deksametasoon+n eomütsiin+polümü ksiin B, 1mg+3500RÜ+60 00RÜ 1ml	S01CA8 0	MAXITROL, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK	Novartis Baltics SIA	50						
1150276	deksametasoon+t obramütsiin, 1mg+3mg 1g	S01CA8 1	TOBRADEX, silmasalv, 3.5g 1TK	Novartis Baltics SIA	50						
1124266	deksametasoon+t obramütsiin, 1mg+3mg 1ml	S01CA8 1	TOBRADEX, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK	Novartis Baltics SIA	50						
1834961	deksametasoon+t obramütsiin, 1mg+3mg 1ml	S01CA8 1	TOBRAMYCIN/DEXAM ETHASONE ELVIM, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK	SIA Elvim	50						
1772018	deltafolliitropiin, 36mcg 1.08ml	G03GA1 0	REKOVELLE, süstelahus pen-süstlis, 1.08ml 1TK	Ferring Pharmaceuticals A/S	100	N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks
					50						
1772029	deltafolliitropiin, 72mcg 2.16ml	G03GA1 0	REKOVELLE, süstelahus pen-süstlis, 2.16ml 1TK	Ferring Pharmaceuticals A/S	100	N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks
					50						
1481857	denosumab, 60mg 1ml	M05BX0 4	PROLIA, süstelahus süstlis, 1ml 1TK	Amgen Europe B.V.	75	M80-M80					patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna ja kellel esineb kaasvalt raske neerupuudulikkus või söögitoru akalaasia, striktuur, düskineesia või põletik (N17-19; K22.0; K22.2; K22.4; K20)
					50						
1653937	desloratadiin, 0,5mg 1ml	R06AX2 7	DES Loratadine SOPHARMA, suukaudne lahus, 120ml 1TK	Sopharma AD	50						
1550797	desloratadiin, 5mg	R06AX2 7	DASSELTA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	KRKA d.d. Novo mesto	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1554140	desloratadiin, 5mg	R06AX2 7	DESLORATADINE ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Actavis Group Ptc ehf.	50						
1064348	desmopressiin, 10mcg 1annus	H01BA0 2	MINIRIN, ninasprei, lahus, 2.5ml 1TK	Ferring GmbH	50						
					100	E23.2-E23.2	Endokrinoloog, Pediaater	esmane			
1225594	desmopressiin, 120mcg	H01BA0 2	MINIRIN, suukaudne lühofilisaat, 30TK	Ferring GmbH	100	E23.2-E23.2	Endokrinoloog, Pediaater	esmane			
					50						
3035832	desmopressiin, 120mcg	H01BA0 2	MITACLAU, keelealune tablett, 30TK	Noramedia UAB	50						
					100	E23.2-E23.2	Pediaater, Endokrinoloog	esmane			
1225561	desmopressiin, 60mcg	H01BA0 2	MINIRIN, suukaudne lühofilisaat, 30TK	Ferring GmbH	100	E23.2-E23.2	Pediaater, Endokrinoloog	esmane			
					50						
3035685	desmopressiin, 60mcg	H01BA0 2	MITACLAU, keelealune tablett, 30TK	Noramedia UAB	50						
					100	E23.2-E23.2	Pediaater, Endokrinoloog	esmane			
1063303	desogestreel, 75mcg	G03AC0 9	CERAZETTE, õhukese polümeerikattega tablett, 84TK	Organon N.V.	75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
					50						
1505450	desogestreel, 75mcg	G03AC0 9	DESIRETT 75 MCG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Exeltis Baltics UAB	75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
					50						
1656143	desogestreel, 75mcg	G03AC0 9	DELAMONIE, õhukese polümeerikattega tablett, 84TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
					50						
1861882	desogestreel, 75mcg	G03AC0 9	CERAZETTE, õhukese polümeerikattega tablett, 84TK	Ideal Trade Links UAB	50						
					75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
1062920	desogestreel+etün üülöstradiol, 0,15mg+0,02mg	G03AA0 9	NOVYNETTE, õhukese polümeerikattega tablett, 63TK	Gedeon Richter Plc.	50						
					75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1867574	desogestreel+etün öüülostradiool, 0,15mg+0,02mg	G03AA0 9	NOVYNETTE, õhukese polümeerikattega tablett, 63TK	Lex Ano UAB	50						
					75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
1880535	desogestreel+etün öüülostradiool, 0,15mg+0,02mg	G03AA0 9	NOVYNETTE, õhukese polümeerikattega tablett, 63TK	Ideal Trade Links UAB	75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
					50						
1062931	desogestreel+etün öüülostradiool, 0,15mg+0,03mg	G03AA0 9	REGULON, õhukese polümeerikattega tablett, 63TK	Gedeon Richter Plc.	75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
					50						
1208045	detemir-insuliin, 100ühik 1ml	A10AE0 5	LEVEMIR FLEXPEN, süstelahus pen-süstlis, 3ml 5TK	Novo Nordisk A/S	100	O24-O24, E13- E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1					
					50						
1007659	diasepaam, 10mg 2.5ml	N05BA0 1	DIAZEPAM DESITIN, rektaallahus, 2.5ml 5TK	Desitin Arzneimittel GmbH	50						
1007682	diasepaam, 5mg 2.5ml	N05BA0 1	DIAZEPAM DESITIN, rektaallahus, 2.5ml 5TK	Desitin Arzneimittel GmbH	50						
1385276	dienogest, 2mg	G03DB0 8	VISANNETTE, tablett, 28TK	Bayer AG	75	N80-N80	Günekoloog				
					50						
1587146	dienogest+etünöüü östradiool, 0+0/2mg+0,03mg	G03AA1 6	SIBILLA PLUS, õhukese polümeerikattega tablett, 7TK / 21TK	Gedeon Richter Plc.	75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
					50						
1066834	dienogest+etünöüü östradiool, 2mg+0,03mg	G03AA1 6	JEANINE, kaetud tablett, 21TK	Bayer AG	50						
					75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
1305818	dienogest+etünöüü östradiool, 2mg+0,03mg	G03AA1 6	AMMILY 2 MG / 0,03 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 21TK	Orivas UAB	50						
					75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
1070592	digoksiin, 0,25mg	C01AA0 5	DIGOXIN-GRINDEKS, tablett, 50TK	Grindeks AS	75	I50-I50					
					50						
1222209	digoksiin, 0,25mg	C01AA0 5	DIGOXIN ORIFARM 0,25 MG, tablett, 60TK	Orifarm Healthcare A/S	50						
					75	I50-I50					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1222197	digoksiin, 62,5mcg	C01AA05	DIGOXIN ORIFARM 62,5 MCG, tablett, 60TK	Orifarm Generics A/S	75	I50-I50					
					50						
1361786	dihüdrokodeiin, 60mg	N02AA08	DHC CONTINUS, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 10TK	Ennogen Healthcare (Europe) Limited	50						
1016109	diklofenak, 100mg	M01AB05	DICLOBERL RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 50TK	Berlin-Chemie AG	100	C00-D48					
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					50						
					75	M15-M19			63,00		
1017133	diklofenak, 100mg	M01AB05	DICLOFENAC- RATIOPHARM 100 MG, rektaalsuposiit, 10TK	Ratiopharm GmbH	100	C00-D48					
					75	M15-M19			63,00		
					50						
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
1032589	diklofenak, 100mg	M01AB05	DICLOMELAN RETARD 100 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	G.L. Pharma GmbH	75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					75	M15-M19			63,00		
					100	C00-D48					
					50						
1039632	diklofenak, 100mg	M01AB05	OLFEN DEPOCAPS, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 20TK	Teva B.V.	100	C00-D48					
					75	M15-M19			63,00		
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					50						
1078163	diklofenak, 100mg	M01AB05	DICLAC 100 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 50TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					50						
					75	M15-M19			63,00		
					100	C00-D48					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1071920	diklofenak, 150mg	M01AB05	DICLAC ID 150 MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 20TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					100	C00-D48					
					75	M15-M19			63,00		
					50						
1071942	diklofenak, 150mg	M01AB05	DICLAC ID 150 MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 100TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					75	M15-M19			63,00		
					100	C00-D48					
1072280	diklofenak, 150mg	M01AB05	DICLOFENAC-RATIOPHARM UNO, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 50TK	Ratiopharm GmbH	50						
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					100	C00-D48					
					75	M15-M19			63,00		
1032590	diklofenak, 50mg	M01AB05	DICLOMELAN 50 MG, gastroresistentne tablett, 10TK	G.L. Pharma GmbH	50						
					75	M15-M19			63,00		
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					100	C00-D48					
1072213	diklofenak, 50mg	M01AB05	DICLOFENAC-RATIOPHARM 50MG, gastroresistentne tablett, 50TK	Ratiopharm GmbH	100	C00-D48					
					50						
					75	M15-M19			63,00		
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
1012048	diklofenak, 75mg	M01AB05	OLFEN DEPOTABS, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Teva B.V.	50						
					75	M15-M19			63,00		
					100	C00-D48					
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1071986	diklofenak, 75mg	M01AB05	DICLAC ID 75 MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 100TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	M15-M19			63,00		
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					100	C00-D48					
					50						
1031634	diltiaseem, 180mg	C08DB01	DILTIAZEM LANNACHER, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	G.L. Pharma GmbH	75	I47-I49	Pediaater, Kardioloog	esmane			
					50						
					100	I27.0-I27.0					
1031645	diltiaseem, 90mg	C08DB01	DILTIAZEM LANNACHER, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 20TK	G.L. Pharma GmbH	50						
					100	I27.0-I27.0					
					75	I47-I49	Pediaater, Kardioloog	esmane			
1638693	dimetüülfumaraat, 120mg	L04AX07	TECFIDERA, gastroresistentne kõvakapsel, 14TK	Biogen Netherlands B.V.	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel ägenemiste ja remissioonidega kulgeva hulgiskleroosi raviks
1865954	dimetüülfumaraat, 120mg	L04AX07	DIMETHYL FUMARATE STADA, gastroresistentne kõvakapsel, 14TK	Stada Arzneimittel AG	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel ägenemistega kulgeva hulgiskleroosi raviks
1638705	dimetüülfumaraat, 240mg	L04AX07	TECFIDERA, gastroresistentne kõvakapsel, 56TK	Biogen Netherlands B.V.	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel ägenemiste ja remissioonidega kulgeva hulgiskleroosi raviks
1866067	dimetüülfumaraat, 240mg	L04AX07	DIMETHYL FUMARATE STADA, gastroresistentne kõvakapsel, 56TK	Stada Arzneimittel AG	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel ägenemistega kulgeva hulgiskleroosi raviks
1866607	diroksimeelfumaraat, 231mg	L04AX09	VUMERITY, gastroresistentne kõvakapsel, 120TK	Biogen Netherlands B.V.	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel ägenemiste ja remissioonidega kulgeva hulgiskleroosi raviks
1028214	doksasosiin, 2mg	C02CA04	CARDURA, tablett, 30TK	Upjohn EESV	50						
1071391	doksasosiin, 2mg	C02CA04	KAMIREN, tablett, 30TK	KRKA d.d. Novo mesto	50						



Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3027248	doksasosiin, 2mg	C02CA04	CARDURA, tablett, 30TK	Ideal Trade Links UAB	50						
1028225	doksasosiin, 4mg	C02CA04	CARDURA, tablett, 30TK	Upjohn EESV	50						
1071379	doksasosiin, 4mg	C02CA04	KAMIREN, tablett, 30TK	KRKA d.d. Novo mesto	50						
1129799	doksasosiin, 4mg	C02CA04	CARDURA XL 4MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Upjohn EESV	50						
1205895	doksasosiin, 4mg	C02CA04	DOXALFA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK	Stada Arzneimittel AG	50						
3027260	doksasosiin, 4mg	C02CA04	CARDURA, tablett, 30TK	Ideal Trade Links UAB	50						
3028744	doksasosiin, 4mg	C02CA04	CARDURA XL 4MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK	Ideal Trade Links UAB	50						
1018303	doksütsükliin, 100mg	J01AA02	DOXYCYCLIN STADA, tablett, 10TK	Stada Arzneimittel AG	50						
					100	A50-A53	Dermatovenerol oog				
1065877	doksütsükliin, 100mg	J01AA02	DOXYCYCLINE VITABALANS, tablett, 10TK	Vitabalans Oy	50						
					100	A50-A53	Dermatovenerol oog				
1065899	doksütsükliin, 100mg	J01AA02	DOXYLAN, tablett, 10TK	G.L. Pharma GmbH	100	A50-A53	Dermatovenerol oog				
					50						
1144976	doksütsükliin, 100mg	J01AA02	DOXY-M-RATIOPHARM 100 MG, tablett, 10TK	Ratiopharm GmbH	50						
					100	A50-A53	Dermatovenerol oog				
1240366	domperidoon, 10mg	A03FA03	DOMPERIDON ACTAVIS, tablett, 30TK	Teva B.V.	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1292206	donepesiil, 10mg	N06DA02	DONEPEZIL ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Teva B.V.	50						
1391217	donepesiil, 10mg	N06DA02	DONEPEZIL ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	50						
1873560	donepesiil, 10mg	N06DA02	DONEPEZIL ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	First Pharma OÜ	50						
1292105	donepesiil, 5mg	N06DA02	DONEPEZIL ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Teva B.V.	50						
1391116	donepesiil, 5mg	N06DA02	DONEPEZIL ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	50						
1014961	dorsolamiid, 2%	S01EC03	TRUSOPT, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK	Santen Oy	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
1420108	dorsolamiid, 20mg 1ml	S01EC03	DORZOLAMIDE ELVIM, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK	SIA Elvim	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
1755480	dorsolamiid, 20mg 1ml	S01EC03	VIZIDOR, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK	Bausch + Lomb Ireland Limited	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
1454093	dronedaroon, 400mg	C01BD07	MULTAQ, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Sanofi Winthrop Industrie	50		Kardioloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus kardioloogil siinusrütmi säilitamiseks kodade virvendusarütmia puhul pärast kardioversiooni, kui teised antiarütmikumid on ebasobivad (IC klassi antiarütmikumid ja sotalool on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks ning amiodaroon on vastunäidustatud) ning patsiendil ei esine südamepuudulikkust ega vasaku vatsakese düsfunktsiooni

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1316090	drospirenoon+etün üülöstradiol, 0+0/3mg+0,02mg	G03AA1 2	YAZ, õhukese polümeerikattega tablett, 4TK / 24TK	Bayer AG	50						
1331378	drospirenoon+etün üülöstradiol, 0+0/3mg+0,02mg	G03AA1 2	MARIONELLE, õhukese polümeerikattega tablett, 7TK / 21TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
					50						
1453766	drospirenoon+etün üülöstradiol, 0+0/3mg+0,02mg	G03AA1 2	DAYLETTE, õhukese polümeerikattega tablett, 4TK / 24TK	Gedeon Richter Plc.	50						
					75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
1220487	drospirenoon+etün üülöstradiol, 3mg+0,02mg	G03AA1 2	YASMINELLE, õhukese polümeerikattega tablett, 21TK	Bayer AG	50						
1330759	drospirenoon+etün üülöstradiol, 3mg+0,02mg	G03AA1 2	MADELEINE, õhukese polümeerikattega tablett, 21TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
					50						
1331019	drospirenoon+etün üülöstradiol, 3mg+0,02mg	G03AA1 2	JANGEE 0,02 MG/3 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 21TK	Exeltis Baltics UAB	75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
					50						
1043536	drospirenoon+etün üülöstradiol, 3mg+0,03mg	G03AA1 2	YARINA, õhukese polümeerikattega tablett, 21TK	Bayer AG	75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
					50						
1331053	drospirenoon+etün üülöstradiol, 3mg+0,03mg	G03AA1 2	JANGEE 0,03 MG/3 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 21TK	Exeltis Baltics UAB	75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
					50						
1165711	drospirenoon+östr adiol, 2mg+1mg	G03FA1 7	ANGELIQ, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Bayer AG	50						
1670745	dulaglutiid, 1,5mg 0.5ml	A10BJ05	TRULICITY, süstelahus pen-süstlis, 0.5ml 4TK	Eli Lilly Nederland B.V.	50	E14-E14, E11- E11					II tüüpi diabeedi raviks juhul, kui ravi suukaudsete diabeediravimitega ei ole efektiivne või on vastunäidustatud
					75	E14-E14, E11- E11					II tüüpi diabeedi raviks rasvumusega patsientidel (KMI>=35kg/m2), kellel suukaudsed diabeediravidid (metformiin, sulfonüüluurea preparaat, PPAR agonist, DPP-4 inhibiitor) maksimaalsetes talutavates annustes ei ole andnud rahuldavat efekti või on vastunäidustatud

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1195624	duloksetiin, 30mg	N06AX2 1	CYMBALTA, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK	Eli Lilly Nederland B.V.	75	G43-G43					
					50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
1660643	duloksetiin, 30mg	N06AX2 1	DULSEVIA, gastroresistentne kõvakapsel, 30TK	KRKA, d.d., Novo mesto	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
					75	G43-G43					
1661701	duloksetiin, 30mg	N06AX2 1	DULOXGAMMA, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK	Woerwag Pharma GmbH & Co. KG	75	G43-G43					
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1670419	duloksetiin, 30mg	N06AX2 1	ONELAR, gastroresistentne kõvakapsel, 30TK	Medochemie Limited	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
					75	G43-G43					
1694921	duloksetiin, 30mg	N06AX2 1	DULOXETINE ZENTIVA, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK	Zentiva k.s.	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
					75	G43-G43					
1195635	duloksetiin, 60mg	N06AX2 1	CYMBALTA, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK	Eli Lilly Nederland B.V.	75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					50						
					75	G43-G43					
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1660733	duloksetiin, 60mg	N06AX2 1	DULSEVIA, gastroresistentne kõvakapsel, 30TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					75	G43-G43					
1661745	duloksetiin, 60mg	N06AX2 1	DULOXGAMMA, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK	Woerwag Pharma GmbH & Co. KG	75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					75	G43-G43					
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1670510	duloksetiin, 60mg	N06AX2 1	ONELAR, gastroresistentne kõvakapsel, 30TK	Medochemie Limited	75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					75	G43-G43					
1694954	duloksetiin, 60mg	N06AX2 1	DULOXETINE ZENTIVA, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK	Zentiva k.s.	75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					75	G43-G43					
					50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1796182	dupilumab, 200mg 1.14ml	D11AH0 5	DUPIXENT, süstelahus süstlis, 1.14ml 2TK	Sanofi Winthrop Industrie	100	L20.8-L20.9	Pediaater, Dermatovenerol oog, Allergoloog- immunoloog				mõõduka või raske haigusega (EASI $\geq$ 16, DLQI $\geq$ 10) patsiendile, kes ei allu süsteemsele konventsionaalsele ravile tsüklosporiiniga 8–12 nädala jooksul või kellele see on vastunäidustatud või põhjustanud talumatuid kõrvaltoimeid
					100	J45-J45	Allergoloog- immunoloog, Pulmonoloog				vähemalt kolmest pulmonoloogist või allergoloog- immunoloogist koosneva eksperdikomisjoni otsusel 2. tüüpi põletikust juhitud astmaga patsiendile, kelle astma on vaatamata eelnevale pikaajalisele kolmikravile (inhaleeritav glükokortikosteroid ja pikatoimeline beeta-2-agonist koos antileukotrieeni või pikatoimelise teofülliinpreparaadi või pikatoimelise antikoliinergilise ainega) puudulikult kontrollitud. Kui 3 kuu möödumisel ravi alustamisest ei ole ekspertkomisjoni hinnangul astma ravi tulemused kliiniliselt oluliselt paranenud, lõpetatakse ravi selle preparaadiga
					100	J32-J33	Otorinolarüngolo og, Allergoloog- immunoloog				vähemalt kolmeliikmelise kõrva-nina-kurguarstidest koosneva eksperdikomisjoni otsuse alusel patsiendile, kellel on raske krooniline rinosinusiit ning ninapolüpooside raviks on viimase 2 aasta jooksul teostatud vähemalt 2 endoskoopilist siinuse operatsiooni või üle kolme endoskoopilise siinuse operatsiooni elu jooksul. Kui 16 nädala möödudes ravi alustamisest ei ole patsiendi NPS skoor vähenenud vähemalt ühe ühiku võrra, siis ravi katkestatakse

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1796227	dupilumab, 200mg 1.14ml	D11AH0 5	DUPIXENT, süstelahus pen-süstlis, 1.14ml 2TK	Sanofi Winthrop Industrie	100	L20.8-L20.9	Pediaater, Dermatovenerol oog, Allergoloog- immunoloog				mõõduka või raske haigusega (EASI $\geq$ 16, DLQI $\geq$ 10) patsiendile, kes ei allu süsteemsele konventsionaalsele ravile tsüklosporiiniga 8–12 nädala jooksul või kellele see on vastunäidustatud või põhjustanud talumatuid kõrvaltoimeid
					100	J45-J45	Allergoloog- immunoloog, Pulmonoloog				vähemalt kolmest pulmonoloogist või allergoloog- immunoloogist koosneva eksperdikomisjoni otsusel 2. tüüpi põletikust juhitud astmaga patsiendile, kelle astma on vaatamata eelnevale pikaajalisele kolmikravile (inhaleeritav glükokortikosteroid ja pikatoimeline beeta-2-agonist koos antileukotrieeni või pikatoimelise teofülliinpreparaadi või pikatoimelise antikoliinergilise ainega) puudulikult kontrollitud. Kui 3 kuu möödumisel ravi alustamisest ei ole ekspertkomisjoni hinnangul astma ravi tulemused kliiniliselt oluliselt paranenud, lõpetatakse ravi selle preparaadiga
					100	J32-J33	Otorinolarüngolo og, Allergoloog- immunoloog				vähemalt kolmeliikmelise kõrva-nina-kurguarstidest koosneva eksperdikomisjoni otsuse alusel patsiendile, kellel on raske krooniline rinosinusiit ning ninapolüpooside raviks on viimase 2 aasta jooksul teostatud vähemalt 2 endoskoopilist siinuse operatsiooni või üle kolme endoskoopilise siinuse operatsiooni elu jooksul. Kui 16 nädala möödudes ravi alustamisest ei ole patsiendi NPS skoor vähenenud vähemalt ühe ühiku võrra, siis ravi katkestatakse

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1753938	dupilumab, 300mg 2ml	D11AH0 5	DUPIXENT, süstelahus süstlis, 2ml 2TK	Sanofi Winthrop Industrie	100	J45-J45	Pulmonoloog, Allergoloog- immunoloog				vähemalt kolmest pulmonoloogist või allergoloog- immunoloogist koosneva eksperdikomisjoni otsusel 2. tüüpi põletikust juhitud astmaga patsiendile, kelle astma on vaatamata eelnevale pikaajalisele kolmikravile (inhaleeritav glükokortikosteroid ja pikatoimeline beeta-2- agonist koos antileukotrieeni või pikatoimelise teofülliinpreparaadi või pikatoimelise antikoliinergilise ainega) puudulikult kontrollitud. Kui 3 kuu möödumisel ravi alustamisest ei ole ekspertkomisjoni hinnangul astma ravi tulemused kliiniliselt oluliselt paranenud, lõpetatakse ravi selle preparaadiga
					100	L20.8-L20.9	Dermatovenerol oog, Allergoloog- immunoloog, Pediaater				mööduka või raske haigusega (EASI≥16, DLQI≥10) patsiendile, kes ei allu süsteemsele konventsionaalsele ravile tsüklosporiiniga 8–12 nädala jooksul või kellele see on vastunäidustatud või põhjustanud talumatuid kõrvaltoimeid
					100	J32-J33	Allergoloog- immunoloog, Otorinolarüngolo og				vähemalt kolmeliikmelise kõrva-nina-kurguarstidest koosneva eksperdikomisjoni otsuse alusel patsiendile, kellel on raske krooniline rinosinusiit ning ninapolüpooside raviks on viimase 2 aasta jooksul teostatud vähemalt 2 endoskoopilist siinuse operatsiooni või üle kolme endoskoopilise siinuse operatsiooni elu jooksul. Kui 16 nädala möödudes ravi alustamisest ei ole patsiendi NPS skoor vähenenud vähemalt ühe ühiku võrra, siis ravi katkestatakse



Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1818479	dupilumab, 300mg 2ml	D11AH0 5	DUPIXENT, süstelahus pen-süstlis, 2ml 2TK	Sanofi Winthrop Industrie	100	J45-J45	Pulmonoloog, Allergoloog- immunoloog				vähemalt kolmest pulmonoloogist või allergoloog- immunoloogist koosneva eksperdikomisjoni otsusel 2. tüüpi põletikust juhitud astmaga patsiendile, kelle astma on vaatamata eelnevale pikaajalisele kolmikravile (inhaleeritav glükokortikosteroid ja pikatoimeline beeta-2- agonist koos antileukotrieeni või pikatoimelise teofülliinpreparaadi või pikatoimelise antikoliinergilise ainega) puudulikult kontrollitud. Kui 3 kuu möödumisel ravi alustamisest ei ole ekspertkomisjoni hinnangul astma ravi tulemused kliiniliselt oluliselt paranenud, lõpetatakse ravi selle preparaadiga
					100	L20.8-L20.9	Allergoloog- immunoloog, Dermatovenerol oog, Pediaater				mõõduka või raske haigusega (EASI $\geq$ 16, DLQI $\geq$ 10) patsiendile, kes ei allu süsteemsele konventsionaalsele ravile tsüklosporiiniga 8–12 nädala jooksul või kellele see on vastunäidustatud või põhjustanud talumatuid kõrvaltoimeid
					100	J32-J33	Otorinolarüngolo og, Allergoloog- immunoloog				vähemalt kolmeliikmelise kõrva-nina-kurguarstidest koosneva eksperdikomisjoni otsuse alusel patsiendile, kellel on raske krooniline rinosinusiit ning ninapolüpooside raviks on viimase 2 aasta jooksul teostatud vähemalt 2 endoskoopilist siinuse operatsiooni või üle kolme endoskoopilise siinuse operatsiooni elu jooksul. Kui 16 nädala möödudes ravi alustamisest ei ole patsiendi NPS skoor vähenenud vähemalt ühe ühiku võrra, siis ravi katkestatakse
1155440	dutasteriid, 0,5mg	G04CB0 2	AVODART, pehmekapsel, 30TK	GlaxoSmithKline Trading Services Limited	50						
1539929	dutasteriid, 0,5mg	G04CB0 2	DUTASTERIDE TEVA, pehmekapsel, 30TK	Teva Pharma B.V.	50						
1707241	dutasteriid, 0,5mg	G04CB0 2	DUTRYS, pehmekapsel, 30TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
1787137	dutasteriid, 0,5mg	G04CB0 2	DUTASTERIDE ELVIM, pehmekapsel, 30TK	SIA Elvim	50						
1886339	dutasteriid, 0,5mg	G04CB0 2	AVODART, pehmekapsel, 30TK	First Pharma OÜ	50						
3017562	dutasteriid, 0,5mg	G04CB0 2	AVODART, pehmekapsel, 30TK	Ideal Trade Links UAB	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1054752	düdrogesteroon, 10mg	G03DB0 1	DUPHASTON, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	Viatis SIA	100	E89.4-E89.4, E28.3-E28.3, E23.0-E23.0, Q96-Q97	Endokrinoloog, Günekoloog, Pediaater – endokrinoloog	esmane		50,00	haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient on alla 50. eluaasta vana
					50						
1013803	düdrogesteroon+ö stradiool, 0+1mg/10mg+1mg	G03FB0 8	FEMOSTON, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK / 14TK	Viatis SIA	50						
					100	E89.4-E89.4, E28.3-E28.3, E23.0-E23.0, Q96-Q97	Pediaater – endokrinoloog, Endokrinoloog, Günekoloog	esmane		50,00	haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient on alla 50. eluaasta vana
1375332	düdrogesteroon+ö stradiool, 2,5mg+0,5mg	G03FA1 4	FEMOSTON CONTI 0,5 MG/2,5 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	VIATRIS HEALTHCARE Limited	50						
					100	E89.4-E89.4, E28.3-E28.3, E23.0-E23.0, Q96-Q97	Pediaater – endokrinoloog, Günekoloog, Endokrinoloog	esmane		50,00	haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient on alla 50. eluaasta vana
1082528	düdrogesteroon+ö stradiool, 5mg+1mg	G03FA1 4	FEMOSTON CONTI, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Viatis SIA	100	E89.4-E89.4, E28.3-E28.3, E23.0-E23.0, Q96-Q97	Endokrinoloog, Pediaater – endokrinoloog, Günekoloog	esmane		50,00	haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient on alla 50. eluaasta vana
					50						
1077937	ebastiin, 20mg	R06AX2 2	KESTINE, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Almirall S.A.	50						
1691546	edoksabaan, 30mg	B01AF0 3	LIXIANA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Daiichi Sankyo Europe GmbH	75	I48-I48					
					50						
					100	I80-I82, I26-I26, I67.6-I67.6					kaasuva pahaloolumulise kasvaja esinemisel
1691658	edoksabaan, 60mg	B01AF0 3	LIXIANA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Daiichi Sankyo Europe GmbH	50						
					100	I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6					kaasuva pahaloolumulise kasvaja esinemisel
					75	I48-I48					
1020373	ekonasool, 150mg	G01AF0 5	GYNO-PEVARYL, vaginaalsuposiit, 3TK	Karo Pharma AB	50						
1039036	ekonasool, 50mg	G01AF0 5	GYNO-PEVARYL, vaginaalsuposiit, 15TK	Karo Pharma AB	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1011148	eksemestaar, 25mg	L02BG0 6	AROMASIN, kaetud tablett, 30TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	C50-C50	Günekoloog, Üldkirurg, Onkoloog				günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks
					50						
1392780	eksemestaar, 25mg	L02BG0 6	ESCEPRAN, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	KRKA d.d. Novo mesto	50						
					100	C50-C50	Onkoloog, Üldkirurg, Günekoloog				günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks
1392960	eksemestaar, 25mg	L02BG0 6	EXEMESTANE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare B.V.	100	C50-C50	Onkoloog, Üldkirurg, Günekoloog				günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks
					50						
1423134	eksemestaar, 25mg	L02BG0 6	EXEMESTANE ZENTIVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Zentiva k.s.	50						
					100	C50-C50	Onkoloog, Günekoloog, Üldkirurg				günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks
1453632	eksemestaar, 25mg	L02BG0 6	EXEMESTANE SANOSWISS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Sanoswiss UAB	100	C50-C50	Günekoloog, Üldkirurg, Onkoloog				günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks
					50						
1725870	elbasviir+grasopre viir, 50mg+100mg	J05AP54	ZEPATIER, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Merck Sharp & Dohme B.V.	100	B18.2-B18.2	Infektsionist, Gastroenteroloog				1. ja 4. genotüübi kroonilise progresseeruva Cviirushepatiidi raviks
1462003	eltrombopaag, 25mg	B02BX0 5	REVOLADE, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Novartis Europharm Limited	100	D69.4-D69.4					patsientidele, kelle ravi alustamine on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele - muu suukaudne ravi (kortikosteroidi, immuunsupressandiga) on osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud, splenektoomia on osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud (sh splenektoomia ettevalmistamiseks, kui intravenoosne immuunglobuliin ei ole piisavalt tõhus) ning esineb trombotsütopeenia <20 000/µl

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1765795	emitsizumab, 105mg 0.7ml	B02BX0 6	HEMLIBRA, süstelahus, 0.7ml 1TK	Roche Registration GmbH	100	D66-D66	Pediaater, Pediaater – hematoloog- onkoloog, Hematoloog				verejooksu episoodide ennetamiseks raske ja mõõduka A-hemofiiliaga patsientide (VIII faktori tase <5% normiväärtusest) järgnevatele rühmadele, kui neil eelneva parima võimaliku profülaktilise raviga ei ole saavutatud piisavalt head kontrolli veritsuste osas (ABR>=3): lapsed ja alla 19-aastased noorukid kellel on raskendatud veenisiseste süstete teostamine ja probleemse veeniteega täiskasvanud (kellel veenisisene ravi on võimalik vaid meditsiinipersonali poolt teostatult)
					100	D66-D66	Pediaater, Pediaater – hematoloog- onkoloog, Hematoloog				hüübimisfaktori inhibiitorite esinemise korral
1765807	emitsizumab, 150mg 1ml	B02BX0 6	HEMLIBRA, süstelahus, 1ml 1TK	Roche Registration GmbH	100	D66-D66	Hematoloog, Pediaater – hematoloog- onkoloog, Pediaater				verejooksu episoodide ennetamiseks raske ja mõõduka A-hemofiiliaga patsientide (VIII faktori tase <5% normiväärtusest) järgnevatele rühmadele, kui neil eelneva parima võimaliku profülaktilise raviga ei ole saavutatud piisavalt head kontrolli veritsuste osas (ABR>=3): lapsed ja alla 19-aastased noorukid kellel on raskendatud veenisiseste süstete teostamine ja probleemse veeniteega täiskasvanud (kellel veenisisene ravi on võimalik vaid meditsiinipersonali poolt teostatult)
					100	D66-D66	Pediaater, Hematoloog, Pediaater – hematoloog- onkoloog				hüübimisfaktori inhibiitorite esinemise korral
1765773	emitsizumab, 30mg 1ml	B02BX0 6	HEMLIBRA, süstelahus, 1ml 1TK	Roche Registration GmbH	100	D66-D66	Pediaater – hematoloog- onkoloog, Hematoloog, Pediaater				verejooksu episoodide ennetamiseks raske ja mõõduka A-hemofiiliaga patsientide (VIII faktori tase <5% normiväärtusest) järgnevatele rühmadele, kui neil eelneva parima võimaliku profülaktilise raviga ei ole saavutatud piisavalt head kontrolli veritsuste osas (ABR>=3): lapsed ja alla 19-aastased noorukid kellel on raskendatud veenisiseste süstete teostamine ja probleemse veeniteega täiskasvanud (kellel veenisisene ravi on võimalik vaid meditsiinipersonali poolt teostatult)

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1765784	emitsizumab, 60mg 0.4ml	B02BX0 6	HEMLIBRA, süstelahus, 0.4ml 1TK	Roche Registration GmbH	100	D66-D66	Pediaater, Hematoloog, Pediaater – hematoloog- onkoloog				hüübimisfaktori inhibiitorite esinemise korral
					100	D66-D66	Pediaater, Hematoloog, Pediaater – hematoloog- onkoloog				verejooksu episoodide ennetamiseks raske ja mõõduka A-hemofiiliaga patsientide (VIII faktori tase <5% normiväärtusest) järgnevatele rühmadele, kui neil eelneva parima võimaliku profülaktilise raviga ei ole saavutatud piisavalt head kontrolli veritsuste osas (ABR>=3): lapsed ja alla 19-aastased noorukid kellel on raskendatud veenisiseste süstete teostamine ja probleemse veeniteega täiskasvanud (kellel veenisisene ravi on võimalik vaid meditsiinipersonali poolt teostatult)
1649000	empaglifloosiin, 10mg	A10BK0 3	JARDIANCE, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	75	I50-I50					patsiendile, kes kuulub NYHA II-IV funktsionaalklassi, kellel ravikoostöö on hea ning kellel AKE-inhibiitor või ARB ja beetablokaatori kaksikraviga südamepuudulikkuse sümptomid endiselt püsivad või süvenevad
					75	E14-E14, E11- E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea on meditsiiniliselt vastunäidustatud
					50						
1649134	empaglifloosiin, 25mg	A10BK0 3	JARDIANCE, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	75	I50-I50					kroonilise südamepuudulikkuse korral patsiendile, kellel esineb kaasuvana II tüüpi diabeet (E11;E14), kes kuulub NYHA II-IV funktsionaalklassi, kellel ravikoostöö on hea ning kellel AKE-inhibiitor või ARB ja beetablokaatori kaksikraviga südamepuudulikkuse sümptomid endiselt püsivad või süvenevad
					50						
					75	E14-E14, E11- E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea on meditsiiniliselt vastunäidustatud
1010620	enalapriil, 10mg	C09AA0 2	ENAHEXAL 10 MG, tablett, 30TK	Hexal AG	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1013599	enalapriil, 10mg	C09AA02	BERLIPRIL 10 MG, tablett, 30TK	Berlin-Chemie AG	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1133929	enalapriil, 10mg	C09AA02	ENAP, tablett, 60TK	KRKA, d.d., Novo mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1359974	enalapriil, 10mg	C09AA02	ENALAPRIL VITABALANS, tablett, 30TK	Vitabalans Oy	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1360011	enalapriil, 10mg	C09AA02	ENALAPRIL VITABALANS, tablett, 100TK	Vitabalans Oy	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
3022085	enalapriil, 10mg	C09AA02	ENAP, tablett, 60TK	Ideal Trade Links UAB	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1010631	enalapriil, 20mg	C09AA02	ENAHEXAL 20 MG, tablett, 30TK	Hexal AG	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1013601	enalapriil, 20mg	C09AA02	BERLIPRIL 20 MG, tablett, 30TK	Berlin-Chemie AG	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1133952	enalapriil, 20mg	C09AA02	ENAP, tablett, 60TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1360033	enalapriil, 20mg	C09AA02	ENALAPRIL VITABALANS, tablett, 30TK	Vitabalans Oy	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1360077	enalapriil, 20mg	C09AA02	ENALAPRIL VITABALANS, tablett, 100TK	Vitabalans Oy	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
3022119	enalapriil, 20mg	C09AA02	ENAP, tablett, 60TK	Ideal Trade Links UAB	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1074080	enalapriil, 5mg	C09AA0 2	BERLIPRIL 5 MG, tablett, 50TK	Berlin-Chemie AG	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1133895	enalapriil, 5mg	C09AA0 2	ENAP, tablett, 60TK	KRKA, d.d., Novo mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1359918	enalapriil, 5mg	C09AA0 2	ENALAPRIL VITABALANS, tablett, 30TK	Vitabalans Oy	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1359952	enalapriil, 5mg	C09AA0 2	ENALAPRIL VITABALANS, tablett, 100TK	Vitabalans Oy	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
3022041	enalapriil, 5mg	C09AA0 2	ENAP, tablett, 60TK	Ideal Trade Links UAB	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1147564	enalapriil+hüdroklo rotiasiid, 10mg+12,5mg	C09BA8 1	ENAP-HL, tablett, 30TK	KRKA d.d. Novo mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1147575	enalapriil+hüdroklo rotiasiid, 10mg+12,5mg	C09BA8 1	ENAP-HL, tablett, 60TK	KRKA d.d. Novo mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1147597	enalapriil+hüdroklo rotiasiid, 10mg+25mg	C09BA8 1	ENAP-H, tablett, 30TK	KRKA d.d. Novo mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1147609	enalapriil+hüdroklo rotiasiid, 10mg+25mg	C09BA8 1	ENAP-H, tablett, 60TK	KRKA d.d. Novo mesto	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1074888	enalapriil+hüdroklo rotiasiid, 20mg+12,5mg	C09BA8 1	CO-RENITEC, tablett, 28TK	Organon N.V.	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1129159	enalapriil+hüdroklo rotiasiid, 20mg+12,5mg	C09BA8 1	ENAHEXAL COMP 20 MG/12,5 MG, tablett, 30TK	Hexal AG	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1151389	enalapriil+hüdroklo rotiasiid, 20mg+12,5mg	C09BA8 1	ENAP-HL, tablett, 30TK	KRKA d.d. Novo mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1619175	ensalutamiid, 40mg	L02BB0 4	XTANDI, pehmekapsel, 112TK	Astellas Pharma Europe B.V.	100	C61-C61	Uroloog, Onkoloog				metastaatilise kastratsioonresistentse eesnäärmevähi raviks patsientidele, kes ei ole enne haiguse metastaseerumist saanud ravi teise põlvkonna androgeenireseptori inhibiitoriga, kes on asümptomaatilised või kergelt sümptomaatilised peale ebaõnnestunud androgeenide deprivatsioonravi, ning kellel kemoteraapia ei ole veel kliiniliselt näidustatud või heas üldseisundis (ECOG 0-1 või valusündroomist tingitud ECOG 2) patsientidele, kelle haigus on eelneva dotsetakseeli sisaldava kemoteraapia vältel või pärast seda progresseerunud. Ravimi kasutamisele ei või eelneda metastaatilise haiguse ravi apalutamiidi, ensalutamiidiga või abiraterooniga varasemas ravireas, kuid lubatud on ravimi vahetus talumatute kõrvaltoimete ilmnemisel. Soodustus kehtib patsientidele, kelle ravi ensalutamiidi sisaldava ravimpreparaadiga on välja kirjutatud enne 01.04.2023
1247509	entekaviir, 0,5mg	J05AF10	BARACLUDE, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG	100	B18.0-B18.1	Gastroenteroloog, Infektsionist				kroonilise progresseeruva kuluga B-viirushepatiidi raviks
1247510	entekaviir, 1mg	J05AF10	BARACLUDE, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG	100	B18.0-B18.1	Gastroenteroloog, Infektsionist				kroonilise progresseeruva kuluga B-viirushepatiidi raviks
1588844	epinefriin (adrenaliin), 150mcg 0.3ml	C01CA2 4	EPIPEN, süstelahus pen-süstlis, 2ml 1TK	VIATRIS HEALTHCARE Limited	100	T88.6-T88.6, T78.0-T78.0, T88.2-T88.2, T80.5-T80.6, T78.2-T78.3, L50.0-L50.0					
1588866	epinefriin (adrenaliin), 300mcg 0.3ml	C01CA2 4	EPIPEN, süstelahus pen-süstlis, 2ml 1TK	VIATRIS HEALTHCARE Limited	100	T88.6-T88.6, T78.0-T78.0, T88.2-T88.2, T80.5-T80.6, T78.2-T78.3, L50.0-L50.0					



Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
7017960	eritoitesegu,		Neocate Syneo, pulber, 400g N6	Nutrimedical OÜ	75	K52.2-K52.2, L27.2-L27.2, L50-L50, T78.1-T78.1, K22.8-K22.8, K90.4-K90.4, T78.2-T78.2, L20.8-L20.8, T78.0-T78.0				1,00	
7017667	eritoitesegu,		COMIDA PKU C Formula, pulber, 500g N1	Vitaflo International Ltd.	100	E70.0-E70.1					
					50						
7017656	eritoitesegu,		COMIDA PKU C Formula Orange, pulber, 500g N1	Vitaflo International Ltd.	50						
					100	E70.0-E70.1					
7004911	eritoitesegu,		Lipistart , suukaudse lahuse pulber, 400 g	Vitaflo	100	E71.3-E71.3					ravimi väljakirjutamise õigus pika ahelaga rasvhapete beetaoksüdatsiooni defektide korral
7004955	eritoitesegu,		MONOGEN, pulber, 400g	Nutricia Ltd	100	E71.3-E71.3					ravimi väljakirjutamise õigus pika ahelaga rasvhapete beeta-oksüdatsiooni defektide korral
1205435	erütropoetiin, 10000RÜ 0.6ml	B03XA01	NEORECORMON, süstelahus süstlis, 0.6ml 6TK	Roche Registration GmbH	50						
					100	D46-D46, D47.1-D47.1	Hematoloog				
					100	D63-D63, T86-T86	Pediaater, Nefroloog, Uroloog				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1422335	esetimiib, 10mg	C10AX09	EZOLETA, tablett, 28TK	KRKA, d.d., Novo mesto	100	N18-N18					alates III staadiumist kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	I11-I12					raske südame või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	I70.2-I70.2, Z45-Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95					
					75	E13-E14, E10-E11					kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust;
					50						
1681174	esetimiib, 10mg	C10AX09	EZETIMIBE ACCORD, tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	75	I70.2-I70.2, Z45-Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95					
					75	E13-E14, E10-E11					kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust;
					75	I11-I12					raske südame või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					50						
					100	N18-N18					alates III staadiumist kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1815926	ezetimiib, 10mg	C10AX09	EZETIMIBE ELVIM, tablett, 28TK	SIA Elvim	100	N18-N18					alates III staadiumist kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	I11-I12					raske südame või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	E13-E14, E10-E11					kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust;
					75	I70.2-I70.2, Z45-Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95					
					50						
1818323	ezetimiib, 10mg	C10AX09	EZOLETA, tablett, 30TK	First Pharma OÜ	100	N18-N18					alates III staadiumist kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					50						
					75	I11-I12					raske südame või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	I70.2-I70.2, Z45-Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95					
					75	E13-E14, E10-E11					kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust;

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1818356	esetimiib, 10mg	C10AX09	EZOLETA, tablett, 60TK	First Pharma OÜ	50						
					75	I11-I12					raske südamete või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	I70.2-I70.2, Z45-Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95					
					100	N18-N18					alates III staadiumist kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	E13-E14, E10-E11					kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust;
1861714	esetimiib, 10mg	C10AX09	EZOLETA, tablett, 30TK	Ideal Trade Links UAB	75	E13-E14, E10-E11					kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust;
					50						
					75	I11-I12					raske südamete või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	I70.2-I70.2, Z45-Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95					
					100	N18-N18					alates III staadiumist kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1861747	esetimiib, 10mg	C10AX09	EZOLETA, tablett, 60TK	Ideal Trade Links UAB	50						
					75	I11-I12					raske südamete või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	E13-E14, E10-E11					kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust;
					100	N18-N18					alates III staadiumist kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	I70.2-I70.2, Z45-Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95					
1862704	esetimiib, 10mg	C10AX09	EZOLETA, tablett, 30TK	Lex Ano UAB	75	I70.2-I70.2, Z45-Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95					
					75	I11-I12					raske südamete või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	E13-E14, E10-E11					kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust;
					50						
					100	N18-N18					alates III staadiumist kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1087949	esomeprasool, 20mg	A02BC0 5	NEXIUM, gastroresistentne tablett, 14TK	Grunenthal GmbH	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1087950	esomeprasool, 20mg	A02BC0 5	NEXIUM, gastroresistentne tablett, 28TK	Grunenthal GmbH	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1337891	esomeprasool, 20mg	A02BC0 5	NEXMEZOL 20 MG, gastroresistentne tablett, 28TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1337914	esomeprasool, 20mg	A02BC0 5	NEXMEZOL 20 MG, gastroresistentne tablett, 56TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1395985	esomeprasool, 20mg	A02BC0 5	ESCADRA, gastroresistentne kõvakapsel, 14TK	KRKA, d.d., Novo mesto	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
1396009	esomeprasool, 20mg	A02BC0 5	ESCADRA, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1396032	esomeprasool, 20mg	A02BC0 5	ESCADRA, gastroresistentne kõvakapsel, 56TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1542338	esomeprasool, 20mg	A02BC0 5	ESOMEPRAZOLE ACTAVIS, gastroresistentne tablett, 28TK	Teva B.V.	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
1830574	esomeprasool, 20mg	A02BC0 5	NEXIUM, gastroresistentne tablett, 28TK	Lex Ano UAB	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1892268	esomeprasool, 20mg	A02BC0 5	NEXIUM, gastroresistentne tablett, 28TK	Ideal Trade Links UAB	75	K25-K27					H. pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi raviks koos antibiootikumidega
					50						
1087972	esomeprasool, 40mg	A02BC0 5	NEXIUM, gastroresistentne tablett, 14TK	Grunenthal GmbH	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1087983	esomeprasool, 40mg	A02BC0 5	NEXIUM, gastroresistentne tablett, 28TK	Grunenthal GmbH	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
1337981	esomeprasool, 40mg	A02BC0 5	NEXMEZOL 40 MG, gastroresistentne tablett, 14TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
1338005	esomeprasool, 40mg	A02BC0 5	NEXMEZOL 40 MG, gastroresistentne tablett, 28TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
1338027	esomeprasool, 40mg	A02BC0 5	NEXMEZOL 40 MG, gastroresistentne tablett, 56TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
1396111	esomeprasool, 40mg	A02BC0 5	ESCADRA, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK	KRKA, d.d., Novo mesto	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
1542462	esomeprasool, 40mg	A02BC0 5	ESOMEPRAZOLE ACTAVIS, gastroresistentne tablett, 28TK	Teva B.V.	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1885215	esomeprasool, 40mg	A02BC0 5	NEXIUM, gastroresistentne tablett, 28TK	Lex Ano UAB	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
1888049	esomeprasool, 40mg	A02BC0 5	ESCADRA, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK	Lex Ano UAB	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
1892303	esomeprasool, 40mg	A02BC0 5	NEXIUM, gastroresistentne tablett, 28TK	Ideal Trade Links UAB	75	K25-K27					H. pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi raviks koos antibiootikumidega
					50						
1325023	estsitalopraam, 10mg	N06AB1 0	ESCITALOPRAM ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Teva B.V.	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1331648	estsitalopraam, 10mg	N06AB1 0	ESCITALOPRAM TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Teva Pharma B.V.	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
1400218	estsitalopraam, 10mg	N06AB1 0	ELICEA 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA, d.d., Novo mesto	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1484018	estsitalopraam, 10mg	N06AB1 0	CIRASET 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1488540	estsitalopraam, 10mg	N06AB1 0	ESCITALOPRAM ACCORD 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1543137	estsitalopraam, 10mg	N06AB1 0	ESTAN, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Medochemie Limited	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1559987	estsitalopraam, 10mg	N06AB1 0	ELICEA Q-TAB 10MG, suus dispergeeruv tablett, 28TK	KRKA d.d. Novo mesto	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1325225	estsitalopraam, 20mg	N06AB1 0	ESCITALOPRAM ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Teva B.V.	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
1331907	estsitalopraam, 20mg	N06AB1 0	ESCITALOPRAM TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Teva Pharma B.V.	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
1400320	estsitalopraam, 20mg	N06AB1 0	ELICEA 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			



Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1488595	estsitalopraam, 20mg	N06AB1 0	ESCITALOPRAM ACCORD 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1560046	estsitalopraam, 20mg	N06AB1 0	ELICEA Q-TAB 20MG, suus dispergeeruv tablett, 28TK	KRKA d.d. Novo mesto	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1011665	etanertsept, 25mg	L04AB0 1	ENBREL, süstelahuse pulber ja lahusti, 4TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	L40-L40	Dermatovenerol oog, Pediaater				patsient vastab järgmistele tingimustele: haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor >=10 ja/või DLQI>=10 ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen + UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduva hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas)
					100	M07.0-M07.3	Pediaater, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.
					100	M05-M05, M08- M08, M06-M06	Reumatoloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks
					100	M45-M45, M46- M46	Pediaater, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.
					100	M08-M08	Reumatoloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1265600	etanertsept, 25mg	L04AB01	ENBREL, süstelahus süstlis, 4TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	M05-M05, M08-M08, M06-M06	Pediaater, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks
					100	M07.0-M07.3	Pediaater, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.
					100	L40-L40	Pediaater, Dermatoveneroloog				patsient vastab järgmistele tingimustele: haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor $\geq 10$ ja/või DLQI $\geq 10$ ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen + UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas)
					100	M08-M08	Reumatoloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav
					100	M45-M45, M46-M46	Pediaater, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1748482	etanertsept, 25mg	L04AB01	ERELZI, süstelahus süstlis, 4TK	Sandoz GmbH	100	L40-L40	Dermatoveneroloog, Pediaater				patsient vastab järgmistele tingimustele: haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor $\geq 10$ ja/või DLQI $\geq 10$ ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen + UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasivorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas)
					100	M08-M08	Reumatoloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav
					100	M05-M05, M08-M08, M06-M06	Pediaater, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks
					100	M07.0-M07.3, M45-M45, M46-M46	Pediaater, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1265644	etanertsept, 50mg	L04AB01	ENBREL, süstelahus süstlis, 4TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	M45-M45, M07.0-M07.3, M46-M46	Pediaater, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.
					100	M05-M05, M08-M08, M06-M06	Pediaater, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks
					100	L40-L40	Dermatoveneroloog, Pediaater				patsient vastab järgmistele tingimustele: haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor $\geq 10$ ja/või DLQI $\geq 10$ ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen + UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasivorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas)
					100	M08-M08	Pediaater, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1460191	etanertsept, 50mg	L04AB01	ENBREL, süstelahus pen-süstlis, 4TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	M05-M05, M08-M08, M06-M06	Pediaater, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks
					100	L40-L40	Dermatoveneroloog, Pediaater				patsient vastab järgmistele tingimustele: haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor $\geq 10$ ja/või DLQI $\geq 10$ ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen + UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasivorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas)
					100	M08-M08	Reumatoloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav
					100	M45-M45, M07.0-M07.3, M46-M46	Pediaater, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1708680	etanertsept, 50mg	L04AB01	BENEPALI, süstelahus pen-süstlis, 4TK	Samsung Bioepis NL B.V.	100	L40-L40	Dermatoveneroloog, Pediaater				patsient vastab järgmistele tingimustele: haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor $\geq 10$ ja/või DLQI $\geq 10$ ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen + UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasivorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas)
					100	M08-M08	Reumatoloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav
					100	M45-M45, M07.0-M07.3, M46-M46	Pediaater, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.
					100	M05-M05, M08-M08, M06-M06	Reumatoloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1748527	etanertsept, 50mg	L04AB01	ERELZI, süstelahus süstlis, 4TK	Sandoz GmbH	100	M07.0-M07.3, M45-M45, M46-M46	Pediaater, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.
					100	L40-L40	Dermatoveneroloog, Pediaater				patsient vastab järgmistele tingimustele: haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor $\geq 10$ ja/või DLQI $\geq 10$ ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen + UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduva hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasivorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas)
					100	M08-M08	Reumatoloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav
					100	M05-M05, M08-M08, M06-M06	Reumatoloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1748561	etanertsept, 50mg	L04AB01	ERELZI, süstelahus pen-süstlis, 4TK	Sandoz GmbH	100	M05-M05, M08-M08, M06-M06	Pediaater, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks
					100	M08-M08	Pediaater, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav
					100	L40-L40	Pediaater, Dermatoveneroloog				patsient vastab järgmistele tingimustele: haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor $\geq 10$ ja/või DLQI $\geq 10$ ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen + UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas)
					100	M45-M45, M07.0-M07.3, M46-M46	Pediaater, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.
1589171	etonogestreel, 68mg	G03AC08	NEXPLANON, implantaat, 1TK	Organon N.V.	50						
1138621	etonogestreel+etü nüüülöstradiool, 120mcg+15mcg 24h	G02BB01	NUVARING, vaginaalravivahend, 1TK	Organon N.V.	50						
1712584	etonogestreel+etü nüüülöstradiool, 120mcg+15mcg 24h	G02BB01	SETLONA, vaginaalravivahend, 1TK	Viatrix Limited	50						
1085352	etorikoksiib, 120mg	M01AH05	ARCOXIA, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Organon N.V.	50						



Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1653241	etorikoksiib, 120mg	M01AH0 5	ETORICOXIB ZENTIVA 120 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 7TK	Zentiva k.s.	50						
1653252	etorikoksiib, 120mg	M01AH0 5	ETORICOXIB ZENTIVA 120 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Zentiva k.s.	50						
1658369	etorikoksiib, 120mg	M01AH0 5	ETORICOXIB TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Teva B.V.	50						
1699577	etorikoksiib, 120mg	M01AH0 5	ETOXIB, õhukese polümeerikattega tablett, 7TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
1699588	etorikoksiib, 120mg	M01AH0 5	ETOXIB, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
1751385	etorikoksiib, 120mg	M01AH0 5	ETIDYLAN, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	G.L. Pharma GmbH	50						
1085318	etorikoksiib, 60mg	M01AH0 5	ARCOXIA, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Organon N.V.	50						
1652824	etorikoksiib, 60mg	M01AH0 5	ETORICOXIB ZENTIVA 60 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Zentiva k.s.	50						
1699342	etorikoksiib, 60mg	M01AH0 5	ETOXIB, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
1085330	etorikoksiib, 90mg	M01AH0 5	ARCOXIA, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Organon N.V.	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1653173	etorikoksiib, 90mg	M01AH05	ETORICOXIB ZENTIVA 90 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 7TK	Zentiva k.s.	50						
1653184	etorikoksiib, 90mg	M01AH05	ETORICOXIB ZENTIVA 90 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Zentiva k.s.	50						
1658279	etorikoksiib, 90mg	M01AH05	ETORICOXIB TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Teva B.V.	50						
1699454	etorikoksiib, 90mg	M01AH05	ETOXIB, õhukese polümeerikattega tablett, 7TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
1699465	etorikoksiib, 90mg	M01AH05	ETOXIB, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
1751251	etorikoksiib, 90mg	M01AH05	ETIDYLAN, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	G.L. Pharma GmbH	50						
1433315	everoliimus, 10mg	L01EG02	AFINITOR, tablett, 30TK	Novartis Europharm Limited	100	C78-C78, C25-C25, C34-C34, C16-C20	Onkoloog				patsientidele, kellel ravi alustamise näidustatus everoliimusega on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud kaugelearenenud kõrgelt diferentseerunud (täielikult) mitteresetseeritav progresseeruva kuluga seedetraktist, kopsust või pankreasest lähtunud neuroendokriinne kasvaja ning süsteemne keemiaravi ja/või ravi somatostatiini analoogiga on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1787632	everoliimus, 10mg	L01EG0 2	EVEROLIMUS NORAMEDA, tablett, 30TK	Norameda UAB	100	C78-C78, C25- C25, C34-C34, C16-C20	Onkoloog				patsientidele, kellel ravi alustamise näidustatus everoliimusega on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud kaugelearenenud kõrgelt diferentseerunud (täielikult) mitteresetseeritav progresseeruva kuluga seedetraktist, kopsust või pankreasest lähtunud neuroendokriinne kasvaja ning süsteemne keemiaravi ja/või ravi somatostatiini analoogiga on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks
1433281	everoliimus, 5mg	L01EG0 2	AFINITOR, tablett, 30TK	Novartis Europharm Limited	100	C78-C78, C25- C25, C34-C34, C16-C20	Onkoloog				patsientidele, kellel ravi alustamise näidustatus everoliimusega on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud kaugelearenenud kõrgelt diferentseerunud (täielikult) mitteresetseeritav progresseeruva kuluga seedetraktist, kopsust või pankreasest lähtunud neuroendokriinne kasvaja ning süsteemne keemiaravi ja/või ravi somatostatiini analoogiga on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks
1787609	everoliimus, 5mg	L01EG0 2	EVEROLIMUS NORAMEDA, tablett, 30TK	Norameda UAB	100	C78-C78, C25- C25, C34-C34, C16-C20	Onkoloog				patsientidele, kellel ravi alustamise näidustatus everoliimusega on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud kaugelearenenud kõrgelt diferentseerunud (täielikult) mitteresetseeritav progresseeruva kuluga seedetraktist, kopsust või pankreasest lähtunud neuroendokriinne kasvaja ning süsteemne keemiaravi ja/või ravi somatostatiini analoogiga on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1693256	evolokumab, 140mg 1ml	C10AX1 3	REPATHA, süstelahus pen-süstlis, 1ml 1TK	Amgen Europe B.V.	100	E78.0-E78.0	Kardioloog	esmane			kroonilise perekondliku hüperkolesteroleemia raviks dokumenteeritud ateroskleroosiga patsientidele, kui varasem ravi maksimaalselt talutavas annuses statiini ja esetimiibiga on osutunud ebapiisavaks või on need ravimid olnud vastunäidustatud ning patsiendi LDL-C väärtus on >=2,6 mmol/L
					100	I22-I22, Z95- Z95, I66-I66, I69-I69, I25-I25, I63-I63, I21-I21, I70.2-I70.2, I65- I65, I20.0-I20.0	Neuroloog, vaskulaarkirurg, Kardioloog	esmane			ägeda koronaarsündroomi (ÄKS, STEMI, NSTEMI, ebastabiilne stenokardia), isheemilise insuldi ja revaskulariseerimise (koronaararter, karotiidarter, perifeerse arteriaalse) järgselt (möödunud <=36 kuud) kombinatsioonis statiini ja esetimiibiga patsientidele, kelle LDL-C väärtus on >=2,6 mmol/l ja kellel vaatamata 1-3 kuud kestnud ravile maksimaalses talutavas annuses statiini ja esetimiibiga ei ole saavutatud LDL kolesterooli eesmärgväärtust või kellele statiin/esetimiib on vastunäidustatud
1680410	faktor VIII inhibiitorist möödamineva aktiivsusega hüübimisfaktorid, 25ühik 1ml	B02BD0 3	FEIBA 25 Ü/ML, infusioonilahuse pulber ja lahusti, 20ml 1TK	Baxalta Innovations GmbH	100	D68.4-D68.4, D66-D66	Hematoloog, Pediaater, Pediaater – hematoloog- onkoloog				
1680421	faktor VIII inhibiitorist möödamineva aktiivsusega hüübimisfaktorid, 50ühik 1ml	B02BD0 3	FEIBA 50 Ü/ML, infusioonilahuse pulber ja lahusti, 20ml 1TK	Baxalta Innovations GmbH	100	D66-D66, D68.4-D68.4	Pediaater – hematoloog- onkoloog, Pediaater, Hematoloog				
1349300	febuksostaat, 120mg	M04AA0 3	ADENURIC, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	50						
					75	M10-M10					juhul, kui allopurinool on vastunäidustatud või talumatu (põhjustab ravi katkestama sundivaid või annuse tõstmist takistavaid kõrvaltoimeid)

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1716207	febuksostaat, 120mg	M04AA0 3	FEBUXOSTAT TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Teva B.V.	50						
					75	M10-M10					juhul, kui allopurinool on vastunäidustatud või talumatu (põhjustab ravi katkestama sundivaid või annuse tõstmist takistavaid kõrvaltoimeid)
1721753	febuksostaat, 120mg	M04AA0 3	DRUNILER, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	M10-M10					juhul, kui allopurinool on vastunäidustatud või talumatu (põhjustab ravi katkestama sundivaid või annuse tõstmist takistavaid kõrvaltoimeid)
1748325	febuksostaat, 120mg	M04AA0 3	FEBUXOSTAT VIATRIS, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Viartis Limited	75	M10-M10					juhul, kui allopurinool on vastunäidustatud või talumatu (põhjustab ravi katkestama sundivaid või annuse tõstmist takistavaid kõrvaltoimeid)
					50						
1750755	febuksostaat, 120mg	M04AA0 3	FEBUXOSTAT ZENTIVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Zentiva k.s.	75	M10-M10					juhul, kui allopurinool on vastunäidustatud või talumatu (põhjustab ravi katkestama sundivaid või annuse tõstmist takistavaid kõrvaltoimeid)
					50						
1791581	febuksostaat, 120mg	M04AA0 3	FEBUXOSTAT KRKA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
					75	M10-M10					juhul, kui allopurinool on vastunäidustatud või talumatu (põhjustab ravi katkestama sundivaid või annuse tõstmist takistavaid kõrvaltoimeid)
1349287	febuksostaat, 80mg	M04AA0 3	ADENURIC, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	50						
					75	M10-M10					juhul, kui allopurinool on vastunäidustatud või talumatu (põhjustab ravi katkestama sundivaid või annuse tõstmist takistavaid kõrvaltoimeid)
1716140	febuksostaat, 80mg	M04AA0 3	FEBUXOSTAT TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Teva B.V.	75	M10-M10					juhul, kui allopurinool on vastunäidustatud või talumatu (põhjustab ravi katkestama sundivaid või annuse tõstmist takistavaid kõrvaltoimeid)
					50						
1721696	febuksostaat, 80mg	M04AA0 3	DRUNILER, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	M10-M10					juhul, kui allopurinool on vastunäidustatud või talumatu (põhjustab ravi katkestama sundivaid või annuse tõstmist takistavaid kõrvaltoimeid)

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1748291	febuksostaat, 80mg	M04AA0 3	FEBUXOSTAT VIATRIS, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Viartis Limited	75	M10-M10					juhul, kui allopurinool on vastunäidustatud või talumatu (põhjustab ravi katkestama sundivaid või annuse tõstmist takistavaid kõrvaltoimeid)
					50						
1750698	febuksostaat, 80mg	M04AA0 3	FEBUXOSTAT ZENTIVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Zentiva k.s.	75	M10-M10					juhul, kui allopurinool on vastunäidustatud või talumatu (põhjustab ravi katkestama sundivaid või annuse tõstmist takistavaid kõrvaltoimeid)
					50						
1791547	febuksostaat, 80mg	M04AA0 3	FEBUXOSTAT KRKA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA, d.d., Novo mesto	75	M10-M10					juhul, kui allopurinool on vastunäidustatud või talumatu (põhjustab ravi katkestama sundivaid või annuse tõstmist takistavaid kõrvaltoimeid)
					50						
1012330	felodipiin, 10mg	C08CA0 2	PRESID, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Teva B.V.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1174474	felodipiin, 10mg	C08CA0 2	FELODIPIN HEXAL, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Hexal AG	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1012318	felodipiin, 2,5mg	C08CA0 2	PRESID, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Teva B.V.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1012329	felodipiin, 5mg	C08CA0 2	PRESID, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Teva B.V.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1174373	felodipiin, 5mg	C08CA0 2	FELODIPIN HEXAL, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Hexal AG	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1029495	fenobarbitaal, 100mg	N03AA0 2	PHENAEMAL, tablett, 50TK	Desitin Arzneimittel GmbH	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50						
1026593	fenofibraat, 200mg	C10AB0 5	LIPANTHYL, kõvakapsel, 30TK	Viartis SIA	50						
1020340	fenoksümetüülpeni tsilliin, 1000000RÜ	J01CE0 2	OSPEN, õhukese polümeerikattega tablett, 12TK	Sandoz GmbH	50						
					75	H65-H67, J13- J18				16,00	

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1105951	fenoksümetüülpeni tsilliin, 400000RÜ 5ml	J01CE0 2	OSPEN, suukaudne suspensioon, 60ml 1TK	Sandoz GmbH	75	H65-H67, J13- J18				16,00	
					50						
1044223	fenoterool, 100mcg 1annus	R03AC0 4	BEROTEC N, inhalatsiooniaerosool, lahus, 200annus 1TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	75	J44-J44, J43- J43	Pulmonoloog	esmane			
					75	J45-J45					
					50						
1009651	fenoterool+ipratroo piumbromiid, 50mcg+20mcg 1annus	R03AL0 1	BERODUAL N, inhalatsiooniaerosool, lahus, 200annus 1TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			
					50						
					75	J45-J45					
1346958	fentanüül, 100mcg	N02AB0 3	EFFENTORA, bukaaltablett, 28TK	Teva B.V.	50						
					100	C00-D48	Anestesioloog, Reumatoloog, Hematoloog, Neuroloog, Onkoloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil (vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvianalgeetilist annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu
1400948	fentanüül, 100mcg	N02AB0 3	LUNALDIN, keelealune tablett, 10TK	Gedeon Richter Plc.	100	C00-D48	Neuroloog, Hematoloog, Reumatoloog, Onkoloog, Anestesioloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil (vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvianalgeetilist annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1223165	fentanüül, 100mcg 1h	N02AB03	MATRIFEN, transdermaalne plaaster, 5TK	Takeda Pharma AS	100	R52.1-R52.1	Anestesioloog, Neuroloog, Reumatoloog	esmane			esmise väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist
					100	C00-D48					patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga valutustamist
					50						
1223121	fentanüül, 12mcg 1h	N02AB03	MATRIFEN, transdermaalne plaaster, 5TK	Takeda Pharma AS	100	R52.1-R52.1	Neuroloog, Reumatoloog, Anestesioloog	esmane			esmise väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist
					100	C00-D48					patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga valutustamist
					50						
1346970	fentanüül, 200mcg	N02AB03	EFFENTORA, bukaaltablett, 28TK	Teva B.V.	50						
					100	C00-D48	Neuroloog, Hematoloog, Anestesioloog, Reumatoloog, Onkoloog	esmane			ravimi esmise väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil (vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalsel fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvivalgeetilist annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu



Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1400959	fentanüül, 200mcg	N02AB03	LUNALDIN, keelealune tablett, 10TK	Gedeon Richter Plc.	100	C00-D48	Neuroloog, Hematoloog, Reumatoloog, Anestesioloog, Onkoloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil (vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvivalentsust annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu
					50						
1223132	fentanüül, 25mcg 1h	N02AB03	MATRIFEN, transdermaalne plaaster, 5TK	Takeda Pharma AS	100	R52.1-R52.1	Reumatoloog, Anestesioloog, Neuroloog	esmane			esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist
					50						
					100	C00-D48					patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga valutustamist
1400960	fentanüül, 300mcg	N02AB03	LUNALDIN, keelealune tablett, 10TK	Gedeon Richter Plc.	100	C00-D48	Reumatoloog, Onkoloog, Neuroloog, Hematoloog, Anestesioloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil (vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvivalentsust annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1346992	fentanüül, 400mcg	N02AB03	EFFENTORA, bukaaltablett, 28TK	Teva B.V.	100	C00-D48	Neuroloog, Onkoloog, Hematoloog, Anestesioloog, Reumatoloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil (vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvianalgeetilist annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu
					50						
1400971	fentanüül, 400mcg	N02AB03	LUNALDIN, keelealune tablett, 10TK	Gedeon Richter Plc.	50						
					100	C00-D48	Reumatoloog, Onkoloog, Anestesioloog, Hematoloog, Neuroloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil (vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvianalgeetilist annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu
1223143	fentanüül, 50mcg 1h	N02AB03	MATRIFEN, transdermaalne plaaster, 5TK	Takeda Pharma AS	100	C00-D48					patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga valutustamist
					100	R52.1-R52.1	Reumatoloog, Neuroloog, Anestesioloog	esmane			esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1347038	fentanüül, 600mcg	N02AB03	EFFENTORA, bukaaltablett, 28TK	Teva B.V.	50						
					100	C00-D48	Onkoloog, Reumatoloog, Neuroloog, Anestesioloog, Hematoloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil (vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvivalentsust annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu
1400982	fentanüül, 600mcg	N02AB03	LUNALDIN, keelealune tablett, 10TK	Gedeon Richter Plc.	50						
					100	C00-D48	Anestesioloog, Neuroloog, Hematoloog, Reumatoloog, Onkoloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil (vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvivalentsust annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu
1223154	fentanüül, 75mcg 1h	N02AB03	MATRIFEN, transdermaalne plaaster, 5TK	Takeda Pharma AS	50						
					100	C00-D48					patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga valutustamist
					100	R52.1-R52.1	Neuroloog, Anestesioloog, Reumatoloog	esmane			esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1347016	fentanüül, 800mcg	N02AB03	EFFENTORA, bukaaltablett, 28TK	Teva B.V.	100	C00-D48	Reumatoloog, Neuroloog, Anestesioloog, Onkoloog, Hematoloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil (vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvianalgeetilist annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu
					50						
1400993	fentanüül, 800mcg	N02AB03	LUNALDIN, keelealune tablett, 10TK	Gedeon Richter Plc.	50						
					100	C00-D48	Anestesioloog, Hematoloog, Onkoloog, Reumatoloog, Neuroloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil (vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvianalgeetilist annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu
1077050	fenütoiin, 100mg	N03AB02	PHENHYDAN, tablett, 100TK	Desitin Arzneimittel GmbH	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1828649	filgotiniib, 100mg	L04AF04	JYSELECA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Galapagos	100	K51-K51	Pediaater, Pediaater – gastroenteroloog , Gastroenteroloo g				ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt kahe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud
					100	M05-M06	Reumatoloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt kahe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud
1828661	filgotiniib, 200mg	L04AF04	JYSELECA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Galapagos	100	K51-K51	Gastroenteroloo g, Pediaater – gastroenteroloog , Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt kahe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud
					100	M05-M06	Reumatoloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt kahe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1300587	finasteriid, 5mg	G04CB01	FINASTERIDE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	50						
1338724	finasteriid, 5mg	G04CB01	FINASTERIDE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	50						
1876181	finerenoon, 10mg	C03DA05	KERENDIA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Bayer AG	75	N18-N18					2. tüübi diabeediga patsientidele, kellel säilib albuminuuria, hoolimata maksimaalsest talutavast AKEi või ARB-i annusest ja SGLT-2 inhibiitori kasutamisest, juhul kui need ravimid ei ole vastunäidustatud
1876248	finerenoon, 20mg	C03DA05	KERENDIA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Bayer AG	75	N18-N18					2. tüübi diabeediga patsientidele, kellel säilib albuminuuria, hoolimata maksimaalsest talutavast AKEi või ARB-i annusest ja SGLT-2 inhibiitori kasutamisest, juhul kui need ravimid ei ole vastunäidustatud
1144842	flukonasool, 150mg	J02AC01	FLUNOC, kõvakapsel, 2TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	100	B45-B45, B48.2-B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44-B44					kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks
					50						
1395165	flukonasool, 150mg	J02AC01	FLUCONAZOLE ELVIM, kõvakapsel, 1TK	SIA Elvim	100	B45-B45, B48.2-B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44-B44					kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks
					50						
1395176	flukonasool, 150mg	J02AC01	FLUCONAZOLE ELVIM, kõvakapsel, 2TK	SIA Elvim	100	B45-B45, B48.2-B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44-B44					kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1395187	flukonasool, 150mg	J02AC0 1	FLUCONAZOLE ELVIM, kõvakapsel, 4TK	SIA Elvim	50						
					100	B45-B45, B48.2- B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44-B44					kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks
1490688	flukonasool, 150mg	J02AC0 1	FLUCONAZOLE ACTAVIS, kõvakapsel, 1TK	Teva B.V.	50						
					100	B45-B45, B48.2- B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44-B44					kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks
1490699	flukonasool, 150mg	J02AC0 1	FLUCONAZOLE ACTAVIS, kõvakapsel, 2TK	Teva B.V.	50						
					100	B45-B45, B48.2- B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44-B44					kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks
1531279	flukonasool, 150mg	J02AC0 1	FLUCONAZOLE MEDOCHEMIE, kõvakapsel, 2TK	Medochemie Limited	100	B45-B45, B48.2- B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44-B44					kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks
					50						
1821237	flukonasool, 150mg	J02AC0 1	FLUCONAZOLE VITABALANS, tablett, 2TK	Vitalbans Oy	50						
					100	B45-B45, B48.2- B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44-B44					kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks
1821248	flukonasool, 150mg	J02AC0 1	FLUCONAZOLE VITABALANS, tablett, 4TK	Vitalbans Oy	50						
					100	B45-B45, B48.2- B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44-B44					kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1140691	flukonasool, 50mg	J02AC01	FLUCONAZOLE MEDOCHEMIE, kõvakapsel, 7TK	Medochemie Limited	50						
					100	B45-B45, B48.2-B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44-B44					kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks
1395660	flukonasool, 50mg	J02AC01	FLUCONAZOLE ELVIM, kõvakapsel, 7TK	SIA Elvim	100	B45-B45, B48.2-B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44-B44					kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks
					50						
1167971	fluokortoloon+lidokaiin, 1mg+20mg 1g	C05AA84	DOLOPROCT 1MG/20MG/G REKTAALKREEM, rektaalkreem, 15g 1TK	Karo Pharma AB	50						
1167948	fluokortoloon+lidokaiin, 1mg+40mg	C05AA84	DOLOPROCT 1MG/40MG REKTAALSUPOSIIDID, rektaalsuposiit, 10TK	Karo Pharma AB	50						
1107122	fluoksetiin, 20mg	N06AB03	FLUX, kõvakapsel, 28TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			



Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1456691	fluoksetiin, 20mg	N06AB03	FLUOXETINE VITABALANS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Vitabalans Oy	50						
					100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4- F11.7, F18.4- F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3- F60.3, F13.4- F13.7, F10.4- F10.7, F17.4- F17.7, F15.4- F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
1456703	fluoksetiin, 20mg	N06AB03	FLUOXETINE VITABALANS, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Vitabalans Oy	100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4- F11.7, F18.4- F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3- F60.3, F13.4- F13.7, F10.4- F10.7, F17.4- F17.7, F15.4- F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1489765	flupentiksool, 1mg	N05AF0 1	FLUANXOL, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	H. Lundbeck A/S	50						
					100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4- F11.7, F18.4- F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3- F60.3, F13.4- F13.7, F10.4- F10.7, F17.4- F17.7, F15.4- F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
1006175	flupentiksool, 20mg 1ml	N05AF0 1	FLUANXOL DEPOT, süstelahus, 1ml 1TK	H. Lundbeck A/S	100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4- F11.7, F18.4- F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3- F60.3, F13.4- F13.7, F10.4- F10.7, F17.4- F17.7, F15.4- F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
					50						
1007840	flutikasoon, 100mcg 1annus	R03BA0 5	FLIXOTIDE DISKUS 100 MCG, inhalatsioonipulber, 60annus 1TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50						
					75	J45-J45					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1007884	flutikasoon, 250mcg 1annus	R03BA0 5	FLIXOTIDE DISKUS 250 MCG, inhalatsioonipulber, 60annus 1TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50						
					75	J45-J45					
1006344	flutikasoon, 500mcg 1g	D07AC1 7	CUTIVATE CREAM, kreem, 15g 1TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50						
					75	L20-L20, L40- L40, L23-L23					
1007233	flutikasoon, 50mcg 1annus	R01AD0 8	FLIXONASE AQUEOUS NASAL SPRAY 50 MCG, ninasprei, suspensioon, 120annus 1TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50						
1130690	flutikasoon, 50mcg 1annus	R03BA0 5	FLIXOTIDE INHALER, inhalatsiooniaerosool, suspensioon, 120annus 1TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50						
					75	J45-J45					
1343034	flutikasoonfuroaat, 27,5mcg 1annus	R01AD1 2	AVAMYS, ninasprei, suspensioon, 120annus 1TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50						
1287187	fluvastatiin, 80mg	C10AA0 4	FLUVASTATIN ACTAVIS, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK	Teva B.V.	50						
					75	I21-I22, Z45- Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10- E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78- E78, I11-I12					
					100	N18-N18					
1723216	fluvastatiin, 80mg	C10AA0 4	LESCOL XL, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK	First Pharma OÜ	75	I21-I22, Z45- Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10- E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78- E78, I11-I12					
					100	N18-N18					
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1881042	fluvastatiin, 80mg	C10AA04	LESCOL XL, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK	Ideal Trade Links UAB	75	I21-I22, Z45- Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10- E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78- E78, I11-I12					
					50						
					100	N18-N18					
1039564	fluvoksamiin, 100mg	N06AB08	FEVARIN, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Viartis SIA	50						
1087152	formoterool, 12mcg	R03AC13	FORADIL AEROLIZER, inhalatsioonipulber kõvakapslis, 60TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	J45-J45					
					50						
					75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			
1178939	formoterool, 12mcg 1annus	R03AC13	FOMEDA EASYHALER, inhalatsioonipulber, 120annus 1TK	Orion Corporation	50						
					75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			
					75	J45-J45					
1669697	formoterool+aklidi- nium, 11,8mcg+340mcg 1mõõttannus	R03AL05	BRIMICA GENUAIR, inhalatsioonipulber, 60mõõttannus 1TK	Covis Pharma Europe B.V.	75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			
					50						
1314256	formoterool+beklo- metasoon, 6mcg+100mcg 1annus	R03AK08	FOSTER, inhalatsiooniaerosool, lahus, 180annus 1TK	CHIESI Pharmaceuticals GmbH	50						
					75	J45-J45					
					75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			C-D staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel eosinofiilide arv perifeerses veres on $\geq 100$ rakku/ $\mu$ L ning kellel on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasis ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1796991	formoterool+beklo metasoon, 6mcg+100mcg 1annus	R03AK0 8	FOSTER NEXTHALER, inhalatsioonipulber, 180annus 1TK	CHIESI Pharmaceuticals GmbH	75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			C-D staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel eosinofiilide arv perifeerses veres on $\geq 100$ rakku/ $\mu$ L ning kellel on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasis ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga
					50						
					75	J45-J45					
1653410	formoterool+beklo metasoon, 6mcg+200mcg 1annus	R03AK0 8	FOSTER, inhalatsiooniaerosool, lahus, 180annus 1TK	CHIESI Pharmaceuticals GmbH	75	J45-J45					
					50						
					75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			C-D staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel eosinofiilide arv perifeerses veres on $\geq 100$ rakku/ $\mu$ L ning kellel on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasis ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga
1068443	formoterool+budes oniid, 4,5mcg+160mcg 1annus	R03AK0 7	SYMBICORT TURBUHALER, inhalatsioonipulber, 120annus 1TK	Astrazeneca AB	75	J45-J45					
					50						
					75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			C-D staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel eosinofiilide arv perifeerses veres on $\geq 100$ rakku/ $\mu$ L ning kellel on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasis ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga
1611470	formoterool+budes oniid, 4,5mcg+160mcg 1annus	R03AK0 7	BUFOMIX EASYHALER, inhalatsioonipulber, 120annus 1TK	Orion Corporation	75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			C-D staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel eosinofiilide arv perifeerses veres on $\geq 100$ rakku/ $\mu$ L ning kellel on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasis ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga
					75	J45-J45					
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1742789	formoterool+budes oniid, 4,5mcg+160mcg 1mõõttannus	R03AK0 7	AIRBUFO FORSPIRO, annustatud inhalatsioonipulber, 60mõõttannus 2TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			C-D staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel eosinofiilide arv perifeerses veres on $\geq 100$ rakku/ $\mu$ L ning kellel on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasis ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga
					50						
					75	J45-J45					
1156250	formoterool+budes oniid, 9mcg+320mcg 1annus	R03AK0 7	SYMBICORT TURBUHALER, inhalatsioonipulber, 60annus 1TK	Astrazeneca AB	50						
					75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			C-D staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel eosinofiilide arv perifeerses veres on $\geq 100$ rakku/ $\mu$ L ning kellel on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasis ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga
					75	J45-J45					
1611481	formoterool+budes oniid, 9mcg+320mcg 1annus	R03AK0 7	BUFOMIX EASYHALER, inhalatsioonipulber, 60annus 1TK	Orion Corporation	50						
					75	J45-J45					
					75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			C-D staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel eosinofiilide arv perifeerses veres on $\geq 100$ rakku/ $\mu$ L ning kellel on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasis ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga
1808603	formoterool+budes oniid, 9mcg+320mcg 1mõõttannus	R03AK0 7	AIRBUFO FORSPIRO, annustatud inhalatsioonipulber, 60mõõttannus 1TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	J45-J45					
					75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			C-D staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel eosinofiilide arv perifeerses veres on $\geq 100$ rakku/L ning kellel on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasis ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1786596	formoterool+glüko pürroonium, 5mcg+7,2mcg 1mõõtannus	R03AL0 7	BEVESPI AEROSPHERE, inhalatsiooniaerosool, suspensioon, 120mõõtannus 1TK	Astrazeneca AB	50						
					75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			
1750227	formoterool+glüko pürroonium+beklo metasoon, 5mcg+9mcg+87m cg 1mõõtannus	R03AL0 9	TRIMBOW, inhalatsiooniaerosool, lahus, 120mõõtannus 1TK	Chiesi Farmaceutici S.p.A.	50						
					75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			patsiendile, kelle eosinofiilide arv perifeerses veres on >=100 rakku ning IKS/LABA või LAMA/LABA kaksikravil on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasis ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga; või kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsiendile, kes saab IKS+LAMA+LABA toimeaineid avatud kombinatsioonis (e. kolmikravi erinevatest inhalaatoritest); või kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsiendile, kelle eosinofiilide arv perifeerses veres on >=300 rakku ning LABA või LAMA monoteraapial on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasis ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1834905	formoterool+glüko pürroonium+budes oniid, 5mcg+7,2mcg+16 0mcg 1mõõtannus	R03AL1 1	TRIXEO AEROSPHERE, inhalatsioonieraerosool, suspensioon, 120mõõtannus 1TK	Astrazeneca AB	75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			patsiendile, kelle eosinofiilide arv perifeerses veres on >=100 rakku ning IKS/LABA või LAMA/LABA kaksikravil on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasis ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga; või kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsiendile, kes saab IKS+LABA+LABA toimeaineid avatud kombinatsioonis (e. kolmikravi erinevatest inhalaatoritest); või kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsiendile, kelle eosinofiilide arv perifeerses veres on >=300 rakku ning LABA või LAMA monoteraapial on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasis ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga
					50						
1027145	fosinopriil, 10mg	C09AA0 9	MONOPRIL, tablett, 28TK	PharmaSwiss Ceska republika s.r.o.	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1193767	fosinopriil, 10mg	C09AA0 9	FOSINOPRIL ACTAVIS, tablett, 28TK	Teva B.V.	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1027336	fosinopriil, 20mg	C09AA0 9	MONOPRIL, tablett, 28TK	PharmaSwiss Ceska republika s.r.o.	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1193891	fosinopriil, 20mg	C09AA0 9	FOSINOPRIL ACTAVIS, tablett, 28TK	Teva B.V.	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1107021	fosinopriil+hüdrokl orotiasiid, 20mg+12,5mg	C09BA8 7	MONOZIDE, tablett, 28TK	PharmaSwiss Ceska republika s.r.o.	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1250581	fosinopriil+hüdrokl orotiasiid, 20mg+12,5mg	C09BA8 7	FOSINOPRIL HCT ACTAVIS, tablett, 30TK	Teva B.V.	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						



Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1791615	fremanezumab, 225mg	N02CD0 3	AJOVY, süstelahus pen- süstlis, 1TK	Teva GmbH	75	G43-G43	Neuroloog	esmane			kroonilise migreeni profülaktiliseks raviks täiskasvanutel, kellel esinevad peavalud >= 15 päeval kuus, millest vähemalt 8 päeval on tegemist migreeni kriteeriume täitvate hoogudega ja kellel on vähemalt 3 eelnevat profülaktilist ravi ebaõnnestunud. Ravivastust hinnatakse 6 ravikuu möödumisel ning soodustusega väljakirjutamise õigus jätkub patsientidele, kellel raviarsti hinnangul on dokumenteeritult >=50% vähenemine migreenipäevade arvus kuus. Edaspidi tuleb ravi jätkamise vajadust hinnata regulaarselt, ravi jätkamise eelduseks on püsiv ravivastus. Ravi lõpetatakse, kui peavaluga päevade arv on alla 4 päeva kuus vähemalt 3 järjestikuse kuu vältel.
1161548	frovatriptaan, 2,5mg	N02CC0 7	MIGARD, õhukese polümeerikattega tablett, 2TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	75	G43-G43					
					50						
1892752	frovatriptaan, 2,5mg	N02CC0 7	MIGARD, õhukese polümeerikattega tablett, 2TK	Ideal Trade Links UAB	50						
					75	G43-G43					
1892785	frovatriptaan, 2,5mg	N02CC0 7	MIGARD, õhukese polümeerikattega tablett, 6TK	Ideal Trade Links UAB	75	G43-G43					
					50						
1039362	furosemiid, 60mg	C03CA0 1	LASIX RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	Sanofi Winthrop Industrie	100	I27.0-I27.0					
					75	I50-I50					
					50						
1018606	fusidiinhape, 10mg 1g	S01AA1 3	FUCITHALMIC, silmatilgad, suspensioon, 5g 1TK	Amdipharm Limited	50						
1007727	fusidiinhape, 20mg 1g	D06AX0 1	FUCIDIN 20 mg/g salv, salv, 15g 1TK	LEO Pharma A/S	50						
1007750	fusidiinhape, 20mg 1g	D06AX0 1	FUCIDIN 20 mg/g kreem, kreem, 15g 1TK	LEO Pharma A/S	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1032815	gabapentiin, 300mg	N02BF0 1	NEURONTIN, kõvakapsel, 50TK	Upjohn EESV	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					50						
1126055	gabapentiin, 300mg	N02BF0 1	GABAGAMMA 300MG, kõvakapsel, 50TK	Woerwag Pharma GmbH & Co. KG	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
1696417	gabapentiin, 300mg	N02BF0 1	GABAPENTIN ACCORD, kõvakapsel, 50TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
1826355	gabapentiin, 300mg	N02BF0 1	NEURONTIN, kõvakapsel, 90TK	Lex Ano UAB	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
1845547	gabapentiin, 300mg	N02BF0 1	NEURONTIN, kõvakapsel, 100TK	Ideal Trade Links UAB	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1893012	gabapentiin, 300mg	N02BF0 1	NEURONTIN, kõvakapsel, 100TK	Ideal Trade Links UAB	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					50						
1897331	gabapentiin, 300mg	N02BF0 1	NEURONTIN, kõvakapsel, 50TK	Lex Ano UAB	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
1125953	gabapentiin, 400mg	N02BF0 1	GABAGAMMA 400MG, kõvakapsel, 50TK	Woerwag Pharma GmbH & Co. KG	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50						
					75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
1696529	gabapentiin, 400mg	N02BF0 1	GABAPENTIN ACCORD, kõvakapsel, 50TK	Accord Healthcare B.V.	75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50						
1888173	ganireliks, 0,25mg 0.5ml	H01CC0 1	GANIRELIX GEDEON RICHTER, süstelahus süstlis, 0.5ml 1TK	Gedeon Richter Plc.	100	N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks
					50						
1115716	gestodeen+etünüü löstradiool, 0,075mg+0,02mg	G03AA1 0	LINDYNETTE 20, kaetud tablett, 63TK	Gedeon Richter Plc.	75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
					50						
1828548	gestodeen+etünüü löstradiool, 0,075mg+0,02mg	G03AA1 0	LINDYNETTE 20, kaetud tablett, 63TK	Ideal Trade Links UAB	50						
					75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
1115693	gestodeen+etünüü löstradiool, 0,075mg+0,03mg	G03AA1 0	LINDYNETTE 30, kaetud tablett, 63TK	Gedeon Richter Plc.	75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1828559	gestodeen+etünüü löstradiool, 0,075mg+0,03mg	G03AA1 0	LINDYNETTE 30, kaetud tablett, 63TK	Ideal Trade Links UAB	50						
					75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
1062953	gestodeen+etünüü löstradiool, 75mcg+20mcg	G03AA1 0	HARMONET, kaetud tablett, 63TK	Pfizer Europe MA EEIG	50						
					75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
1364105	gestodeen+etünüü löstradiool, 75mcg+20mcg	G03AA1 0	GESYTIL 75/20 MIKROGRAMMI, kaetud tablett, 63TK	Ratiopharm GmbH	50						
					75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
1364138	gestodeen+etünüü löstradiool, 75mcg+30mcg	G03AA1 0	GESYTIL 75/30 MIKROGRAMMI, kaetud tablett, 63TK	Ratiopharm GmbH	50						
					75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
1061334	glargiin-insuliin, 100ühik 1ml	A10AE0 4	LANTUS, süstelahus kolbampullis, 3ml 5TK	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	100	O24-O24, E13- E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1					
					50						
1265790	glargiin-insuliin, 100ühik 1ml	A10AE0 4	LANTUS SOLOSTAR, süstelahus pen-süstlis, 3ml 5TK	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	50						
					100	O24-O24, E13- E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1					
1665053	glargiin-insuliin, 100ühik 1ml	A10AE0 4	ABASAGLAR KWIKPEN, süstelahus pen-süstlis, 3ml 5TK	Eli Lilly Nederland B.V.	50						
					100	O24-O24, E13- E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1					
1684043	glargiin-insuliin, 300ühik 1ml	A10AE0 4	TOUJEO, süstelahus pen-süstlis, 1.5ml 5TK	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	50						
					100	O24-O24, E13- E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1737042	glargiin- insuliin+liksisenatii d, 100ühik+33mcg 1ml	A10AE5 4	SULIQUA, süstelahus pen-süstlis, 3ml 5TK	Sanofi Winthrop Industrie	50	E14-E14, E11- E11					II tüüpi diabeedi raviks kombinatsioonis metformiiniga juhul kui ravi suukaudsete diabeediravimitega ei ole efektiivne või on vastunäidustatud
					75	E14-E14, E11- E11					II tüüpi diabeedi raviks kombinatsioonis metformiiniga rasvumusega patsientidele (KMI $\geq$ 35kg/m <sup>2</sup> ), kellel suukaudsed diabeediravimid (metformiin, sulfonüüluurea preparaat, PPAR agonist, DPP-4 inhibiitor) maksimaalsetes talutavates annustes ei ole andnud rahuldavat efekti või on vastunäidustatud
1737020	glargiin- insuliin+liksisenatii d, 100ühik+50mcg 1ml	A10AE5 4	SULIQUA, süstelahus pen-süstlis, 3ml 5TK	Sanofi Winthrop Industrie	50	E14-E14, E11- E11					II tüüpi diabeedi raviks kombinatsioonis metformiiniga juhul kui ravi suukaudsete diabeediravimitega ei ole efektiivne või on vastunäidustatud
					75	E14-E14, E11- E11					II tüüpi diabeedi raviks kombinatsioonis metformiiniga rasvumusega patsientidele (KMI $\geq$ 35kg/m <sup>2</sup> ), kellel suukaudsed diabeediravimid (metformiin, sulfonüüluurea preparaat, PPAR agonist, DPP-4 inhibiitor) maksimaalsetes talutavates annustes ei ole andnud rahuldavat efekti või on vastunäidustatud
1241244	glatirameeratasetaa t, 20mg 1ml	L03AX1 3	COPAXONE, süstelahus süstlis, 1ml 28TK	Teva GmbH	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel ägenemiste ja remissioonidega kulgeva hulgiskleroosi raviks
1618196	glatirameeratasetaa t, 40mg 1ml	L03AX1 3	COPAXONE, süstelahus süstlis, 1ml 12TK	Teva GmbH	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel ägenemiste ja remissioonidega kulgeva hulgiskleroosi raviks
1751037	glekapreviir+pibre ntasviir, 100mg+40mg	J05AP57	MAVIRET, õhukese polümeerikattega tablett, 84TK	AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG	100	B18.2-B18.2	Infektsionist, Gastroenteroloog				kroonilise progresseeruva C-viirushepatiidi raviks
1860016	glekapreviir+pibre ntasviir, 50mg+20mg	J05AP57	MAVIRET, kaetud graanulid kotikeses, 28TK	AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG	100	B18.2-B18.2	Gastroenteroloog, Infektsionist				kroonilise progresseeruva C-viirushepatiidi raviks
1261066	gliklasiid, 30mg	A10BB0 9	GLICLADA 30 MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 60TK	KRKA d.d. Novo mesto	50						
					75	E14-E14, E11- E11					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1261101	gliklasiid, 30mg	A10BB09	GLICLADA 30 MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 120TK	KRKA d.d. Novo mesto	75	E14-E14, E11-E11					
					50						
1603145	gliklasiid, 30mg	A10BB09	GLICLAZIDE KRKA, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 60TK	KRKA d.d. Novo mesto	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1350054	gliklasiid, 60mg	A10BB09	DIAPREL MR 60MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 60TK	Les Laboratoires Servier	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1551822	gliklasiid, 60mg	A10BB09	GLICLADA 60 MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 60TK	KRKA d.d. Novo mesto	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1551855	gliklasiid, 60mg	A10BB09	GLICLADA 60 MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 120TK	KRKA d.d. Novo mesto	75	E14-E14, E11-E11					
					50						
1551945	gliklasiid, 60mg	A10BB09	GLICLAZIDE KRKA 60 MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 60TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1644601	gliklasiid, 60mg	A10BB09	GLICLAZIDE ACTAVIS, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 60TK	Teva B.V.	75	E14-E14, E11-E11					
					50						
1847246	gliklasiid, 60mg	A10BB09	DIAPREL MR 60MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 60TK	Ideal Trade Links UAB	75	E11-E11, E14-E14					
					50						
1046405	gliklasiid, 80mg	A10BB09	DIAPREL, tablett, 60TK	Les Laboratoires Servier	50						
					75	E14-E14, E11-E11					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1176948	glimepiriid, 1mg	A10BB1 2	OLTAR 1MG, tablett, 30TK	Berlin-Chemie AG	50						
					75	E14-E14, E11- E11					
1334821	glimepiriid, 1mg	A10BB1 2	GLIMEPIRIDE ACCORD, tablett, 30TK	Accord Healthcare B.V.	75	E14-E14, E11- E11					
					50						
1110328	glimepiriid, 2mg	A10BB1 2	AMARYL, tablett, 30TK	Sanofi Winthrop Industrie	50						
					75	E14-E14, E11- E11					
1177039	glimepiriid, 2mg	A10BB1 2	OLTAR 2 MG, tablett, 30TK	Berlin-Chemie AG	75	E14-E14, E11- E11					
					50						
1334865	glimepiriid, 2mg	A10BB1 2	GLIMEPIRIDE ACCORD, tablett, 30TK	Accord Healthcare B.V.	75	E14-E14, E11- E11					
					50						
1671195	glimepiriid, 2mg	A10BB1 2	AMARYL, tablett, 30TK	First Pharma OÜ	75	E14-E14, E11- E11					
					50						
1846942	glimepiriid, 2mg	A10BB1 2	AMARYL, tablett, 30TK	Ideal Trade Links UAB	50						
					75	E14-E14, E11- E11					
1110339	glimepiriid, 3mg	A10BB1 2	AMARYL, tablett, 30TK	Sanofi Winthrop Industrie	75	E14-E14, E11- E11					
					50						
1177129	glimepiriid, 3mg	A10BB1 2	OLTAR 3 MG, tablett, 30TK	Berlin-Chemie AG	75	E14-E14, E11- E11					
					50						
1334900	glimepiriid, 3mg	A10BB1 2	GLIMEPIRIDE ACCORD, tablett, 30TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					75	E14-E14, E11- E11					
1670992	glimepiriid, 3mg	A10BB1 2	AMARYL, tablett, 30TK	First Pharma OÜ	50						
					75	E14-E14, E11- E11					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1847055	glimepiriid, 3mg	A10BB1 2	AMARYL, tablett, 30TK	Ideal Trade Links UAB	75	E14-E14, E11- E11					
					50						
3055407	glimepiriid, 3mg	A10BB1 2	AMARYL, tablett, 30TK	Ideal Trade Links UAB	75	E14-E14, E11- E11					
					50						
1125391	glimepiriid, 4mg	A10BB1 2	AMARYL, tablett, 30TK	Sanofi Winthrop Industrie	75	E14-E14, E11- E11					
					50						
1334944	glimepiriid, 4mg	A10BB1 2	GLIMEPIRIDE ACCORD, tablett, 30TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					75	E14-E14, E11- E11					
3055542	glimepiriid, 4mg	A10BB1 2	AMARYL, tablett, 30TK	Ideal Trade Links UAB	50						
					75	E14-E14, E11- E11					
1029338	glipisiid, 10mg	A10BB0 7	GLIBENESE GITS, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Pfizer Europe MA EEIG	75	E14-E14, E11- E11					
					50						
1029349	glipisiid, 5mg	A10BB0 7	GLIBENESE GITS, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Pfizer Europe MA EEIG	75	E14-E14, E11- E11					
					50						
1201396	glulisiin-insuliin, 100ühik 1ml	A10AB0 6	APIDRA, süstelahus kolbampullis, 3ml 5TK	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	50						
					100	O24-O24, E13- E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1					
1294398	glulisiin-insuliin, 100ühik 1ml	A10AB0 6	APIDRA SOLOSTAR, süstelahus pen-süstlis, 3ml 5TK	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	100	O24-O24, E13- E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1					
					50						
1165878	glükagoon, 1mg	H04AA0 1	GLUCAGEN 1MG HYPOKIT, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Novo Nordisk A/S	50						



Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1326653	glükoosamiin, 1178mg	M01AX0 5	GLUCOSAMIN- RATIOPHARM 1178 MG, suukaudse lahuse pulber, 20TK	Ratiopharm GmbH	50						
1183687	glükoosamiin, 400mg	M01AX0 5	GLUCOSAMINE PHARMA NORD, kõvakapsel, 90TK	Pharma Nord ApS	50						
1183698	glükoosamiin, 400mg	M01AX0 5	GLUCOSAMINE PHARMA NORD, kõvakapsel, 270TK	Pharma Nord ApS	50						
1595954	glükopürroonium, 44mcg	R03BB0 6	SEEBRI BREEZHALER, inhalatsioonipulber kõvakapslis, 30TK	Novartis Europharm Limited	75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			
					50						
1648403	gosereliin, 10,8mg	L02AE0 3	RESELIGO, implantaat süstlis, 1TK	Zentiva k.s.	100	N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks
					100	C61-C61	Uroloog, Onkoloog				lokaalse või lokaalselt levinud kõrge riskiga (kliiniline staadium >=T2c või Gleasoni skoor 8-10 või PSA >=20 ng/ml või regionaalsete lümfisõlmede haaratus või positiivne reseksioonipiir) multimodaalse ravi osana kuni 2 aasta vältel ning metastaseerunud eesnäärmevähiga patsientidele
					50						
					75	D25-D25	Günekoloog	esmane			mõõdukate kuni raskete sümptomitega patsientidele, kellel esmavaliku ravimid (traneksaamhape, hormonaalsed kontratseptiivid, emakasisesed rasestumisvastased vahendid) on ebaefektiivsed või talumatud.
					75	N80-N80					III-IV astme endometrioosi põdevatele patsientidele

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1002621	gosereliin, 3,6mg	L02AE03	ZOLADEX, implantaat, 1TK	Astrazeneca AB	50						
					100	N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks
					100	C61-C61	Onkoloog, Uroloog				lokaalse või lokaalselt levinud kõrge riskiga (kliiniline staadium $\geq$ T2c või Gleasoni skoor 8-10 või PSA $\geq$ 20 ng/ml või regionaalsete lümfisõlmede haaratus või positiivne resektsioonipiir) multimodaalse ravi osana kuni 2 aasta vältel ning metastaseerunud eesnäärmevähiga patsientidele
					75	N80-N80					III-IV astme endometrioosi põdevatele patsientidele
					75	D25-D25	Günekoloog	esmane			mõõdukate kuni raskete sümptomitega patsientidele, kellel esmavaliku ravimid (traneksaamhape, hormonaalsed kontratseptiivid, emakasisesed rasestumisvastased vahendid) on ebaefektiivsed või talumatud.
1648425	gosereliin, 3,6mg	L02AE03	RESELIGO, implantaat süstlis, 1TK	Zentiva k.s.	50						
					100	N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks
					75	N80-N80					III-IV astme endometrioosi põdevatele patsientidele
					75	D25-D25	Günekoloog	esmane			mõõdukate kuni raskete sümptomitega patsientidele, kellel esmavaliku ravimid (traneksaamhape, hormonaalsed kontratseptiivid, emakasisesed rasestumisvastased vahendid) on ebaefektiivsed või talumatud.
					100	C61-C61	Onkoloog, Uroloog				lokaalse või lokaalselt levinud kõrge riskiga (kliiniline staadium $\geq$ T2c või Gleasoni skoor 8-10 või PSA $\geq$ 20 ng/ml või regionaalsete lümfisõlmede haaratus või positiivne resektsioonipiir) multimodaalse ravi osana kuni 2 aasta vältel ning metastaseerunud eesnäärmevähiga patsientidele
1023950	granisetroon, 1mg	A04AA02	KYTRIL, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Atnahs Pharma Netherlands B.V.	100	C00-D48					suukaudsest keemiaravist põhjustatud iivelduse ja oksendamise profülaktikaks ja raviks juhul, kui metoklopramiid ei ole esmase valikuna soovitatud või see on osutunud ebaefektiivseks
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1800470	guselkumab, 100mg 1ml	L04AC1 6	TREMIFYA, süstelahus pen-süstlis, 1ml 1TK	Janssen - Cilag International	100	M07.0-M07.3	Reumatoloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus M07.0–3 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud.
					100	L40-L40	Pediaater, Dermatovenerol oog				patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus L40 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud.
1014680	haloperidool, 1,5mg	N05AD0 1	HALOPERIDOL- RICHTER, tablett, 50TK	Gedeon Richter Plc.	50						
					100	F33.2-F33.3, F18.4-F18.7, F60.3-F60.3, F11.4-F11.7, F13.4-F13.7, F14.4-F14.7, F17.4-F17.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F70-F79, F00- F09, F20-F29, F32.2-F33.2, F15.4-F15.7, F30-F31, F12.4- F12.7, F10.4- F10.7	Psühhiaater	esmane			

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1014691	haloperidool, 2mg 1ml	N05AD01	HALOPERIDOL- RICHTER, suukaudsed tilgad, lahus, 10ml 1TK	Gedeon Richter Plc.	100	F33.2-F33.3, F18.4-F18.7, F60.3-F60.3, F11.4-F11.7, F13.4-F13.7, F14.4-F14.7, F17.4-F17.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F70-F79, F00- F09, F20-F29, F32.2-F33.2, F15.4-F15.7, F30-F31, F12.4- F12.7, F10.4- F10.7	Psühhiaater	esmane			
					50						
1064674	haloperidool, 50mg 1ml	N05AD01	HALOPERIDOL DECANOATE- RICHTER, süstelahus, 1ml 5TK	Gedeon Richter Plc.	100	F33.2-F33.3, F18.4-F18.7, F60.3-F60.3, F11.4-F11.7, F13.4-F13.7, F14.4-F14.7, F17.4-F17.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F70-F79, F00- F09, F20-F29, F32.2-F33.2, F15.4-F15.7, F30-F31, F12.4- F12.7, F10.4- F10.7	Psühhiaater	esmane			
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1014679	haloperidool, 5mg	N05AD01	HALOPERIDOL- RICHTER, tablett, 50TK	Gedeon Richter Plc.	100	F33.2-F33.3, F18.4-F18.7, F60.3-F60.3, F11.4-F11.7, F13.4-F13.7, F14.4-F14.7, F17.4-F17.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F70-F79, F00- F09, F20-F29, F32.2-F33.2, F15.4-F15.7, F30-F31, F12.4- F12.7, F10.4- F10.7	Psühhiaater	esmane			
					50						
1054055	hõbesulfadiasiin, 10mg 1g	D06BA01	SULFARGIN, salv, 50g 1TK	Grindeks AS	50						
1015478	hüdroklorotiasiid, 25mg	C03AA03	HYPOTHIAZID, tablett, 20TK	Sanofi Winthrop Industrie	75	I15-I15, I10-I13, O10-O16, I50- I50					
					50						
					100	I27.0-I27.0					
1137013	hüdrokortisoon, 10mg 1g	D07AA02	HYDROCORTISONE DAK, salv, 30g 1TK	Orifarm Healthcare A/S	50						
1018594	hüdrokortisoon+fu sidiinhape, 10mg+20mg 1g	D07CA83	FUCIDIN H, kreem, 15g 1TK	LEO Pharma A/S	50						
1035403	hüdrokortisoon+kl oorheksidiin, 10mg+10mg 1g	D07BA80	SIBICORT, kreem, 20g 1TK	Orion Corporation	50						
1045145	hüdrokortisoon+tsi profloksatsiin, 10mg+2mg 1ml	S02CA82	CIPROBAY HC, kõrvatilgad, suspensioon, 10ml 1TK	Novartis Baltics SIA	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1036022	hüdroksükarbamii d, 500mg	L01XX0 5	HYDREA, kõvakapsel, 100TK	Cheplapharm Arzneimittel GmbH	50						
					100	C00-D48	Onkoloog, Hematoloog				
1615698	hüdroksükarbamii d, 500mg	L01XX0 5	HYDREA, kõvakapsel, 100TK	First Pharma OÜ	50						
					100	C00-D48	Onkoloog, Hematoloog				
1878251	hüdroksükarbamii d, 500mg	L01XX0 5	HYDREA, kõvakapsel, 100TK	Lex Ano UAB	50						
					100	C00-D48	Hematoloog, Onkoloog				
1027291	hüdroksüklorokviin , 200mg	P01BA0 2	PLAQUENIL, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Sanofi Winthrop Industrie	50						
					75	M45-M46, M08- M08, M30-M35, M05-M06	Pediaater, Reumatoloog	esmane			
1566086	hüdroksüklorokviin , 200mg	P01BA0 2	PLAQUENIL, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	First Pharma OÜ	75	M45-M46, M08- M08, M30-M35, M05-M06	Pediaater, Reumatoloog	esmane			
					50						
1830529	hüdroksüklorokviin , 200mg	P01BA0 2	PLAQUENIL, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Lex Ano UAB	75	M45-M46, M08- M08, M30-M35, M05-M06	Reumatoloog, Pediaater	esmane			
					50						
1891290	hüdroksüklorokviin , 200mg	P01BA0 2	PLAQUENIL, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Ideal Trade Links UAB	75	M45-M46, M08- M08, M30-M35, M05-M06	Reumatoloog, Pediaater	esmane			
					50						
1893551	hüdroksüklorokviin , 200mg	P01BA0 2	PLAQUENIL, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Lex Ano UAB	50						
					75	M45-M46, M08- M08, M30-M35, M05-M06	Reumatoloog, Pediaater	esmane			
1498978	ibandronhape, 150mg	M05BA0 6	IBANDRONIC ACID TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 1TK	Teva B.V.	75	M80-M80					patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1498989	ibandronhape, 150mg	M05BA0 6	IBANDRONIC ACID TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 3TK	Teva B.V.	50 75	M80-M80					patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna
1798825	ibrutiniib, 140mg	L01EL01	IMBRUVICA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Janssen - Cilag International	100	C91.1-C91.1	Hematoloog				monoteraapiana patsientidele, kellel esineb 17p deletsioon või TP53 mutatsioon, kes ei ole eelnevalt ravi saanud või kes on eelnevalt saanud vähemalt ühe ravikuuri ja haigus ei ole ravile allunud või on taastekkinud lühema aja kui 36 kuu jooksul eelneva ravi alustamisest alates ning patsientidele, kellel esineb 11q deletsioon, kes ei ole eelnevalt ravi saanud või kes on eelnevalt saanud vähemalt ühe ravikuuri ja haigus ei ole ravile allunud või on taastekkinud ning kombinatsioonis venetoklaksiga patsientidele, kes ei ole eelnevalt ravi saanud. Kombinatsioonravi pikkus maksimaalselt 15 tsüklit.
					100	C83.1-C83.1	Hematoloog				monoteraapiana heas üldseisundis (ECOG 0-1) ravirefraktaarsele mantelrakulise lümfoomiga patsiendile (dokumenteeritud suutmatus saavutada vähemalt osalist ravivastust) või teise rea ravina patsiendile, kellel on tekkinud haiguse varajane ägenemine (<24 kuud). Ravi ibrutiniibiga teostatakse kuni haiguse progressioonini
1775156	ibrutiniib, 420mg	L01EL01	IMBRUVICA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Janssen - Cilag International	100	C91.1-C91.1	Hematoloog				monoteraapiana patsientidele, kellel esineb 17p deletsioon või TP53 mutatsioon, kes ei ole eelnevalt ravi saanud või kes on eelnevalt saanud vähemalt ühe ravikuuri ja haigus ei ole ravile allunud või on taastekkinud lühema aja kui 36 kuu jooksul eelneva ravi alustamisest alates ning patsientidele, kellel esineb 11q deletsioon, kes ei ole eelnevalt ravi saanud või kes on eelnevalt saanud vähemalt ühe ravikuuri ja haigus ei ole ravile allunud või on taastekkinud ning kombinatsioonis venetoklaksiga patsientidele, kes ei ole eelnevalt ravi saanud. Kombinatsioonravi pikkus maksimaalselt 15 tsüklit.
1775167	ibrutiniib, 560mg	L01EL01	IMBRUVICA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Janssen - Cilag International	100	C83.1-C83.1	Hematoloog				monoteraapiana heas üldseisundis (ECOG 0-1) ravirefraktaarsele mantelrakulise lümfoomiga patsiendile (dokumenteeritud suutmatus saavutada vähemalt osalist ravivastust) või teise rea ravina patsiendile, kellel on tekkinud haiguse varajane ägenemine (<24 kuud). Ravi ibrutiniibiga teostatakse kuni haiguse progressioonini

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1073012	ibuprofeen, 400mg	M01AE01	IBUMAX, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Vitabalans Oy	50						
					100	C00-D48					
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					75	M15-M19			63,00		
1073089	ibuprofeen, 400mg	M01AE01	IBUMETIN, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Orifarm Healthcare A/S	75	M15-M19			63,00		
					50						
					100	C00-D48					
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
1473588	ibuprofeen, 400mg	M01AE01	IBUPROFEN LANNACHER, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	G.L. Pharma GmbH	100	C00-D48					
					50						
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					75	M15-M19			63,00		
1032714	ibuprofeen, 600mg	M01AE01	IBUPROFEN LANNACHER, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	G.L. Pharma GmbH	75	M15-M19			63,00		
					50						
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					100	C00-D48					
1073113	ibuprofeen, 600mg	M01AE01	IBUMETIN, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Orifarm Healthcare A/S	75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					75	M15-M19			63,00		
					100	C00-D48					
					50						
1085194	ibuprofeen, 600mg	M01AE01	IBUMAX, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Vitabalans Oy	100	C00-D48					
					75	M15-M19			63,00		
					50						
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					



Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1085206	ibuprofeen, 600mg	M01AE01	IBUMAX, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Vitabalans Oy	50						
					100	C00-D48					
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					75	M15-M19			63,00		
1473599	ibuprofeen, 600mg	M01AE01	IBUPROFEN LANNACHER, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	G.L. Pharma GmbH	75	M15-M19			63,00		
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					100	C00-D48					
					50						
1673692	ibuprofeen, 600mg	M01AE01	IBUPROFEN ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Accord Healthcare B.V.	75	M15-M19			63,00		
					75	M05-M08, M30-M35, M45-M46					
					100	C00-D48					
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1697126	idebenoon, 150mg	N06BX13	RAXONE, õhukese polümeerikattega tablett, 180TK	Chiesi Farmaceutici S.p.A.	100	H47.2-H47.2	Oftalmoloog				ravi jätkamiseks kliiniliselt olulise paranemise (clinically relevant recovery, CRR) saavutamisel võrreldes idebenoon-ravi alustamisega geneetilise testiga kinnitatud Leberi päriliku optilise neuropaatia näidustusel. Ravi jätkamisel toimub ravivastuse hindamine iga 6 kuu tagant. Ravi lõpetatakse, kui pärast CRR saavutamist ei ole kahel järjestikusel mõõtmisel enam toimunud täiendavat nägemisteravuse paranemist. Off-chart patsiendil, kes enne ravi alustamist ei näe ühtegi tähte logMAR lugemistabelil, tähendab CRR võimet lugeda lugemistabelilt vähemalt 5 tähte (võrdne ühe rea lugemisega) ning on-chart patsiendil, kes suutis lugeda tähti lugemistabelilt enne ravi alustamist, tähendab CRR võimet lugeda täiendavalt vähemalt 10 tähte (võrdne 2 rea lugemisega lugemistabelil)
					100	H47.2-H47.2	Oftalmoloog				ravi alustamiseks geneetilise testiga kinnitatud Leberi päriliku optilise neuropaatia näidustusel ning jätkamiseks patsientidel, kellel ei ole iga 3 kuu järgsel ravivastuse hindamisel saavutatud olulist kliinilist paranemist (clinically relevant recovery, CRR) pärast 3. 6. ja 9. ravikuud. Ravi lõpetatakse kui 12. kuu järel ei ole CRR saavutatud. Off-chart patsiendil, kes enne ravi alustamist ei näe ühtegi tähte logMAR lugemistabelil, tähendab CRR võimet lugeda lugemistabelilt vähemalt 5 tähte (võrdne ühe rea lugemisega) ning on-chart patsiendil, kes suutis lugeda tähti lugemistabelilt enne ravi alustamist, tähendab CRR võimet lugeda täiendavalt vähemalt 10 tähte (võrdne 2 rea lugemisega lugemistabelil)

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1717107	iksekizumab, 80mg 1ml	L04AC1 3	TALTZ, süstelahus pen- süstlis, 1ml 1TK	Eli Lilly And Co (Ireland) Limited	100	M07.0-M07.3	Pediaater, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus M07.0–3 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud.
					100	L40-L40	Pediaater, Dermatovenerol oog				patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus L40 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud.
					100	M45-M45, M46- M46	Pediaater, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus M45 ja M46 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud.
1291890	iloprost, 10mcg 1ml	B01AC1 1	VENTAVIS, nebuliseeritav lahus, 1ml 30TK	Bayer AG	100	I27.0-I27.0	Reumatoloog, Pulmonoloog, Pediaater, Kardioloog				NYHA III-IV kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafiil on vastunäidustatud, osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1291902	iloprost, 10mcg 1ml	B01AC1 1	VENTAVIS, nebuliseeritav lahus, 1ml 168TK	Bayer AG	100	I27.0-I27.0	Reumatoloog, Kardioloog, Pulmonoloog, Pediaater				NYHA III-IV kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafiil on vastunäidustatud, osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid
					50						
1566413	imatiniib, 100mg	L01EA0 1	MEAXIN, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	KRKA, d.d., Novo mesto	100	C49.9-C49.9, C16-C20	Onkoloog				patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: KIT-positiivse kõrge retsidiiviriskiga pahaloolumulise gastrointestinaalse stromaaltuumori adjuvantraviks kuni 3 aasta vältel ja KIT-positiivse mitteopereeritava või metastaseerunud pahaloolumulise gastrointestinaalse stromaaltuumori raviks, kui mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena
					100	C92.1-C92.1	Hematoloog				konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi ning imatiniibravi foonil püsib hematoloogiline ravivastus (haigus ei progresseeru)
					100	C83.5-C83.5, C91.0-C91.0	Hematoloog				patsiendile, kelle ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: Ph-positiivse B- rakulise lümfoblastleukeemia või -lümfoomi raviks kuni 3 aasta vältel või haiguse progresseerumiseni

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1588417	imatiniiib, 100mg	L01EA0 1	IMATINIB GRINDEKS, kõvakapsel, 120TK	Grindeks AS	100	C83.5-C83.5, C91.0-C91.0	Hematoloog				patsiendile, kelle ravi alustamine ja jätkamine imatiniiibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: Ph-positiivse B-rakulise lümfoblastleukeemia või -lümfoomi raviks kuni 3 aasta vältel või haiguse progresseerumiseni
					100	C49.9-C49.9, C16-C20	Onkoloog				patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine imatiniiibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: KIT-positiivse kõrge retsidiiviriskiga pahaloolumulise gastrointestinaalse stromaaltuumori adjuvantraviks kuni 3 aasta vältel ja KIT-positiivse mitteopereeritava või metastaseerunud pahaloolumulise gastrointestinaalse stromaaltuumori raviks, kui mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena
					100	C92.1-C92.1	Hematoloog				konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi ning imatiniiibravi foonil püsib hematoloogiline ravivastus (haigus ei progresseeru)
1604900	imatiniiib, 100mg	L01EA0 1	IMATINIB TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Teva B.V.	100	C83.5-C83.5, C91.0-C91.0	Hematoloog				patsiendile, kelle ravi alustamine ja jätkamine imatiniiibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: Ph-positiivse B-rakulise lümfoblastleukeemia või -lümfoomi raviks kuni 3 aasta vältel või haiguse progresseerumiseni
					100	C92.1-C92.1	Hematoloog				konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi ning imatiniiibravi foonil püsib hematoloogiline ravivastus (haigus ei progresseeru)
					100	C49.9-C49.9, C16-C20	Onkoloog				patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine imatiniiibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: KITpositiivse kõrge retsidiiviriskiga pahaloolumulise gastrointestinaalse stromaaltuumori adjuvantraviks kuni 3 aasta vältel ja KITpositiivse mitteopereeritava või metastaseerunud pahaloolumulise gastrointestinaalse stromaaltuumori raviks, kui mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1619726	imatiniiib, 100mg	L01EA0 1	IMATINIB ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	C92.1-C92.1	Hematoloog				konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi ning imatiniiibravi foonil püsib hematoloogiline ravivastus (haigus ei progresseeru)
					100	C49.9-C49.9, C16-C20	Onkoloog				patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine imatiniiibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: KIT-positiivse kõrge retsidiiviriskiga pahaloolumulise gastrointestinaalse stromaaltuumori adjuvantraviks kuni 3 aasta vältel ja KIT-positiivse mitteopereeritava või metastaseerunud pahaloolumulise gastrointestinaalse stromaaltuumori raviks, kui mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena
					100	C83.5-C83.5, C91.0-C91.0	Hematoloog				patsiendile, kelle ravi alustamine ja jätkamine imatiniiibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: Ph-positiivse B-rakulise lümfoblastleukeemia või -lümfoomi raviks kuni 3 aasta vältel või haiguse progresseerumiseni
1658448	imatiniiib, 100mg	L01EA0 1	GLIPOX, kõvakapsel, 120TK	Noramedia UAB	100	C83.5-C83.5, C91.0-C91.0	Hematoloog				patsiendile, kelle ravi alustamine ja jätkamine imatiniiibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: Ph-positiivse B-rakulise lümfoblastleukeemia või -lümfoomi raviks kuni 3 aasta vältel või haiguse progresseerumiseni
					100	C92.1-C92.1	Hematoloog				konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi ning imatiniiibravi foonil püsib hematoloogiline ravivastus (haigus ei progresseeru)
					100	C49.9-C49.9, C16-C20	Onkoloog				patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine imatiniiibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: KIT-positiivse kõrge retsidiiviriskiga pahaloolumulise gastrointestinaalse stromaaltuumori adjuvantraviks kuni 3 aasta vältel ja KIT-positiivse mitteopereeritava või metastaseerunud pahaloolumulise gastrointestinaalse stromaaltuumori raviks, kui mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1619759	imatiniiib, 400mg	L01EA0 1	IMATINIB ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	C92.1-C92.1	Hematoloog				konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi ning imatiniiibravi foonil püsib hematoloogiline ravivastus (haigus ei progresseeru)
					100	C49.9-C49.9, C16-C20	Onkoloog				patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine imatiniiibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: KIT-positiivse kõrge retsidiiviriskiga pahaloolumulise gastrointestinaalse stromaaltuumori adjuvantraviks kuni 3 aasta vältel ja KIT-positiivse mitteopereeritava või metastaseerunud pahaloolumulise gastrointestinaalse stromaaltuumori raviks, kui mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena
					100	C83.5-C83.5, C91.0-C91.0	Hematoloog				patsiendile, kelle ravi alustamine ja jätkamine imatiniiibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: Ph-positiivse B-rakulise lümfoblastleukeemia või -lümfoomi raviks kuni 3 aasta vältel või haiguse progresseerumiseni
1658471	imatiniiib, 400mg	L01EA0 1	GLIPOX, kõvakapsel, 30TK	Norameda UAB	100	C92.1-C92.1	Hematoloog				konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi ning imatiniiibravi foonil püsib hematoloogiline ravivastus (haigus ei progresseeru)
					100	C83.5-C83.5, C91.0-C91.0	Hematoloog				patsiendile, kelle ravi alustamine ja jätkamine imatiniiibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: Ph-positiivse B-rakulise lümfoblastleukeemia või -lümfoomi raviks kuni 3 aasta vältel või haiguse progresseerumiseni
					100	C49.9-C49.9, C16-C20	Onkoloog				patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine imatiniiibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: KIT-positiivse kõrge retsidiiviriskiga pahaloolumulise gastrointestinaalse stromaaltuumori adjuvantraviks kuni 3 aasta vältel ja KIT-positiivse mitteopereeritava või metastaseerunud pahaloolumulise gastrointestinaalse stromaaltuumori raviks, kui mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
7000085	imikute toitesegu,		APTAMIL Pepti MCT (APTAMIL DIGESTIVE CARE), pulber, 450 g N12	N.V. Nutricia	75	K52.2-K52.2, L27.2-L27.2, L50-L50, T78.1- T78.1, K22.8- K22.8, K90.4- K90.4, T78.2- T78.2, L20.8- L20.8, T78.0- T78.0				1,00	
7002863	imikute toitesegu,		FRISOLAC GOLD PEP AC, pulber, 400g	Friesland Foods BV	75	K52.2-K52.2, L27.2-L27.2, L50-L50, T78.1- T78.1, K22.8- K22.8, K90.4- K90.4, T78.2- T78.2, L20.8- L20.8, T78.0- T78.0				1,00	
7002874	imikute toitesegu,		FRISOLAC GOLD PREMATURE, pulber, 400g	Friesland Foods BV	75	P05-P05, E42- E42, P07-P07, P27.1-P27.1				0,58	
7002885	imikute toitesegu,		FRISOLAC GOLD PEP, pulber, 400g	Friesland Foods BV	75	K52.2-K52.2, L27.2-L27.2, L50-L50, T78.1- T78.1, K22.8- K22.8, K90.4- K90.4, T78.2- T78.2, L20.8- L20.8, T78.0- T78.0				1,00	
7017432	imikute toitesegu,		INFATRINI, suspensioon, 125ml N24	Nutricia	75	E42-E42				1,00	lastele, kellele on paigaldatud gastrostoom või jejunostoom



Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
7017971	imikute toitesegu,		Neocate (aminohapete segu), pulber, 400g N6	Nutrimedical OÜ	75	K52.2-K52.2, L27.2-L27.2, L50-L50, T78.1-T78.1, K22.8-K22.8, K90.4-K90.4, T78.2-T78.2, L20.8-L20.8, T78.0-T78.0				1,00	
7018095	imikute toitesegu,		APTAMIL HMF, pulber, 200g	Nutricia Cuijk bv	75	P05-P05, E42-E42, P07-P07, P27.1-P27.1				0,58	
7004933	imikute toitesegu,		APTAMIL PREMATIL, pulber, 400 g	Nutricia Cuijk BV.	75	P05-P05, E42-E42, P07-P07, P27.1-P27.1				0,58	
7018017	imikute toitesegu,		Aptamil Pepti Syneo, pulber, 400g N12	Nutricia Cuijk bv	75	K52.2-K52.2, L27.2-L27.2, L50-L50, T78.1-T78.1, K22.8-K22.8, K90.4-K90.4, T78.2-T78.2, L20.8-L20.8, T78.0-T78.0				1,00	
1060322	imikvimood, 5%	D06BB10	ALDARA, kreem, 250mg 12TK	VIATRIS HEALTHCARE Limited	50						
1452169	indakaterool, 150mcg	R03AC18	ONBREZ BREEZHALER, inhalatsioonipulber kõvakapslis, 30TK	Novartis Europharm Limited	50						
					75	J44-J44, J43-J43	Pulmonoloog	esmane			
1452215	indakaterool, 300mcg	R03AC18	ONBREZ BREEZHALER, inhalatsioonipulber kõvakapslis, 30TK	Novartis Europharm Limited	75	J44-J44, J43-J43	Pulmonoloog	esmane			
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1626555	indakaterool+glüko pürroonium, 85mcg+43mcg	R03AL0 4	ULTIBRO BREEZHALER, inhalatsioonipulber kõvakapslis, 30TK	Novartis Europharm Limited	75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			
					50						
1167780	indapamiid, 1,5mg	C03BA1 1	TERTENSIF SR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Les Laboratoires Servier	75	I15-I15, I10-I13, O10-O16, I50- I50					
					100	I27.0-I27.0					
					50						
1185230	indapamiid, 1,5mg	C03BA1 1	RAWEL SR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	KRKA, d.d., Novo mesto	75	I15-I15, I10-I13, O10-O16, I50- I50					
					100	I27.0-I27.0					
					50						
1379741	indapamiid, 1,5mg	C03BA1 1	INDAMAX, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	50						
					75	I15-I15, I10-I13, O10-O16, I50- I50					
					100	I27.0-I27.0					
1860746	indapamiid, 1,5mg	C03BA1 1	TERTENSIF SR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Ideal Trade Links UAB	50						
					100	I27.0-I27.0					
					75	I15-I15, I10-I13, O10-O16, I50- I50					
1019416	indapamiid, 2,5mg	C03BA1 1	TERTENSIF, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Les Laboratoires Servier	50						
					75	I15-I15, I10-I13, O10-O16, I50- I50					
					100	I27.0-I27.0					
1038383	indapamiid, 2,5mg	C03BA1 1	PROINDAP, kõvakapsel, 30TK	Pro.Med.Cs Praha a.s.	75	I15-I15, I10-I13, O10-O16, I50- I50					
					50						
					100	I27.0-I27.0					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1886261	inklisiraan, 284mg 1.5ml	C10AX1 6	LEQVIO, süstelahus süstlis, 1.5ml 1TK	Novartis Europharm Limited	100	I22-I22, Z95- Z95, I66-I66, I69-I69, I25-I25, I63-I63, I21-I21, I70.2-I70.2, I65- I65, I20.0-I20.0	Neuroloog, Kardioloog, vaskulaarkirurg	esmane			ägeda koronaarsündroomi (ÄKS, STEMI, NSTEMI, ebastabiilne stenokardia), isheemilise insuldi ja revaskulariseerimise (koronaararter, karotiidarter, perifeerse arteriaalse) järgselt (möödunud <=36 kuud) kombinatsioonis statiini ja esetimiibiga patsientidele, kelle LDL-C väärtus on >=2,6 mmol/l ja kellel vaatamata 1-3 kuud kestnud ravile maksimaalses talutavas annuses statiini ja esetimiibiga ei ole saavutatud LDL-kolesterooli eesmärgvärtust või kellele statiin/esetimiib on vastunäidustatud
					100	E78.0-E78.0	Kardioloog	esmane			kroonilise perekondliku hüperkolesteroleemia raviks dokumenteeritud ateroskleroosiga patsientidele, kui varasem ravi maksimaalselt talutavas annuses statiini ja esetimiibiga on osutunud ebapiisavaks või on need ravimid olnud vastunäidustatud ning patsiendi LDL-C väärtus on >=2,6 mmol/L
1105940	ipratroopiumbromiid, 20mcg 1annus	R03BB0 1	ATROVENT N, inhalatsiooniaerosool, lahus, 200annus 1TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	50						
					75	J45-J45					
					75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			
1699724	isavukonasool, 100mg	J02AC0 5	CRESEMBA, kõvakapsel, 14TK	Basilea Pharmaceutica Deutschland GmbH	100	B46-B46					kui ravi on alustatud haiglas
					100	B44-B44					kui ravi vorikonasooliga on olnud ebaefektiivne või vastunäidustatud ning ravi on alustatud haiglas
1000348	isokonasool, 10mg 1g	D01AC0 5	TRAVOGEN, kreem, 20g 1TK	LEO Pharma A/S	50						
1820191	isokonasool, 10mg 1g	D01AC0 5	TRAVOGEN, kreem, 30g 1TK	First Pharma OÜ	50						
1865156	isokonasool, 10mg 1g	D01AC0 5	TRAVOGEN, kreem, 30g 1TK	Ideal Trade Links UAB	50						
1000416	isokonasool+diflukortoloon, 10mg+1mg 1g	D01AC8 0	TRAVOCORT, kreem, 15g 1TK	LEO Pharma A/S	50						
1783830	isokonasool+diflukortoloon, 10mg+1mg 1g	D01AC8 0	TRAVOCORT, kreem, 30g 1TK	First Pharma OÜ	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1827659	isokonasool+difluk ortoloon, 10mg+1mg 1g	D01AC8 0	TRAVOCORT, kreem, 30g 1TK	Ideal Trade Links UAB	50						
1891380	isokonasool+difluk ortoloon, 10mg+1mg 1g	D01AC8 0	TRAVOCORT, kreem, 30g 1TK	Lex Ano UAB	50						
1043547	isosorbiitmononitra at, 20mg	C01DA1 4	MONOSAN 20 MG, tablett, 30TK	Pro.Med.Cs Praha a.s.	75	I20-I20					
					50						
1017010	isosorbiitmononitra at, 40mg	C01DA1 4	MONOSAN 40 MG, tablett, 30TK	Pro.Med.Cs Praha a.s.	75	I20-I20					
					50						
1046786	isosorbiitmononitra at, 60mg	C01DA1 4	IMDUR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	TopRidge Pharma (Ireland) Limited	75	I20-I20					
					50						
1127584	isosorbiitmononitra at, 60mg	C01DA1 4	ISOMONIT 60 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Hexal AG	50						
					75	I20-I20					
1252741	isosorbiitmononitra at, 60mg	C01DA1 4	ISOMONIT 60 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	Hexal AG	50						
					75	I20-I20					
1004364	isotretinoiin, 10mg	D10BA0 1	ROACCUTANE 10 MG, pehmekapsel, 30TK	Roche Eesti Osaühing	75	L70.0-L70.0, L71.8-L71.8, L70.1-L70.2	Dermatovenerol oog				
					50						
					75	L43-L43	Pediaater, Dermatovenerol oog				
1790007	isotretinoiin, 10mg	D10BA0 1	ISOTRETINOIN SANDOZ, pehmekapsel, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	L70.0-L70.0, L71.8-L71.8, L70.1-L70.2	Dermatovenerol oog				
					75	L43-L43	Pediaater, Dermatovenerol oog				
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1112230	isotretinoiin, 20mg	D10BA01	ROACCUTANE 20 MG, pehmekapsel, 30TK	Roche Eesti Osühing	50						
					75	L43-L43	Dermatoveneroloog, Pediaater				
					75	L70.0-L70.0, L71.8-L71.8, L70.1-L70.2	Dermatoveneroloog				
1790041	isotretinoiin, 20mg	D10BA01	ISOTRETINOIN SANDOZ, pehmekapsel, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	L70.0-L70.0, L71.8-L71.8, L70.1-L70.2	Dermatoveneroloog				
					75	L43-L43	Pediaater, Dermatoveneroloog				
					50						
1833599	isotretinoiin, 20mg	D10BA01	ISOTIORGA, pehmekapsel, 30TK	Laboratoires Bailleul S.A.	75	L70.0-L70.0, L71.8-L71.8, L70.1-L70.2	Dermatoveneroloog				
					50						
					75	L43-L43	Dermatoveneroloog, Pediaater				
1164035	itrakonasool, 100mg	J02AC02	PROKANAZOL, kõvakapsel, 4TK	Pro.Med.Cs Praha a.s.	50						
					100	B45-B45, B48.2-B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44-B44					kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks
1164057	itrakonasool, 100mg	J02AC02	PROKANAZOL, kõvakapsel, 28TK	Pro.Med.Cs Praha a.s.	100	B45-B45, B48.2-B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44-B44					kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1183553	itrakonasool, 100mg	J02AC0 2	CLADOSOL 100MG, kõvakapsel, 14TK	Stada Arzneimittel AG	100	B45-B45, B48.2- B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44-B44					kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks
					50						
1230488	itrakonasool, 100mg	J02AC0 2	ITRACONAZOL ACTAVIS, kõvakapsel, 28TK	Teva B.V.	50						
					100	B45-B45, B48.2- B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44-B44					kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks
1219553	ivabradiin, 5mg	C01EB1 7	PROCORALAN, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Les Laboratoires Servier	50						
1700772	ivabradiin, 5mg	C01EB1 7	IVABRADINE GRINDEKS, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Grindeks AS	50						
1715712	ivabradiin, 5mg	C01EB1 7	IVABRADINE MYLAN, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Mylan Pharmaceuticals Limited	50						
1746378	ivabradiin, 5mg	C01EB1 7	IVABRADINE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Accord Healthcare S.L.U.	50						
1219485	ivabradiin, 7,5mg	C01EB1 7	PROCORALAN, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Les Laboratoires Servier	50						
1700783	ivabradiin, 7,5mg	C01EB1 7	IVABRADINE GRINDEKS, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Grindeks AS	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1746446	ivabradiin, 7,5mg	C01EB1 7	IVABRADINE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Accord Healthcare S.L.U.	50						
1821057	ivakaftoor, 150mg	R07AX0 2	KALYDECO, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited	100	E84-E84	Pediaater, Pulmonoloog				koos ivakaftoori/tesakaftoori/eleksakaftoori tablettidega tsüstilise fibroosi kombinatsioonraviks patsientidele, kellel on tsüstilise fibroosi transmembraanse juhtivuse regulaatorgeenis vähemalt üks F508del-mutatsioon
3058253	ivakaftoor, 59,5mg	R07AX0 2	KALYDECO, graanulid kotikeses, 28TK	Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited	100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater				koos ivakaftoori/tesakaftoori/eleksakaftoori tablettidega tsüstilise fibroosi kombinatsioonraviks patsientidele, kellel on tsüstilise fibroosi transmembraanse juhtivuse regulaatorgeenis vähemalt üks F508del-mutatsioon
1834534	ivakaftoor, 75mg	R07AX0 2	KALYDECO, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited	100	E84-E84	Pediaater, Pulmonoloog				koos ivakaftoori/tesakaftoori/eleksakaftoori tablettidega tsüstilise fibroosi kombinatsioonraviks patsientidele, kellel on tsüstilise fibroosi transmembraanse juhtivuse regulaatorgeenis vähemalt üks F508del-mutatsioon
3061516	ivakaftoor, 75mg	R07AX0 2	KALYDECO, graanulid kotikeses, 28TK	Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited	100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater				koos ivakaftoori/tesakaftoori/eleksakaftoori tablettidega tsüstilise fibroosi kombinatsioonraviks patsientidele, kellel on tsüstilise fibroosi transmembraanse juhtivuse regulaatorgeenis vähemalt üks F508del-mutatsioon
1872211	ivakaftoor+tesakaft oor+eleksakaftoor, 37,5mg+25mg+50 mg	R07AX3 2	KAFTRIO, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited	100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater				koos ivakaftooriga tsüstilise fibroosi kombinatsioonraviks patsientidele, kellel on tsüstilise fibroosi transmembraanse juhtivuse regulaatorgeenis vähemalt üks F508del-mutatsioon
3059771	ivakaftoor+tesakaft oor+eleksakaftoor, 60mg+40mg+80m g	R07AX3 2	KAFTRIO, graanulid kotikeses, 28TK	Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited	100	E84-E84	Pediaater, Pulmonoloog				koos ivakaftooriga tsüstilise fibroosi kombinatsioonraviks patsientidele, kellel on tsüstilise fibroosi transmembraanse juhtivuse regulaatorgeenis vähemalt üks F508del-mutatsioon
1826232	ivakaftoor+tesakaft oor+eleksakaftoor, 75mg+50mg+100 mg	R07AX3 2	KAFTRIO, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited	100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater				koos ivakaftooriga tsüstilise fibroosi kombinatsioonraviks patsientidele, kellel on tsüstilise fibroosi transmembraanse juhtivuse regulaatorgeenis vähemalt üks F508del-mutatsioon
3059782	ivakaftoor+tesakaft oor+eleksakaftoor, 75mg+50mg+100 mg	R07AX3 2	KAFTRIO, graanulid kotikeses, 28TK	Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited	100	E84-E84	Pediaater, Pulmonoloog				koos ivakaftooriga tsüstilise fibroosi kombinatsioonraviks patsientidele, kellel on tsüstilise fibroosi transmembraanse juhtivuse regulaatorgeenis vähemalt üks F508del-mutatsioon

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1718535	IX hüübimisfaktor, 1000RÜ	B02BD0 4	ALPROLIX, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)	100	D67-D67	Hematoloog, Pediaater, Pediaater – hematoloog- onkoloog				verejooksu episoodide ennetamiseks B- hemofiiliaga patsientidele, kellel on raskendatud veenisiseste süstete teostamine ning seetõttu pole võimalik kasutada profülaktilises annuses vereplasmast valmistatud IX hüübimisfaktorit
1038068	IX hüübimisfaktor, 1200RÜ	B02BD0 4	IMMUNINE, süste- /infusioonilahuse pulber ja lahusti, 1TK	Baxalta Innovations GmbH	100	D67-D67	Pediaater, Hematoloog, Pediaater – hematoloog- onkoloog				
1718546	IX hüübimisfaktor, 2000RÜ	B02BD0 4	ALPROLIX, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)	100	D67-D67	Hematoloog, Pediaater, Pediaater – hematoloog- onkoloog				verejooksu episoodide ennetamiseks B- hemofiiliaga patsientidele, kellel on raskendatud veenisiseste süstete teostamine ning seetõttu pole võimalik kasutada profülaktilises annuses vereplasmast valmistatud IX hüübimisfaktorit
1718513	IX hüübimisfaktor, 250RÜ	B02BD0 4	ALPROLIX, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)	100	D67-D67	Pediaater – hematoloog- onkoloog, Pediaater, Hematoloog				verejooksu episoodide ennetamiseks B- hemofiiliaga patsientidele, kellel on raskendatud veenisiseste süstete teostamine ning seetõttu pole võimalik kasutada profülaktilises annuses vereplasmast valmistatud IX hüübimisfaktorit
1718557	IX hüübimisfaktor, 3000RÜ	B02BD0 4	ALPROLIX, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)	100	D67-D67	Pediaater, Hematoloog, Pediaater – hematoloog- onkoloog				verejooksu episoodide ennetamiseks B- hemofiiliaga patsientidele, kellel on raskendatud veenisiseste süstete teostamine ning seetõttu pole võimalik kasutada profülaktilises annuses vereplasmast valmistatud IX hüübimisfaktorit
1718524	IX hüübimisfaktor, 500RÜ	B02BD0 4	ALPROLIX, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)	100	D67-D67	Hematoloog, Pediaater, Pediaater – hematoloog- onkoloog				verejooksu episoodide ennetamiseks B- hemofiiliaga patsientidele, kellel on raskendatud veenisiseste süstete teostamine ning seetõttu pole võimalik kasutada profülaktilises annuses vereplasmast valmistatud IX hüübimisfaktorit
1038057	IX hüübimisfaktor, 600RÜ	B02BD0 4	IMMUNINE, süste- /infusioonilahuse pulber ja lahusti, 1TK	Baxalta Innovations GmbH	100	D67-D67	Pediaater, Hematoloog, Pediaater – hematoloog- onkoloog				



Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1728840	kabosantiniib, 20mg	L01EX0 7	CABOMETYX, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Ipsen Pharma	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumis heledarakulise neeru kartsinoomi raviks heas üldseisundis (ECOG 0–1) patsientidele teise rea raviks ning heas üldseisundis (ECOG 0–1) patsientidele kolmanda rea raviks, kui sunitiniib ja pasopaniib on vastunäidustatud või ebaefektiivsed
1728862	kabosantiniib, 40mg	L01EX0 7	CABOMETYX, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Ipsen Pharma	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumis heledarakulise neeru kartsinoomi raviks heas üldseisundis (ECOG 0–1) patsientidele teise rea raviks ning heas üldseisundis (ECOG 0–1) patsientidele kolmanda rea raviks, kui sunitiniib ja pasopaniib on vastunäidustatud või ebaefektiivsed
1728884	kabosantiniib, 60mg	L01EX0 7	CABOMETYX, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Ipsen Pharma	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumis heledarakulise neeru kartsinoomi raviks heas üldseisundis (ECOG 0–1) patsientidele teise rea raviks ning heas üldseisundis (ECOG 0–1) patsientidele kolmanda rea raviks, kui sunitiniib ja pasopaniib on vastunäidustatud või ebaefektiivsed
1093340	kaltsipotriool+beet ametasoon, 50mcg+0,5mg 1g	D05AX8 0	DAIVOBET, salv, 30g 1TK	LEO Pharma A/S	75	L40-L40					
					50						
1534621	kaltsipotriool+beet ametasoon, 50mcg+0,5mg 1g	D05AX8 0	DAIVOBET, geel, 30g 1TK	LEO Pharma A/S	75	L40-L40					
					50						
1676369	kaltsipotriool+beet ametasoon, 50mcg+0,5mg 1g	D05AX8 0	CABEMET, salv, 30g 1TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	L40-L40					
					50						
1676370	kaltsipotriool+beet ametasoon, 50mcg+0,5mg 1g	D05AX8 0	CABEMET, salv, 60g 1TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	L40-L40					
1680050	kaltsipotriool+beet ametasoon, 50mcg+0,5mg 1g	D05AX8 0	ENSTILAR, nahavaht, 60g 1TK	LEO Pharma A/S	50						
					75	L40-L40					
3030871	kaltsipotriool+beet ametasoon, 50mcg+0,5mg 1g	D05AX8 0	DAIVOBET, salv, 15g 2TK	Ideal Trade Links UAB	75	L40-L40					
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1004599	kaltsitriool, 0,25mcg	A11CC0 4	ROCALTROL, pehmekapsel, 30TK	Atnahs Pharma Netherlands B.V.	50						
					100	E89.2-E89.2, E20-E20	Pediaater, Endokrinoloog				
					100	N25-N25, N18- N18	Pediaater, Nefroloog				
1392016	kaltsium+kolekaltsi ferool, 500mg+400RÜ	A12AX8 0	CALCIGRAN FORTE, närimistablett, 120TK	Orifarm Healthcare A/S	75	M80-M80					kombinatsioonravi osana patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna
					100	N18-N18					
1046337	kaltsiumkarbonaat, 1250mg	A12AA0 4	CALCIGRAN SINE, närimistablett, 100TK	Orifarm Healthcare A/S	100	E89.2-E89.2, E20-E20	Endokrinoloog, Pediaater				
					100	N18-N18					
1776483	kaltsiumkarbonaat, 1250mg	A12AA0 4	CALCIGRAN SINE, närimistablett, 120TK	Orifarm Healthcare A/S	100	E89.2-E89.2, E20-E20	Endokrinoloog, Pediaater				
					100	N18-N18					
1291070	kandesartaan, 16mg	C09CA0 6	PRESCANDEN 16MG, tablett, 56TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1455061	kandesartaan, 16mg	C09CA0 6	CANDESARTAN ACTAVIS, tablett, 28TK	Actavis Group Ptc ehf.	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1487572	kandesartaan, 16mg	C09CA0 6	CARZAN 16MG, tablett, 28TK	Zentiva k.s.	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1497630	kandesartaan, 16mg	C09CA0 6	CANOCORD 16 MG, tablett, 30TK	KRKA, d.d., Novo mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1183867	kandesartaan, 32mg	C09CA0 6	ATACAND, tablett, 28TK	Cheplapharm Arzneimittel GmbH	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1396470	kandesartaan, 32mg	C09CA0 6	PRESCANDEN 32MG, tablett, 56TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	I10-I13, I15-I15, I50-I50					
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1487651	kandesartaan, 32mg	C09CA0 6	CARZAN 32MG, tablett, 28TK	Zentiva k.s.	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1497719	kandesartaan, 32mg	C09CA0 6	CANOCORD 32 MG, tablett, 30TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1497551	kandesartaan, 8mg	C09CA0 6	CANOCORD 8 MG, tablett, 30TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1589665	kandesartaan+aml odipiin, 16mg+10mg	C09DB0 7	ZENICAMO, tablett, 28TK	Zentiva k.s.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1355879	kandesartaan+hüd roklorotiasiid, 16mg+12,5mg	C09DA8 4	PRESCANDEN HCT 16 MG/12,5 MG, tablett, 28TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1455375	kandesartaan+hüd roklorotiasiid, 16mg+12,5mg	C09DA8 4	CANDESARTAN HCT ACTAVIS, tablett, 28TK	Actavis Group Ptc ehf.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1487819	kandesartaan+hüd roklorotiasiid, 16mg+12,5mg	C09DA8 4	CARZAN HCT 16MG/12,5MG, tablett, 28TK	Zentiva k.s.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1634419	kandesartaan+hüd roklorotiasiid, 16mg+12,5mg	C09DA8 4	CANOCOMBI, tablett, 30TK	KRKA, d.d., Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1634600	kandesartaan+hüd roklorotiasiid, 32mg+12,5mg	C09DA8 4	CANOCOMBI, tablett, 30TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1634329	kandesartaan+hüd roklorotiasiid, 32mg+25mg	C09DA8 4	CANOCOMBI, tablett, 30TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1634510	kandesartaan+hüd roklorotiasiid, 8mg+12,5mg	C09DA8 4	CANOCOMBI, tablett, 30TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
					75	I10-I13, I15-I15					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1801460	kannabidiool, 100mg 1ml	N03AX2 4	EPIDYOLEX, suukaudne lahus, 100ml 1TK	Jazz Pharmaceuticals Ireland Limited	100	G40.4-G40.4	Pediaater – neuroloog, Neuroloog				koos klobasaamiga Lennox-Gastaut' sündroomi, Dravet' sündroomi või tuberoosse skleroosi kompleksiga seotud epileptiliste hoogude lisaraviks alates 2-aastastel patsientidel, tingimusel, et raviefekti hinnatakse iga 6 kuu järel. Juhul kui ravieelse perioodiga võrreldes ei ole epilepsiahood vähenenud vähemalt 30%, ravi lõpetatakse
1567986	kapetsitabiin, 150mg	L01BC0 6	CAPECITABINE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	C18-C20	Onkoloog				kolorektaalvähi adjuvantseks ja palliatiivseks monokemoteraapiaks
					50						
					100	C22-C25	Onkoloog				biliopankreaatilise süsteemi kasvajate adjuvantraviks
1540099	kapetsitabiin, 500mg	L01BC0 6	CAPECITABINE ZENTIVA 500 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Zentiva k.s.	50						
					100	C18-C20	Onkoloog				kolorektaalvähi adjuvantseks ja palliatiivseks monokemoteraapiaks
					100	C22-C25	Onkoloog				biliopankreaatilise süsteemi kasvajate adjuvantraviks
1568055	kapetsitabiin, 500mg	L01BC0 6	CAPECITABINE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Accord Healthcare S.L.U.	50						
					100	C22-C25	Onkoloog				biliopankreaatilise süsteemi kasvajate adjuvantraviks
					100	C18-C20	Onkoloog				kolorektaalvähi adjuvantseks ja palliatiivseks monokemoteraapiaks
1077117	karbamasepiin, 150mg	N03AF0 1	TIMONIL 150 RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	Desitin Arzneimittel GmbH	75	G50.0-G50.0					
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50						
					100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4- F11.7, F18.4- F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3- F60.3, F13.4- F13.7, F10.4- F10.7, F17.4- F17.7, F15.4- F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1042311	karbamasepiin, 200mg	N03AF0 1	CARBALEX 200 MG, tablett, 50TK	G.L. Pharma GmbH	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50						
					100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4- F11.7, F18.4- F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3- F60.3, F13.4- F13.7, F10.4- F10.7, F17.4- F17.7, F15.4- F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
					75	G50.0-G50.0					
1077207	karbamasepiin, 300mg	N03AF0 1	TIMONIL 300 RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	Desitin Arzneimittel GmbH	75	G50.0-G50.0					
					100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4- F11.7, F18.4- F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3- F60.3, F13.4- F13.7, F10.4- F10.7, F17.4- F17.7, F15.4- F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1115592	karbamasepiin, 300mg	N03AF0 1	CARBALEX RETARD 300 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 50TK	G.L. Pharma GmbH	50						
					75	G50.0-G50.0					
					100	F18.4-F18.7, F33.2-F33.3, F70-F79, F00- F09, F15.4- F15.7, F14.4- F14.7, F12.4- F12.7, F30-F31, F11.4-F11.7, F60.3-F60.3, F10.4-F10.7, F16.4-F16.7, F32.2-F32.3, F13.4-F13.7, F20-F29, F19.4- F19.7	Psühhiaater	esmane			
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
1042322	karbamasepiin, 400mg	N03AF0 1	CARBALEX 400 MG, tablett, 50TK	G.L. Pharma GmbH	100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4- F11.7, F18.4- F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3- F60.3, F13.4- F13.7, F10.4- F10.7, F17.4- F17.7, F15.4- F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					75	G50.0-G50.0					
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1007716	karbamasepiin, 600mg	N03AF0 1	TIMONIL 600 RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 50TK	Desitin Arzneimittel GmbH	50						
					75	G50.0-G50.0					
					100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4- F11.7, F18.4- F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3- F60.3, F13.4- F13.7, F10.4- F10.7, F17.4- F17.7, F15.4- F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
1042333	karbamasepiin, 600mg	N03AF0 1	CARBALEX RETARD 600 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 50TK	G.L. Pharma GmbH	100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4- F11.7, F18.4- F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3- F60.3, F13.4- F13.7, F10.4- F10.7, F17.4- F17.7, F15.4- F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
					50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					75	G50.0-G50.0					
1749821	kariprasiin, 1,5mg	N05AX1 5	REAGILA, kõvakapsel, 28TK	Gedeon Richter Plc.	100	F20-F29, F30- F31	Psühhiaater				

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1749922	kariprasiin, 3mg	N05AX1 5	REAGILA, kõvakapsel, 28TK	Gedeon Richter Plc.	100	F20-F29, F30- F31	Psühhiaater				
1750025	kariprasiin, 4,5mg	N05AX1 5	REAGILA, kõvakapsel, 28TK	Gedeon Richter Plc.	100	F20-F29, F30- F31	Psühhiaater				
1750104	kariprasiin, 6mg	N05AX1 5	REAGILA, kõvakapsel, 28TK	Gedeon Richter Plc.	100	F20-F29, F30- F31	Psühhiaater				
1110564	karvedilool, 12,5mg	C07AG0 2	CARVEDILOLHEXAL 12,5 MG, tablett, 30TK	Hexal AG	50						
					75	I50-I50, I47-I49					
1110520	karvedilool, 25mg	C07AG0 2	CARVEDILOLHEXAL 25 MG, tablett, 30TK	Hexal AG	50						
					75	I50-I50, I47-I49					
1110609	karvedilool, 6,25mg	C07AG0 2	CARVEDILOLHEXAL 6,25 MG, tablett, 30TK	Hexal AG	50						
					75	I50-I50, I47-I49					
1115637	keskmise toimeajaga humaaninsuliin, 100RÜ 1ml	A10AC0 1	HUMULIN N KWIKPEN, süstesuspensioon pen- süstlis, 3ml 5TK	Eli Lilly Nederland B.V.	100	O24-O24, E13- E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1					
					50						
1018189	ketokonasool, 20mg 1g	D01AC0 8	NIZORAL, kreem, 15g 1TK	Stada Arzneimittel AG	50						
1073461	ketoprofeen, 100mg	M01AE0 3	KETO, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Vitabalans Oy	50						
					75	M30-M35, M05- M08, M45-M46					
					100	C00-D48					
					75	M15-M19			63,00		
1073483	ketoprofeen, 100mg	M01AE0 3	KETO, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Vitabalans Oy	75	M30-M35, M05- M08, M45-M46					
					75	M15-M19			63,00		
					100	C00-D48					
					50						
1752443	kladribiin, 10mg	L04AA4 0	MAVENCLAD, tablett, 1TK	Merck Europe B.V.	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel ägenemistega kulgeva hulgiskleroosi raviks
1028887	klaritromütsiin, 250mg	J01FA09	FROMILID, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	KRKA d.d. Novo mesto	75	H65-H67, J13- J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliiniga
					50						



Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1032747	klaritromütsiin, 250mg	J01FA09	KLACID 250 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Viartis SIA	75	H65-H67, J13- J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliiniga
					50						
1110261	klaritromütsiin, 250mg	J01FA09	KLERIMED 250MG, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Medochemie Limited	50						
					75	H65-H67, J13- J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliiniga
1549582	klaritromütsiin, 250mg	J01FA09	CLARITHROMYCIN GRINDEKS, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Grindeks AS	50						
					75	H65-H67, J13- J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliiniga
1068881	klaritromütsiin, 25mg 1ml	J01FA09	KLACID 125 MG/5 ML, suukaudse suspensiooni graanulid, 100ml 1TK	Viartis SIA	75	H65-H67, J13- J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliiniga
					50						
1028876	klaritromütsiin, 500mg	J01FA09	FROMILID, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	KRKA d.d. Novo mesto	50						
					75	H65-H67, J13- J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliiniga
1032758	klaritromütsiin, 500mg	J01FA09	KLACID SR 500 MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 5TK	Viartis SIA	50						
					75	H65-H67, J13- J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliiniga
1068904	klaritromütsiin, 500mg	J01FA09	KLACID SR 500 MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 7TK	Viartis SIA	50						
					75	H65-H67, J13- J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliiniga
1110238	klaritromütsiin, 500mg	J01FA09	KLERIMED 500MG, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Medochemie Limited	75	H65-H67, J13- J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliiniga
					50						
1141276	klaritromütsiin, 500mg	J01FA09	FROMILID UNO, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 5TK	KRKA d.d. Novo mesto	50						
					75	H65-H67, J13- J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliiniga

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1141287	klaritromütsiin, 500mg	J01FA09	FROMILID UNO, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 7TK	KRKA d.d. Novo mesto	50						
					75	H65-H67, J13- J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliiniga
1166677	klaritromütsiin, 500mg	J01FA09	KLABAX, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.	50						
					75	H65-H67, J13- J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliiniga
1405460	klaritromütsiin, 500mg	J01FA09	KLACID, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Viatris SIA	50						
					75	H65-H67, J13- J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliiniga
1549627	klaritromütsiin, 500mg	J01FA09	CLARITHROMYCIN GRINDEKS, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Grindeks AS	50						
					75	H65-H67, J13- J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliiniga
1011160	klindamütsiin, 100mg	G01AA1 0	DALACIN, vaginaalsuposiit, 3TK	Pfizer Europe MA EEIG	50						
1007503	klindamütsiin, 150mg	J01FF01	DALACIN C, kõvakapsel, 16TK	Pfizer Europe MA EEIG	50						
1007536	klindamütsiin, 300mg	J01FF01	DALACIN C, kõvakapsel, 16TK	Pfizer Europe MA EEIG	50						
1108561	klindamütsiin, 300mg	J01FF01	CLINDAMYCIN - MIP 300, õhukese polümeerikattega tablett, 16TK	MIP Pharma GmbH	50						
1865101	klindamütsiin, 300mg	J01FF01	DALACIN C, kõvakapsel, 16TK	Lex Ano UAB	50						
1108606	klindamütsiin, 600mg	J01FF01	CLINDAMYCIN - MIP 600, õhukese polümeerikattega tablett, 16TK	MIP Pharma GmbH	50						
1432268	klindamütsiin, 600mg	J01FF01	CLINDAMYCIN - MIP 600, õhukese polümeerikattega tablett, 32TK	MIP Pharma GmbH	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1527814	klindamütsiin+treti noin, 10mg+0,25mg 1g	D10AF8 2	TRECLINAC, geel, 30g 1TK	VIATRIS HEALTHCARE Limited	50						
1005208	klobetasool, 500mcg 1g	D07AD0 1	DERMOVATE OINTMENT, salv, 25g 1TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50						
1005242	klobetasool, 500mcg 1g	D07AD0 1	DERMOVATE CREAM, kreem, 25g 1TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50						
1005286	klobetasool, 500mcg 1ml	D07AD0 1	DERMOVATE, nahalahus, 25ml 1TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50						
1829325	klobetasool, 500mcg 1ml	D07AD0 1	DERMOVATE, nahalahus, 25ml 1TK	Lex Ano UAB	50						
1842386	klobetasool, 500mcg 1ml	D07AD0 1	DERMOVATE, nahalahus, 25ml 1TK	Ideal Trade Links UAB	50						
3041659	klobetasool, 500mcg 1ml	D07AD0 1	DERMOVATE, nahalahus, 50ml 1TK	Lex Ano UAB	50						
1011407	klomipramiin, 10mg	N06AA0 4	ANAFRANIL, kaetud tablett, 30TK	pharmaand GmbH	50						
1001462	klomipramiin, 25mg	N06AA0 4	ANAFRANIL, kaetud tablett, 30TK	Pharmaand GmbH	50						
1011418	klomipramiin, 75mg	N06AA0 4	ANAFRANIL SR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 20TK	pharmaand GmbH	50						
1004544	klonasepaam, 2mg	N03AE0 1	RIVOTRIL, tablett, 30TK	Cheplapharm Arzneimittel GmbH	50	G20-G26, G63- G63					
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
1007345	kloorambutsiil, 2mg	L01AA0 2	LEUKERAN, õhukese polümeerikattega tablett, 25TK	Aspen Pharma Trading Limited	50						
					100	C00-D48	Hematoloog, Onkoloog				
1044357	klooramfenikool, 5mg 1ml	S01AA0 1	OFTAN AKVAKOL, silmatilgad, lahus, 10ml 1TK	Santen Oy	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1356937	kloormadinoon+et ünüülöstradiol, 2mg+0,03mg	G03AA1 5	CLORMETIN 2 MG/0,03 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 21TK	Exeltis Baltics UAB	50						
					75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
1356948	kloormadinoon+et ünüülöstradiol, 2mg+0,03mg	G03AA1 5	CLORMETIN 2 MG/0,03 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 63TK	Exeltis Baltics UAB	75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
					50						
1006063	kloorprotikseen, 25mg	N05AF0 3	TRUXAL, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	H. Lundbeck A/S	100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4- F11.7, F18.4- F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3- F60.3, F13.4- F13.7, F10.4- F10.7, F17.4- F17.7, F15.4- F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1006096	kloorprotikseen, 50mg	N05AF0 3	TRUXAL, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	H. Lundbeck A/S	100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4- F11.7, F18.4- F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3- F60.3, F13.4- F13.7, F10.4- F10.7, F17.4- F17.7, F15.4- F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
					50						
1040588	klopidogreel, 75mg	B01AC0 4	PLAVIX, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Sanofi-Aventis Groupe	75	Z95-Z95, I21- I22, I25.2-I25.2	Sisearst, Kardioloog	esmane			müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12 kuu vältel
					50						
1065743	klopidogreel, 75mg	B01AC0 4	PLAVIX, õhukese polümeerikattega tablett, 84TK	Sanofi-Aventis Groupe	50						
					75	Z95-Z95, I21- I22, I25.2-I25.2	Kardioloog, Sisearst	esmane			müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12 kuu vältel
1357141	klopidogreel, 75mg	B01AC0 4	TROMBEX 75 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Zentiva k.s.	75	Z95-Z95, I21- I22, I25.2-I25.2	Kardioloog, Sisearst	esmane			müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12 kuu vältel
					50						
1367197	klopidogreel, 75mg	B01AC0 4	CLOPIDOGREL SANOSWISS 75MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Sanoswiss UAB	75	Z95-Z95, I21- I22, I25.2-I25.2	Kardioloog, Sisearst	esmane			müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12 kuu vältel
					50						
1431256	klopidogreel, 75mg	B01AC0 4	CLOPIDOGREL ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					75	Z95-Z95, I21- I22, I25.2-I25.2	Kardioloog, Sisearst	esmane			müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12 kuu vältel

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1437465	klopidogreel, 75mg	B01AC0 4	ZYLLET, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
					75	Z95-Z95, I21- I22, I25.2-I25.2	Kardioloog, Sisearst	esmane			müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12 kuu vältel
1437500	klopidogreel, 75mg	B01AC0 4	ZYLLET, õhukese polümeerikattega tablett, 84TK	KRKA, d.d., Novo mesto	75	Z95-Z95, I21- I22, I25.2-I25.2	Sisearst, Kardioloog	esmane			müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12 kuu vältel
					50						
1448489	klopidogreel, 75mg	B01AC0 4	CLOPIDOGREL KRKA, õhukese polümeerikattega tablett, 84TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
					75	Z95-Z95, I21- I22, I25.2-I25.2	Kardioloog, Sisearst	esmane			müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12 kuu vältel
1004724	klosapiin, 100mg	N05AH0 2	LEPONEX, tablett, 50TK	Viatris SIA	100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4- F11.7, F18.4- F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3- F60.3, F13.4- F13.7, F10.4- F10.7, F17.4- F17.7, F15.4- F15.7, F30-F31					
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1663859	klosapiin, 100mg	N05AH02	CLOZAPINE ACCORD, tablett, 50TK	Accord Healthcare B.V.	100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31					
					50						
1004768	klosapiin, 25mg	N05AH02	LEPONEX, tablett, 50TK	Viatris SIA	100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31					
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1663657	klosapiin, 25mg	N05AH02	CLOZAPINE ACCORD, tablett, 30TK	Accord Healthcare B.V.	100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31					
					50						
1033692	klotrimasool, 1%/100mg	G01AF02	CANIFUG CREMOLUM, kreem + vaginaalsuposiit, 20g 1TK / 6TK	Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel	50						
1033726	klotrimasool, 100mg	G01AF02	CANIFUG CREMOLUM, vaginaalsuposiit, 6TK	Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel	50						
1045123	klotrimasool, 100mg	G01AF02	KLOTTRIMASOOL GSK, vaginaaltablett, 6TK	GlaxoSmithKline Trading Services Limited	50						
1831014	klotrimasool, 100mg	G01AF02	KLOTTRIMASOOL GSK, vaginaaltablett, 6TK	Ideal Trade Links UAB	50						
1893562	klotrimasool, 100mg	G01AF02	KLOTTRIMASOOL GSK, vaginaaltablett, 6TK	Ideal Trade Links UAB	50						
1140815	kodeiin+paratsetamol, 30mg+500mg	N02AJ06	PARACETAMOL/CODEINE VITABALANS, tablett, 30TK	Vitabalans Oy	50						
1140826	kodeiin+paratsetamol, 30mg+500mg	N02AJ06	PARACETAMOL/CODEINE VITABALANS, tablett, 100TK	Vitabalans Oy	50						



Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1485187	kodeiin+paratseta mool, 30mg+500mg	N02AJ0 6	ALGOCALM, tablett, 30TK	Zentiva k.s.	50						
1485200	kodeiin+paratseta mool, 30mg+500mg	N02AJ0 6	ALGOCALM, tablett, 100TK	Zentiva k.s.	50						
1241356	kvetiapiin, 100mg	N05AH0 4	KETIPINOR, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Orion Corporation	100	F20-F29, F30- F31	Psühhiaater				
					50						
1258297	kvetiapiin, 100mg	N05AH0 4	KVENTIAX, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	KRKA d.d. Novo mesto	50						
					100	F20-F29, F30- F31	Psühhiaater				
3048544	kvetiapiin, 100mg	N05AH0 4	KVENTIAX, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Ideal Trade Links UAB	50						
					100	F20-F29, F30- F31	Psühhiaater				
1636792	kvetiapiin, 150mg	N05AH0 4	KVENTIAX SR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	KRKA, d.d., Novo mesto	100	F20-F29, F30- F31	Psühhiaater				
					50						
1683750	kvetiapiin, 150mg	N05AH0 4	QUETIAPINE ACCORD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					100	F20-F29, F30- F31	Psühhiaater				
1115086	kvetiapiin, 200mg	N05AH0 4	SEROQUEL, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Cheplapharm Arzneimittel GmbH	100	F20-F29, F30- F31	Psühhiaater				
					50						
1241378	kvetiapiin, 200mg	N05AH0 4	KETIPINOR, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Orion Corporation	100	F20-F29, F30- F31	Psühhiaater				
					50						
1258477	kvetiapiin, 200mg	N05AH0 4	KVENTIAX, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	KRKA d.d. Novo mesto	50						
					100	F20-F29, F30- F31	Psühhiaater				
1301847	kvetiapiin, 200mg	N05AH0 4	QUETIAPINE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Teva Pharma B.V.	50						
					100	F20-F29, F30- F31	Psühhiaater				

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1454059	kvetiapiin, 200mg	N05AH04	QUETIAPINE ACCORD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	Accord Healthcare B.V.	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					50						
1636859	kvetiapiin, 200mg	N05AH04	KVENTIAX SR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
1241334	kvetiapiin, 25mg	N05AH04	KETIPINOR, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Orion Corporation	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
1258208	kvetiapiin, 25mg	N05AH04	KVENTIAX, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	KRKA d.d. Novo mesto	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
1258242	kvetiapiin, 25mg	N05AH04	KVENTIAX, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	KRKA d.d. Novo mesto	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
1377503	kvetiapiin, 25mg	N05AH04	QUETIAPINE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
1879690	kvetiapiin, 25mg	N05AH04	KETIPINOR, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Ideal Trade Links UAB	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
1301937	kvetiapiin, 300mg	N05AH04	QUETIAPINE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Teva Pharma B.V.	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
1454149	kvetiapiin, 300mg	N05AH04	QUETIAPINE ACCORD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	Accord Healthcare B.V.	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					50						
1496998	kvetiapiin, 300mg	N05AH04	QUETIAPINE TEVA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	Teva Pharma B.V.	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1895610	kvetiapiin, 300mg	N05AH04	QUETIAPINE TEVA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	Ideal Trade Links UAB	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
1454206	kvetiapiin, 400mg	N05AH04	QUETIAPINE ACCORD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
1497067	kvetiapiin, 400mg	N05AH04	QUETIAPINE TEVA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	Teva Pharma B.V.	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					50						
1724510	kvetiapiin, 400mg	N05AH04	KVENTIAX SR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	KRKA, d.d., Novo mesto	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					50						
1895777	kvetiapiin, 400mg	N05AH04	QUETIAPINE TEVA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	Ideal Trade Links UAB	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
1555253	kvetiapiin, 50mg	N05AH04	QUETIAPINE ACCORD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
1007828	labetalool, 100mg	C07AG01	TRANDATE, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	Aspen Pharma Trading Limited	50						
					75	O10-O16					
1043042	lamivudiin, 100mg	J05AF05	ZEFFIX, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50						
1025873	lamivudiin, 150mg	J05AF05	EPIVIR, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Viiv Healthcare B.V.	50		Infektsionist				HIV-nakkuse profülaktikaks, v a tööülesannete täitmisega seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega
1379123	lamotrigiin, 100mg	N03AX09	LAMICTAL 100MG, närimis-/dispergeeruv tablett, 28TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	100	F30-F31	Psühhiaater				
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1394210	lamotrigiin, 25mg	N03AX09	LAMICTAL 25MG, närimis-/dispergeeruv tablett, 28TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50						
					100	F30-F31	Psühhiaater				
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
1379088	lamotrigiin, 50mg	N03AX09	LAMICTAL 50MG, närimis-/dispergeeruv tablett, 28TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50						
					100	F30-F31	Psühhiaater				
1141434	lamotrigiin, 5mg	N03AX09	LAMICTAL 5MG, närimis-/dispergeeruv tablett, 30TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50						
					100	F30-F31	Psühhiaater				
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
1134560	lanreotiid, 120mg	H01CB03	SOMATULINE AUTOGEL 120MG, süstelahus süstlis, 1TK	Ipsen Pharma	100	C00-D48, E22.0-E22.0	Pediaater – endokrinoloog, Endokrinoloog, Onkoloog				neuroendokriinkasvaja või akromegaalia raviks
1134582	lanreotiid, 60mg	H01CB03	SOMATULINE AUTOGEL 60MG, süstelahus süstlis, 1TK	Ipsen Pharma	100	C00-D48, E22.0-E22.0	Onkoloog, Pediaater – endokrinoloog, Endokrinoloog				neuroendokriinkasvaja või akromegaalia raviks
1134571	lanreotiid, 90mg	H01CB03	SOMATULINE AUTOGEL 90MG, süstelahus süstlis, 1TK	Ipsen Pharma	100	C00-D48, E22.0-E22.0	Endokrinoloog, Onkoloog, Pediaater – endokrinoloog				neuroendokriinkasvaja või akromegaalia raviks
1235056	lantaan, 750mg	V03AE03	FOSRENOL, närimistablett, 90TK	Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch	50						
					100	N18-N18	Nefroloog, Pediaater				kui kaltsiumipõhine fosforisiduja on vastunäidustatud (seerumi kaltsiumisisaldus >2,54 mmol/l)
1781232	lantaan, 750mg	V03AE03	CALAFOS, närimistablett, 90TK	Viartis Limited	50						
					100	N18-N18	Nefroloog, Pediaater				kui kaltsiumipõhine fosforisiduja on vastunäidustatud (seerumi kaltsiumisisaldus >2,54 mmol/l)
1041196	latanoprost, 50mcg 1ml	S01EE01	XALATAN, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK	Upjohn EESV	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
1165733	latanoprost, 50mcg 1ml	S01EE01	GLAUMAX, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK	Aktiaselts KEVELT	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
1346790	latanoprost, 50mcg 1ml	S01EE01	LATANOPROST ACTAVIS, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK	Teva B.V.	100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1346802	latanoprost, 50mcg 1ml	S01EE0 1	LATANOPROST ACTAVIS, silmatilgad, lahus, 2.5ml 3TK	Teva B.V.	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
1377873	latanoprost, 50mcg 1ml	S01EE0 1	UNILAT, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK	Unimed Pharma spol. s r.o.	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
1860229	latanoprost, 50mcg 1ml	S01EE0 1	LATANOPROST ELVIM, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK	SIA Elvim	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
1073023	latsidipiin, 4mg	C08CA0 9	LACIPIL, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1009921	leflunomiid, 10mg	L04AK0 1	ARAVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	75	M07-M07	Pediaater, Reumatoloog				kui metotreksaat pole küllaldaselt efektiivne, on vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
					75	M05-M06	Pediaater, Reumatoloog				kui mono- ja kombinatsioonravi metotreksaadi ja sulfasalasiiniga pole küllaldaselt efektiivne, on vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
					50						
1873009	leflunomiid, 10mg	L04AK0 1	LEFLUNOMIDE ELVIM, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	SIA Elvim	75	M05-M06	Pediaater, Reumatoloog				kui mono-ja kombinatsioonravi metotreksaadi ja sulfasalasiini pole küllaldaselt efektiivne, on vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
					50						
					75	M07-M07	Pediaater, Reumatoloog				kui metotreksaat pole küllaldaselt efektiivne, on vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
1009932	leflunomiid, 20mg	L04AK0 1	ARAVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	75	M07-M07	Pediaater, Reumatoloog				kui metotreksaat pole küllaldaselt efektiivne, on vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
					50						
					75	M05-M06	Pediaater, Reumatoloog				kui mono- ja kombinatsioonravi metotreksaadi ja sulfasalasiiniga pole küllaldaselt efektiivne, on vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
1873043	leflunomiid, 20mg	L04AK0 1	LEFLUNOMIDE ELVIM, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	SIA Elvim	75	M07-M07	Pediaater, Reumatoloog				kui metotreksaat pole küllaldaselt efektiivne, on vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
					75	M05-M06	Pediaater, Reumatoloog				kui mono-ja kombinatsioonravi metotreksaadi ja sulfasalasiini pole küllaldaselt efektiivne, on vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1748156	lenalidomiid, 10mg	L04AX04	LENALIDOMIDE AUXILIA, kõvakapsel, 21TK	Auxilia Pharma OÜ	100	D46-D46	Hematoloog				konsiiliumi (vähemasti 3 hematoloogi) otsuse alusel isoleeritud 5q deletsioonist tingitud tsütogeneetilise häirega seotud müelodüsplastilise sündroomi raviks erütrotsüütide suspensiooni ülekannetest sõltuva (koormusega vähemalt 4 doosi 8 nädala kohta) ja madala või madala-mõõduka riskiskooriga (IPSS 0-1) patsiendile piisava ravivastuse saavutamisel (ülekannete koormus väheneb vähemalt 50% võrra 16. ravinädalaks) ja selle püsimisel
					100	C90-C90	Hematoloog				
1766000	lenalidomiid, 10mg	L04AX04	LENALIDOMIDE GRINDEKS, kõvakapsel, 21TK	Grindeks AS	100	C90-C90	Hematoloog				
					100	D46-D46	Hematoloog				konsiiliumi (vähemasti 3 hematoloogi) otsuse alusel isoleeritud 5q deletsioonist tingitud tsütogeneetilise häirega seotud müelodüsplastilise sündroomi raviks erütrotsüütide suspensiooni ülekannetest sõltuva (koormusega vähemalt 4 doosi 8 nädala kohta) ja madala või madala-mõõduka riskiskooriga (IPSS 0-1) patsiendile piisava ravivastuse saavutamisel (ülekannete koormus väheneb vähemalt 50% võrra 16. ravinädalaks) ja selle püsimisel
1780411	lenalidomiid, 10mg	L04AX04	LENALIDOMIDE ACCORD, kõvakapsel, 21TK	Accord Healthcare S.L.	100	D46-D46	Hematoloog				konsiiliumi (vähemasti 3 hematoloogi) otsuse alusel isoleeritud 5q deletsioonist tingitud tsütogeneetilise häirega seotud müelodüsplastilise sündroomi raviks erütrotsüütide suspensiooni ülekannetest sõltuva (koormusega vähemalt 4 doosi 8 nädala kohta) ja madala või madala-mõõduka riskiskooriga (IPSS 0-1) patsiendile piisava ravivastuse saavutamisel (ülekannete koormus väheneb vähemalt 50% võrra 16. ravinädalaks) ja selle püsimisel
					100	C90-C90	Hematoloog				

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1748202	lenalidomiid, 15mg	L04AX04	LENALIDOMIDE AUXILIA, kõvakapsel, 21TK	Auxilia Pharma OÜ	100	D46-D46	Hematoloog				konsiiliumi (vähemasti 3 hematoloogi) otsuse alusel isoleeritud 5q deletsioonist tingitud tsütogeneetilise häirega seotud müelodüsplastilise sündroomi raviks erütrotsüütide suspensiooni ülekannetest sõltuva (koormusega vähemalt 4 doosi 8 nädala kohta) ja madala või madala-mõõduka riskiskooriga (IPSS 0-1) patsiendile piisava ravivastuse saavutamisel (ülekannete koormus väheneb vähemalt 50% võrra 16. ravinädalaks) ja selle püsimisel
					100	C90-C90	Hematoloog				
1766022	lenalidomiid, 15mg	L04AX04	LENALIDOMIDE GRINDEKS, kõvakapsel, 21TK	Grindeks AS	100	C90-C90	Hematoloog				
					100	D46-D46	Hematoloog				konsiiliumi (vähemasti 3 hematoloogi) otsuse alusel isoleeritud 5q deletsioonist tingitud tsütogeneetilise häirega seotud müelodüsplastilise sündroomi raviks erütrotsüütide suspensiooni ülekannetest sõltuva (koormusega vähemalt 4 doosi 8 nädala kohta) ja madala või madala-mõõduka riskiskooriga (IPSS 0-1) patsiendile piisava ravivastuse saavutamisel (ülekannete koormus väheneb vähemalt 50% võrra 16. ravinädalaks) ja selle püsimisel
1780433	lenalidomiid, 15mg	L04AX04	LENALIDOMIDE ACCORD, kõvakapsel, 21TK	Accord Healthcare S.L.	100	D46-D46	Hematoloog				konsiiliumi (vähemasti 3 hematoloogi) otsuse alusel isoleeritud 5q deletsioonist tingitud tsütogeneetilise häirega seotud müelodüsplastilise sündroomi raviks erütrotsüütide suspensiooni ülekannetest sõltuva (koormusega vähemalt 4 doosi 8 nädala kohta) ja madala või madala-mõõduka riskiskooriga (IPSS 0-1) patsiendile piisava ravivastuse saavutamisel (ülekannete koormus väheneb vähemalt 50% võrra 16. ravinädalaks) ja selle püsimisel
					100	C90-C90	Hematoloog				

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1748257	lenalidomiid, 25mg	L04AX04	LENALIDOMIDE AUXILIA, kõvakapsel, 21TK	Auxilia Pharma OÜ	100	D46-D46	Hematoloog				konsiiliumi (vähemasti 3 hematoloogi) otsuse alusel isoleeritud 5q deletsioonist tingitud tsütogeneetilise häirega seotud müelodüsplastilise sündroomi raviks erütrotsüütide suspensiooni ülekannetest sõltuva (koormusega vähemalt 4 doosi 8 nädala kohta) ja madala või madala-mõõduka riskiskooriga (IPSS 0-1) patsiendile piisava ravivastuse saavutamisel (ülekannete koormus väheneb vähemalt 50% võrra 16. ravinädalaks) ja selle püsimisel
					100	C90-C90	Hematoloog				
1766066	lenalidomiid, 25mg	L04AX04	LENALIDOMIDE GRINDEKS, kõvakapsel, 21TK	Grindeks AS	100	C90-C90	Hematoloog				
					100	D46-D46	Hematoloog				konsiiliumi (vähemasti 3 hematoloogi) otsuse alusel isoleeritud 5q deletsioonist tingitud tsütogeneetilise häirega seotud müelodüsplastilise sündroomi raviks erütrotsüütide suspensiooni ülekannetest sõltuva (koormusega vähemalt 4 doosi 8 nädala kohta) ja madala või madala-mõõduka riskiskooriga (IPSS 0-1) patsiendile piisava ravivastuse saavutamisel (ülekannete koormus väheneb vähemalt 50% võrra 16. ravinädalaks) ja selle püsimisel
1780455	lenalidomiid, 25mg	L04AX04	LENALIDOMIDE ACCORD, kõvakapsel, 21TK	Accord Healthcare S.L.	100	D46-D46	Hematoloog				konsiiliumi (vähemasti 3 hematoloogi) otsuse alusel isoleeritud 5q deletsioonist tingitud tsütogeneetilise häirega seotud müelodüsplastilise sündroomi raviks erütrotsüütide suspensiooni ülekannetest sõltuva (koormusega vähemalt 4 doosi 8 nädala kohta) ja madala või madala-mõõduka riskiskooriga (IPSS 0-1) patsiendile piisava ravivastuse saavutamisel (ülekannete koormus väheneb vähemalt 50% võrra 16. ravinädalaks) ja selle püsimisel
					100	C90-C90	Hematoloog				



Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1748101	lenalidomiid, 5mg	L04AX04	LENALIDOMIDE AUXILIA, kõvakapsel, 21TK	Auxilia Pharma OÜ	100	D46-D46	Hematoloog				konsiiliumi (vähemasti 3 hematoloogi) otsuse alusel isoleeritud 5q deletsioonist tingitud tsütogeneetilise häirega seotud müelodüsplastilise sündroomi raviks erütrotsüütide suspensiooni ülekannetest sõltuva (koormusega vähemalt 4 doosi 8 nädala kohta) ja madala või madala-mõõduka riskiskooriga (IPSS 0-1) patsiendile piisava ravivastuse saavutamisel (ülekannete koormus väheneb vähemalt 50% võrra 16. ravinädalaks) ja selle püsimisel
					100	C90-C90	Hematoloog				
1765964	lenalidomiid, 5mg	L04AX04	LENALIDOMIDE GRINDEKS, kõvakapsel, 21TK	Grindeks AS	100	D46-D46	Hematoloog				konsiiliumi (vähemasti 3 hematoloogi) otsuse alusel isoleeritud 5q deletsioonist tingitud tsütogeneetilise häirega seotud müelodüsplastilise sündroomi raviks erütrotsüütide suspensiooni ülekannetest sõltuva (koormusega vähemalt 4 doosi 8 nädala kohta) ja madala või madala-mõõduka riskiskooriga (IPSS 0-1) patsiendile piisava ravivastuse saavutamisel (ülekannete koormus väheneb vähemalt 50% võrra 16. ravinädalaks) ja selle püsimisel
					100	C90-C90	Hematoloog				
1780376	lenalidomiid, 5mg	L04AX04	LENALIDOMIDE ACCORD, kõvakapsel, 21TK	Accord Healthcare S.L.	100	D46-D46	Hematoloog				konsiiliumi (vähemasti 3 hematoloogi) otsuse alusel isoleeritud 5q deletsioonist tingitud tsütogeneetilise häirega seotud müelodüsplastilise sündroomi raviks erütrotsüütide suspensiooni ülekannetest sõltuva (koormusega vähemalt 4 doosi 8 nädala kohta) ja madala või madala-mõõduka riskiskooriga (IPSS 0-1) patsiendile piisava ravivastuse saavutamisel (ülekannete koormus väheneb vähemalt 50% võrra 16. ravinädalaks) ja selle püsimisel
					100	C90-C90	Hematoloog				

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1780398	lenalidomiid, 7,5mg	L04AX0 4	LENALIDOMIDE ACCORD, kõvakapsel, 21TK	Accord Healthcare S.L.	100	C90-C90	Hematoloog				
					100	D46-D46	Hematoloog				konsiiliumi (vähemasti 3 hematoloogi) otsuse alusel isoleeritud 5q deletsioonist tingitud tsütogeneetilise häirega seotud müelodüsplastilise sündroomi raviks erütrotsüütide suspensiooni ülekannetest sõltuva (koormusega vähemalt 4 doosi 8 nädala kohta) ja madala või madala-mööduka riskiskooriga (IPSS 0-1) patsiendile piisava ravivastuse saavutamisel (ülekannete koormus väheneb vähemalt 50% võrra 16. ravinädalaks) ja selle püsimisel
1687192	lenvatiniib, 10mg	L01EX0 8	LENVIMA, kõvakapsel, 30TK	Eisai GmbH	100	C73-C73	Onkoloog				kuni haiguse progresseerumiseni, kui ravi alustamise lenvatiniibiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 2 onkoloogi) vastavaks järgmistele kriteeriumitele: diagnoositud progresseeruv, lokaalselt kaugelearenenud või metastaatiline, diferentseeritud (papillaarne/follikulaarne/Hürthle-rakuline), radioaktiivsele joodile allumatu kilpnäärme kartsinoom ja patsiendi üldseisund on hea (funktsionaalne klass 0-1 ECOG järgi). RAI allumatu kilpnäärme kartsinoom on diagnoositud, kui esineb vähemalt üks haiguskolle, mis ei näita RAI-skaneeringul joodi neeldumist, või haigus progresseerub RAI-ravi foonil, või kumulatiivne RAI annus on $\geq 22,2$ GBq. Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi lenvatiniibiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. oktoobrit 2020. a

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1687181	lenvatiniib, 4mg	L01EX0 8	LENVIMA, kõvakapsel, 30TK	Eisai GmbH	100	C22-C22	Onkoloog				kuni haiguse progresseerumiseni, kui ravi alustamise lenvatiniibiga on hinnatud konsiilium (vähemalt 3 onkoloogi) vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud kaugelearenenud või opereerimatu hepatotsellulaarne kartsinoom, patsiendi üldseisund on hea (funktsionaalne klass 0-1 ECOG järgi) ning maksa funktsioon ei ole oluliselt häiritud. Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi lenvatiniibiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. oktoobrit 2020. a
					100	C73-C73	Onkoloog				kuni haiguse progresseerumiseni, kui ravi alustamise lenvatiniibiga on hinnatud konsiilium (vähemalt 2 onkoloogi) vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud progresseeruv, lokaalselt kaugelearenenud või metastaatiline, diferentseeritud (papillaarne/follikulaarne/Hürthle-rakuline), radioaktiivsele joodile allumatu kilpnäärme kartsinoom ja patsiendi üldseisund on hea (funktsionaalne klass 0-1 ECOG järgi). RAI allumatu kilpnäärme kartsinoom on diagnoositud, kui esineb vähemalt üks haiguskolle, mis ei näita RAI-skaneeringul joodi neeldumist, või haigus progresseerub RAI-ravi foonil, või kumulatiivne RAI annus on $\geq 22,2$ GBq. Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi lenvatiniibiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. oktoobrit 2020. a
1474950	lerkanidipiin, 10mg	C08CA1 3	LERCAPIN, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1611234	lerkanidipiin, 10mg	C08CA1 3	LERCANIDIPINE ACTAVIS 10MG, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Teva B.V.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1826018	lerkanidipiin, 10mg	C08CA1 3	LERCANIDIPINE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1860386	lerkanidipiin, 10mg	C08CA13	KAPIDIN, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Zentiva k.s.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1880186	lerkanidipiin, 10mg	C08CA13	LERCAPIN, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Ideal Trade Links UAB	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1474994	lerkanidipiin, 20mg	C08CA13	LERCAPIN, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1611245	lerkanidipiin, 20mg	C08CA13	LERCANIDIPINE ACTAVIS 20MG, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Teva B.V.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1826085	lerkanidipiin, 20mg	C08CA13	LERCANIDIPINE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1860498	lerkanidipiin, 20mg	C08CA13	KAPIDIN, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Zentiva k.s.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1034334	letrosool, 2,5mg	L02BG04	FEMARA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Novartis Baltics SIA	50						
					100	C50-C50	Onkoloog, Üldkirurg, Günekoloog				günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks
1302398	letrosool, 2,5mg	L02BG04	LETROZOLE SANOSWISS 2,5 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Sanoswiss UAB	50						
					100	C50-C50	Onkoloog, Günekoloog, Üldkirurg				günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks
1349771	letrosool, 2,5mg	L02BG04	LETROZOLE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	100	C50-C50	Üldkirurg, Günekoloog, Onkoloog				günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1409352	letrosool, 2,5mg	L02BG04	LETROZOLE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare B.V.	100	C50-C50	Günekoloog, Üldkirurg, Onkoloog				günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks
					50						
1554702	letrosool, 2,5mg	L02BG04	LORTANDA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	KRKA d.d. Novo mesto	100	C50-C50	Onkoloog, Günekoloog, Üldkirurg				günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks
					50						
1836738	letrosool, 2,5mg	L02BG04	LETROZOLE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Ideal Trade Links UAB	100	C50-C50	Onkoloog, Üldkirurg, Günekoloog				günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks
					50						
1198975	levetiratsetaam, 1000mg	N03AX14	KEPPRA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	UCB Pharma	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50						
1544981	levetiratsetaam, 1000mg	N03AX14	LEVETIRACETAM TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva B.V.	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
1545566	levetiratsetaam, 1000mg	N03AX14	LEVETIRACETAM ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare S.L.U.	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
1546130	levetiratsetaam, 1000mg	N03AX14	MATEVER, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Pharmathen S.A.	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
1198762	levetiratsetaam, 250mg	N03AX14	KEPPRA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	UCB Pharma	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50						
1544802	levetiratsetaam, 250mg	N03AX14	LEVETIRACETAM TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva B.V.	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50						
1545353	levetiratsetaam, 250mg	N03AX14	LEVETIRACETAM ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare S.L.U.	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1545904	levetiratsetaam, 250mg	N03AX1 4	MATEVER, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Pharmathen S.A.	50 100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
1198829	levetiratsetaam, 500mg	N03AX1 4	KEPPRA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	UCB Pharma	50 100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
1495054	levetiratsetaam, 500mg	N03AX1 4	NORMEG 500 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Zentiva k.s.	100 50	G40-G40	Neuroloog	esmane			
1544868	levetiratsetaam, 500mg	N03AX1 4	LEVETIRACETAM TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva B.V.	100 50	G40-G40	Neuroloog	esmane			
1545421	levetiratsetaam, 500mg	N03AX1 4	LEVETIRACETAM ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare S.L.U.	100 50	G40-G40	Neuroloog	esmane			
1545960	levetiratsetaam, 500mg	N03AX1 4	MATEVER, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Pharmathen S.A.	100 50	G40-G40	Neuroloog	esmane			
1077049	levodopa+bensera siid, 100mg+25mg	N04BA8 0	MADOPAR, dispergeeruv tablett, 100TK	Roche Eesti Osaühing	100 50	G23-G23, G20- G20, G90.3- G90.3, G24.1- G24.1, G21- G21, G31.8- G31.8	Neuroloog	esmane			
1082922	levodopa+bensera siid, 100mg+25mg	N04BA8 0	MADOPAR, kõvakapsel, 100TK	Roche Eesti Osaühing	100 50	G23-G23, G20- G20, G90.3- G90.3, G24.1- G24.1, G21- G21, G31.8- G31.8	Neuroloog	esmane			

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1085161	levodopa+bensera siid, 100mg+25mg	N04BA8 0	MADOPAR HBS, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 100TK	Roche Eesti Osaühing	100	G23-G23, G20- G20, G90.3- G90.3, G24.1- G24.1, G21- G21, G31.8- G31.8	Neuroloog	esmane			
					50						
1002014	levodopa+bensera siid, 200mg+50mg	N04BA8 0	MADOPAR, tablett, 100TK	Roche Eesti Osaühing	50		Neuroloog	esmane			
					100	G23-G23, G20- G20, G90.3- G90.3, G24.1- G24.1, G21- G21, G31.8- G31.8					
1599611	levodopa+bensera siid, 200mg+50mg	N04BA8 0	MADOPAR, tablett, 100TK	First Pharma OÜ	100	G23-G23, G20- G20, G90.3- G90.3, G24.1- G24.1, G21- G21, G31.8- G31.8	Neuroloog	esmane			
					50						
1891032	levodopa+bensera siid, 200mg+50mg	N04BA8 0	MADOPAR, tablett, 100TK	Ideal Trade Links UAB	100	G23-G23, G20- G20, G90.3- G90.3, G24.1- G24.1, G21- G21, G31.8- G31.8	Neuroloog	esmane			
					50						
1798072	levodopa+karbido pa, 100mg+25mg	N04BA8 1	SINEMET 25/100, tablett, 60TK	Organon N.V.	50		Neuroloog	esmane			
					100	G23-G23, G20- G20, G90.3- G90.3, G24.1- G24.1, G21- G21, G31.8- G31.8					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1006861	levodopa+karbido pa, 250mg+25mg	N04BA8 1	SINEMET 25/250, tablett, 100TK	Organon N.V.	50						
					100	G23-G23, G20- G20, G90.3- G90.3, G24.1- G24.1, G21- G21, G31.8- G31.8	Neuroloog	esmane			
1172854	levodopa+karbido pa+entakapoon, 100mg+25mg+200 mg	N04BA0 3	STALEVO, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Orion Corporation	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						
1629716	levodopa+karbido pa+entakapoon, 100mg+25mg+200 mg	N04BA0 3	LEVODOPA/CARBIDOP A/ENTACAPONE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Teva Pharma B.V.	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1172898	levodopa+karbido pa+entakapoon, 150mg+37,5mg+2 00mg	N04BA0 3	STALEVO, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Orion Corporation	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1630257	levodopa+karbido pa+entakapoon, 150mg+37,5mg+2 00mg	N04BA0 3	LEVODOPA/CARBIDOP A/ENTACAPONE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Teva Pharma B.V.	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						
1538580	levodopa+karbido pa+entakapoon, 175mg+43,75mg+ 200mg	N04BA0 3	STALEVO, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Orion Corporation	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1368020	levodopa+karbido pa+entakapoon, 200mg+50mg+200 mg	N04BA0 3	STALEVO, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Orion Corporation	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1630527	levodopa+karbido pa+entakapoon, 200mg+50mg+200 mg	N04BA0 3	LEVODOPA/CARBIDOP A/ENTACAPONE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Teva Pharma B.V.	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						



Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1629974	levodopa+karbido pa+entakapoon, 75mg+18,75mg+2 00mg	N04BA0 3	LEVODOPA/CARBIDOP A/ENTACAPONE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Teva Pharma B.V.	100 50	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1549650	levonorgestreel, 13,5mg	G02BA0 3	FLEREE, intrauteriinne ravivahend, 1TK	Bayer AG	50 75						
1703955	levonorgestreel, 19,5mg	G02BA0 3	KYLEENA, intrauteriinne ravivahend, 1TK	Bayer AG	75 50	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
1009493	levonorgestreel, 52mg	G02BA0 3	MIRENA, intrauteriinne ravivahend, 1TK	Bayer AG	75 50	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
1816118	levonorgestreel, 52mg	G02BA0 3	DONASERT, intrauteriinne ravivahend, 1TK	Gedeon Richter Plc.	75 50	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
1621752	levonorgestreel+et ünüülöstradiool, 0,15mg+0,03mg	G03AA0 7	LEVERETTE, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Exeltis Baltics UAB	50 75						sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
1223064	levotsetirisiin, 0,5mg 1ml	R06AE0 9	XYZAL, suukaudne lahus, 200ml 1TK	UCB Pharma Oy Finland	50						
1138137	levotsetirisiin, 5mg	R06AE0 9	XYZAL, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	UCB Pharma Oy Finland	50						
1512065	levotsetirisiin, 5mg	R06AE0 9	CEZERA 5 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	KRKA d.d. Novo mesto	50						
3026652	levotsetirisiin, 5mg	R06AE0 9	XYZAL, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Ideal Trade Links UAB	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1607240	liksisenatiid, 10mcg/20mcg 0.2ml	A10BJ03	LYXUMIA, süstelahus, 3ml 1TK / 3ml 1TK	Sanofi Winthrop Industrie	75	E14-E14, E11- E11					II tüüpi diabeedi raviks rasvumusega patsientidel (KMI>=35kg/m2), kellel suukaudsed diabeediravimid (metformiin, sulfonüüluurea preparaat, PPAR agonist, DPP-4 inhibiitor) maksimaalsetes talutavates annustes ei ole andnud rahuldavat efekti või on vastunäidustatud
					50	E14-E14, E11- E11					II tüüpi diabeedi raviks juhul, kui ravi suukaudsete diabeediravimitega ei ole efektiivne või on vastunäidustatud
1607228	liksisenatiid, 20mcg 0.2ml	A10BJ03	LYXUMIA, süstelahus, 3ml 2TK	Sanofi Winthrop Industrie	50	E14-E14, E11- E11					II tüüpi diabeedi raviks juhul, kui ravi suukaudsete diabeediravimitega ei ole efektiivne või on vastunäidustatud
					75	E14-E14, E11- E11					II tüüpi diabeedi raviks rasvumusega patsientidel (KMI>=35kg/m2), kellel suukaudsed diabeediravimid (metformiin, sulfonüüluurea preparaat, PPAR agonist, DPP-4 inhibiitor) maksimaalsetes talutavates annustes ei ole andnud rahuldavat efekti või on vastunäidustatud
1539288	linagliptiin, 5mg	A10BH0 5	TRAJENTA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	75	E14-E14, E11- E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud
					50						
1733071	linagliptiin+empagl ifloosiin, 5mg+10mg	A10BD1 9	GLYXAMBI, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	75	I50-I50					kroonilise südamepuudulikkuse korral patsiendile, kellel esineb kaasuvana II tüüpi diabeet (E11;E14), kes kuulub NYHA II-IV funktsionaalklassi, kellel ravikoostöö on hea ning kellel AKE-inhibiitor või ARB ja beetablokaatori kaksikravlil südamepuudulikkuse sümptomid endiselt püsivad või süvenevad
					75	E11-E11, E14- E14					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea on meditsiiniliselt vastunäidustatud
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1733161	linagliptiin+empagl ifloisiin, 5mg+25mg	A10BD1 9	GLYXAMBI, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	75	I50-I50					kroonilise südamepuudulikkuse korral patsiendile, kellel esineb kaasuvana II tüüpi diabeet (E11;E14), kes kuulub NYHA II-IV funktsionaalklassi, kellel ravikoostöö on hea ning kellel AKE-inhibiitor või ARB ja beetablokaatori kaksikravitl südamepuudulikkuse sümptomid endiselt püsivad või süvenevad
					75	E14-E14, E11- E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea on meditsiiniliselt vastunäidustatud
					50						
1643251	linesoliid, 600mg	J01XX08	LINEZOLID ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Accord Healthcare B.V.	50						
1751206	linesoliid, 600mg	J01XX08	APEL, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Medochemie Limited	50						
1063763	lipaas+amülaas+p roteaas, 10000ühik+8000ü hik+600ühik	A09AA0 2	KREON 10 000 U, gastroresistentne kõvakapsel, 50TK	VIATRIS HEALTHCARE Limited	50						
					100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater	esmane			
1020205	lipaas+amülaas+p roteaas, 10000ühik+9000ü hik+500ühik	A09AA0 2	PANGROL 10000, gastroresistentne kõvakapsel, 20TK	Berlin-Chemie AG	100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater	esmane			
					50						
1060434	lipaas+amülaas+p roteaas, 20000ühik+12000 ühik+900ühik	A09AA0 2	MEZYM 20 000, gastroresistentne tablett, 100TK	Berlin-Chemie AG	100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater	esmane			
					50						
1044470	lipaas+amülaas+p roteaas, 25000ühik+18000 ühik+1000ühik	A09AA0 2	KREON 25 000 U, gastroresistentne kõvakapsel, 20TK	VIATRIS HEALTHCARE Limited	50						
					100	E84-E84	Pediaater, Pulmonoloog	esmane			

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1063707	lipaas+amülaas+p roteaas, 25000ühik+18000 ühik+1000ühik	A09AA0 2	KREON 25 000 U, gastroresistentne kõvakapsel, 50TK	VIATRIS HEALTHCARE Limited	50						
					100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater	esmane			
1020182	lipaas+amülaas+p roteaas, 25000ühik+22500 ühik+1250ühik	A09AA0 2	PANGROL 25000, gastroresistentne kõvakapsel, 20TK	Berlin-Chemie AG	50						
					100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater	esmane			
1426845	liraglutiid, 6mg 1ml	A10BJ02	VICTOZA, süstelahus pen-süstlis, 3ml 2TK	Novo Nordisk A/S	75	E14-E14, E11- E11					II tüüpi diabeedi raviks rasvumusega patsientidel (KMI>=35kg/m2), kellel suukaudsed diabeediravimid (metformiin, sulfonüüluurea preparaat, PPAR agonist, DPP-4 inhibiitor) maksimaalsetes talutavates annustes ei ole andnud rahuldavat efekti või on vastunäidustatud
					50	E14-E14, E11- E11					II tüüpi diabeedi raviks juhul, kui ravi suukaudsete diabeediravimitega ei ole efektiivne või on vastunäidustatud
1300598	lisinopriil+amlodipii n, 10mg+5mg	C09BB0 3	DIRONORM, tablett, 30TK	Gedeon Richter Plc.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1501456	lisinopriil+amlodipii n, 20mg+5mg	C09BB0 3	DIRONORM, tablett, 30TK	Gedeon Richter Plc.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1111284	lispro-insuliin, 100ühik 1ml	A10AB0 4	HUMALOG, süstelahus kolbampullis, 3ml 5TK	Eli Lilly Nederland B.V.	100	O24-O24, E13- E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1					
					50						
1364510	lispro-insuliin, 100ühik 1ml	A10AB0 4	HUMALOG KWIKPEN, süstelahus, 3ml 5TK	Eli Lilly Nederland B.V.	100	O24-O24, E13- E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1					
					50						
1364532	lispro-insuliin, 100ühik 1ml	A10AD0 4	HUMALOG MIX25 KWIKPEN, süstesuspensioon, 3ml 5TK	Eli Lilly Nederland B.V.	100	O24-O24, E13- E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1					
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügilooma hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1364554	lispro-insuliin, 100ühik 1ml	A10AD0 4	HUMALOG MIX50 KWIKPEN, süstesuspensioon, 3ml 5TK	Eli Lilly Nederland B.V.	50						
					100	O24-O24, E13- E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1					
1754692	lispro-insuliin, 100ühik 1ml	A10AB0 4	HUMALOG JUNIOR KWIKPEN, süstelahu pen-süstlis, 3ml 5TK	Eli Lilly Nederland B.V.	50						
					100	O24-O24, E13- E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1					
1814408	lispro-insuliin, 100ühik 1ml	A10AB0 4	LYUMJEV KWIKPEN, süstelahus pen-süstlis, 3ml 5TK	Eli Lilly Nederland B.V.	100	O24-O24, E13- E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1					
					50						
1713248	lispro-insuliin, 200ühik 1ml	A10AB0 4	HUMALOG KWIKPEN, süstelahus pen-süstlis, 3ml 5TK	Eli Lilly Nederland B.V.	100	O24-O24, E13- E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1					
					50						
1063482	loperamiid, 2mg	A07DA0 3	IMODIUM, kõvakapsel, 20TK	McNeil Healthcare (Ireland) Limited	50						
1503571	loperamiid, 2mg	A07DA0 3	LOPACUT, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Vitabalans Oy	50						
1284320	lopinaviir+ritonaviir , 200mg+50mg	J05AR1 0	KALETRA, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG	50		Infektsionist				HIV-nakkuse profülaktikaks, v a tööülesannete täitmisega seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega
1082472	lopinaviir+ritonaviir , 80mg+20mg 1ml	J05AR1 0	KALETRA, suukaudne lahus, 60ml 5TK	AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG	50		Infektsionist				HIV-nakkuse profülaktikaks, v a tööülesannete täitmisega seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega
1796104	lorlatiniib, 100mg	L01ED0 5	LORVIQUA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	C34-C34	Onkoloog				I või II rea raviks anaplastilise lümfoomkineaas-positiivse kaugelearenenud mitteväikerakk-kopsuvähiga heas üldseisundis (ECOG 0-2) täiskasvanud patsientidele, kes on varem ravimata või kelle haigus on progresseerunud pärast esmaavaliku ravi ALK türosiinkinaasi inhibiitoriga

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1816422	lorlatiniib, 25mg	L01ED0 5	LORVIQUA, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	C34-C34	Onkoloog				I või II rea raviks anaplastilise lümfoomkinaas-positiivse kaugelearenenud mitteväikerakk-kopsuvähiga heas üldseisundis (ECOG 0-2) täiskasvanud patsientidele, kes on varem ravimata või kelle haigus on progresseerunud pärast esmavaliku ravi ALK türosiinikinaasi inhibiitoriga
1805756	lornoksikaam, 8mg	M01AC0 5	XEFO RAPID, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	First Pharma OÜ	50						
1805767	lornoksikaam, 8mg	M01AC0 5	XEFO RAPID, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	First Pharma OÜ	50						
1830608	lornoksikaam, 8mg	M01AC0 5	XEFO RAPID, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	Ideal Trade Links UAB	50						
1834332	lornoksikaam, 8mg	M01AC0 5	XEFO, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	Lex Ano UAB	50						
1207167	losartaan, 100mg	C09CA0 1	LOZAP 100, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Zentiva k.s.	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1210688	losartaan, 100mg	C09CA0 1	LOZAP 100, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Zentiva k.s.	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1268962	losartaan, 100mg	C09CA0 1	LORISTA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1013735	losartaan, 50mg	C09CA0 1	LORISTA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA, d.d., Novo mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1207134	losartaan, 50mg	C09CA0 1	LOZAP 50, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Zentiva k.s.	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1210701	losartaan, 50mg	C09CA0 1	LOZAP 50, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Zentiva k.s.	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1166059	losartaan+hüdrokl orotiasiid, 50mg+12,5mg	C09DA8 0	LORISTA H, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1217809	losartaan+hüdrokl orotiasiid, 50mg+12,5mg	C09DA8 0	LOZAP H, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Zentiva k.s.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1217810	losartaan+hüdrokl orotiasiid, 50mg+12,5mg	C09DA8 0	LOZAP H, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Zentiva k.s.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1185195	loteprednool, 0,5%	S01BA1 4	LOTEMAX, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK	Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm. Fabrik GmbH	50						
7000175	L-tsitrulliin,		L-CITRULLINE , pulber, 100 g N1	SHS	50						
7017476	L-tsitrulliin,		L-CITRULLINE, pulber, 100g N10	SHS International Ltd	50						
1029417	lühikese toimeajaga humaaninsuliin, 100RÜ 1ml	A10AB0 1	HUMULIN R, süstelahus kolbampullis, 3ml 5TK	Eli Lilly Nederland B.V.	100	O24-O24, E13- E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1					
					50						
1479416	makrogool+naatriu msulfaat, veevaba+naatrium kloriid+kaaliumklor iid+askorbiinhape+ naatriumaskorbaat , 100g+7,5g+2,691g +1,015g+0+0/0+0 +0+0+4,7g+5,9g	A06AD8 3	MOVIPREP, suukaudse lahuse pulber, 2TK / 2TK	Norgine B.V.	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1636602	matsitentaan, 10mg	C02KX0 4	OPSUMIT, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Janssen - Cilag International	100	I27.0-I27.0	Reumatoloog, Kardioloog, Pediaater, Pulmonoloog				NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafili ja bosentaan on vastunäidustatud, osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid
					50						
1007222	mebendasool, 100mg	P02CA0 1	VERMOX 100 MG, tablett, 6TK	Gedeon Richter Plc.	50						
1008245	mebendasool, 100mg	P02CA0 1	MEBENDAZOLE- GRINDEKS, tablett, 6TK	Grindeks AS	50						
1832486	mebendasool, 100mg	P02CA0 1	VERMOX 100 MG, tablett, 6TK	Lex Ano UAB	50						
1837076	mebendasool, 100mg	P02CA0 1	VERMOX 100 MG, tablett, 6TK	Ideal Trade Links UAB	50						
1136696	mebeveriin, 200mg	A03AA0 4	DUSPATALIN, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	Viatris SIA	50						
1891672	mebeveriin, 200mg	A03AA0 4	DUSPATALIN, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	Lex Ano UAB	50						
1013195	medroksüprogeste roon, 500mg	L02AB0 2	FARLUTAL, tablett, 30TK	Pfizer Europe MA EEIG	50						
					100	C00-D48	Onkoloog				
1004410	melfalaan, 2mg	L01AA0 3	ALKERAN, õhukese polümeerikattega tablett, 25TK	Aspen Pharma Trading Limited	50						
					100	C00-D48	Onkoloog, Hematoloog				
1035021	meloksikaam, 15mg	M01AC0 6	MOVALIS, tablett, 20TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	100	C00-D48					
					75	M30-M35, M05- M08, M45-M46					
					75	M15-M19			63,00		
					50						



Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1140680	meloksikaam, 15mg	M01AC06	MELOX 15MG, tablett, 20TK	Medochemie Limited	75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					75	M15-M19			63,00		
					100	C00-D48					
					50						
1149779	meloksikaam, 15mg	M01AC06	MEXOLAN 15 MG, tablett, 30TK	G.L. Pharma GmbH	50						
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					75	M15-M19			63,00		
					100	C00-D48					
1175936	meloksikaam, 15mg	M01AC06	RECOXA, tablett, 20TK	Zentiva k.s.	50						
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					75	M15-M19			63,00		
					100	C00-D48					
1189199	meloksikaam, 15mg	M01AC06	LORMED 15 MG, tablett, 20TK	Pro.Med.Cs Praha a.s.	100	C00-D48					
					75	M15-M19			63,00		
					50						
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
1240254	meloksikaam, 15mg	M01AC06	RECOXA, tablett, 60TK	Zentiva k.s.	75	M15-M19			63,00		
					100	C00-D48					
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					50						
1360189	meloksikaam, 15mg	M01AC06	MELOXICAM-RATIOPHARM 15 MG, tablett, 20TK	Ratiopharm GmbH	75	M15-M19			63,00		
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					50						
					100	C00-D48					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1560260	meloksikaam, 15mg	M01AC0 6	MELOX 15MG, tablett, 60TK	Medochemie Limited	75	M30-M35, M05- M08, M45-M46					
					75	M15-M19			63,00		
					100	C00-D48					
					50						
3038532	meloksikaam, 15mg	M01AC0 6	MOVALIS, tablett, 20TK	Ideal Trade Links UAB	75	M45-M46, M05- M08, M30-M35					
					75	M15-M19			63,00		
					50						
					100	C00-D48					
1035009	meloksikaam, 7,5mg	M01AC0 6	MOVALIS, tablett, 20TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	75	M15-M19			63,00		
					50						
					75	M30-M35, M05- M08, M45-M46					
					100	C00-D48					
1140679	meloksikaam, 7,5mg	M01AC0 6	MELOX 7,5MG, tablett, 30TK	Medochemie Limited	100	C00-D48					
					75	M30-M35, M05- M08, M45-M46					
					50						
					75	M15-M19			63,00		
1146350	meloksikaam, 7,5mg	M01AC0 6	MOVALIS, tablett, 50TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	100	C00-D48					
					75	M30-M35, M05- M08, M45-M46					
					50						
					75	M15-M19			63,00		
1149746	meloksikaam, 7,5mg	M01AC0 6	MEXOLAN 7,5 MG, tablett, 30TK	G.L. Pharma GmbH	75	M30-M35, M05- M08, M45-M46					
					75	M15-M19			63,00		
					100	C00-D48					
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1360134	meloksikaam, 7,5mg	M01AC06	MELOXICAM- RATIOPHARM 7,5 MG, tablett, 20TK	Ratiopharm GmbH	75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					100	C00-D48					
					50						
					75	M15-M19			63,00		
1360156	meloksikaam, 7,5mg	M01AC06	MELOXICAM- RATIOPHARM 7,5 MG, tablett, 50TK	Ratiopharm GmbH	75	M15-M19			63,00		
					100	C00-D48					
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					50						
1560271	meloksikaam, 7,5mg	M01AC06	MELOX 7,5MG, tablett, 60TK	Medochemie Limited	50						
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					75	M15-M19			63,00		
					100	C00-D48					
1006007	melperoon, 25mg	N05AD03	BURONIL, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Medilink A/S	50						
					100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1006030	melperoon, 50mg	N05AD03	BURONIL, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Medilink A/S	100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
					50						
1123524	memantiin, 10mg	N06DX01	AXURA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Merz Pharmaceuticals GmbH	50						
1123535	memantiin, 10mg	N06DX01	AXURA, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Merz Pharmaceuticals GmbH	50						
1614563	memantiin, 10mg	N06DX01	MARIXINO, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA d.d. Novo mesto	50						
1614608	memantiin, 10mg	N06DX01	MARIXINO, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	KRKA d.d. Novo mesto	50						
1618747	memantiin, 10mg	N06DX01	MEMANTINE RATIOPHARM, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Ratiopharm GmbH	50						
1618781	memantiin, 10mg	N06DX01	MEMANTINE RATIOPHARM, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Ratiopharm GmbH	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1621998	memantiin, 10mg	N06DX0 1	MANTOMED, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Medochemie Limited	50						
1622023	memantiin, 10mg	N06DX0 1	MANTOMED, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Medochemie Limited	50						
1635331	memantiin, 10mg	N06DX0 1	MEMANTINE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare S.L.U.	50						
1635375	memantiin, 10mg	N06DX0 1	MEMANTINE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Accord Healthcare S.L.U.	50						
1648694	memantiin, 10mg	N06DX0 1	MEMANTINE GRINDEKS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Grindeks AS	50						
1648739	memantiin, 10mg	N06DX0 1	MEMANTINE GRINDEKS, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Grindeks AS	50						
1621819	memantiin, 20mg	N06DX0 1	MANTOMED, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Medochemie Limited	50						
1872895	menopausaalne humaangonadotro piin, 75RÜ	G03GA0 2	MENOPUR, süstelahuse pulber ja lahusti, 5TK	Ferring GmbH	100	N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks
1004971	merkaptopuriin, 50mg	L01BB0 2	PURI-NETHOL, tablett, 25TK	Aspen Pharma Trading Limited	100	C00-D48	Hematoloog, Onkoloog, Pediaater – hematoloog- onkoloog				
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1737648	mesalasiin, 1600mg	A07EC0 2	YALDIGO, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 30TK	Tillotts Pharma AB	50						
					75	K51-K51, K50- K50	Pediaater, Gastroenteroloo g				
1023815	mesalasiin, 1g	A07EC0 2	PENTASA, rektaalsuposiit, 28TK	Ferring GmbH	50						
					75	K51-K51, K50- K50	Pediaater, Gastroenteroloo g				
1352810	mesalasiin, 1g	A07EC0 2	PENTASA 1G, toimeainet prolongeeritult vabastavad graanulid, 50TK	Ferring GmbH	75	K51-K51, K50- K50	Pediaater, Gastroenteroloo g				
					50						
1807578	mesalasiin, 1g	A07EC0 2	YALDIGO, rektaalsuposiit, 30TK	Tillotts Pharma AB	50						
					75	K51-K51, K50- K50	Gastroenteroloo g, Pediaater				
1352854	mesalasiin, 2g	A07EC0 2	PENTASA 2G, toimeainet prolongeeritult vabastavad graanulid, 60TK	Ferring GmbH	50						
					75	K51-K51, K50- K50	Gastroenteroloo g, Pediaater				
1146574	mesalasiin, 400mg	A07EC0 2	ASACOL 400MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 100TK	Tillotts Pharma AB	50						
					75	K51-K51, K50- K50	Gastroenteroloo g, Pediaater				
1023826	mesalasiin, 500mg	A07EC0 2	PENTASA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	Ferring GmbH	75	K51-K51, K50- K50	Gastroenteroloo g, Pediaater				
					50						
1146541	mesalasiin, 500mg	A07EC0 2	ASACOL, rektaalsuposiit, 20TK	Tillotts Pharma AB	50						
					75	K51-K51, K50- K50	Pediaater, Gastroenteroloo g				
1184970	mesalasiin, 800mg	A07EC0 2	ASACOL 800 MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 50TK	Tillotts Pharma AB	50						
					75	K51-K51, K50- K50	Pediaater, Gastroenteroloo g				

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1034109	metadoon, 1mg 1ml	N07BC0 2	METADON DAK 1 MG/ML, suukaudne lahus, 1000ml 1TK	Orifarm Healthcare A/S	50						
					100	R52.1-R52.1	Anestesioloog, Neuroloog, Reumatoloog	esmane			esmise väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul
					100	C00-D48					
1684155	metadoon, 20mg	N07BC0 2	METADON DAK, tablett, 100TK	Orifarm Healthcare A/S	100	R52.1-R52.1	Anestesioloog, Reumatoloog, Neuroloog	esmane			esmise väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul
					100	C00-D48					
					50						
1164798	metformiin, 1000mg	A10BA0 2	METFORAL 1000 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Laboratori Guidotti S.p.A.	75	E14-E14, E11- E11					
					50						
1302949	metformiin, 1000mg	A10BA0 2	METFOGAMMA 1000, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Woerwag Pharma GmbH & Co. KG	75	E14-E14, E11- E11					
					50						
1568246	metformiin, 1000mg	A10BA0 2	METFORMIN TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Teva Pharma B.V.	50						
					75	E14-E14, E11- E11					
1818019	metformiin, 1000mg	A10BA0 2	METFORMIN ZENTIVA, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Zentiva k.s.	50						
					75	E11-E11, E14- E14					
1820034	metformiin, 1000mg	A10BA0 2	METFORMIN ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Accord Healthcare B.V.	75	E14-E14, E11- E11					
					50						
1064719	metformiin, 500mg	A10BA0 2	METFORAL 500 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Berlin-Chemie AG	75	E14-E14, E11- E11					
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1083169	metformiin, 500mg	A10BA0 2	METFORMIN- RATIOPHARM 500 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Ratiopharm GmbH	75	E14-E14, E11- E11					
					50						
1116380	metformiin, 500mg	A10BA0 2	METFOGAMMA 500, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Woerwag Pharma GmbH & Co. KG	50						
					75	E14-E14, E11- E11					
1817816	metformiin, 500mg	A10BA0 2	METFORMIN ZENTIVA, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Zentiva k.s.	50						
					75	E11-E11, E14- E14					
1819694	metformiin, 500mg	A10BA0 2	METFORMIN ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Accord Healthcare B.V.	75	E14-E14, E11- E11					
					50						
1064731	metformiin, 850mg	A10BA0 2	METFORAL 850 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Berlin-Chemie AG	50						
					75	E14-E14, E11- E11					
1083158	metformiin, 850mg	A10BA0 2	METFORMIN- RATIOPHARM 850 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Ratiopharm GmbH	75	E14-E14, E11- E11					
					50						
1111262	metformiin, 850mg	A10BA0 2	METFOGAMMA 850, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Woerwag Pharma GmbH & Co. KG	50						
					75	E14-E14, E11- E11					
1156609	metformiin, 850mg	A10BA0 2	METFORMIN SANDOZ 850 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Sandoz GmbH	50						
					75	E14-E14, E11- E11					
1817939	metformiin, 850mg	A10BA0 2	METFORMIN ZENTIVA, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Zentiva k.s.	50						
					75	E14-E14, E11- E11					



Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1819841	metformiin, 850mg	A10BA02	METFORMIN ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1637917	metformiin+dapaglifloosiin, 1000mg+5mg	A10BD15	XIGDUO, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Astrazeneca AB	75	E11-E11, E14-E14					
					50						
1637861	metformiin+dapaglifloosiin, 850mg+5mg	A10BD15	XIGDUO, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Astrazeneca AB	75	E11-E11, E14-E14					
					50						
1687136	metformiin+empaglifloosiin, 1000mg+12,5mg	A10BD20	SYNJARDY, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	50						
					75	I50-I50					kroonilise südamepuudulikkuse korral patsiendile, kellel esineb kaasuvana II tüüpi diabeet (E11;E14), kes kuulub NYHA II-IV funktsionaalklassi, kellel ravikoostöö on hea ning kellel AKE-inhibiitor või ARB ja beetablokaatori kaksikravitel südamepuudulikkuse sümptomid endiselt püsivad või süvenevad
					75	E11-E11, E14-E14					kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama sulfonüüluurea preparaati, välja arvatud juhul kui see on meditsiiniliselt vastunäidustatud
1686955	metformiin+empaglifloosiin, 1000mg+5mg	A10BD20	SYNJARDY, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	75	I50-I50					kroonilise südamepuudulikkuse korral patsiendile, kellel esineb kaasuvana II tüüpi diabeet (E11;E14), kes kuulub NYHA II-IV funktsionaalklassi, kellel ravikoostöö on hea ning kellel AKE-inhibiitor või ARB ja beetablokaatori kaksikravitel südamepuudulikkuse sümptomid endiselt püsivad või süvenevad
					75	E14-E14, E11-E11					kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama sulfonüüluurea preparaati, välja arvatud juhul kui see on meditsiiniliselt vastunäidustatud
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1687046	metformiin+empaglifloosiin, 850mg+12,5mg	A10BD20	SYNJARDY, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	75	I50-I50					kroonilise südamepuudulikkuse korral patsiendile, kellel esineb kaasuvana II tüüpi diabeet (E11;E14), kes kuulub NYHA II-IV funktsionaalklassi, kellel ravikoostöö on hea ning kellel AKE-inhibiitor või ARB ja beetablokaatori kaksikravitel südamepuudulikkuse sümptomid endiselt püsivad või süvenevad
					75	E14-E14, E11-E11					kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama sulfonüüluurea preparaati, välja arvatud juhul kui see on meditsiiniliselt vastunäidustatud
					50						
1686865	metformiin+empaglifloosiin, 850mg+5mg	A10BD20	SYNJARDY, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	50						
					75	E11-E11, E14-E14					kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama sulfonüüluurea preparaati, välja arvatud juhul kui see on meditsiiniliselt vastunäidustatud
					75	I50-I50					kroonilise südamepuudulikkuse korral patsiendile, kellel esineb kaasuvana II tüüpi diabeet (E11;E14), kes kuulub NYHA II-IV funktsionaalklassi, kellel ravikoostöö on hea ning kellel AKE-inhibiitor või ARB ja beetablokaatori kaksikravitel südamepuudulikkuse sümptomid endiselt püsivad või süvenevad
1590599	metformiin+linagliptiin, 1000mg+2,5mg	A10BD11	JENTADUETO, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama sulfonüüluurea preparaati, välja arvatud juhul kui see on meditsiiniliselt vastunäidustatud
					50						
1590465	metformiin+linagliptiin, 850mg+2,5mg	A10BD11	JENTADUETO, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	50						
					75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama sulfonüüluurea preparaati, välja arvatud juhul kui see on meditsiiniliselt vastunäidustatud
1550326	metformiin+saksagliptiin, 1000mg+2,5mg	A10BD10	KOMBOGLYZE, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Astrazeneca AB	50						
					75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama sulfonüüluurea preparaati, välja arvatud juhul kui see on meditsiiniliselt vastunäidustatud
1550270	metformiin+saksagliptiin, 850mg+2,5mg	A10BD10	KOMBOGLYZE, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Astrazeneca AB	50						
					75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama sulfonüüluurea preparaati, välja arvatud juhul kui see on meditsiiniliselt vastunäidustatud

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1361034	metformiin+sitagliptiin, 1000mg+50mg	A10BD07	JANUMET, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Merck Sharp & Dohme B.V.	50						
					75	E11-E11, E14-E14					
1805307	metformiin+sitagliptiin, 1000mg+50mg	A10BD07	MAYMETSI, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
					75	E11-E11, E14-E14					
1815049	metformiin+sitagliptiin, 1000mg+50mg	A10BD07	SITAGLIPTIN/METFORMIN HYDROCHLORIDE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Teva GmbH	75	E14-E14, E11-E11					
					50						
1822283	metformiin+sitagliptiin, 1000mg+50mg	A10BD07	JAMESI, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Zentiva k.s.	50						
					75	E11-E11, E14-E14					
1828324	metformiin+sitagliptiin, 1000mg+50mg	A10BD07	JUZIMETTE, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Gedeon Richter Plc.	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1830169	metformiin+sitagliptiin, 1000mg+50mg	A10BD07	SITAGLIPTIN/METFORMIN HYDROCHLORIDE SANDOZ, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	E14-E14, E11-E11					
					50						
1833207	metformiin+sitagliptiin, 1000mg+50mg	A10BD07	METFORMIN HYDROCHLORIDE/SITAGLIPTIN GRINDEKS, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Grindeks AS	75	E11-E11, E14-E14					
					50						
1360965	metformiin+sitagliptiin, 850mg+50mg	A10BD07	JANUMET, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Merck Sharp & Dohme B.V.	50						
					75	E11-E11, E14-E14					
1805239	metformiin+sitagliptiin, 850mg+50mg	A10BD07	MAYMETSI, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	KRKA, d.d., Novo mesto	75	E11-E11, E14-E14					
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1814969	metformiin+sitaglip tiin, 850mg+50mg	A10BD0 7	SITAGLIPTIN/METFOR MIN HYDROCHLORIDE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Teva GmbH	50						
					75	E14-E14, E11- E11					
1822249	metformiin+sitaglip tiin, 850mg+50mg	A10BD0 7	JAMESI, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Zentiva k.s.	50						
					75	E11-E11, E14- E14					
1828256	metformiin+sitaglip tiin, 850mg+50mg	A10BD0 7	JUZIMETTE, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Gedeon Richter Plc.	75	E14-E14, E11- E11					
					50						
1830091	metformiin+sitaglip tiin, 850mg+50mg	A10BD0 7	SITAGLIPTIN/METFOR MIN HYDROCHLORIDE SANDOZ, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	E14-E14, E11- E11					
					50						
1833173	metformiin+sitaglip tiin, 850mg+50mg	A10BD0 7	METFORMIN HYDROCHLORIDE/SIT AGLIPTIN GRINDEKS, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Grindeks AS	50						
					75	E11-E11, E14- E14					
1349401	metformiin+vildagli ptiin, 1000mg+50mg	A10BD0 8	EUCREAS, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Novartis Europharm Limited	50						
					75	E11-E11, E14- E14					
1714968	metformiin+vildagli ptiin, 1000mg+50mg	A10BD0 8	VILSPOX, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	E11-E11, E14- E14					
					50						
1720864	metformiin+vildagli ptiin, 1000mg+50mg	A10BD0 8	DALTEX, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Medochemie Limited	75	E11-E11, E14- E14					
					50						
1815397	metformiin+vildagli ptiin, 1000mg+50mg	A10BD0 8	IPINZAN, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Zentiva k.s.	75	E11-E11, E14- E14					
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1848775	metformiin+vildagli ptiin, 1000mg+50mg	A10BD0 8	VILDAGLIPTIN/ METFORMIN ELVIM, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	SIA Elvim	75	E11-E11, E14- E14					
					50						
1878554	metformiin+vildagli ptiin, 1000mg+50mg	A10BD0 8	VILDAGLIPTIN/METFO RMIN HYDROCHLORIDE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Accord Healthcare S.L.U.	50						
					75	E11-E11, E14- E14					
1897397	metformiin+vildagli ptiin, 1000mg+50mg	A10BD0 8	VILSPOX, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Ideal Trade Links UAB	50						
					75	E11-E11, E14- E14					
1349344	metformiin+vildagli ptiin, 850mg+50mg	A10BD0 8	EUCREAS, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Novartis Europharm Limited	75	E11-E11, E14- E14					
					50						
1714913	metformiin+vildagli ptiin, 850mg+50mg	A10BD0 8	VILSPOX, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	E11-E11, E14- E14					
1720796	metformiin+vildagli ptiin, 850mg+50mg	A10BD0 8	DALTEX, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Medochemie Limited	50						
					75	E11-E11, E14- E14					
1815353	metformiin+vildagli ptiin, 850mg+50mg	A10BD0 8	IPINZAN, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Zentiva k.s.	75	E11-E11, E14- E14					
					50						
1848764	metformiin+vildagli ptiin, 850mg+50mg	A10BD0 8	VILDAGLIPTIN/ METFORMIN ELVIM, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	SIA Elvim	75	E11-E11, E14- E14					
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1878532	metformiin+vildagli ptiin, 850mg+50mg	A10BD0 8	VILDAGLIPTIN/METFO RMIN HYDROCHLORIDE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Accord Healthcare S.L.U.	50						
					75	E11-E11, E14- E14					
1897364	metformiin+vildagli ptiin, 850mg+50mg	A10BD0 8	VILSPOX, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Ideal Trade Links UAB	50						
					75	E11-E11, E14- E14					
1000674	metoklopramiid, 10mg	A03FA0 1	CERUCAL, tablett, 50TK	Teva Pharma B.V.	50						
					100	C00-D48					
1699050	metoklopramiid, 10mg	A03FA0 1	METOCLOPRAMIDE ACCORD, tablett, 50TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					100	C00-D48					
1327643	metoksüpolüetülee nglükool- beetaepoetiin, 100mcg 0.3ml	B03XA0 3	MIRCERA, süstelahus süstlis, 0.3ml 1TK	Roche Registration GmbH	50						
					100	D63-D63, T86- T86	Nefroloog, Uroloog, Pediaater				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
					100	D46-D46, D47.1-D47.1	Hematoloog				
1370540	metoksüpolüetülee nglükool- beetaepoetiin, 120mcg 0.3ml	B03XA0 3	MIRCERA, süstelahus süstlis, 0.3ml 1TK	Roche Registration GmbH	100	D46-D46, D47.1-D47.1	Hematoloog				
					50						
					100	D63-D63, T86- T86	Uroloog, Pediaater, Nefroloog				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
1327665	metoksüpolüetülee nglükool- beetaepoetiin, 200mcg 0.3ml	B03XA0 3	MIRCERA, süstelahus süstlis, 0.3ml 1TK	Roche Registration GmbH	50						
					100	D63-D63, T86- T86	Uroloog, Pediaater, Nefroloog				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
					100	D46-D46, D47.1-D47.1	Hematoloog				

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1327621	metoksüpolüetülee nglükool- beetaepoetiin, 50mcg 0.3ml	B03XA0 3	MIRCERA, süstelahus süstlis, 0.3ml 1TK	Roche Registration GmbH	100	D46-D46, D47.1-D47.1	Hematoloog				
					100	D63-D63, T86- T86	Nefroloog, Pediaater, Uroloog				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
					50						
1327632	metoksüpolüetülee nglükool- beetaepoetiin, 75mcg 0.3ml	B03XA0 3	MIRCERA, süstelahus süstlis, 0.3ml 1TK	Roche Registration GmbH	100	D63-D63, T86- T86	Pediaater, Uroloog, Nefroloog				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
					50						
					100	D46-D46, D47.1-D47.1	Hematoloog				
1010811	metoprolool, 100mg	C07AB0 2	EMZOK, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Teva B.V.	75	I47-I49, I50-I50, I20-I20, I10-I13, I15-I15					
					50						
1019720	metoprolool, 100mg	C07AB0 2	BETALOC ZOK 100, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Recordati Ireland Limited	75	I47-I49, I50-I50, I20-I20, I10-I13, I15-I15					
					50						
1224278	metoprolool, 100mg	C07AB0 2	METOZOK, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	I47-I49, I50-I50, I20-I20, I10-I13, I15-I15					
1224290	metoprolool, 100mg	C07AB0 2	METOZOK, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	I47-I49, I50-I50, I20-I20, I10-I13, I15-I15					
1672286	metoprolool, 100mg	C07AB0 2	BLOXAZOC 100, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	KRKA, d.d., Novo mesto	75	I47-I49, I50-I50, I20-I20, I10-I13, I15-I15					
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1083406	metoprolol, 25mg	C07AB02	BETALOC ZOK 25, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK	Recordati Ireland Limited	50						
					75	I47-I49, I50-I50, I20-I20, I10-I13, I15-I15					
1224201	metoprolol, 25mg	C07AB02	METOZOK, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	I47-I49, I50-I50, I20-I20, I10-I13, I15-I15					
					50						
1672130	metoprolol, 25mg	C07AB02	BLOXAZOC 25, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
					75	I47-I49, I50-I50, I20-I20, I10-I13, I15-I15					
1009055	metoprolol, 50mg	C07AB02	METOPROLOL-RATIOPHARM 50 MG, tablett, 30TK	Ratiopharm GmbH	75	I47-I49, I50-I50, I20-I20, I10-I13, I15-I15					
					50						
1010800	metoprolol, 50mg	C07AB02	EMZOK, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Teva B.V.	50						
					75	I47-I49, I50-I50, I20-I20, I10-I13, I15-I15					
1019719	metoprolol, 50mg	C07AB02	BETALOC ZOK 50, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Recordati Ireland Limited	75	I47-I49, I50-I50, I20-I20, I10-I13, I15-I15					
					50						
1072190	metoprolol, 50mg	C07AB02	METOPROLOL STADA, tablett, 100TK	Stada Arzneimittel AG	75	I47-I49, I50-I50, I20-I20, I10-I13, I15-I15					
					50						
1224245	metoprolol, 50mg	C07AB02	METOZOK, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	I47-I49, I50-I50, I20-I20, I10-I13, I15-I15					
					50						



Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1224267	metoprolool, 50mg	C07AB02	METOZOK, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	I47-I49, I50-I50, I20-I20, I10-I13, I15-I15					
1282160	metoprolool, 50mg	C07AB02	METOPROLOL- RATIOPHARM RETARD 50 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Ratiopharm GmbH	75	I47-I49, I50-I50, I20-I20, I10-I13, I15-I15					
					50						
1672174	metoprolool, 50mg	C07AB02	BLOXAZOC 50, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
					75	I47-I49, I50-I50, I20-I20, I10-I13, I15-I15					
1672242	metoprolool, 50mg	C07AB02	BLOXAZOC 50, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	KRKA, d.d., Novo mesto	75	I47-I49, I50-I50, I20-I20, I10-I13, I15-I15					
					50						
1688744	metotreksaat, 2,5mg	L04AX03	TREXAN, tablett, 100TK	Orion Corporation	75	L40-L40	Dermatovenerol oog, Pediaater				
					100	C00-D48	Hematoloog, Onkoloog, Pediaater – hematoloog- onkoloog				
					50						
					75	M30-M35, M05- M08, M45-M46	Pediaater, Reumatoloog				

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1847651	metotreksaat, 2,5mg	L04AX0 3	TREXAN, tablett, 100TK	Ideal Trade Links UAB	50						
					100	C00-D48	Onkoloog, Hematoloog, Pediaater – hematoloog- onkoloog				
					75	M45-M46, M30- M35, M05-M08	Reumatoloog, Pediaater				
					75	L40-L40	Dermatovenerol oog, Pediaater				
3036631	metotreksaat, 2,5mg	L04AX0 3	TREXAN, tablett, 100TK	Ideal Trade Links UAB	50						
					100	C00-D48	Onkoloog, Hematoloog, Pediaater – hematoloog- onkoloog				
					75	L40-L40	Pediaater, Dermatovenerol oog				
					75	M30-M35, M05- M08, M45-M46	Pediaater, Reumatoloog				

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1418914	metotreksaat, 20mg 1ml	L04AX0 3	EBETREX 20MG/ML, süstelahus süstlis, 1ml 5TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	M08.0-M08.8, M46.8-M46.8, M05.8-M05.8, M07.0-M07.6, M05.3-M05.3, M45-M45, M06.0-M06.0	Pediaater, Reumatoloog				patsientidele, kellel eelneva 3 kuu jooksul kombineeritud haiguse kulgu mõjutav ravi, sh adekvaatses annuses suukaudse metotreksaadiga ja glükokortikosteroidiga madalas annuses on olnud ebaefektiivne või on tekkinud ravi katkestama sundivad või annuse tõstmist takistavad seedetrakti poolset kõrvaltoimed
					75	L40-L40	Pediaater, Dermatovenerol oog				ravile allumatu raske psoriaasiga patsientidele, kellel eelnev suukaudne ravi, sh adekvaatses annuses suukaudse metotreksaadiga on olnud ebaefektiivne või tekitanud ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed
					75	M08.0-M08.8, M46.8-M46.8, M05.8-M05.8, M07.0-M07.6, M05.3-M05.3, M45-M45, M06.0-M06.0	Reumatoloog, Pediaater			5,00	
1418925	metotreksaat, 20mg 1ml	L04AX0 3	EBETREX 20MG/ML, süstelahus süstlis, 1.25ml 5TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	M08.0-M08.8, M46.8-M46.8, M05.8-M05.8, M07.0-M07.6, M05.3-M05.3, M45-M45, M06.0-M06.0	Reumatoloog, Pediaater			5,00	
					75	L40-L40	Dermatovenerol oog, Pediaater				ravile allumatu raske psoriaasiga patsientidele, kellel eelnev suukaudne ravi, sh adekvaatses annuses suukaudse metotreksaadiga on olnud ebaefektiivne või tekitanud ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed
					75	M08.0-M08.8, M46.8-M46.8, M05.8-M05.8, M07.0-M07.6, M05.3-M05.3, M45-M45, M06.0-M06.0	Reumatoloog, Pediaater				patsientidele, kellel eelneva 3 kuu jooksul kombineeritud haiguse kulgu mõjutav ravi, sh adekvaatses annuses suukaudse metotreksaadiga ja glükokortikosteroidiga madalas annuses on olnud ebaefektiivne või on tekkinud ravi katkestama sundivad või annuse tõstmist takistavad seedetrakti poolset kõrvaltoimed

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1547074	metotreksaat, 20mg 1ml	L04AX0 3	EBETREX 20MG/ML, süstelahus süstlis, 0.5ml 5TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	L40-L40	Pediaater, Dermatovenerol oog				ravile allumatu raske psoriaasiga patsientidele, kellel eelnev suukaudne ravi, sh adekvaatses annuses suukaudse metotreksaadiga on olnud ebaefektiivne või tekitanud ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed
					75	M08.0-M08.8, M46.8-M46.8, M05.8-M05.8, M07.0-M07.6, M05.3-M05.3, M45-M45, M06.0-M06.0	Reumatoloog, Pediaater				patsientidele, kellel eelneva 3 kuu jooksul kombineeritud haiguse kulgu mõjutav ravi, sh adekvaatses annuses suukaudse metotreksaadiga ja glükokortikosteroidiga madalas annuses on olnud ebaefektiivne või on tekkinud ravi katkestama sundivad või annuse tõstmist takistavad seedetrakti poolset kõrvaltoimed
					75	M08.0-M08.8, M46.8-M46.8, M05.8-M05.8, M07.0-M07.6, M05.3-M05.3, M45-M45, M06.0-M06.0	Reumatoloog, Pediaater			5,00	
1547120	metotreksaat, 20mg 1ml	L04AX0 3	EBETREX 20MG/ML, süstelahus süstlis, 0.75ml 5TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	M08.0-M08.8, M46.8-M46.8, M05.8-M05.8, M07.0-M07.6, M05.3-M05.3, M45-M45, M06.0-M06.0	Pediaater, Reumatoloog				patsientidele, kellel eelneva 3 kuu jooksul kombineeritud haiguse kulgu mõjutav ravi, sh adekvaatses annuses suukaudse metotreksaadiga ja glükokortikosteroidiga madalas annuses on olnud ebaefektiivne või on tekkinud ravi katkestama sundivad või annuse tõstmist takistavad seedetrakti poolset kõrvaltoimed
					75	L40-L40	Pediaater, Dermatovenerol oog				ravile allumatu raske psoriaasiga patsientidele, kellel eelnev suukaudne ravi, sh adekvaatses annuses suukaudse metotreksaadiga on olnud ebaefektiivne või tekitanud ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed
					75	M08.0-M08.8, M46.8-M46.8, M05.8-M05.8, M07.0-M07.6, M05.3-M05.3, M45-M45, M06.0-M06.0	Pediaater, Reumatoloog			5,00	

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1304637	metotreksaat, 50mg 1ml	L04AX0 3	METEX, süstelahus süstlis, 0.2ml 6TK	Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH	75	L40-L40	Pediaater, Dermatovenerol oog				ravile allumatu raske psoriaasiga patsientidele, kellel eelnev suukaudne ravi, sh adekvaatses annuses suukaudse metotreksaadiga on olnud ebaefektiivne või tekitanud ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed
					75	M08.0-M08.8, M46.8-M46.8, M05.8-M05.8, M07.0-M07.6, M05.3-M05.3, M45-M45, M06.0-M06.0	Pediaater, Reumatoloog				patsientidele, kellel eelneva 3 kuu jooksul kombineeritud haiguse kulgu mõjutav ravi, sh adekvaatses annuses suukaudse metotreksaadiga ja glükokortikosteroidiga madalas annuses on olnud ebaefektiivne või on tekkinud ravi katkestama sundivad või annuse tõstmist takistavad seedetrakti poolset kõrvaltoimed
					75	M08.0-M08.8, M46.8-M46.8, M05.8-M05.8, M07.0-M07.6, M05.3-M05.3, M45-M45, M06.0-M06.0	Reumatoloog, Pediaater			5,00	
1304682	metotreksaat, 50mg 1ml	L04AX0 3	METEX, süstelahus süstlis, 0.3ml 6TK	Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH	75	M08.0-M08.8, M46.8-M46.8, M05.8-M05.8, M07.0-M07.6, M05.3-M05.3, M45-M45, M06.0-M06.0	Reumatoloog, Pediaater			5,00	
					75	M08.0-M08.8, M46.8-M46.8, M05.8-M05.8, M07.0-M07.6, M05.3-M05.3, M45-M45, M06.0-M06.0	Pediaater, Reumatoloog				patsientidele, kellel eelneva 3 kuu jooksul kombineeritud haiguse kulgu mõjutav ravi, sh adekvaatses annuses suukaudse metotreksaadiga ja glükokortikosteroidiga madalas annuses on olnud ebaefektiivne või on tekkinud ravi katkestama sundivad või annuse tõstmist takistavad seedetrakti poolset kõrvaltoimed
					75	L40-L40	Dermatovenerol oog, Pediaater				ravile allumatu raske psoriaasiga patsientidele, kellel eelnev suukaudne ravi, sh adekvaatses annuses suukaudse metotreksaadiga on olnud ebaefektiivne või tekitanud ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1304738	metotreksaat, 50mg 1ml	L04AX0 3	METEX, süstelahus süstlis, 0.4ml 6TK	Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH	75	L40-L40	Dermatovenerol oog, Pediaater				ravile allumatu raske psoriaasiga patsientidele, kellel eelnev suukaudne ravi, sh adekvaatses annuses suukaudse metotreksaadiga on olnud ebaefektiivne või tekitanud ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed
					75	M08.0-M08.8, M46.8-M46.8, M05.8-M05.8, M07.0-M07.6, M05.3-M05.3, M45-M45, M06.0-M06.0	Pediaater, Reumatoloog			5,00	
					75	M08.0-M08.8, M46.8-M46.8, M05.8-M05.8, M07.0-M07.6, M05.3-M05.3, M45-M45, M06.0-M06.0	Reumatoloog, Pediaater				patsientidele, kellel eelneva 3 kuu jooksul kombineeritud haiguse kulgu mõjutav ravi, sh adekvaatses annuses suukaudse metotreksaadiga ja glükokortikosteroidiga madalas annuses on olnud ebaefektiivne või on tekkinud ravi katkestama sundivad või annuse tõstmist takistavad seedetrakti poolsed kõrvaltoimed
1304783	metotreksaat, 50mg 1ml	L04AX0 3	METEX, süstelahus süstlis, 0.5ml 6TK	Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH	75	L40-L40	Pediaater, Dermatovenerol oog				ravile allumatu raske psoriaasiga patsientidele, kellel eelnev suukaudne ravi, sh adekvaatses annuses suukaudse metotreksaadiga on olnud ebaefektiivne või tekitanud ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed
					75	M08.0-M08.8, M46.8-M46.8, M05.8-M05.8, M07.0-M07.6, M05.3-M05.3, M45-M45, M06.0-M06.0	Pediaater, Reumatoloog				patsientidele, kellel eelneva 3 kuu jooksul kombineeritud haiguse kulgu mõjutav ravi, sh adekvaatses annuses suukaudse metotreksaadiga ja glükokortikosteroidiga madalas annuses on olnud ebaefektiivne või on tekkinud ravi katkestama sundivad või annuse tõstmist takistavad seedetrakti poolsed kõrvaltoimed
					75	M08.0-M08.8, M46.8-M46.8, M05.8-M05.8, M07.0-M07.6, M05.3-M05.3, M45-M45, M06.0-M06.0	Pediaater, Reumatoloog			5,00	

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1033658	metronidasool, 1g	G01AF0 1	ARILIN, vaginaalsuposiit, 2TK	Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel	50						
1008706	metronidasool, 500mg	P01AB0 1	METRONIDAZOL ORIFARM, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Orifarm Healthcare A/S	50						
1223749	metronidasool, 7,5mg 1g	D06BX0 1	METROSA, geel, 25g 1TK	Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel	50						
1819234	metronidasool, 7,5mg 1g	D06BX0 1	ROZEX, geel, 30g 1TK	Lex Ano UAB	50						
1829943	metronidasool, 7,5mg 1g	D06BX0 1	ROZEX, geel, 30g 1TK	Ideal Trade Links UAB	50						
1869969	metronidasool, 7,5mg 1g	D06BX0 1	METROSA, geel, 25g 1TK	Ideal Trade Links UAB	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1396335	metüülfenidaat, 10mg	N06BA04	MEDIKINET XL 10MG, toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	Medice Arzneimittel Puetter GmbH & Co. KG	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater – laste- ja noorukitepsühhi aater	esmane	6,00	20,00	ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatiline meeskond (2 Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti 2 erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, CGAS skoor ≤50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega;
					75	F90.0-F90.1	Psühhiaater, Psühhiaater – laste- ja noorukitepsühhi aater	esmane	20,00		ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: esineb mõõdukas kuni raske funktsionaalne kahjustus vähemalt kahes olukorras (sotsiaalne, akadeemiline ja/või tööalane tegevus), haigus mõjutab konkreetse inimese elu mitmeid aspekte ning viide haiguse esinemisele on tõendatult tuvastatav lapseeast. Ravimi väljakirjutamise õigus esmavalikuna on kaasuva sõltuvushäire puudumisel ning teise valikuna kaasuva sõltuvushäire esinemisel, kui atomoksetiin on olnud ebaefektiivne või talumatu. Ravi efektiivsus on hinnatav 6-nädalase perioodi jooksul kasutamisel adekvaatses annuses.



Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1838033	metüülfenidaat, 10mg	N06BA04	AFFENID, toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	Zentiva k.s.	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater – laste- ja noorukitepsühhi aater	esmane	6,00	20,00	ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatiline meeskond (2 Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti 2 erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, CGAS skoor ≤50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega;
					75	F90.0-F90.1	Psühhiaater – laste- ja noorukitepsühhi aater, Psühhiaater	esmane	20,00		ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: esineb mõõdukas kuni raske funktsionaalne kahjustus vähemalt kahes olukorras (sotsiaalne, akadeemiline ja/või tööalane tegevus), haigus mõjutab konkreetse inimese elu mitmeid aspekte ning viide haiguse esinemisele on tõendatult tuvastatav lapseeas. Ravimi väljakirjutamise õigus esmavalikuna on kaasuva sõltuvushäire puudumisel ning teise valikuna kaasuva sõltuvushäire esinemisel, kui atomoksetiin on olnud ebaefektiivne või talumatu. Ravi efektiivsus on hinnatav 6-nädalase perioodi jooksul kasutamisel adekvaatses annuses.

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1313569	metüülfenidaat, 18mg	N06BA04	CONCERTA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Johnson & Johnson UAB	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater – laste- ja noorukitepsühhi aater	esmane	6,00	20,00	ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatiline meeskond (2 Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed- eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti 2 erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, CGAS skoor ≤50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega;
					75	F90.0-F90.1	Psühhiaater, Psühhiaater – laste- ja noorukitepsühhi aater	esmane	20,00		ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: esineb mõõdukas kuni raske funktsionaalne kahjustus vähemalt kahes olukorras (sotsiaalne, akadeemiline ja/või tööalane tegevus), haigus mõjutab konkreetse inimese elu mitmeid aspekte ning viide haiguse esinemisele on tõendatult tuvastatav lapseeast. Ravimi väljakirjutamise õigus esmavalikuna on kaasuva sõltuvushäire puudumisel ning teise valikuna kaasuva sõltuvushäire esinemisel, kui atomoksetiin on olnud ebaefektiivne või talumatu. Ravi efektiivsus on hinnatav 6-nädalase perioodi jooksul kasutamisel adekvaatses annuses.

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1396368	metüülfenidaat, 20mg	N06BA04	MEDIKINET XL 20MG, toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	Medice Arzneimittel Puetter GmbH & Co. KG	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater – laste- ja noorukitepsühhi aater	esmane	6,00	20,00	ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatiline meeskond (2 Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti 2 erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, CGAS skoor ≤50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega;
					75	F90.0-F90.1	Psühhiaater – laste- ja noorukitepsühhi aater, Psühhiaater	esmane	20,00		ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: esineb mõõdukas kuni raske funktsionaalne kahjustus vähemalt kahes olukorras (sotsiaalne, akadeemiline ja/või tööalane tegevus), haigus mõjutab konkreetse inimese elu mitmeid aspekte ning viide haiguse esinemisele on tõendatult tuvastatav lapseast. Ravimi väljakirjutamise õigus esmavalikuna on kaasuva sõltuvushäire puudumisel ning teise valikuna kaasuva sõltuvushäire esinemisel, kui atomoksetiin on olnud ebaefektiivne või talumatu. Ravi efektiivsus on hinnatav 6-nädalase perioodi jooksul kasutamisel adekvaatses annuses.

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1838101	metüülfenidaat, 20mg	N06BA04	AFFENID, toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	Zentiva k.s.	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater – laste- ja noorukitepsühhi aater	esmane	6,00	20,00	ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatiline meeskond (2 Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed- eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti 2 erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, CGAS skoor ≤50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega;
					75	F90.0-F90.1	Psühhiaater – laste- ja noorukitepsühhi aater, Psühhiaater	esmane	20,00		ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: esineb mõõdukas kuni raske funktsionaalne kahjustus vähemalt kahes olukorras (sotsiaalne, akadeemiline ja/või tööalane tegevus), haigus mõjutab konkreetse inimese elu mitmeid aspekte ning viide haiguse esinemisele on tõendatult tuvastatav lapseeas. Ravimi väljakirjutamise õigus esmavalikuna on kaasuva sõltuvushäire puudumisel ning teise valikuna kaasuva sõltuvushäire esinemisel, kui atomoksetiin on olnud ebaefektiivne või talumatu. Ravi efektiivsus on hinnatav 6-nädalase perioodi jooksul kasutamisel adekvaatses annuses.

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1396391	metüülfenidaat, 30mg	N06BA04	MEDIKINET XL 30MG, toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	Medice Arzneimittel Puetter GmbH & Co. KG	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater – laste- ja noorukitepsühhi aater	esmane	6,00	20,00	ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatiline meeskond (2 Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti 2 erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, CGAS skoor ≤50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega;
					75	F90.0-F90.1	Psühhiaater, Psühhiaater – laste- ja noorukitepsühhi aater	esmane	20,00		ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: esineb mõõdukas kuni raske funktsionaalne kahjustus vähemalt kahes olukorras (sotsiaalne, akadeemiline ja/või tööalane tegevus), haigus mõjutab konkreetse inimese elu mitmeid aspekte ning viide haiguse esinemisele on tõendatult tuvastatav lapseast. Ravimi väljakirjutamise õigus esmavalikuna on kaasuva sõltuvushäire puudumisel ning teise valikuna kaasuva sõltuvushäire esinemisel, kui atomoksetiin on olnud ebaefektiivne või talumatu. Ravi efektiivsus on hinnatav 6-nädalase perioodi jooksul kasutamisel adekvaatses annuses.

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1838178	metüülfenidaat, 30mg	N06BA04	AFFENID, toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	Zentiva k.s.	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater – laste- ja noorukitepsühhi aater	esmane	6,00	20,00	ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatiline meeskond (2 Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed- eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti 2 erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, CGAS skoor ≤50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega;
					75	F90.0-F90.1	Psühhiaater – laste- ja noorukitepsühhi aater, Psühhiaater	esmane	20,00		ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: esineb mõõdukas kuni raske funktsionaalne kahjustus vähemalt kahes olukorras (sotsiaalne, akadeemiline ja/või tööalane tegevus), haigus mõjutab konkreetse inimese elu mitmeid aspekte ning viide haiguse esinemisele on tõendatult tuvastatav lapseeas. Ravimi väljakirjutamise õigus esmavalikuna on kaasuva sõltuvushäire puudumisel ning teise valikuna kaasuva sõltuvushäire esinemisel, kui atomoksetiin on olnud ebaefektiivne või talumatu. Ravi efektiivsus on hinnatav 6-nädalase perioodi jooksul kasutamisel adekvaatses annuses.

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1313581	metüülfenidaat, 36mg	N06BA04	CONCERTA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Johnson & Johnson UAB	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater – laste- ja noorukitepsühhi aater	esmane	6,00	20,00	ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatiline meeskond (2 Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed- eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti 2 erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, CGAS skoor ≤50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega;
					75	F90.0-F90.1	Psühhiaater, Psühhiaater – laste- ja noorukitepsühhi aater	esmane	20,00		ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: esineb mõõdukas kuni raske funktsionaalne kahjustus vähemalt kahes olukorras (sotsiaalne, akadeemiline ja/või tööalane tegevus), haigus mõjutab konkreetse inimese elu mitmeid aspekte ning viide haiguse esinemisele on tõendatult tuvastatav lapseeast. Ravimi väljakirjutamise õigus esmavalikuna on kaasuva sõltuvushäire puudumisel ning teise valikuna kaasuva sõltuvushäire esinemisel, kui atomoksetiin on olnud ebaefektiivne või talumatu. Ravi efektiivsus on hinnatav 6-nädalase perioodi jooksul kasutamisel adekvaatses annuses.

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1395266	metüülfenidaat, 40mg	N06BA04	MEDIKINET XL 40MG, toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	Medice Arzneimittel Puetter GmbH & Co. KG	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater – laste- ja noorukitepsühhi aater	esmane	6,00	20,00	ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatiline meeskond (2 Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti 2 erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, CGAS skoor ≤50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega;
					75	F90.0-F90.1	Psühhiaater, Psühhiaater – laste- ja noorukitepsühhi aater	esmane	20,00		ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: esineb mõõdukas kuni raske funktsionaalne kahjustus vähemalt kahes olukorras (sotsiaalne, akadeemiline ja/või tööalane tegevus), haigus mõjutab konkreetse inimese elu mitmeid aspekte ning viide haiguse esinemisele on tõendatult tuvastatav lapseast. Ravimi väljakirjutamise õigus esmavalikuna on kaasuva sõltuvushäire puudumisel ning teise valikuna kaasuva sõltuvushäire esinemisel, kui atomoksetiin on olnud ebaefektiivne või talumatu. Ravi efektiivsus on hinnatav 6-nädalase perioodi jooksul kasutamisel adekvaatses annuses.



Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1838235	metüülfenidaat, 40mg	N06BA04	AFFENID, toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	Zentiva k.s.	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater – laste- ja noorukitepsühhi aater	esmane	6,00	20,00	ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatiline meeskond (2 Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed- eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti 2 erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, CGAS skoor ≤50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega;
					75	F90.0-F90.1	Psühhiaater – laste- ja noorukitepsühhi aater, Psühhiaater	esmane	20,00		ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: esineb mõõdukas kuni raske funktsionaalne kahjustus vähemalt kahes olukorras (sotsiaalne, akadeemiline ja/või tööalane tegevus), haigus mõjutab konkreetse inimese elu mitmeid aspekte ning viide haiguse esinemisele on tõendatult tuvastatav lapseeas. Ravimi väljakirjutamise õigus esmavalikuna on kaasuva sõltuvushäire puudumisel ning teise valikuna kaasuva sõltuvushäire esinemisel, kui atomoksetiin on olnud ebaefektiivne või talumatu. Ravi efektiivsus on hinnatav 6-nädalase perioodi jooksul kasutamisel adekvaatses annuses.

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1313660	metüülfenidaat, 54mg	N06BA04	CONCERTA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Johnson & Johnson UAB	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater – laste- ja noorukitepsühhi aater	esmane	6,00	20,00	ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatiline meeskond (2 Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed- eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti 2 erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, CGAS skoor ≤50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega;
					75	F90.0-F90.1	Psühhiaater, Psühhiaater – laste- ja noorukitepsühhi aater	esmane	20,00		ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: esineb mõõdukas kuni raske funktsionaalne kahjustus vähemalt kahes olukorras (sotsiaalne, akadeemiline ja/või tööalane tegevus), haigus mõjutab konkreetse inimese elu mitmeid aspekte ning viide haiguse esinemisele on tõendatult tuvastatav lapseeast. Ravimi väljakirjutamise õigus esmavalikuna on kaasuva sõltuvushäire puudumisel ning teise valikuna kaasuva sõltuvushäire esinemisel, kui atomoksetiin on olnud ebaefektiivne või talumatu. Ravi efektiivsus on hinnatav 6-nädalase perioodi jooksul kasutamisel adekvaatses annuses.

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1838291	metüülfenidaat, 60mg	N06BA04	AFFENID, toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	Zentiva k.s.	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater – laste- ja noorukitepsühhi aater	esmane	6,00	20,00	ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatiline meeskond (2 Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed- eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti 2 erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, CGAS skoor ≤50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega;
					75	F90.0-F90.1	Psühhiaater, Psühhiaater – laste- ja noorukitepsühhi aater	esmane	20,00		ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: esineb mõõdukas kuni raske funktsionaalne kahjustus vähemalt kahes olukorras (sotsiaalne, akadeemiline ja/või tööalane tegevus), haigus mõjutab konkreetse inimese elu mitmeid aspekte ning viide haiguse esinemisele on tõendatult tuvastatav lapseeast. Ravimi väljakirjutamise õigus esmavalikuna on kaasuva sõltuvushäire puudumisel ning teise valikuna kaasuva sõltuvushäire esinemisel, kui atomoksetiin on olnud ebaefektiivne või talumatu. Ravi efektiivsus on hinnatav 6-nädalase perioodi jooksul kasutamisel adekvaatses annuses.

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1009099	metüülprednisoloon, 16mg	H02AB04	MEDROL, tablett, 50TK	Pfizer Europe MA EEIG	75	K50-K51, K73-K74	Pediaater, Gastroenteroloog				
					100	Z94-Z94, T86-T86					
					50						
					75	L12-L12, L23-L23, L13.0-L13.0, L10-L10, L20-L20	Dermatoveneroloog, Pediaater, Allergoloog-immunoloog				
					100	G35-G35	Neuroloog, Pediaater	esmane			
					75	N00-N08	Pediaater, Nefroloog				
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46	Reumatoloog, Pediaater	esmane			
1866922	metüülprednisoloon, 16mg	H02AB04	MEDROL, tablett, 50TK	Lex Ano UAB	75	L12-L12, L23-L23, L13.0-L13.0, L10-L10, L20-L20	Pediaater, Dermatoveneroloog, Allergoloog-immunoloog				
					100	Z94-Z94, T86-T86					
					75	N00-N08	Pediaater, Nefroloog				
					100	G35-G35	Pediaater, Neuroloog	esmane			
					75	K50-K51, K73-K74	Gastroenteroloog, Pediaater				
					75	M45-M46, M30-M35, M05-M08	Reumatoloog, Pediaater	esmane			
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1009190	metüülprednisoloon, 40mg 1ml	H02AB04	DEPO-MEDROL, süstesuspensioon, 1ml 1TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	Z94-Z94, T86-T86					
					75	N00-N08	Nefroloog, Pediaater				
					50						
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46	Reumatoloog, Pediaater	esmane			
					100	G35-G35	Neuroloog, Pediaater	esmane			
1065754	metüülprednisoloon, 4mg	H02AB04	MEDROL, tablett, 100TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	G35-G35	Neuroloog, Pediaater	esmane			
					100	Z94-Z94, T86-T86					
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46	Pediaater, Reumatoloog	esmane			
					50						
					75	N00-N08	Pediaater, Nefroloog				
					75	L12-L12, L23-L23, L13.0-L13.0, L10-L10, L20-L20	Allergoloog-immunoloog, Dermatoveneroloog, Pediaater				
					75	K50-K51, K73-K74	Gastroenteroloog, Pediaater				

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1868328	metüülprednisoloon, 4mg	H02AB04	MEDROL, tablett, 100TK	Lex Ano UAB	50						
					100	Z94-Z94, T86-T86					
					75	M05-M08, M30-M35, M45-M46	Pediaater, Reumatoloog	esmane			
					100	G35-G35	Pediaater, Neuroloog	esmane			
					75	L12-L12, L23-L23, L13.0-L13.0, L10-L10, L20-L20	Pediaater, Allergoloog-immunoloog, Dermatoveneroloog				
					75	K50-K51, K73-K74	Gastroenteroloog, Pediaater				
					75	N00-N08	Pediaater, Nefroloog				
1028102	metüülprednisoloonatseponaat, 1mg 1g	D07AC14	ADVANTAN, kreem, 15g 1TK	LEO Pharma A/S	50						
					75	L20-L20, L40-L40, L23-L23					
1062009	metüülprednisoloonatseponaat, 1mg 1g	D07AC14	ADVANTAN, salv, 15g 1TK	LEO Pharma A/S	75	L20-L20, L40-L40, L23-L23					
					50						
1133356	metüülprednisoloonatseponaat, 1mg 1g	D07AC14	ADVANTAN MILK, nahaemulsioon, 20g 1TK	LEO Pharma A/S	75	L20-L20, L40-L40, L23-L23					
					50						
3031681	metüülprednisoloonatseponaat, 1mg 1g	D07AC14	ADVANTAN MILK, nahaemulsioon, 50g 1TK	Ideal Trade Links UAB	75	L20-L20, L40-L40, L23-L23					
					50						
1764794	midostauriin, 25mg	L01EX10	RYDAPT, pehmekapsel, 56TK	Novartis Europharm Limited	100	C92-C92	Hematoloog				esmakordselt diagnoositud ägeda müeloidleukeemia ja FLT3 mutatsiooniga täiskasvanud patsientidele koos standardse antratsükliini ja tsütarabiini induktsioonkeemiaraviga ning koos suures annuses tsütarabiini konsolideeriva keemiaraviga, millele täieliku ravivastuse korral järgneb säilitusravi ainult midostauriiniga

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1722013	migalastaat, 123mg	A16AX1 4	GALAFOLD, kõvakapsel, 14TK	Amicus Therapeutics Europe Limited	100	E75.2-E75.2	Sisearst, Neuroloog				
1024579	mikonasool, 20mg 1g	A01AB0 9	DAKTARIN, suukaudne geel, 40g 1TK	Johnson & Johnson UAB	50						
1828379	mikonasool, 20mg 1g	A01AB0 9	DAKTARIN, suukaudne geel, 40g 1TK	Lex Ano UAB	50						
1891379	mikonasool, 20mg 1g	A01AB0 9	DAKTARIN, suukaudne geel, 40g 1TK	Ideal Trade Links UAB	50						
1604337	mirabegroon, 50mg	G04BD1 2	BETMIGA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Astellas Pharma Europe B.V.	50						
1181607	mirtasapiin, 15mg	N06AX1 1	MIRTASTAD 15 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Stada Arzneimittel AG	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1243684	mirtasapiin, 15mg	N06AX1 1	MIRTAZAPIN ORION, suus dispergeeruv tablett, 30TK	Orion Corporation	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1273137	mirtasapiin, 15mg	N06AX1 1	MIRTAZAPIN ACTAVIS, suus dispergeeruv tablett, 30TK	Teva B.V.	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
1314683	mirtasapiin, 15mg	N06AX1 1	MIRZATEN Q-TAB, suus dispergeeruv tablett, 30TK	KRKA d.d. Novo mesto	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
1170166	mirtasapiin, 30mg	N06AX1 1	ESPRITAL 30, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Zentiva k.s.	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
1181797	mirtasapiin, 30mg	N06AX1 1	MIRTASTAD 30 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Stada Arzneimittel AG	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1243729	mirtasapiin, 30mg	N06AX1 1	MIRTAZAPIN ORION, suus dispergeeruv tablett, 30TK	Orion Corporation	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1273227	mirtasapiin, 30mg	N06AX1 1	MIRTAZAPIN ACTAVIS, suus disperseeruv tablett, 30TK	Teva B.V.	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1301522	mirtasapiin, 30mg	N06AX1 1	MIRZATEN Q-TAB, suus disperseeruv tablett, 30TK	KRKA d.d. Novo mesto	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1243741	mirtasapiin, 45mg	N06AX1 1	MIRTAZAPIN ORION, suus disperseeruv tablett, 30TK	Orion Corporation	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1154618	moksifloksatsiin, 400mg	J01MA1 4	AVELOX, õhukese polümeerikattega tablett, 5TK	Bayer AG	50	J44-J44, J41- J41, J47-J47, J13-J15					kui beetalaktaam-antibiootikum, tetratsükliin ja makroliid on ebaefektiivsed või vastunäidustatud
1751891	moksifloksatsiin, 400mg	J01MA1 4	FLOXELAN, õhukese polümeerikattega tablett, 5TK	Medochemie Limited	100	F30-F31	Psühhiaater				
					50	J44-J44, J41- J41, J47-J47, J13-J15					kui beetalaktaam-antibiootikum, tetratsükliin ja makroliid on ebaefektiivsed või vastunäidustatud
1145999	moksonidiin, 0,2mg	C02AC0 5	MOXONIDINHEXAL 0,2 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Hexal AG	50						
1155091	moksonidiin, 0,2mg	C02AC0 5	STADAPRESS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Stada Arzneimittel AG	50						
1157778	moksonidiin, 0,2mg	C02AC0 5	MOXOGAMMA 0,2 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Woerwag Pharma GmbH & Co. KG	50						
1247598	moksonidiin, 0,2mg	C02AC0 5	MOXONIDIN ACTAVIS 0,2 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva B.V.	50						
1146079	moksonidiin, 0,3mg	C02AC0 5	MOXONIDINHEXAL 0,3 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Hexal AG	50						



Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1157857	moksonidiin, 0,3mg	C02AC0 5	MOXOGAMMA 0,3 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Woerwag Pharma GmbH & Co. KG	50						
1247677	moksonidiin, 0,3mg	C02AC0 5	MOXONIDIN ACTAVIS 0,3 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva B.V.	50						
1013791	moksonidiin, 0,4mg	C02AC0 5	PHYSIOTENS 0,4 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Viartis SIA	50						
1146170	moksonidiin, 0,4mg	C02AC0 5	MOXONIDINHEXAL 0,4 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Hexal AG	50						
1155259	moksonidiin, 0,4mg	C02AC0 5	STADAPRESS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Stada Arzneimittel AG	50						
1157947	moksonidiin, 0,4mg	C02AC0 5	MOXOGAMMA 0,4 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Woerwag Pharma GmbH & Co. KG	50						
1247756	moksonidiin, 0,4mg	C02AC0 5	MOXONIDIN ACTAVIS 0,4 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva B.V.	50						
1028933	mometasoon, 1mg 1g	D07AC1 3	ELOCON, nahalahus, 20ml 1TK	Organon N.V.	75	L40-L40					
					75	L23-L23, L20- L20					
					50						
1028944	mometasoon, 1mg 1g	D07AC1 3	ELOCON, salv, 20g 1TK	Organon N.V.	75	L40-L40					
					50						
					75	L23-L23, L20- L20					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1028955	mometasoon, 1mg 1g	D07AC1 3	ELOCON, kreem, 20g 1TK	Organon N.V.	75	L40-L40					
					50						
					75	L23-L23, L20- L20					
1833904	mometasoon, 1mg 1g	D07AC1 3	ELOCOM, kreem, 15g 1TK	Lex Ano UAB	75	L23-L23, L40- L40, L20-L20					
					50						
1833915	mometasoon, 1mg 1g	D07AC1 3	ELOCOM, salv, 15g 1TK	Lex Ano UAB	50						
					75	L23-L23, L40- L40, L20-L20					
1847101	mometasoon, 1mg 1g	D07AC1 3	ELOCON, salv, 15g 2TK 1g	Ideal Trade Links UAB	50						
					75	L23-L23, L20- L20, L40-L40					
1028966	mometasoon, 50mcg 1annus	R01AD0 9	NASONEX, ninasprei, suspensioon, 140annus 1TK	Organon N.V.	50						
					75	J30-J30				17,00	
1484298	mometasoon, 50mcg 1annus	R01AD0 9	NASOMETIN, ninasprei, suspensioon, 140annus 1TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	J30-J30				17,00	
					50						
1621224	mometasoon, 50mcg 1annus	R01AD0 9	BRESO, ninasprei, suspensioon, 140annus 1TK	Norameda UAB	50						
					75	J30-J30				17,00	
1820135	mometasoon, 50mcg 1annus	R01AD0 9	NASONEX, ninasprei, suspensioon, 140annus 1TK	Lex Ano UAB	50						
					75	J30-J30				17,00	
1823554	mometasoon, 50mcg 1annus	R01AD0 9	NASONEX, ninasprei, suspensioon, 140annus 1TK	Ideal Trade Links UAB	50						
					75	J30-J30				17,00	
1602087	mometasoon, 50mcg 1mõõttannus	R01AD0 9	KALMENTE, ninasprei, suspensioon, 140mõõttannus 1TK	Zentiva k.s.	75	J30-J30				17,00	
					50						
1641787	mometasoon, 50mcg 1mõõttannus	R01AD0 9	MOMETASONE SANOSWISS, ninasprei, suspensioon, 140mõõttannus 1TK	Sanoswiss UAB	50						
					75	J30-J30				17,00	

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1274116	montelukast, 10mg	R03DC0 3	MONTELUKAST TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Teva Pharma B.V.	50						
					75	J45-J45			11,00		mõõduka ja raske haiguse puhul lisaks püsiravile optimaalses annuses inhaleeritava kortikosteroidiga
					75	J45-J45				11,00	
1289987	montelukast, 10mg	R03DC0 3	MONKASTA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
					75	J45-J45				11,00	
					75	J45-J45			11,00		mõõduka ja raske haiguse puhul lisaks püsiravile optimaalses annuses inhaleeritava kortikosteroidiga
1273722	montelukast, 4mg	R03DC0 3	MONTELUKAST TEVA, närimistablett, 28TK	Teva Pharma B.V.	75	J45-J45			11,00		mõõduka ja raske haiguse puhul lisaks püsiravile optimaalses annuses inhaleeritava kortikosteroidiga
					50						
					75	J45-J45				11,00	
1289718	montelukast, 4mg	R03DC0 3	MONKASTA, närimistablett, 28TK	KRKA, d.d., Novo mesto	75	J45-J45			11,00		mõõduka ja raske haiguse puhul lisaks püsiravile optimaalses annuses inhaleeritava kortikosteroidiga
					50						
					75	J45-J45				11,00	
1273845	montelukast, 5mg	R03DC0 3	MONTELUKAST TEVA, närimistablett, 28TK	Teva Pharma B.V.	75	J45-J45			11,00		mõõduka ja raske haiguse puhul lisaks püsiravile optimaalses annuses inhaleeritava kortikosteroidiga
					50						
					75	J45-J45				11,00	
1289831	montelukast, 5mg	R03DC0 3	MONKASTA, närimistablett, 28TK	KRKA, d.d., Novo mesto	75	J45-J45			11,00		mõõduka ja raske haiguse puhul lisaks püsiravile optimaalses annuses inhaleeritava kortikosteroidiga
					75	J45-J45				11,00	
					50						
1035740	morfiin, 100mg	N02AA0 1	VENDAL RETARD 100 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	G.L. Pharma GmbH	50						
					100	R52.1-R52.1	Reumatoloog, Neuroloog, Anestesioloog	esmane			esmise väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul
					100	C00-D48					
1035717	morfiin, 10mg	N02AA0 1	VENDAL RETARD 10 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	G.L. Pharma GmbH	50						
					100	R52.1-R52.1	Reumatoloog, Neuroloog, Anestesioloog	esmane			esmise väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul
					100	C00-D48					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1382284	morfiin, 10mg	N02AA01	SEVREDOL, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Mundipharma Ges.m.b.H.	100	C00-D48					
					50						
					100	R52.1-R52.1	Reumatoloog, Neuroloog, Anestesioloog	esmane			esmise väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul
1382307	morfiin, 20mg	N02AA01	SEVREDOL, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Mundipharma Ges.m.b.H.	50						
					100	C00-D48					
					100	R52.1-R52.1	Anestesioloog, Neuroloog, Reumatoloog	esmane			esmise väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul
1035728	morfiin, 30mg	N02AA01	VENDAL RETARD 30 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	G.L. Pharma GmbH	100	C00-D48					
					100	R52.1-R52.1	Anestesioloog, Reumatoloog, Neuroloog	esmane			esmise väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul
					50						
1339422	morfiin, 30mg	N02AA01	MXL 30 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	Mundipharma Ges.m.b.H.	100	C00-D48					
					100	R52.1-R52.1	Neuroloog, Reumatoloog, Anestesioloog	esmane			esmise väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul
					50						
1035739	morfiin, 60mg	N02AA01	VENDAL RETARD 60 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	G.L. Pharma GmbH	100	C00-D48					
					50						
					100	R52.1-R52.1	Neuroloog, Anestesioloog, Reumatoloog	esmane			esmise väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul
1023556	mükofenoolhape, 250mg	L04AA06	CELLCEPT, kõvakapsel, 100TK	Roche Registration GmbH	100	Z94-Z94, T86-T86					
					75	E05.0-E05.0	Oftalmoloog, Endokrinoloog				
					75	L10-L10, L94-L94, M30-M36					
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1164697	mükofenoolhape, 360mg	L04AA0 6	MYFORTIC, gastroresistentne tablett, 120TK	Novartis Baltics SIA	50						
					75	E05.0-E05.0	Oftalmoloog, Endokrinoloog				
					75	L10-L10, L94- L94, M30-M36					
					100	Z94-Z94, T86- T86					
1088344	mükofenoolhape, 500mg	L04AA0 6	CELLCEPT, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	Roche Registration GmbH	50						
					100	Z94-Z94, T86- T86					
					75	E05.0-E05.0	Oftalmoloog, Endokrinoloog				
					75	L10-L10, L94- L94, M30-M36					
1276736	mükofenoolhape, 500mg	L04AA0 6	MYCOPHENOLATE MOFETIL ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	Accord Healthcare B.V.	75	L10-L10, L94- L94, M30-M36					
					100	Z94-Z94, T86- T86					
					50						
					75	E05.0-E05.0	Oftalmoloog, Endokrinoloog				
1343270	mükofenoolhape, 500mg	L04AA0 6	MYFENAX, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	Teva B.V.	75	E05.0-E05.0	Oftalmoloog, Endokrinoloog				
					100	Z94-Z94, T86- T86					
					50						
					75	L10-L10, L94- L94, M30-M36					
3042964	mükofenoolhape, 500mg	L04AA0 6	CELLCEPT, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	Roche Registration GmbH	75	M30-M36, L94- L94, L10-L10					
					50						
					75	E05.0-E05.0	Endokrinoloog, Oftalmoloog				
					100	Z94-Z94, T86- T86					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1193127	naatriumbemiparii n, 2500RÜ anti Xa 0.2ml	B01AB1 2	ZIBOR, süstelahus süstlis, 0.2ml 10TK	Rovi Pharma Industrial Services S.A.	100	O99.8-O99.8					
					50						
					100	I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6					kuni 10 päevaks
1193172	naatriumbemiparii n, 3500RÜ anti Xa 0.2ml	B01AB1 2	ZIBOR, süstelahus süstlis, 10TK	Rovi Pharma Industrial Services S.A.	75	M17-M17, S72.7-S72.7, S72.1-S72.1, S72.2-S72.2, M16-M16, S72.0-S72.0					kuni 30 päevaks
					100	O99.8-O99.8					
					100	I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6					kuni 10 päevaks
					50						
1065596	naatriumenoksapa riin, 10000RÜ 1ml	B01AB0 5	CLEXANE, süstelahus süstlis, 1ml 2TK	Sanofi Winthrop Industrie	50						
					100	O99.8-O99.8					
					100	I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6					kuni 10 päevaks või kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
1065529	naatriumenoksapa riin, 2000RÜ 0.2ml	B01AB0 5	CLEXANE, süstelahus süstlis, 0.2ml 10TK	Sanofi Winthrop Industrie	50						
					100	I80-I82, I26-I26, I67.6-I67.6					kuni 10 päevaks või kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
					100	O99.8-O99.8					
					75	M17-M17, S72.7-S72.7, S72.1-S72.1, S72.2-S72.2, M16-M16, S72.0-S72.0					kuni 30 päevaks

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1745939	naatriumenoksapa riin, 2000RÜ 0.2ml	B01AB0 5	LOSMINA, süstelahus süstlis, 0.2ml 10TK	Laboratorios Farmaceuticos Rovi S.A.	100	I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6					kuni 10 päevaks või kaasuva pahaloolumulise kasvaja esinemisel
					75	M17-M17, S72.7-S72.7, S72.1-S72.1, S72.2-S72.2, M16-M16, S72.0-S72.0					kuni 30 päevaks
					50						
					100	O99.8-O99.8					
1065541	naatriumenoksapa riin, 4000RÜ 0.4ml	B01AB0 5	CLEXANE, süstelahus süstlis, 0.4ml 10TK	Sanofi Winthrop Industrie	75	M17-M17, S72.7-S72.7, S72.1-S72.1, S72.2-S72.2, M16-M16, S72.0-S72.0					kuni 30 päevaks
					100	O99.8-O99.8					
					50						
					100	I26-I26, I67.6- I67.6, I80-I82					kuni 10 päevaks või kaasuva pahaloolumulise kasvaja esinemisel
1781489	naatriumenoksapa riin, 4000RÜ 0.4ml	B01AB0 5	LOSMINA, süstelahus süstlis, 0.4ml 10TK	Laboratorios Farmaceuticos Rovi S.A.	100	I26-I26, I67.6- I67.6, I80-I82					kuni 10 päevaks või kaasuva pahaloolumulise kasvaja esinemisel
					75	M17-M17, S72.7-S72.7, S72.1-S72.1, S72.2-S72.2, M16-M16, S72.0-S72.0					kuni 30 päevaks
					50						
					100	O99.8-O99.8					
1065552	naatriumenoksapa riin, 6000RÜ 0.6ml	B01AB0 5	CLEXANE, süstelahus süstlis, 0.6ml 2TK	Sanofi Winthrop Industrie	100	O99.8-O99.8					
					100	I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6					kuni 10 päevaks või kaasuva pahaloolumulise kasvaja esinemisel
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1065574	naatriumenoksapa riin, 8000RÜ 0.8ml	B01AB0 5	CLEXANE, süstelahus süstlis, 0.8ml 2TK	Sanofi Winthrop Industrie	100	I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6					kuni 10 päevaks või kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
					100	O99.8-O99.8					
					50						
1201521	naatriumfenüülbut üraat, 500mg	A16AX0 3	AMMONAPS, tablett, 250TK	Immedica Pharma AB	100	E72.2-E72.2					konsiiliumi (vähemalt 2 pediaatri ühise) otsuse alusel järgmistel tingimustel: haigus kulgeb metaboolsete kriisidega vaatamata muule suukaudsele ravile; patsiendi prognoos paranemisele on hea (püsivat ajukahjustust või organpuudulikkust ei esine); ravi jätkatakse patsiendil, kellel 1 kuu kestnud ravi on andnud hea tulemuse (hüperammoneemilisi kriise ei ole esinenud või on nende sagedus oluliselt vähenenud)
1065822	naatriumlevotürok siin, 100mcg	H03AA0 1	L-THYROXIN BERLIN- CHEMIE, tablett, 100TK	Berlin-Chemie AG	50						
					100	E89.0-E89.0, E03-E03, E89.3- E89.3					
1892022	naatriumlevotürok siin, 100mcg	H03AA0 1	L-THYROXIN BERLIN- CHEMIE, tablett, 100TK	Ideal Trade Links UAB	50						
					100	E89.0-E89.0, E89.3-E89.3, E03-E03					
1065866	naatriumlevotürok siin, 50mcg	H03AA0 1	L-THYROXIN BERLIN- CHEMIE, tablett, 100TK	Berlin-Chemie AG	100	E89.0-E89.0, E03-E03, E89.3- E89.3					
					50						
1891997	naatriumlevotürok siin, 50mcg	H03AA0 1	L-THYROXIN BERLIN- CHEMIE, tablett, 100TK	Ideal Trade Links UAB	50						
					100	E89.0-E89.0, E89.3-E89.3, E03-E03					
1836558	naatriumpikosulfaa t+magneesiumoksi id+sidrunhape, 10mg+3,5g+10,97 g	A06AB8 0	CITRAFLEET, suukaudse lahuse pulber kotikeses, 2TK	Casen Recordati S.L.	50						



Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1448524	naatriumpikosulfaa t+magneesiumoksi id+sidrunhape, 10mg+3,5g+12g	A06AB8 0	PICOPREP, suukaudse lahuse pulber, 2TK	Ferring GmbH	50						
1035346	naatriumsulfaat, veevaba+kaaliumk loriid+naatriumklori id+makrogool+naa triumvesinikkarbon aat, 5,7g+0,75g+1,46g +64g+1,68g	A06AD8 1	FORTTRANS, suukaudse lahuse pulber, 4TK	Ipsen Consumer Healthcare S.A.S.	50						
1023949	nabumetoon, 1g	M01AX0 1	RELIFEX, disperseeruv tablett, 20TK	Meda AB	50						
1205479	nabumetoon, 1g	M01AX0 1	RELIFEX, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	Meda AB	50						
1147902	naftidrofurüül, 100mg	C04AX2 1	ENELBIN 100 RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 50TK	Zentiva k.s.	50						
1147913	naftidrofurüül, 100mg	C04AX2 1	ENELBIN 100 RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	Zentiva k.s.	50						
1671263	naloksegool, 25mg	A06AH0 3	MOVENTIG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Gruenthal GmbH	75	K59.0-K59.0					kroonilise opioid-indutseeritud kõhukinnisuse raviks patsiendile, kes kasutab igapäevaselt opioidi ning kes ei ole vähemalt 2 kuu möödumisel opioidravi alustamisest saavutanud lahtistite abil piisavat raviefekti
1644713	naprokseen, 550mg	M01AE0 2	NALGESIN FORTE, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	KRKA d.d. Novo mesto	50						
					75	M15-M19			63,00		
					100	C00-D48					
					75	M30-M35, M05- M08, M45-M46					
1437791	naprokseen+esom eprasool, 500mg+20mg	M01AE5 2	VIMOVO, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 60TK	Grunenthal GmbH	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1072437	nebivolool, 5mg	C07AB1 2	NEBILET, tablett, 28TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	50						
					75	I10-I13, I47-I49, I15-I15, I50-I50					
1237429	nebivolool, 5mg	C07AB1 2	NEBIVOLOL STADA, tablett, 100TK	Stada Arzneimittel AG	75	I10-I13, I47-I49, I15-I15, I50-I50					
					50						
1259355	nebivolool, 5mg	C07AB1 2	NEBICARD 5MG, tablett, 60TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	I10-I13, I47-I49, I15-I15, I50-I50					
1259377	nebivolool, 5mg	C07AB1 2	NEBICARD 5MG, tablett, 90TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	I10-I13, I47-I49, I15-I15, I50-I50					
					50						
1269862	nebivolool, 5mg	C07AB1 2	NEBIVOLOL ACTAVIS, tablett, 28TK	Teva B.V.	50						
					75	I10-I13, I47-I49, I15-I15, I50-I50					
1269907	nebivolool, 5mg	C07AB1 2	NEBIVOLOL ACTAVIS, tablett, 90TK	Teva B.V.	50						
					75	I10-I13, I47-I49, I15-I15, I50-I50					
1344259	nebivolool, 5mg	C07AB1 2	NEBIPHAR, tablett, 28TK	Teva Pharma B.V.	50						
					75	I10-I13, I47-I49, I15-I15, I50-I50					
1445149	nebivolool, 5mg	C07AB1 2	NEBILET, tablett, 90TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	50						
					75	I10-I13, I47-I49, I15-I15, I50-I50					
1780084	nebivolool, 5mg	C07AB1 2	NOLIBETA, tablett, 90TK	KRKA d.d. Novo mesto	75	I10-I13, I47-I49, I15-I15, I50-I50					
					50						
1880276	nebivolool, 5mg	C07AB1 2	NEBILET, tablett, 90TK	Ideal Trade Links UAB	50						
					75	I10-I13, I47-I49, I15-I15, I50-I50					
1343001	nepafenak, 1mg 1ml	S01BC1 0	NEVANAC, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK	Novartis Europharm Limited	50						katarakti operatsiooni järgseks kuni 60 päevaseks raviks kaasuva diabeetilise retinopaatia esinemisel

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1072572	nifedipiin, 10mg	C08CA05	CORINFAR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	Teva Pharma B.V.	50						
1072550	nifedipiin, 20mg	C08CA05	CORINFAR RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	Teva Pharma B.V.	75	I10-I13, I15-I15, I20-I20, O10- O16					
					100	I27.0-I27.0					
					75	M34-M34	Reumatoloog, Pediaater	esmane			
					50						
1342190	nilotiniib, 200mg	L01EA03	TASIGNA, kõvakapsel, 112TK	Novartis Europharm Limited	100	C92.1-C92.1	Hematoloog				konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi, eelnev ravi imatiniibiga annuses 600mg on ebaõnnestunud või osutunud talumatuks (imatiniibravi on põhjustanud III või IV astme kõrvaltoime või üle 3 kuu püsinud II astme kõrvaltoime CTC klassifikatsiooni järgi) ning ravi alustatakse kuni kolmanda rea ravina; ravi võib jätkata kuni hematoloogilise ravivastuse püsimiseni (haigus ei progresseeru nilotiniibravi foonil). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi nilotiniibiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. oktoobrit 2009. a.
1675571	nintedaniib, 100mg	L01EX09	OFEV, pehmekapsel, 60TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	100	J67-J67, J84.1- J84.1, M34.8- M34.8, J84.8- J84.8, J84.9- J84.9	Pulmonoloog				konsiiliumi (kahe pulmonoloogi ühise) otsuse alusel progresseeruva fenotüübiga teiste krooniliste fibroosivate interstitsiaalsete kopsuhaiguste ja süsteemse skleroosiga seotud progresseeruva kuluga fibroosieriva interstitsiaalse kopsuhaiguse raviks patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=45%
					100	J84.1-J84.1	Pulmonoloog				patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=50% eeldatavast. Soodustus ei hõlma nintedaniibi ja pirfenidooni kombinatsioonravi.

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1675593	nintedaniib, 150mg	L01EX0 9	OFEV, pehmekapsel, 60TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	100	J84.1-J84.1	Pulmonoloog				patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=50% eeldatavast. Soodustus ei hõlma nintedaniibi ja pirfenidooni kombinatsioonravi.
					100	J67-J67, J84.1- J84.1, M34.8- M34.8, J84.8- J84.8, J84.9- J84.9	Pulmonoloog				konsiiliumi (kahe pulmonoloogi ühise) otsuse alusel progresseeruva fenotüübiga teiste krooniliste fibroseerivate interstitsiaalsete kopsuhaiguste ja süsteemse skleroosiga seotud progresseeruva kuluga fibroseeriva interstitsiaalse kopsuhaiguse raviks patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=45%
1872200	nirmatrelviir+ritona viir, 150mg+0/0+100m g	J05AE30	PAXLOVID, õhukese polümeerikattega tablett, 150mg 20TK / 100mg 10TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	U07.2-U07.2, U07.1-U07.1					riskirühma patsientidele, kellel esinevad COVID-19 sümptomid ning kellel tervishoiuteenuse osutaja juures tehtud COVID-19 antigeeni kiirtest või PCR test või kodune antigeeni kiirtest koos epidemioloogilise seosega on kinnitanud COVID-19-sse haigestumist. Riskirühma kuuluvad patsiendid, kellel esineb vähemalt 1 järgnevatest riskiteguritest: vanus üle 70 a, immuunsupresseeriv haigus või -ravi, KOK või muu raske kopsuhaigus (bronhiektasiasid, krooniline bronhiit, emfüseem) või patsiendil esineb vähemalt 3 Terviseameti kodulehel avaldatud juhendis „Juhis tervishoiuteenuse osutajale esmatasandil (COVID-19)“, Lisa 2. COVID-19 riskirühmade nimekirjas nimetatud riskirühma haigusseisundit
1261842	nitrendipiin, 10mg	C08CA0 8	NITRESAN 10 MG, tablett, 50TK	Pro.Med.Cs Praha a.s.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1014545	nitrendipiin, 20mg	C08CA0 8	LUSOPRESS, tablett, 28TK	Istituto Luso Farmaco D'Italia S.p.A.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1261886	nitrendipiin, 20mg	C08CA0 8	NITRESAN 20 MG, tablett, 50TK	Pro.Med.Cs Praha a.s.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1003857	nitrofurantoiin, 50mg	J01XE01	NITROFURANTOIN ORIFARM, tablett, 20TK	Orifarm Healthcare A/S	50						
1175464	noretisteroon+östr adiool, 0,5mg+1mg	G03FA0 1	ACTIVEELLE, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Novo Nordisk A/S	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1880344	noretisteroon+östradiol, 0,5mg+1mg	G03FA01	ACTIVEELLE, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Ideal Trade Links UAB	50						
1887992	noretisteroon+östradiol, 0,5mg+1mg	G03FA01	ACTIVEELLE, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Lex Ano UAB	50						
1030453	noretisteroon+östradiol, 0+1mg/1mg+2mg/ 0+2mg	G03FB05	TRISEQUENS, õhukese polümeerikattega tablett, 6TK / 10TK / 12TK	Novo Nordisk A/S	50						
					100	E89.4-E89.4, E28.3-E28.3, E23.0-E23.0, Q96-Q97	Endokrinoloog, Günekoloog	esmane		50,00	haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient on alla 50. eluaasta vana
1116560	noretisteroon+östradiol, 1mg+1mg/0+1mg	G03FB05	NOVOFEM, õhukese polümeerikattega tablett, 12TK / 16TK	Novo Nordisk A/S	100	E89.4-E89.4, E28.3-E28.3, E23.0-E23.0, Q96-Q97	Günekoloog, Endokrinoloog	esmane		50,00	haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient on alla 50. eluaasta vana
					50						
1030464	noretisteroon+östradiol, 1mg+2mg	G03FA01	KLIOGEST, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Novo Nordisk A/S	50						
1005455	norfloksatsiin, 400mg	J01MA06	NOLICIN, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	KRKA d.d. Novo mesto	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1005927	nortriptüliin, 25mg	N06AA10	NORITREN, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	H. Lundbeck A/S	100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
					75	G63-G63, G43-G43, G62.0-G62.0					
					50						
1845514	ofatumumab, 20mg 0.4ml	L04AG12	KESIMPTA, süstesuspensioon pensüstlis, 0.4ml 1TK	Novartis Ireland Limited	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel hulgiskleroosi raviks patsientidele, keda on varem ravitud vähemalt kahe esmavaliku ravimiga (beetainterferoon, glatirameeratsetaat, teriflunomiid või dimetüülfumaraat) ja kellel vaatamata eelnevale ravile on viimase aasta jooksul esinenud vähemalt kaks olulist ägenemist
1012374	ofloksatsiin, 200mg	J01MA01	MEDOFLOXINE 200 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Medochemie Limited	50						
1089402	ofloksatsiin, 200mg	J01MA01	OFLOXIN 200, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Zentiva k.s.	50						
1009673	okskarbacepiin, 300mg	N03AF02	TRILEPTAL, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	Novartis Baltics SIA	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
1036044	okskarbacepiin, 300mg	N03AF02	APYDAN 300 MG, tablett, 50TK	Desitin Arzneimittel GmbH	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1009684	okskarbasepiin, 600mg	N03AF0 2	TRILEPTAL, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	Novartis Baltics SIA	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
1036033	okskarbasepiin, 600mg	N03AF0 2	APYDAN 600 MG, tablett, 50TK	Desitin Arzneimittel GmbH	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
1028483	oksübutüniin, 5mg	G04BD0 4	DRIPTANE, tablett, 60TK	Viatrix SIA	75	N31-N31	Pediaater, Uroloog, Neuroloog	esmane			
					50						
1402568	oksükodoon, 10mg	N02AA0 5	OXYCONTIN 10 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	Mundipharma Ges.m.b.H.	100	R52.1-R52.1	Reumatoloog, Anestesioloog, Neuroloog	esmane			esmise väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neurooloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist
					50						
					100	C00-D48					patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist
1526576	oksükodoon, 10mg	N02AA0 5	OXYCODONE VITABALANS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Vitalbans Oy	100	R52.1-R52.1	Reumatoloog, Anestesioloog, Neuroloog	esmane			esmise väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neurooloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist
					50						
					100	C00-D48					patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist
1402580	oksükodoon, 20mg	N02AA0 5	OXYCONTIN 20 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	Mundipharma Ges.m.b.H.	100	C00-D48					patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist
					50						
					100	R52.1-R52.1	Reumatoloog, Anestesioloog, Neuroloog	esmane			esmise väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neurooloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1402603	oksükodoon, 40mg	N02AA0 5	OXYCONTIN 40 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	Mundipharma Ges.m.b.H.	100	C00-D48					patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist
					50						
					100	R52.1-R52.1	Anestesioloog, Reumatoloog, Neuroloog	esmane			esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neurooloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist
1526554	oksükodoon, 5mg	N02AA0 5	OXYCODONE VITABALANS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Vitabalans Oy	50						
					100	R52.1-R52.1	Reumatoloog, Anestesioloog, Neuroloog	esmane			esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neurooloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist
					100	C00-D48					patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist
1402625	oksükodoon, 80mg	N02AA0 5	OXYCONTIN 80 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	Mundipharma Ges.m.b.H.	50						
					100	C00-D48					patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist
					100	R52.1-R52.1	Reumatoloog, Anestesioloog, Neuroloog	esmane			esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neurooloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist
1004926	oktreotiid, 0,1mg 1ml	H01CB0 2	SANDOSTATIN, süste- /infusioonilahus, 1ml 5TK	Novartis Baltics SIA	100	E22.0-E22.0	Endokrinoloog, Pediaater – endokrinoloog				akromegaalia raviks
1041309	oktreotiid, 10mg	H01CB0 2	SANDOSTATIN LAR, süstesuspensiooni pulber ja lahusti, 1TK	Novartis Baltics SIA	100	C00-D48, E22.0- E22.0	Onkoloog, Endokrinoloog, Pediaater – endokrinoloog				neuroendokriinkasvaja või akromegaalia raviks



Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1041310	oktreotiid, 20mg	H01CB0 2	SANDOSTATIN LAR, süstesuspensiooni pulber ja lahusti, 1TK	Novartis Baltics SIA	100	C00-D48, E22.0- E22.0	Pediaater – endokrinoloog, Endokrinoloog, Onkoloog				neuroendokriinkasvaja või akromegaalia raviks
1041321	oktreotiid, 30mg	H01CB0 2	SANDOSTATIN LAR, süstesuspensiooni pulber ja lahusti, 1TK	Novartis Baltics SIA	100	C00-D48, E22.0- E22.0	Pediaater – endokrinoloog, Endokrinoloog, Onkoloog				neuroendokriinkasvaja või akromegaalia raviks
1267714	olansapiin, 10mg	N05AH0 3	OLANZAPIN ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Teva B.V.	50						
					100	F32.3-F32.3, F33.3-F33.3	Psühhiaater	esmane			
					100	F20-F29, F30- F31	Psühhiaater				
1289516	olansapiin, 10mg	N05AH0 3	OLANZAPINE ACTAVIS, suus dispergeeruv tablett, 28TK	Teva B.V.	100	F20-F29, F30- F31	Psühhiaater				
					100	F32.3-F32.3, F33.3-F33.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1326259	olansapiin, 10mg	N05AH0 3	ZALASTA, tablett, 28TK	KRKA d.d. Novo mesto	100	F20-F29, F30- F31	Psühhiaater				
					50						
					100	F32.3-F32.3, F33.3-F33.3	Psühhiaater	esmane			
1326507	olansapiin, 10mg	N05AH0 3	ZALASTA, suus dispergeeruv tablett, 28TK	KRKA d.d. Novo mesto	100	F20-F29, F30- F31	Psühhiaater				
					100	F32.3-F32.3, F33.3-F33.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1342820	olansapiin, 10mg	N05AH0 3	OLANZAPINE TEVA, suus dispergeeruv tablett, 28TK	Teva B.V.	100	F20-F29, F30- F31	Psühhiaater				
					50						
					100	F32.3-F32.3, F33.3-F33.3	Psühhiaater	esmane			

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1354294	olansapiin, 10mg	N05AH03	OLANZAPINE ACCORD 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					100	F32.3-F32.3, F33.3-F33.3	Psühhiaater	esmane			
1768642	olansapiin, 10mg	N05AH03	FARPENTA, suus dispergeeruv tablett, 28TK	Rivopharm Limited	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					50						
					100	F32.3-F32.3, F33.3-F33.3	Psühhiaater	esmane			
1289572	olansapiin, 15mg	N05AH03	OLANZAPINE ACTAVIS, suus dispergeeruv tablett, 28TK	Teva B.V.	50						
					100	F32.3-F32.3, F33.3-F33.3	Psühhiaater	esmane			
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
1326552	olansapiin, 15mg	N05AH03	ZALASTA, suus dispergeeruv tablett, 28TK	KRKA d.d. Novo mesto	100	F32.3-F32.3, F33.3-F33.3	Psühhiaater	esmane			
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					50						
1354351	olansapiin, 15mg	N05AH03	OLANZAPINE ACCORD 15 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					50						
					100	F32.3-F32.3, F33.3-F33.3	Psühhiaater	esmane			
1768664	olansapiin, 15mg	N05AH03	FARPENTA, suus dispergeeruv tablett, 28TK	Rivopharm Limited	50						
					100	F32.3-F32.3, F33.3-F33.3	Psühhiaater	esmane			
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
1267455	olansapiin, 5mg	N05AH03	OLANZAPIN ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Teva B.V.	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					50						
					100	F32.3-F32.3, F33.3-F33.3	Psühhiaater	esmane			

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1289459	olansapiin, 5mg	N05AH03	OLANZAPINE ACTAVIS, suus dispergeeruv tablett, 28TK	Teva B.V.	100	F32.3-F32.3, F33.3-F33.3	Psühhiaater	esmane			
					100	F20-F29, F30- F31	Psühhiaater				
					50						
1326406	olansapiin, 5mg	N05AH03	ZALASTA, suus dispergeeruv tablett, 28TK	KRKA d.d. Novo mesto	100	F20-F29, F30- F31	Psühhiaater				
					100	F32.3-F32.3, F33.3-F33.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1342763	olansapiin, 5mg	N05AH03	OLANZAPINE TEVA, suus dispergeeruv tablett, 28TK	Teva B.V.	100	F32.3-F32.3, F33.3-F33.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
					100	F20-F29, F30- F31	Psühhiaater				
1354104	olansapiin, 5mg	N05AH03	OLANZAPINE ACCORD 5 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					100	F32.3-F32.3, F33.3-F33.3	Psühhiaater	esmane			
					100	F20-F29, F30- F31	Psühhiaater				
1768620	olansapiin, 5mg	N05AH03	FARPENTA, suus dispergeeruv tablett, 28TK	Rivopharm Limited	100	F20-F29, F30- F31	Psühhiaater				
					50						
					100	F32.3-F32.3, F33.3-F33.3	Psühhiaater	esmane			

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1771196	olapariib, 100mg	L01XK0 1	LYNPARZA, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Astrazeneca AB	100	C48-C48, C56- C56, C57.0- C57.0	Onkoloog				levinud (FIGO III ja IV staadium) madalalt diferentseerunud epiteliaalse munasarja-, munajuha või primaarse peritoneaalvähi raviks: säilitusraviks HRD positiivse staatusega patsientidel, kellel on saavutatud osaline või täielik ravivastus pärast esimese rea plaatinapõhise keemiaravi lõpetamist ning retsidiveerunud haiguse korral BRCA mutatsiooniga (iduliini või somaatiline) patsientidele, keda on eelnevalt ravitud kahe või enama plaatinapõhise keemiaraviga ning kes on saanud osalise või täieliku ravivastuse viimasele plaatinapõhisele keemiaravile. Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi olapariibiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. juulit 2020. a
1771219	olapariib, 150mg	L01XK0 1	LYNPARZA, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Astrazeneca AB	100	C48-C48, C56- C56, C57.0- C57.0	Onkoloog				levinud (FIGO III ja IV staadium) madalalt diferentseerunud epiteliaalse munasarja-, munajuha või primaarse peritoneaalvähi raviks: säilitusraviks HRD positiivse staatusega patsientidel, kellel on saavutatud osaline või täielik ravivastus pärast esimese rea plaatinapõhise keemiaravi lõpetamist ning retsidiveerunud haiguse korral BRCA mutatsiooniga (iduliini või somaatiline) patsientidele, keda on eelnevalt ravitud kahe või enama plaatinapõhise keemiaraviga ning kes on saanud osalise või täieliku ravivastuse viimasele plaatinapõhisele keemiaravile. Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi olapariibiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. juulit 2020. a
1407664	olmesartaanmedo ksomiil, 10mg	C09CA0 8	OLIMESTRA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA, d.d., Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1676459	olmesartaanmedo ksomiil, 10mg	C09CA0 8	OLMESARTAN MEDOXOMIL ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1407833	olmesartaanmedo ksomiil, 20mg	C09CA0 8	OLIMESTRA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
					75	I10-I13, I15-I15					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1676538	olmesartaanmedo ksomiil, 20mg	C09CA0 8	OLMESARTAN MEDOXOMIL ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1407934	olmesartaanmedo ksomiil, 40mg	C09CA0 8	OLIMESTRA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA d.d. Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1676617	olmesartaanmedo ksomiil, 40mg	C09CA0 8	OLMESARTAN MEDOXOMIL ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1727434	olmesartaanmedo ksomiil+amlodipiin, 20mg+5mg	C09DB0 2	OLMESARTAN MEDOXOMIL/AMLODIP INE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1308563	olmesartaanmedo ksomiil+amlodipiin, 40mg+10mg	C09DB0 2	SANORAL, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1720628	olmesartaanmedo ksomiil+amlodipiin, 40mg+10mg	C09DB0 2	OLSSA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1727232	olmesartaanmedo ksomiil+amlodipiin, 40mg+10mg	C09DB0 2	OLMESARTAN MEDOXOMIL/AMLODIP INE ZENTIVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Zentiva k.s.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1727579	olmesartaanmedo ksomiil+amlodipiin, 40mg+10mg	C09DB0 2	OLMESARTAN MEDOXOMIL/AMLODIP INE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1308451	olmesartaanmedo ksomiil+amlodipiin, 40mg+5mg	C09DB0 2	SANORAL, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1720538	olmesartaanmedo ksomiil+amlodipiin, 40mg+5mg	C09DB0 2	OLSSA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1727175	olmesartaanmedo ksomiil+amlodipiin, 40mg+5mg	C09DB0 2	OLMESARTAN MEDOXOMIL/AMLODIP INE ZENTIVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Zentiva k.s.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1727502	olmesartaanmedo ksomiil+amlodipiin, 40mg+5mg	C09DB0 2	OLMESARTAN MEDOXOMIL/AMLODIP INE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1452866	olmesartaanmedo ksomiil+amlodipiin +hüdroklorotiasiid, 40mg+10mg+12,5 mg	C09DX0 3	SANORAL HCT, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1786394	olmesartaanmedo ksomiil+amlodipiin +hüdroklorotiasiid, 40mg+10mg+12,5 mg	C09DX0 3	OLMESARTAN MEDOXOMIL/AMLODIP INE/HCT ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1790939	olmesartaanmedo ksomiil+amlodipiin +hüdroklorotiasiid, 40mg+10mg+12,5 mg	C09DX0 3	OLSITRI, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA, d.d., Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15					
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1797509	olmesartaanmedo ksomiil+amlodipiin +hüdroklorotiasiid, 40mg+10mg+12,5 mg	C09DX0 3	OLMESARTAN MEDOXOMIL/AMLODIP INE/HYDROCHLOROT HIAZIDE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Teva B.V.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1801527	olmesartaanmedo ksomiil+amlodipiin +hüdroklorotiasiid, 40mg+10mg+12,5 mg	C09DX0 3	GADUAR, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Zentiva k.s.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1452709	olmesartaanmedo ksomiil+amlodipiin +hüdroklorotiasiid, 40mg+5mg+12,5m g	C09DX0 3	SANORAL HCT, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1786350	olmesartaanmedo ksomiil+amlodipiin +hüdroklorotiasiid, 40mg+5mg+12,5m g	C09DX0 3	OLMESARTAN MEDOXOMIL/AMLODIP INE/HCT ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1790771	olmesartaanmedo ksomiil+amlodipiin +hüdroklorotiasiid, 40mg+5mg+12,5m g	C09DX0 3	OLSITRI, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA, d.d., Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1797464	olmesartaanmedo ksomiil+amlodipiin +hüdroklorotiasiid, 40mg+5mg+12,5m g	C09DX0 3	OLMESARTAN MEDOXOMIL/AMLODIP INE/HYDROCHLOROT HIAZIDE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Teva B.V.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1801482	olmesartaanmedo ksomiil+amlodipiin +hüdroklorotiasiid, 40mg+5mg+12,5m g	C09DX0 3	GADUAR, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Zentiva k.s.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1530672	olmesartaanmedo ksomiil+hüdrokloro tiasiid, 20mg+12,5mg	C09DA8 6	CO-OLIMESTRA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1530762	olmesartaanmedo ksomiil+hüdrokloro tiasiid, 20mg+25mg	C09DA8 6	CO-OLIMESTRA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	KRKA, d.d., Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1648481	olodaterool+tiitroo pium, 2,5mcg+2,5mcg 1mõõttannus	R03AL0 6	SPIOLTO RESPIMAT, inhalatsioonilahus, 60mõõttannus 1TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			
					50						
1140220	olopatadiin, 1mg 1ml	S01GX0 9	OPATANOL, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK	Novartis Europharm Limited	50						
1774728	olopatadiin, 1mg 1ml	S01GX0 9	OLOPATADINE UNIMED PHARMA, silmatilgad, lahus, 10ml 1TK	Unimed Pharma spol. s r.o.	50						
1062166	omeprasool, 20mg	A02BC0 1	OMEPRAZOLE- RATIOPHARM, gastroresistentne kõvakapsel, 30TK	Ratiopharm GmbH	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
1062201	omeprasool, 20mg	A02BC0 1	GASEC GASTROCAPS 20 MG, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK	Teva B.V.	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1269222	omeprasool, 20mg	A02BC0 1	OMEP 20MG, gastroresistentne kõvakapsel, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega



Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1269244	omeprasool, 20mg	A02BC01	OMEP 20MG, gastroresistentne kõvakapsel, 56TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1352393	omeprasool, 20mg	A02BC01	OMEPRAZOLE STADA 20 MG, gastroresistentne kõvakapsel, 30TK	Stada Arzneimittel AG	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
1423077	omeprasool, 20mg	A02BC01	ULTOP, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK	KRKA d.d. Novo mesto	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
1516250	omeprasool, 20mg	A02BC01	GASEC GASTROCAPS 20 MG, gastroresistentne kõvakapsel, 56TK	Teva B.V.	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1112825	omeprasool, 40mg	A02BC01	GASEC GASTROCAPS 40 MG, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK	Teva B.V.	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1269301	omeprasool, 40mg	A02BC01	OMEP 40MG, gastroresistentne kõvakapsel, 15TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
1269323	omeprasool, 40mg	A02BC01	OMEP 40MG, gastroresistentne kõvakapsel, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
1269345	omeprasool, 40mg	A02BC01	OMEP 40MG, gastroresistentne kõvakapsel, 56TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1352551	omeprasool, 40mg	A02BC01	OMEPRAZOLE STADA 40 MG, gastroresistentne kõvakapsel, 30TK	Stada Arzneimittel AG	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1888892	omeprasool, 40mg	A02BC01	OMEP 40MG, gastroresistentne kõvakapsel, 30TK	Lex Ano UAB	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1137372	omega-3- rasvhappe etüülestrid 90, 1000mg	C10AX8 0	OMACOR, pehmekapsel, 28TK	BASF AS	50						
1828380	omega-3- rasvhappe etüülestrid 90, 1000mg	C10AX8 0	OMACOR, pehmekapsel, 28TK	Lex Ano UAB	50						
1889219	omega-3- rasvhappe etüülestrid 90, 1000mg	C10AX8 0	OMACOR, pehmekapsel, 28TK	Ideal Trade Links UAB	50						
1722642	opikapoon, 50mg	N04BX0 4	ONGENTYS, kõvakapsel, 30TK	Bial - Portela & Ca S.A.	100	G20-G20	Neuroloog				patsientidele, kes on saanud adekvaatses annuses entakapooni ravi, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on ravi entakapooniga vastunäidustatud.
1110643	oseltamiviir, 75mg	J05AH0 2	TAMIFLU, kõvakapsel, 10TK	Roche Registration GmbH	50						
1649088	oseltamiviir, 75mg	J05AH0 2	EBILFUMIN, kõvakapsel, 10TK	Actavis Group Ptc ehf.	50						
1841329	oseltamiviir, 75mg	J05AH0 2	SEGOSANA, kõvakapsel, 10TK	Zentiva k.s.	50						
1710379	osimertiniib, 40mg	L01EB0 4	TAGRISSO, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Astrazeneca AB	100	C34-C34	Onkoloog				monoteraapiana kasvaja täieliku resektsiooni järgselt adjuvantraviks IB...IIIA raskusastmega mitteväikerakulise kopsuvähiga täiskasvanud patsientidel, kelle kasvajatel on epidermaalse kasvufaktori retseptori (EGFR) 19. eksoni deletsioonid või 21. eksoni asendusmutatsioonid (L858R) kuni kolmeks aastaks ning monoteraapiana lokaalselt levinud või metastaatilise mitteväikerakulise kopsuvähi esmavaliku raviks täiskasvanud patsientidel, kellel esinevad EGFR aktiveerivad mutatsioonid ning monoteraapiana lokaalselt levinud või metastaatilise EGFR T790M-mutatsioonpositiivse mitteväikerakk kopsuvähiga patsientidele, kelle haigus on progresseerunud pärast ravi EGFR-türosiini kinaasi inhibiitoritega

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1710380	osimertiniib, 80mg	L01EB04	TAGRISSE, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Astrazeneca AB	100	C34-C34	Onkoloog				monoteraapiana kasvaja täieliku resektsiooni järgselt adjuvantraviks IB...IIIA raskusastmega mitteväikerakulise kopsuvähiga täiskasvanud patsientidel, kelle kasvajatel on epidermaalse kasvufaktori retseptori (EGFR) 19. eksoni deletsioonid või 21. eksoni asendusmutatsioonid (L858R) kuni kolmeks aastaks ning monoteraapiana lokaalselt levinud või metastaatilise mitteväikerakulise kopsuvähi esmavaliku raviks täiskasvanud patsientidel, kellel esinevad EGFR aktiveerivad mutatsioonid ning monoteraapiana lokaalselt levinud või metastaatilise EGFR T790M-mutatsioonpositiivse mitteväikerakk kopsuvähiga patsientidele, kelle haigus on progresseerunud pärast ravi EGFR-türosiini kinaasi inhibiitoritega
1811540	palbotsikliib, 100mg	L01EF01	IBRANCE, õhukese polümeerikattega tablett, 21TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	C50-C50	Onkoloog				hormoonretseptor (HR)-positiivse, inimese epidermaalse kasvufaktori retseptor 2 (HER2)-negatiivse, lokaalselt kaugelearenenud või metastaatilise rinnavähi I rea raviks kombinatsioonis aromataasi inhibiitoriga patsiendile kuni haiguse progresseerumiseni ning kombinatsioonis fulvestrandiga I rea raviks kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle haigus on adjuvantse või neoadjuvantse aromataasi inhibiitori foonil või 12 kuud pärast selle lõpetamist progresseerunud ning kombinatsioonis fulvestrandiga II rea raviks kuni haiguse progresseerumiseni patsientidele, kes ei ole varasemalt ravi CDK-4/6 inhibiitoritega saanud
1811562	palbotsikliib, 125mg	L01EF01	IBRANCE, õhukese polümeerikattega tablett, 21TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	C50-C50	Onkoloog				hormoonretseptor (HR)-positiivse, inimese epidermaalse kasvufaktori retseptor 2 (HER2)-negatiivse, lokaalselt kaugelearenenud või metastaatilise rinnavähi I rea raviks kombinatsioonis aromataasi inhibiitoriga patsiendile kuni haiguse progresseerumiseni ning kombinatsioonis fulvestrandiga I rea raviks kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle haigus on adjuvantse või neoadjuvantse aromataasi inhibiitori foonil või 12 kuud pärast selle lõpetamist progresseerunud ning kombinatsioonis fulvestrandiga II rea raviks kuni haiguse progresseerumiseni patsientidele, kes ei ole varasemalt ravi CDK-4/6 inhibiitoritega saanud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1811528	palbotsikliib, 75mg	L01EF01	IBRANCE, õhukese polümeerikattega tablett, 21TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	C50-C50	Onkoloog				hormoonretseptor (HR)-positiivse, inimese epidermaalse kasvufaktori retseptor 2 (HER2)-negatiivse, lokaalselt kaugelearenenud või metastaatilise rinnavähi I rea raviks kombinatsioonis aromataasi inhibiitoriga patsiendile kuni haiguse progresseerumiseni ning kombinatsioonis fulvestrandiga I rea raviks kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle haigus on adjuvantse või neoadjuvantse aromataasi inhibiitori foonil või 12 kuud pärast selle lõpetamist progresseerunud ning kombinatsioonis fulvestrandiga II rea raviks kuni haiguse progresseerumiseni patsientidele, kes ei ole varasemalt ravi CDK-4/6 inhibiitoritega saanud
1696068	panobinostaat, 10mg	L01XH03	FARYDAK, kõvakapsel, 6TK	pharmaand GmbH	100	C90.0-C90.0	Hematoloog				kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise panobinostaadiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: kasutamiseks kombinatsioonis bortesomiibi ja deksametasooniga, retsidiveerunud ja/või refraktaarse hulgimüeloomiga täiskasvanud patsientidele, keda on varasemalt ravitud vähemalt kahe raviskeemiga, sealhulgas bortesomiibi ja immuunomoduleeriva ravimiga ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi panobinostaadiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. aprilli 2018. a.
1696091	panobinostaat, 15mg	L01XH03	FARYDAK, kõvakapsel, 6TK	pharmaand GmbH	100	C90.0-C90.0	Hematoloog				kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise panobinostaadiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: kasutamiseks kombinatsioonis bortesomiibi ja deksametasooniga, retsidiveerunud ja/või refraktaarse hulgimüeloomiga täiskasvanud patsientidele, keda on varasemalt ravitud vähemalt kahe raviskeemiga, sealhulgas bortesomiibi ja immuunomoduleeriva ravimiga ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi panobinostaadiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. aprilli 2018. a.

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1696125	panobinostaat, 20mg	L01XH0 3	FARYDAK, kõvakapsel, 6TK	pharmaand GmbH	100	C90.0-C90.0	Hematoloog				kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise panobinostaadiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: kasutamiseks kombinatsioonis bortesomiibi ja deksametasooniga, retsidiveerunud ja/või refraktaarse hulgimüeloomiga täiskasvanud patsientidele, keda on varasemalt ravitud vähemalt kahe raviskeemiga, sealhulgas bortesomiibi ja immuunomoduleeriva ravimiga ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi panobinostaadiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. aprilli 2018. a.
1043020	pantoprasool, 20mg	A02BC0 2	CONTROLOC 20 MG, gastroresistentne tablett, 14TK	Takeda GmbH	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1249770	pantoprasool, 20mg	A02BC0 2	NOLPAZA, gastroresistentne tablett, 28TK	KRKA, d.d., Novo mesto	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
1249792	pantoprasool, 20mg	A02BC0 2	NOLPAZA, gastroresistentne tablett, 56TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1277232	pantoprasool, 20mg	A02BC0 2	PANTOPRAZOLE ACTAVIS, gastroresistentne tablett, 28TK	Teva B.V.	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1418813	pantoprasool, 20mg	A02BC0 2	OZZION, gastroresistentne tablett, 28TK	Zentiva k.s.	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
1441178	pantoprasool, 20mg	A02BC0 2	PANTOPRAZOLE- MEPHA, gastroresistentne tablett, 14TK	Teva B.V.	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1441189	pantoprasool, 20mg	A02BC0 2	PANTOPRAZOLE- MEPHA, gastroresistentne tablett, 28TK	Teva B.V.	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1537006	pantoprasool, 20mg	A02BC0 2	PANTOPRAZOLE- MEPHA, gastroresistentne tablett, 56TK	Teva B.V.	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
1043031	pantoprasool, 40mg	A02BC0 2	CONTROLOC 40 MG, gastroresistentne tablett, 14TK	Takeda GmbH	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1249646	pantoprasool, 40mg	A02BC0 2	NOLPAZA, gastroresistentne tablett, 14TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1249668	pantoprasool, 40mg	A02BC0 2	NOLPAZA, gastroresistentne tablett, 28TK	KRKA, d.d., Novo mesto	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
1249680	pantoprasool, 40mg	A02BC0 2	NOLPAZA, gastroresistentne tablett, 56TK	KRKA, d.d., Novo mesto	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
1277344	pantoprasool, 40mg	A02BC0 2	PANTOPRAZOLE ACTAVIS, gastroresistentne tablett, 28TK	Teva B.V.	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1280449	pantoprasool, 40mg	A02BC0 2	PANTOPRAZOL - RATIOPHARM 40 MG, gastroresistentne tablett, 14TK	Ratiopharm GmbH	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
1418835	pantoprasool, 40mg	A02BC0 2	OZZION, gastroresistentne tablett, 28TK	Zentiva k.s.	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
1441190	pantoprasool, 40mg	A02BC0 2	PANTOPRAZOLE- MEPHA, gastroresistentne tablett, 14TK	Teva B.V.	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1441202	pantoprasool, 40mg	A02BC0 2	PANTOPRAZOLE- MEPHA, gastroresistentne tablett, 28TK	Teva B.V.	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1537028	pantoprasool, 40mg	A02BC0 2	PANTOPRAZOLE- MEPHA, gastroresistentne tablett, 56TK	Teva B.V.	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
1810268	pantoprasool, 40mg	A02BC0 2	NOLPAZA, gastroresistentne tablett, 28TK	First Pharma OÜ	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
1060232	paroksetiin, 20mg	N06AB0 5	SEROXAT, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1096837	paroksetiin, 20mg	N06AB0 5	REXETIN, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Gedeon Richter Plc.	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1110799	paroksetiin, 20mg	N06AB0 5	PAROXETIN HEXAL 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Hexal AG	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1185072	paroksetiin, 20mg	N06AB0 5	PAROXETIN ACTAVIS 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva B.V.	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1244900	paroksetiin, 20mg	N06AB0 5	ARKETIS 20 MG, tablett, 30TK	Medochemie Limited	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
1855155	paroksetiin, 20mg	N06AB0 5	SEROXAT, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Ideal Trade Links UAB	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1245103	paroksetiin, 40mg	N06AB0 5	ARKETIS 40 MG, tablett, 30TK	Medochemie Limited	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1482027	pasopaniib, 200mg	L01EX0 3	VOTRIENT, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Novartis Europharm Limited	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1830215	pasopaniib, 200mg	L01EX0 3	PAZOPANIB AUXILIA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Auxilia Pharma OÜ	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks
1830237	pasopaniib, 200mg	L01EX0 3	PAZOPANIB AUXILIA, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Auxilia Pharma OÜ	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks
1834062	pasopaniib, 200mg	L01EX0 3	PAZOPANIB ZENTIVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Zentiva k.s.	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks
1851151	pasopaniib, 200mg	L01EX0 3	PAZOPANIB TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva B.V.	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks
1482050	pasopaniib, 400mg	L01EX0 3	VOTRIENT, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Novartis Europharm Limited	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks
1834107	pasopaniib, 400mg	L01EX0 3	PAZOPANIB ZENTIVA, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Zentiva k.s.	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks
1851207	pasopaniib, 400mg	L01EX0 3	PAZOPANIB TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva B.V.	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks
1147980	pentoksüfülliin, 400mg	C04AD0 3	PENTILIN, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	KRKA d.d. Novo mesto	50						
1028854	pentoksüfülliin, 600mg	C04AD0 3	VASONIT RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 20TK	G.L. Pharma GmbH	50						



Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1473409	pentoksüfülliin, 600mg	C04AD0 3	VASONIT RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	G.L. Pharma GmbH	50						
1168422	perindopriil, 10mg	C09AA0 4	PRESTARIUM ARGININE 10MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Les Laboratoires Servier	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1843231	perindopriil, 10mg	C09AA0 4	PERINDOPRIL ZENTIVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Zentiva k.s.	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1843242	perindopriil, 10mg	C09AA0 4	PERINDOPRIL ZENTIVA, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Zentiva k.s.	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1302860	perindopriil, 4mg	C09AA0 4	STOPRESS, tablett, 30TK	Pharmaceutical Works Polpharma S.A.	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1377233	perindopriil, 4mg	C09AA0 4	PRENESSA, tablett, 30TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1845020	perindopriil, 4mg	C09AA0 4	PRENESSA, tablett, 90TK	First Pharma OÜ	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1168310	perindopriil, 5mg	C09AA0 4	PRESTARIUM ARGININE 5MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Les Laboratoires Servier	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1843208	perindopriil, 5mg	C09AA0 4	PERINDOPRIL ZENTIVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Zentiva k.s.	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1843219	perindopriil, 5mg	C09AA04	PERINDOPRIL ZENTIVA, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Zentiva k.s.	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1302871	perindopriil, 8mg	C09AA04	STOPRESS, tablett, 30TK	Pharmaceutical Works Polpharma S.A.	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1377312	perindopriil, 8mg	C09AA04	PRENESSA, tablett, 30TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1822823	perindopriil, 8mg	C09AA04	PRENESSA, tablett, 90TK	First Pharma OÜ	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1289101	perindopriil+amlodi piin, 10mg+10mg	C09BB04	COVERAM, tablett, 30TK	Les Laboratoires Servier	50						
					75	I20-I20, I50-I50, I10-I13, I15-I15					
1288953	perindopriil+amlodi piin, 10mg+5mg	C09BB04	COVERAM, tablett, 30TK	Les Laboratoires Servier	50						
					75	I20-I20, I50-I50, I10-I13, I15-I15					
1499250	perindopriil+amlodi piin, 4mg+10mg	C09BB04	DALNESSA, tablett, 30TK	KRKA, d.d., Novo mesto	75	I20-I20, I50-I50, I10-I13, I15-I15					
					50						
1499003	perindopriil+amlodi piin, 4mg+5mg	C09BB04	DALNESSA, tablett, 30TK	KRKA, d.d., Novo mesto	75	I20-I20, I50-I50, I10-I13, I15-I15					
					50						
1288818	perindopriil+amlodi piin, 5mg+10mg	C09BB04	COVERAM, tablett, 30TK	Les Laboratoires Servier	75	I20-I20, I50-I50, I10-I13, I15-I15					
					50						
1288672	perindopriil+amlodi piin, 5mg+5mg	C09BB04	COVERAM, tablett, 30TK	Les Laboratoires Servier	75	I20-I20, I50-I50, I10-I13, I15-I15					
					50						
1499126	perindopriil+amlodi piin, 8mg+10mg	C09BB04	DALNESSA, tablett, 30TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
					75	I20-I20, I50-I50, I10-I13, I15-I15					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1499069	perindopriil+amlodi piin, 8mg+5mg	C09BB0 4	DALNESSA, tablett, 30TK	KRKA, d.d., Novo mesto	75	I20-I20, I50-I50, I10-I13, I15-I15					
					50						
1588079	perindopriil+amlodi piin+indapamiid, 10mg+10mg+2,5m g	C09BX0 1	TRIPLIXAM, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Les Laboratoires Servier	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1588091	perindopriil+amlodi piin+indapamiid, 10mg+10mg+2,5m g	C09BX0 1	TRIPLIXAM, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Les Laboratoires Servier	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1588024	perindopriil+amlodi piin+indapamiid, 10mg+5mg+2,5mg	C09BX0 1	TRIPLIXAM, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Les Laboratoires Servier	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1588046	perindopriil+amlodi piin+indapamiid, 10mg+5mg+2,5mg	C09BX0 1	TRIPLIXAM, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Les Laboratoires Servier	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1602481	perindopriil+amlodi piin+indapamiid, 4mg+10mg+1,25m g	C09BX0 1	CO-DALNESSA, tablett, 30TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1602504	perindopriil+amlodi piin+indapamiid, 4mg+10mg+1,25m g	C09BX0 1	CO-DALNESSA, tablett, 60TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1602571	perindopriil+amlodi piin+indapamiid, 4mg+5mg+1,25mg	C09BX0 1	CO-DALNESSA, tablett, 30TK	KRKA, d.d., Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1602593	perindopriil+amlodi piin+indapamiid, 4mg+5mg+1,25mg	C09BX0 1	CO-DALNESSA, tablett, 60TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1810897	perindopriil+amlodi piin+indapamiid, 4mg+5mg+1,25mg	C09BX0 1	PRINDAL, tablett, 30TK	Zentiva k.s.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1587977	perindopriil+amlodi piin+indapamiid, 5mg+10mg+1,25m g	C09BX0 1	TRIPLIXAM, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Les Laboratoires Servier	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1587999	perindopriil+amlodi piin+indapamiid, 5mg+10mg+1,25m g	C09BX0 1	TRIPLIXAM, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Les Laboratoires Servier	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1587922	perindopriil+amlodi piin+indapamiid, 5mg+5mg+1,25mg	C09BX0 1	TRIPLIXAM, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Les Laboratoires Servier	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1587944	perindopriil+amlodi piin+indapamiid, 5mg+5mg+1,25mg	C09BX0 1	TRIPLIXAM, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Les Laboratoires Servier	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1602683	perindopriil+amlodi piin+indapamiid, 8mg+10mg+2,5mg	C09BX0 1	CO-DALNESSA, tablett, 30TK	KRKA, d.d., Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1602706	perindopriil+amlodi piin+indapamiid, 8mg+10mg+2,5mg	C09BX0 1	CO-DALNESSA, tablett, 60TK	KRKA, d.d., Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1811045	perindopriil+amlodi piin+indapamiid, 8mg+10mg+2,5mg	C09BX0 1	PRINDAL, tablett, 30TK	Zentiva k.s.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1602795	perindopriil+amlodi piin+indapamiid, 8mg+5mg+2,5mg	C09BX0 1	CO-DALNESSA, tablett, 30TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1602818	perindopriil+amlodi piin+indapamiid, 8mg+5mg+2,5mg	C09BX0 1	CO-DALNESSA, tablett, 60TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1810987	perindopriil+amlodi piin+indapamiid, 8mg+5mg+2,5mg	C09BX0 1	PRINDAL, tablett, 30TK	Zentiva k.s.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1339488	perindopriil+indap amiid, 10mg+2,5mg	C09BA8 3	NOLITERAX 10 MG/2,5 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Les Laboratoires Servier	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1686720	perindopriil+indap amiid, 10mg+2,5mg	C09BA8 3	PERINDOPRIL/INDAPA MIDE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1686742	perindopriil+indap amiid, 10mg+2,5mg	C09BA8 3	PERINDOPRIL/INDAPA MIDE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Teva Pharma B.V.	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1834219	perindopriil+indap amiid, 10mg+2,5mg	C09BA8 3	CO-PRENESSANEO, tablett, 30TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1229587	perindopriil+indap amiid, 2,5mg+0,625mg	C09BA8 3	NOLIPREL ARGININE, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Les Laboratoires Servier	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1544374	perindopriil+indap amiid, 2,5mg+0,625mg	C09BA8 3	PERINDOPRIL/INDAPA MIDE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1600647	perindopriil+indap amiid, 2,5mg+0,625mg	C09BA8 3	PERINDOPRIL/INDAPA MIDE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Teva Pharma B.V.	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1407068	perindopriil+indap amiid, 2mg+0,625mg	C09BA8 3	CO-PRENESSA, tablett, 30TK	KRKA, d.d., Novo mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1295894	perindopriil+indap amiid, 4mg+1,25mg	C09BA8 3	PRENEWEL, tablett, 60TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1407158	perindopriil+indap amiid, 4mg+1,25mg	C09BA8 3	CO-PRENESSA, tablett, 30TK	KRKA, d.d., Novo mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1229879	perindopriil+indap amiid, 5mg+1,25mg	C09BA8 3	NOLIPREL FORTE ARGININE, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Les Laboratoires Servier	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1544486	perindopriil+indap amiid, 5mg+1,25mg	C09BA8 3	PERINDOPRIL/INDAPA MIDE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1600670	perindopriil+indap amiid, 5mg+1,25mg	C09BA8 3	PERINDOPRIL/INDAPA MIDE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Teva Pharma B.V.	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1834130	perindopriil+indap amiid, 5mg+1,25mg	C09BA8 3	CO-PRENESSANEO, tablett, 30TK	KRKA, d.d., Novo mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1407248	perindopriil+indap amiid, 8mg+2,5mg	C09BA8 3	CO-PRENESSA, tablett, 30TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1458367	perindopriil+indap amiid, 8mg+2,5mg	C09BA8 3	PRENEWEL 8 MG/ 2,5 MG, tablett, 60TK	KRKA, d.d., Novo mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1837155	perindopriil+indap amiid, 8mg+2,5mg	C09BA8 3	CO-PRENESSA, tablett, 30TK	Ideal Trade Links UAB	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1104680	pimekroliimus, 10mg 1g	D11AH0 2	ELIDEL, kreem, 15g 1TK	VIATRIS HEALTHCARE Limited	50						
1563454	pioglitason, 15mg	A10BG0 3	PIOGLITAZONE ACCORD, tablett, 28TK	Accord Healthcare S.L.U.	75	E14-E14, E11- E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud
					50						
1498495	pioglitason, 30mg	A10BG0 3	ZIPION 30MG, tablett, 28TK	Zentiva k.s.	75	E14-E14, E11- E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud.
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1563555	pioglitason, 30mg	A10BG03	PIOGLITAZONE ACCORD, tablett, 28TK	Accord Healthcare S.L.U.	50						
					75	E14-E14, E11- E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud
1563757	pioglitason, 45mg	A10BG03	PIOGLITAZONE ACCORD, tablett, 28TK	Accord Healthcare S.L.U.	75	E14-E14, E11- E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud
					50						
1813766	piratsetaam, 800mg	N06BX03	NOOTROPIL, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Ideal Trade Links UAB	50	G25.3-G25.3					
1826377	piratsetaam, 800mg	N06BX03	NOOTROPIL, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	First Pharma OÜ	50	G25.3-G25.3					
1829347	piratsetaam, 800mg	N06BX03	NOOTROPIL, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Lex Ano UAB	50	G25.3-G25.3					
1750856	pirfenidoon, 267mg	L04AX05	ESBRIET, õhukese polümeerikattega tablett, 252TK	Roche Registration GmbH	100	J84.1-J84.1	Pulmonoloog				patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=50% eeldatavast. Soodustus ei hõlma nintedaniibi ja pirfenidooni kombinatsioonravi.
1880434	pirfenidoon, 267mg	L04AX05	PIRFENIDONE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 252TK	Teva GmbH	100	J84.1-J84.1	Pulmonoloog				patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=50% eeldatavast. Soodustus ei hõlma nintedaniibi ja pirfenidooni kombinatsioonravi.
1897678	pirfenidoon, 267mg	L04AX05	PIRFENIDONE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 252TK	Accord Healthcare B.V.	100	J84.1-J84.1	Pulmonoloog				patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=50% eeldatavast. Soodustus ei hõlma nintedaniibi ja pirfenidooni kombinatsioonravi.
1750801	pirfenidoon, 801mg	L04AX05	ESBRIET, õhukese polümeerikattega tablett, 84TK	Roche Registration GmbH	100	J84.1-J84.1	Pulmonoloog				patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=50% eeldatavast. Soodustus ei hõlma nintedaniibi ja pirfenidooni kombinatsioonravi.

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1843534	pirfenidoon, 801mg	L04AX0 5	PIRFENIDONE ZENTIVA, õhukese polümeerikattega tablett, 84TK	Zentiva k.s.	100	J84.1-J84.1	Pulmonoloog				patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=50% eeldatavast. Soodustus ei hõlma nintedaniibi ja pirfenidooni kombinatsioonravi.
1880445	pirfenidoon, 801mg	L04AX0 5	PIRFENIDONE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 84TK	Teva GmbH	100	J84.1-J84.1	Pulmonoloog				patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=50% eeldatavast. Soodustus ei hõlma nintedaniibi ja pirfenidooni kombinatsioonravi.
1897588	pirfenidoon, 801mg	L04AX0 5	PIRFENIDONE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 84TK	Accord Healthcare B.V.	100	J84.1-J84.1	Pulmonoloog				patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=50% eeldatavast. Soodustus ei hõlma nintedaniibi ja pirfenidooni kombinatsioonravi.
1039889	piroksikaam, 20mg	M01AC0 1	BREXIN, tablett, 20TK	CHIESI Pharmaceuticals GmbH	50						
1890930	piroksikaam, 20mg	M01AC0 1	BREXIN, tablett, 30TK	Ideal Trade Links UAB	50						
1271775	polüstüreensulfon aat, 949mg 1g	V03AE0 1	SORBISTERIT, suukaudse/rektaalsuspe nsiooni pulber, 500g 1TK	Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH	50						
					100	N18-N18					
1897342	polüstüreensulfon aat, 949mg 1g	V03AE0 1	SORBISTERIT, suukaudse/rektaalsuspe nsiooni pulber, 500g 1TK	Ideal Trade Links UAB	100	N18-N18					
					50						



Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1622203	pomalidomiid, 1mg	L04AX06	IMNOVID, kõvakapsel, 21TK	Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG	100	C90.0-C90.0	Hematoloog				kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise pomalidomiidiga on hinnanud konsilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: kasutamine kombinatsioonis deksametasooniga retsiveerunud, progresseerunud või refraktaarse hulgmüeloomiga täiskasvanud patsiendil, kelle eelnevad raviskeemid on sisaldanud bortesomiibi, talidomiidi (ainult vereloome tüvirakkude siirdamise näidustusega patsiendid) ja lenalidomiidi, kuid kelle haigus on viimase ravikuuri ajal või 6 kuud pärast ravi lõpetamist progresseerunud või retsiveerunud, ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi pomalidomiidiga on ravimootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 01.01.2018.
1622214	pomalidomiid, 2mg	L04AX06	IMNOVID, kõvakapsel, 21TK	Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG	100	C90.0-C90.0	Hematoloog				kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise pomalidomiidiga on hinnanud konsilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: kasutamine kombinatsioonis deksametasooniga retsiveerunud, progresseerunud või refraktaarse hulgmüeloomiga täiskasvanud patsiendil, kelle eelnevad raviskeemid on sisaldanud bortesomiibi, talidomiidi (ainult vereloome tüvirakkude siirdamise näidustusega patsiendid) ja lenalidomiidi, kuid kelle haigus on viimase ravikuuri ajal või 6 kuud pärast ravi lõpetamist progresseerunud või retsiveerunud, ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi pomalidomiidiga on ravimootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 01.01.2018.

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1622225	pomalidomiid, 3mg	L04AX06	IMNOVID, kõvakapsel, 21TK	Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG	100	C90.0-C90.0	Hematoloog				kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise pomalidomiidiga on hinnanud konsilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: kasutamine kombinatsioonis deksametasooniga retsidiveerunud, progresseerunud või refraktaarse hulgmüeloomiga täiskasvanud patsiendil, kelle eelnevad raviskeemid on sisaldanud bortesomiibi, talidomiidi (ainult vereloome tüvirakkude siirdamise näidustusega patsiendid) ja lenalidomiidi, kuid kelle haigus on viimase ravikuuri ajal või 6 kuud pärast ravi lõpetamist progresseerunud või retsidiveerunud, ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi pomalidomiidiga on ravimootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 01.01.2018.
1622236	pomalidomiid, 4mg	L04AX06	IMNOVID, kõvakapsel, 21TK	Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG	100	C90.0-C90.0	Hematoloog				kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise pomalidomiidiga on hinnanud konsilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: kasutamine kombinatsioonis deksametasooniga retsidiveerunud, progresseerunud või refraktaarse hulgmüeloomiga täiskasvanud patsiendil, kelle eelnevad raviskeemid on sisaldanud bortesomiibi, talidomiidi (ainult vereloome tüvirakkude siirdamise näidustusega patsiendid) ja lenalidomiidi, kuid kelle haigus on viimase ravikuuri ajal või 6 kuud pärast ravi lõpetamist progresseerunud või retsidiveerunud, ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi pomalidomiidiga on ravimootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 01.01.2018.
1856842	ponesimood, 20mg	L04AE04	PONVORY, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Janssen - Cilag International	100	G35-G35	Neuroloog				konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel ägenemistega kulgeva hulgiskleroosi raviks
1863402	ponesimood, 2mg/3mg/4mg/5mg/6mg/7mg/8mg/9mg/10mg	L04AE04	PONVORY, õhukese polümeerikattega tablett, 2TK / 2TK / 2TK / 1TK / 1TK / 1TK / 1TK / 1TK / 3TK	Janssen - Cilag International	100	G35-G35	Neuroloog				konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel ägenemistega kulgeva hulgiskleroosi raviks

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1800627	posakonasool, 100mg	J02AC0 4	POSACONAZOLE ACCORD, gastroresistentne tablett, 24TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	B45-B45, B48.2- B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44-B44					vereloome tüvirakkude siirdamisega seotud transplantaatperemehe-vastu haiguse, ägeda müeloidse leukeemia, ägeda lümfoblastse leukeemia või müelodüsplastilise sündroomi intensiivsest keemiaravist tingitud mükoosi profülaktikaks
1811124	posakonasool, 100mg	J02AC0 4	POSACONAZOLE STADA, gastroresistentne tablett, 24TK	Stada Arzneimittel AG	100	B45-B45, B48.2- B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44-B44					vereloome tüvirakkude siirdamisega seotud transplantaat- peremehe-vastu haiguse, ägeda müeloidse leukeemia, ägeda lümfoblastse leukeemia või müelodüsplastilise sündroomi intensiivsest keemiaravist tingitud mükoosi profülaktikaks
1800010	posakonasool, 40mg 1ml	J02AC0 4	POSACONAZOLE AHCL, suukaudne suspensioon, 105ml 1TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	B45-B45, B48.2- B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44-B44					vereloome tüvirakkude siirdamisega seotud transplantaatperemehe-vastu haiguse, ägeda müeloidse leukeemia, ägeda lümfoblastse leukeemia või müelodüsplastilise sündroomi intensiivsest keemiaravist tingitud mükoosi profülaktikaks
1323256	pramipeksool, 0,088mg	N04BC0 5	EZAPREV 0,088 MG, tablett, 30TK	Noramedia UAB	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1339332	pramipeksool, 0,088mg	N04BC0 5	PRAMIPEXOLE ORION, tablett, 30TK	Orion Corporation	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1041253	pramipeksool, 0,18mg	N04BC0 5	MIRAPEXIN, tablett, 30TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1339354	pramipeksool, 0,18mg	N04BC0 5	PRAMIPEXOLE ORION, tablett, 30TK	Orion Corporation	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						
1450998	pramipeksool, 0,26mg	N04BC0 5	MIRAPEXIN, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						
1451023	pramipeksool, 0,52mg	N04BC0 5	MIRAPEXIN, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1637210	pramipeksool, 0,52mg	N04BC0 5	OPRYMEA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	KRKA d.d. Novo mesto	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1041264	pramipeksool, 0,7mg	N04BC0 5	MIRAPEXIN, tablett, 30TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1323313	pramipeksool, 0,7mg	N04BC0 5	EZAPREV 0,7 MG, tablett, 100TK	Noramedia UAB	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1339400	pramipeksool, 0,7mg	N04BC0 5	PRAMIPEXOLE ORION, tablett, 30TK	Orion Corporation	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1373824	pramipeksool, 0,7mg	N04BC0 5	OPRYMEA, tablett, 30TK	KRKA d.d. Novo mesto	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						
1451067	pramipeksool, 1,05mg	N04BC0 5	MIRAPEXIN, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1637265	pramipeksool, 1,05mg	N04BC0 5	OPRYMEA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	KRKA d.d. Novo mesto	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						
1451135	pramipeksool, 2,1mg	N04BC0 5	MIRAPEXIN, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1637344	pramipeksool, 2,1mg	N04BC0 5	OPRYMEA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	KRKA d.d. Novo mesto	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						
1451168	pramipeksool, 3,15mg	N04BC0 5	MIRAPEXIN, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1118034	pravastatiin, 20mg	C10AA03	PRAVAHEXAL 20 MG, tablett, 30TK	Hexal AG	100	N18-N18					
					50						
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
1065776	prednisoloon, 5mg	H02AB06	PREDNISOLON-RICHTER, tablett, 100TK	Gedeon Richter Plc.	75	K50-K51, K73-K74	Gastroenteroloog, Pediaater				
					75	L12-L12, L23-L23, L13.0-L13.0, L10-L10, L20-L20	Allergoloog-immunoloog, Pediaater, Dermatoveneroloog				
					100	E89.6-E89.6, E27-E27, E89.3-E89.3, E23-E23, E25-E25	Pediaater, Endokrinoloog	esmane			
					100	D59-D59, D69-D69, D60-D64	Pediaater, Hematoloog	esmane			
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46	Reumatoloog, Pediaater	esmane			
					50						
					100	C00-D48					
					75	J45-J45					
					100	G70-G70	Pediaater, Neuroloog	esmane			
					75	L40-L40	Dermatoveneroloog, Pediaater				
					75	N00-N08	Pediaater, Nefroloog				
1031702	prednisoloon+salit süülhape, 0,2%+0,4%	D07XA81	ALPICORT, nahalahus, 100ml 1TK	Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1897803	prednisoloon+salit süülhape, 0,2%+0,4%	D07XA8 1	ALPICORT, nahalahus, 100ml 1TK	Ideal Trade Links UAB	50						
1655513	pregabaliin, 150mg	N02BF0 2	PRAGIOLA, kõvakapsel, 14TK	KRKA, d.d., Novo mesto	75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50						
1655546	pregabaliin, 150mg	N02BF0 2	PRAGIOLA, kõvakapsel, 56TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
1657829	pregabaliin, 150mg	N02BF0 2	BRIEKA, kõvakapsel, 56TK	Teva B.V.	75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
1693122	pregabaliin, 150mg	N02BF0 2	PREGABALIN ZENTIVA, kõvakapsel, 14TK	Zentiva k.s.	50						
					75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
1693133	pregabaliin, 150mg	N02BF0 2	PREGABALIN ZENTIVA, kõvakapsel, 56TK	Zentiva k.s.	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1695630	pregabaliin, 150mg	N02BF0 2	PREGABALIN ACCORD, kõvakapsel, 14TK	Accord Healthcare S.L.U.	50						
					75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
1695663	pregabaliin, 150mg	N02BF0 2	PREGABALIN ACCORD, kõvakapsel, 56TK	Accord Healthcare S.L.U.	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
1766347	pregabaliin, 150mg	N02BF0 2	SIRANALEN, kõvakapsel, 14TK	Medochemie Limited	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					50						
1766370	pregabaliin, 150mg	N02BF0 2	SIRANALEN, kõvakapsel, 56TK	Medochemie Limited	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50						
					75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
1820326	pregabaliin, 150mg	N02BF0 2	PRAGIOLA, kõvakapsel, 56TK	First Pharma OÜ	75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1848371	pregabaliin, 150mg	N02BF0 2	PRAGIOLA, kõvakapsel, 56TK	Ideal Trade Links UAB	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50						
					75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
1655760	pregabaliin, 300mg	N02BF0 2	PRAGIOLA, kõvakapsel, 14TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
1766415	pregabaliin, 300mg	N02BF0 2	SIRANALEN, kõvakapsel, 14TK	Medochemie Limited	75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50						
1655355	pregabaliin, 75mg	N02BF0 2	PRAGIOLA, kõvakapsel, 14TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
					75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
1655388	pregabaliin, 75mg	N02BF0 2	PRAGIOLA, kõvakapsel, 56TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti



Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1657740	pregabaliin, 75mg	N02BF02	BRIEKA, kõvakapsel, 56TK	Teva B.V.	75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
1693043	pregabaliin, 75mg	N02BF02	PREGABALIN ZENTIVA, kõvakapsel, 14TK	Zentiva k.s.	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					50						
1693065	pregabaliin, 75mg	N02BF02	PREGABALIN ZENTIVA, kõvakapsel, 56TK	Zentiva k.s.	50						
					75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
1695438	pregabaliin, 75mg	N02BF02	PREGABALIN ACCORD, kõvakapsel, 14TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50						
					75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
1695461	pregabaliin, 75mg	N02BF02	PREGABALIN ACCORD, kõvakapsel, 56TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50						
					75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1766303	pregabaliin, 75mg	N02BF0 2	SIRANALEN, kõvakapsel, 56TK	Medochemie Limited	75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50						
1077027	primidoon, 250mg	N03AA0 3	LISKANTIN, tablett, 100TK	Desitin Arzneimittel GmbH	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
1020126	propafenoon, 150mg	C01BC0 3	RYTMONORM, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	Viatis SIA	50						
1044526	propafenoon, 150mg	C01BC0 3	PROPANORM 150 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	Pro.Med.Cs Praha a.s.	50						
1704833	propafenoon, 150mg	C01BC0 3	PROPAFENONE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Accord Healthcare B.V.	50						
1020137	propafenoon, 300mg	C01BC0 3	RYTMONORM, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	Viatis SIA	50						
1704888	propafenoon, 300mg	C01BC0 3	PROPAFENONE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Accord Healthcare B.V.	50						
1053223	propranolool, 40mg	C07AA0 5	PROPRA- RATIOPHARM 40 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	Ratiopharm GmbH	75	G43-G43, I47- I49, I15-I15, I10- I13					
					50						
1596944	propranolool, 40mg	C07AA0 5	PROPRANOLOL ACCORD 40MG, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					75	G43-G43, I47- I49, I15-I15, I10- I13					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1141311	pseudoefedriin+ts etirisiin, 120mg+5mg	R01BA9 3	CIRRUS, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 14TK	UCB Pharma Oy Finland	50						
1074451	püridostigmiinbro miid, 60mg	N07AA0 2	KALYMIN 60 N, tablett, 100TK	Teva Pharma B.V.	50						
					100	G70-G70	Pediaater, Neuroloog	esmane			
1664647	püridostigmiinbro miid, 60mg	N07AA0 2	MESTINON, kaetud tablett, 150TK	VIATRIS HEALTHCARE Limited	100	G70-G70	Pediaater, Neuroloog	esmane			
					50						
1865189	püridostigmiinbro miid, 60mg	N07AA0 2	KALYMIN 60 N, tablett, 100TK	Ideal Trade Links UAB	50						
					100	G70-G70	Neuroloog, Pediaater	esmane			
1750553	raltegraviir, 600mg	J05AJ01	ISENTRESS, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Merck Sharp & Dohme B.V.	100	Z20.6-Z20.6	Infektsionist				kombinatsioonis tenofoviirdisoproksiil+emtritsitabiiniga kokkupuute-järgseks (PEP) profülaktiliseks raviks HIV- infektsiooni nakatumise vältimiseks kuni 30-päevaks v.a tööülesannete täitmisega seotud kokkupuutejuhtudel HIV- nakkusega
1059218	ramipriil, 10mg	C09AA0 5	CARDACE, tablett, 28TK	Sanofi Winthrop Industrie	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1153527	ramipriil, 10mg	C09AA0 5	RAMICOR 10 MG, tablett, 30TK	Hexal AG	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1169939	ramipriil, 10mg	C09AA0 5	RAMIPRIL ACTAVIS 10MG, tablett, 28TK	Teva B.V.	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1190078	ramipriil, 10mg	C09AA0 5	AMPRIIL 10 MG, tablett, 30TK	KRKA, d.d., Novo mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1190090	ramipriil, 10mg	C09AA0 5	AMPRIIL 10 MG, tablett, 60TK	KRKA, d.d., Novo mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1217977	ramipriil, 10mg	C09AA0 5	RAMICOR 10 MG, tablett, 60TK	Hexal AG	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1502345	ramipriil, 10mg	C09AA05	CARDACE, tablett, 56TK	Sanofi Winthrop Industrie	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1583423	ramipriil, 10mg	C09AA05	RAMIPRIL ACTAVIS 10MG, tablett, 90TK	Teva B.V.	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1005826	ramipriil, 2,5mg	C09AA05	CARDACE 2,5 MG, tablett, 28TK	Sanofi Winthrop Industrie	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1074743	ramipriil, 2,5mg	C09AA05	CARDACE 2,5 MG, tablett, 98TK	Sanofi Winthrop Industrie	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1153381	ramipriil, 2,5mg	C09AA05	RAMICOR 2,5 MG, tablett, 30TK	Hexal AG	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1189953	ramipriil, 2,5mg	C09AA05	AMPRIIL 2,5 MG, tablett, 30TK	KRKA, d.d., Novo mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1005859	ramipriil, 5mg	C09AA05	CARDACE 5 MG, tablett, 28TK	Sanofi Winthrop Industrie	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1074754	ramipriil, 5mg	C09AA05	CARDACE 5 MG, tablett, 98TK	Sanofi Winthrop Industrie	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1153459	ramipriil, 5mg	C09AA05	RAMICOR 5 MG, tablett, 30TK	Hexal AG	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1169849	ramipriil, 5mg	C09AA05	RAMIPRIL ACTAVIS 5MG, tablett, 28TK	Teva B.V.	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1190034	ramipriil, 5mg	C09AA05	AMPRIIL 5 MG, tablett, 30TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1190056	ramipriil, 5mg	C09AA05	AMPRIIL 5 MG, tablett, 60TK	KRKA, d.d., Novo mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1217966	ramipriil, 5mg	C09AA05	RAMICOR 5 MG, tablett, 60TK	Hexal AG	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1502198	ramipriil, 5mg	C09AA05	CARDACE 5 MG, tablett, 56TK	Sanofi Winthrop Industrie	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1583412	ramipriil, 5mg	C09AA05	RAMIPRIIL ACTAVIS 5MG, tablett, 90TK	Teva B.V.	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1510467	ramipriil+amlodipii n, 10mg+10mg	C09BB07	RAMDACORDIA, kõvakapsel, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	I20-I20, I50-I50, I10-I13, I15-I15					
					50						
1510388	ramipriil+amlodipii n, 10mg+5mg	C09BB07	RAMDACORDIA, kõvakapsel, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	I20-I20, I50-I50, I10-I13, I15-I15					
					50						
1510423	ramipriil+amlodipii n, 5mg+10mg	C09BB07	RAMDACORDIA, kõvakapsel, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	I20-I20, I50-I50, I10-I13, I15-I15					
					50						
1510344	ramipriil+amlodipii n, 5mg+5mg	C09BB07	RAMDACORDIA, kõvakapsel, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	I20-I20, I50-I50, I10-I13, I15-I15					
1512953	ramipriil+hüdroklorotiasiid, 10mg+12,5mg	C09BA84	CARDACE FORTE, tablett, 56TK	Sanofi Winthrop Industrie	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1881738	ramipriil+hüdroklorotiasiid, 10mg+25mg	C09BA84	CARDACE FORTE, tablett, 56TK	First Pharma OÜ	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1881749	ramipriil+hüdroklorotiasiid, 10mg+25mg	C09BA84	CARDACE FORTE, tablett, 60TK	First Pharma OÜ	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1113657	ramipriil+hüdroklor otiasiid, 2,5mg+12,5mg	C09BA8 4	CO-RAMICOR 2,5 MG/12,5 MG, tablett, 30TK	Hexal AG	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1190269	ramipriil+hüdroklor otiasiid, 2,5mg+12,5mg	C09BA8 4	AMPRIIL HL 2,5MG/12,5MG, tablett, 30TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1113680	ramipriil+hüdroklor otiasiid, 5mg+25mg	C09BA8 4	CO-RAMICOR 5 MG/25 MG, tablett, 30TK	Hexal AG	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1141715	ramipriil+hüdroklor otiasiid, 5mg+25mg	C09BA8 4	CARDACE PLUS, tablett, 28TK	Sanofi Winthrop Industrie	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1190179	ramipriil+hüdroklor otiasiid, 5mg+25mg	C09BA8 4	AMPRIIL HD 5MG/25MG, tablett, 30TK	KRKA, d.d., Novo mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1881637	ramipriil+hüdroklor otiasiid, 5mg+25mg	C09BA8 4	CARDACE PLUS, tablett, 56TK	First Pharma OÜ	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1361652	ranolasiin, 375mg	C01EB1 8	RANEXA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	75	I20-I20	Kardioloog, Sisearst	esmane			III-IV funktsionaalse klassi stenokardia esineb vaatamata adekvaatsele antiisheemilisele ravile (beeta- adrenoblokaator, kaltsiumikanali blokaator ja pika toimega nitropreparaat) või need ravimid on vastunäidustatud ja on teostatud koronaarhaiguse invasiivne uurimine ning võimalusel revaskulariseerimine
1859081	ranolasiin, 375mg	C01EB1 8	RANOLAZINE STADA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	Stada Arzneimittel AG	75	I20-I20	Sisearst, Kardioloog	esmane			III-IV funktsionaalse klassi stenokardia esineb vaatamata adekvaatsele antiisheemilisele ravile (beeta- adrenoblokaator, kaltsiumikanali blokaator ja pika toimega nitropreparaat) või need ravimid on vastunäidustatud ja on teostatud koronaarhaiguse invasiivne uurimine ning võimalusel revaskulariseerimine
1869138	ranolasiin, 375mg	C01EB1 8	TEZULIX, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	KRKA, d.d., Novo mesto	75	I20-I20	Kardioloog, Sisearst	esmane			III-IV funktsionaalse klassi stenokardia esineb vaatamata adekvaatsele antiisheemilisele ravile (beeta- adrenoblokaator, kaltsiumikanali blokaator ja pika toimega nitropreparaat) või need ravimid on vastunäidustatud ja on teostatud koronaarhaiguse invasiivne uurimine ning võimalusel revaskulariseerimine

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1361674	ranolasiin, 500mg	C01EB1 8	RANEXA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	75	I20-I20	Kardioloog, Sisearst	esmane			III-IV funktsionaalse klassi stenokardia esineb vaatamata adekvaatsele antiisheemilisele ravile (beeta- adrenoblokaator, kaltsiumikanali blokaator ja pika toimega nitropreparaat) või need ravimid on vastunäidustatud ja on teostatud koronaarhaiguse invasiivne uurimine ning võimalusel revaskulariseerimine
1859115	ranolasiin, 500mg	C01EB1 8	RANOLAZINE STADA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	Stada Arzneimittel AG	75	I20-I20	Sisearst, Kardioloog	esmane			III-IV funktsionaalse klassi stenokardia esineb vaatamata adekvaatsele antiisheemilisele ravile (beeta- adrenoblokaator, kaltsiumikanali blokaator ja pika toimega nitropreparaat) või need ravimid on vastunäidustatud ja on teostatud koronaarhaiguse invasiivne uurimine ning võimalusel revaskulariseerimine
1869161	ranolasiin, 500mg	C01EB1 8	TEZULIX, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	KRKA, d.d., Novo mesto	75	I20-I20	Kardioloog, Sisearst	esmane			III-IV funktsionaalse klassi stenokardia esineb vaatamata adekvaatsele antiisheemilisele ravile (beeta- adrenoblokaator, kaltsiumikanali blokaator ja pika toimega nitropreparaat) või need ravimid on vastunäidustatud ja on teostatud koronaarhaiguse invasiivne uurimine ning võimalusel revaskulariseerimine
1361685	ranolasiin, 750mg	C01EB1 8	RANEXA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	75	I20-I20	Sisearst, Kardioloog	esmane			III-IV funktsionaalse klassi stenokardia esineb vaatamata adekvaatsele antiisheemilisele ravile (beeta- adrenoblokaator, kaltsiumikanali blokaator ja pika toimega nitropreparaat) või need ravimid on vastunäidustatud ja on teostatud koronaarhaiguse invasiivne uurimine ning võimalusel revaskulariseerimine
1859148	ranolasiin, 750mg	C01EB1 8	RANOLAZINE STADA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	Stada Arzneimittel AG	75	I20-I20	Kardioloog, Sisearst	esmane			III-IV funktsionaalse klassi stenokardia esineb vaatamata adekvaatsele antiisheemilisele ravile (beeta- adrenoblokaator, kaltsiumikanali blokaator ja pika toimega nitropreparaat) või need ravimid on vastunäidustatud ja on teostatud koronaarhaiguse invasiivne uurimine ning võimalusel revaskulariseerimine
1869194	ranolasiin, 750mg	C01EB1 8	TEZULIX, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	KRKA, d.d., Novo mesto	75	I20-I20	Sisearst, Kardioloog	esmane			III-IV funktsionaalse klassi stenokardia esineb vaatamata adekvaatsele antiisheemilisele ravile (beeta- adrenoblokaator, kaltsiumikanali blokaator ja pika toimega nitropreparaat) või need ravimid on vastunäidustatud ja on teostatud koronaarhaiguse invasiivne uurimine ning võimalusel revaskulariseerimine
1203422	rasagiliin, 1mg	N04BD0 2	AZILECT, tablett, 28TK	Teva B.V.	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1678215	rasagiliin, 1mg	N04BD02	RALAGO, tablett, 30TK	KRKA, d.d., Novo mesto	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						
1679272	rasagiliin, 1mg	N04BD02	SAGILIA, tablett, 30TK	Medochemie Limited	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1011036	raud(III)hüdroksiid- polümaltooskompl eks, 100mg	B03AB80	FERRUM LEK, närimistablett, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50	D50-D50				3,00	
					75	D50-D50					rasedatele
1011025	raud(III)hüdroksiid- polümaltooskompl eks, 10mg 1ml	B03AB80	FERRUM LEK, siirup, 100ml 1TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50	D50-D50				3,00	
					75	D50-D50					rasedatele
1883134	relugoliiks, 120mg	L02BX04	ORGOVYX, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	C61-C61	Uroloog, Onkoloog				lokaalse või lokaalselt levinud kõrge riskiga (kliiniline staadium $\geq$ T2c või Gleasoni skoor 8-10 või PSA $\geq$ 20 ng/ml või regionaalsete lümfisõlmede haaratus või positiivne resektsioonipiir) multimodaalse ravi osana kuni 2 aasta vältel ning metastaseerunud eesnäärmevähiga patsientidele
1858103	relugoliiks+östradio ol+noretisteroon, 40mg+1mg+0,5mg	H01CC54	RYEQO, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Gedeon Richter Plc.	75	D25-D25	Günekoloog	esmane			mõõdukate kuni raskete sümptomitega patsientidele, kellel esmavaliku ravimid (traneksaamhape, hormonaalsed kontratseptiivid, emakasisesed rasestumisvastased vahendid) on ebaefektiivsed või talumatud.
1752410	ribotsiklib, 200mg	L01EF02	KISQALI, õhukese polümeerikattega tablett, 63TK	Novartis Europharm Limited	100	C50-C50	Onkoloog				hormoonretseptor (HR)-positiivse, inimese epidermaalse kasvufaktori retseptor 2 (HER2)-negatiivse, lokaalselt kaugelearenenud või metastaatilise rinnavähi I rea raviks kombinatsioonis aromataasi inhibiitoriga patsiendile kuni haiguse progresseerumiseni ning kombinatsioonis fulvestrandiga I rea raviks kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle haigus on adjuvantse või neoadjuvantse aromataasi inhibiitori foonil või 12 kuud pärast selle lõpetamist progresseerunud ning kombinatsioonis fulvestrandiga II rea raviks kuni haiguse progresseerumiseni patsientidele, kes ei ole varasemalt ravi CDK-4/6 inhibiitoritega saanud
1035289	rilusool, 50mg	N07XX02	RILUTEK, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Sanofi Winthrop Industrie	50						
					100	G12.2-G12.2	Neuroloog	esmane			mehhaanilise ventilatsiooni vajaduseta patsientidele



Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1882155	rimegepant, 75mg	N02CD06	VYDURA, suukaudne lööfilisaat, 2TK	Pfizer Europe MA EEIG	75	G43-G43					auraga või aurata migreeni akuutseks raviks täiskasvanutel, kellel on ebaõnnestunud 2 või enam triptaanravi
1644375	riotsiguaat, 0,5mg	C02KX05	ADEMPAS, õhukese polümeerikattega tablett, 42TK	Bayer AG	100	I27.0-I27.0	Pediaater, Kardioloog, Reumatoloog, Pulmonoloog				konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel kroonilise trombemboolilise pulmonaalhüpertensiooniga patsiendile, kellel kirurgiline ravi ei ole teostatav või kellel haigus kirurgilise ravi järel püsib või taastekib ning kelle seisund vastab NYHA III-IV funktsionaalsele klassile
1644432	riotsiguaat, 1,5mg	C02KX05	ADEMPAS, õhukese polümeerikattega tablett, 42TK	Bayer AG	100	I27.0-I27.0	Pediaater, Pulmonoloog, Kardioloog, Reumatoloog				konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel kroonilise trombemboolilise pulmonaalhüpertensiooniga patsiendile, kellel kirurgiline ravi ei ole teostatav või kellel haigus kirurgilise ravi järel püsib või taastekib ning kelle seisund vastab NYHA III-IV funktsionaalsele klassile
1644409	riotsiguaat, 1mg	C02KX05	ADEMPAS, õhukese polümeerikattega tablett, 42TK	Bayer AG	100	I27.0-I27.0	Reumatoloog, Kardioloog, Pulmonoloog, Pediaater				konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel kroonilise trombemboolilise pulmonaalhüpertensiooniga patsiendile, kellel kirurgiline ravi ei ole teostatav või kellel haigus kirurgilise ravi järel püsib või taastekib ning kelle seisund vastab NYHA III-IV funktsionaalsele klassile
3042953	riotsiguaat, 1mg	C02KX05	ADEMPAS, õhukese polümeerikattega tablett, 42TK	Bayer AG	100	I27.0-I27.0	Kardioloog, Pulmonoloog, Reumatoloog, Pediaater				konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel kroonilise trombemboolilise pulmonaalhüpertensiooniga patsiendile, kellel kirurgiline ravi ei ole teostatav või kellel haigus kirurgilise ravi järel püsib või taastekib ning kelle seisund vastab NYHA III-IV funktsionaalsele klassile
1644498	riotsiguaat, 2,5mg	C02KX05	ADEMPAS, õhukese polümeerikattega tablett, 42TK	Bayer AG	100	I27.0-I27.0	Pulmonoloog, Kardioloog, Pediaater, Reumatoloog				konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel kroonilise trombemboolilise pulmonaalhüpertensiooniga patsiendile, kellel kirurgiline ravi ei ole teostatav või kellel haigus kirurgilise ravi järel püsib või taastekib ning kelle seisund vastab NYHA III-IV funktsionaalsele klassile

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3042942	riotsiguaat, 2,5mg	C02KX0 5	ADEMPAS, õhukese polümeerikattega tablett, 42TK	Bayer AG	100	I27.0-I27.0	Pulmonoloog, Kardioloog, Pediaater, Reumatoloog				konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel kroonilise trombemboolilise pulmonaalhüpertensiooniga patsiendile, kellel kirurgiline ravi ei ole teostatav või kellel haigus kirurgilise ravi järel püsib või taastekib ning kelle seisund vastab NYHA III-IV funktsionaalsele klassile
1644465	riotsiguaat, 2mg	C02KX0 5	ADEMPAS, õhukese polümeerikattega tablett, 42TK	Bayer AG	100	I27.0-I27.0	Reumatoloog, Pediaater, Pulmonoloog, Kardioloog				konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel kroonilise trombemboolilise pulmonaalhüpertensiooniga patsiendile, kellel kirurgiline ravi ei ole teostatav või kellel haigus kirurgilise ravi järel püsib või taastekib ning kelle seisund vastab NYHA III-IV funktsionaalsele klassile
3042931	riotsiguaat, 2mg	C02KX0 5	ADEMPAS, õhukese polümeerikattega tablett, 42TK	Bayer AG	100	I27.0-I27.0	Pediaater, Pulmonoloog, Reumatoloog, Kardioloog				konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel kroonilise trombemboolilise pulmonaalhüpertensiooniga patsiendile, kellel kirurgiline ravi ei ole teostatav või kellel haigus kirurgilise ravi järel püsib või taastekib ning kelle seisund vastab NYHA III-IV funktsionaalsele klassile
1848438	risankizumab, 150mg 1ml	L04AC1 8	SKYRIZI, süstelahus pen-süstlis, 1ml 1TK	AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG	100	L40-L40	Dermatovenerol oog, Pediaater				patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus L40 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud.

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1845446	risdiplaam, 0,75mg 1ml	M09AX1 0	EVRYSDI, suukaudse lahuse pulber, 80ml 1TK	Roche Registration GmbH	100	G12.0-G12.0, G12.1-G12.1	Pediaater – neuroloog, Neuroloog				geneetiliselt kinnitatud 5q spinaalse lihasatroofia raviks patsiendile, kellel on määratud kuni 4 SMN2 geenikoopiat ja diagnoositud I, II või III tüüpi SMA ning kes on ravi alustamisel alla 26-aastane ning ei vaja püsiventilatsiooni. Ravi alustamise ja lõpetamise otsuse on langetanud arstide eksperdikomisjon (kaks lasteneuroloogi või neuroloogi ja geneetik) ning patsient on SMA ravimise kogemusega lasteneuroloogi või neuroloogi jälgimisel. Ravivastuse hindamine toimub iga kolme kuu tagant. Ravi lõpetatakse püsiventilatsiooni vajaduse tekkel või kui ilmneb motoorsete funktsioonide kliiniliselt oluline halvenemine mõõdetuna motoorsete funktsioonide hindamise skaalal (I tüübi korral HINE-2 või CHOP- INTEND ning II-III tüübi korral MFM32, RULM või HFMSE alusel)
1310757	risedroonhape, 35mg	M05BA0 7	RISEDRONATE SODIUM ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 4TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					75	M80-M80					patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna
1310780	risedroonhape, 35mg	M05BA0 7	RISEDRONATE SODIUM ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 12TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					75	M80-M80					patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna
1060456	risperidoon, 1mg	N05AX0 8	RISPOLEPT 1 mg, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Johnson & Johnson UAB	100	F20-F29, F30- F31	Psühhiaater				
					100	F32.3-F32.3, F33.3-F33.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1271258	risperidoon, 1mg	N05AX0 8	MEDORISPER, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Medochemie Limited	100	F20-F29, F30- F31	Psühhiaater				
					100	F32.3-F32.3, F33.3-F33.3	Psühhiaater	esmane			
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1041028	risperidoon, 1mg 1ml	N05AX0 8	RISPOLEPT, suukaudne lahus, 100ml 1TK	Johnson & Johnson UAB	50						
					100	F20-F29	Psühhiaater				
					100	F32.3-F32.3, F33.3-F33.3	Psühhiaater	esmane			
1151974	risperidoon, 2mg	N05AX0 8	RISPERIDON ACTAVIS 2MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Teva B.V.	100	F32.3-F32.3, F33.3-F33.3	Psühhiaater	esmane			
					100	F20-F29, F30- F31	Psühhiaater				
					50						
1271337	risperidoon, 2mg	N05AX0 8	MEDORISPER, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Medochemie Limited	100	F20-F29, F30- F31	Psühhiaater				
					50						
					100	F32.3-F32.3, F33.3-F33.3	Psühhiaater	esmane			
1067521	risperidoon, 3mg	N05AX0 8	RISPOLEPT 3 mg, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Johnson & Johnson UAB	100	F20-F29, F30- F31	Psühhiaater				
					50						
					100	F32.3-F32.3, F33.3-F33.3	Psühhiaater	esmane			
1271416	risperidoon, 3mg	N05AX0 8	MEDORISPER, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Medochemie Limited	50						
					100	F20-F29, F30- F31	Psühhiaater				
					100	F32.3-F32.3, F33.3-F33.3	Psühhiaater	esmane			
1152010	risperidoon, 4mg	N05AX0 8	RISPERIDON ACTAVIS 4MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Teva B.V.	100	F32.3-F32.3, F33.3-F33.3	Psühhiaater	esmane			
					100	F20-F29, F30- F31	Psühhiaater				
					50						
1381665	rivaroksabaan, 10mg	B01AF0 1	XARELTO, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Bayer AG	75	S72.7-S72.7, M16-M17, S72.0-S72.2					kuni 30 päevaks
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1381676	rivaroksabaan, 10mg	B01AF0 1	XARELTO, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Bayer AG	100	I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6					kaasuva pahaloolumulise kasvaja esinemisel
					75	M16-M17, S72.0-S72.2, S72.7-S72.7					kuni 30 päevaks
					50						
1729818	rivaroksabaan, 10mg	B01AF0 1	RUNAPLAX, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					100	I26-I26, I67.6- I67.6, I80-I82					kaasuva pahaloolumulise kasvaja esinemisel
					75	S72.7-S72.7, S72.0-S72.2, M16-M17					kuni 30 päevaks
1791828	rivaroksabaan, 10mg	B01AF0 1	RIVAROXABAN TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva GmbH	100	I26-I26, I67.6- I67.6, I80-I82					kaasuva pahaloolumulise kasvaja esinemisel
					50						
					75	S72.7-S72.7, M16-M17, S72.0-S72.2					kuni 30 päevaks
1793448	rivaroksabaan, 10mg	B01AF0 1	XERDOXO, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	KRKA, d.d., Novo mesto	75	S72.0-S72.2, S72.7-S72.7, M16-M17					kuni 30 päevaks
					50						
					100	I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6					kaasuva pahaloolumulise kasvaja esinemisel
1844366	rivaroksabaan, 10mg	B01AF0 1	RIVAROXABAN STADA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Stada Arzneimittel AG	100	I26-I26, I67.6- I67.6, I80-I82					kaasuva pahaloolumulise kasvaja esinemisel
					50						
					75	S72.0-S72.2, S72.7-S72.7, M16-M17					kuni 30 päevaks

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1850341	rivaroksabaan, 10mg	B01AF0 1	KARDATUXAN, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Gedeon Richter Plc.	75	S72.7-S72.7, M16-M17, S72.0-S72.2					kuni 30 päevaks
					100	I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6					kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
					50						
1552621	rivaroksabaan, 15mg	B01AF0 1	XARELTO, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Bayer AG	75	I48-I48					
					50						
					100	I26-I26, I67.6- I67.6, I80-I82					kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
1552632	rivaroksabaan, 15mg	B01AF0 1	XARELTO, õhukese polümeerikattega tablett, 42TK	Bayer AG	50						
					75	I48-I48					
					100	I80-I82, I26-I26, I67.6-I67.6					kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
1729908	rivaroksabaan, 15mg	B01AF0 1	RUNAPLAX, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	100	I26-I26, I67.6- I67.6, I80-I82					kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
					50						
					75	I48-I48					
1791918	rivaroksabaan, 15mg	B01AF0 1	RIVAROXABAN TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Teva GmbH	50						
					100	I80-I82, I67.6- I67.6, I26-I26					kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
					75	I48-I48					
1793561	rivaroksabaan, 15mg	B01AF0 1	XERDOXO, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
					75	I48-I48					
					100	I80-I82, I26-I26, I67.6-I67.6					kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
1844568	rivaroksabaan, 15mg	B01AF0 1	RIVAROXABAN STADA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Stada Arzneimittel AG	100	I26-I26, I67.6- I67.6, I80-I82					kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
					50						
					75	I48-I48					
1850486	rivaroksabaan, 15mg	B01AF0 1	KARDATUXAN, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Gedeon Richter Plc.	100	I26-I26, I67.6- I67.6, I80-I82					kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
					75	I48-I48					
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1844906	rivaroksabaan, 15mg/20mg	B01AF0 1	RIVAROXABAN STADA, õhukese polümeerikattega tablett, 42TK / 7TK	Stada Arzneimittel AG	100	I26-I26, I67.6- I67.6, I80-I82					kaasuva pahaloolumulise kasvaja esinemisel
					50						
					75	I48-I48					
1552687	rivaroksabaan, 20mg	B01AF0 1	XARELTO, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Bayer AG	50						
					100	I80-I82, I26-I26, I67.6-I67.6					kaasuva pahaloolumulise kasvaja esinemisel
					75	I48-I48					
1730001	rivaroksabaan, 20mg	B01AF0 1	RUNAPLAX, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	I48-I48					
					100	I26-I26, I67.6- I67.6, I80-I82					kaasuva pahaloolumulise kasvaja esinemisel
1792010	rivaroksabaan, 20mg	B01AF0 1	RIVAROXABAN TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Teva GmbH	100	I26-I26, I67.6- I67.6, I80-I82					kaasuva pahaloolumulise kasvaja esinemisel
					75	I48-I48					
					50						
1793673	rivaroksabaan, 20mg	B01AF0 1	XERDOXO, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
					100	I80-I82, I26-I26, I67.6-I67.6					kaasuva pahaloolumulise kasvaja esinemisel
					75	I48-I48					
1844760	rivaroksabaan, 20mg	B01AF0 1	RIVAROXABAN STADA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Stada Arzneimittel AG	75	I48-I48					
					100	I26-I26, I67.6- I67.6, I80-I82					kaasuva pahaloolumulise kasvaja esinemisel
					50						
1850622	rivaroksabaan, 20mg	B01AF0 1	KARDATUXAN, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Gedeon Richter Plc.	100	I80-I82, I26-I26, I67.6-I67.6					kaasuva pahaloolumulise kasvaja esinemisel
					75	I48-I48					
					50						
1225741	ropinirool, 2mg	N04BC0 4	REQUIP-MODUTAB, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1436598	ropinirool, 2mg	N04BC04	ROLPRYNA SR 2MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1225796	ropinirool, 4mg	N04BC04	REQUIP-MODUTAB, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						
1436633	ropinirool, 4mg	N04BC04	ROLPRYNA SR 4MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK	KRKA, d.d., Novo mesto	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						
1225819	ropinirool, 8mg	N04BC04	REQUIP-MODUTAB, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						
1436677	ropinirool, 8mg	N04BC04	ROLPRYNA SR 8MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1106053	rosuvastatiin, 10mg	C10AA07	CRESTOR, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Gruenenthal GmbH	100	N18-N18					
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
					50						



Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1384758	rosuvastatiin, 10mg	C10AA0 7	ROXARDIO, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	100	N18-N18					
					50						
					75	I21-I22, Z45- Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10- E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78- E78, I11-I12					
1384792	rosuvastatiin, 10mg	C10AA0 7	ROXARDIO, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	I21-I22, Z45- Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10- E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78- E78, I11-I12					
					100	N18-N18					
					50						
1396874	rosuvastatiin, 10mg	C10AA0 7	ROSUCARD 10MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Zentiva k.s.	100	N18-N18					
					50						
					75	I21-I22, Z45- Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10- E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78- E78, I11-I12					
1396896	rosuvastatiin, 10mg	C10AA0 7	ROSUCARD 10MG, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Zentiva k.s.	100	N18-N18					
					50						
					75	I21-I22, Z45- Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10- E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78- E78, I11-I12					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1477267	rosuvastatiin, 10mg	C10AA0 7	ROSUVASTATIN TAD 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	TAD Pharma GmbH	50						
					100	N18-N18					
					75	I21-I22, Z45- Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10- E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78- E78, I11-I12					
1477975	rosuvastatiin, 10mg	C10AA0 7	ROSWERA 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	KRKA d.d. Novo mesto	75	I21-I22, Z45- Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10- E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78- E78, I11-I12					
					50						
					100	N18-N18					
1477997	rosuvastatiin, 10mg	C10AA0 7	ROSWERA 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	KRKA d.d. Novo mesto	50						
					75	I21-I22, Z45- Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10- E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78- E78, I11-I12					
					100	N18-N18					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1587360	rosuvastatiin, 10mg	C10AA0 7	ROVASYN, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Medochemie Limited	75	E78-E78					kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l
					50						
					100	N18-N18					alates III staadiumist
					75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel
					75	Z95-Z95, I21- I22, I25-I25, Z45-Z45, I63- I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13- E14, I65-I66					
1654174	rosuvastatiin, 10mg	C10AA0 7	ROSUVASTATIN ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					75	I21-I22, Z45- Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10- E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78- E78, I11-I12					
					100	N18-N18					
1654219	rosuvastatiin, 10mg	C10AA0 7	ROSUVASTATIN ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Accord Healthcare B.V.	75	I21-I22, Z45- Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10- E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78- E78, I11-I12					
					50						
					100	N18-N18					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1684638	rosuvastatiin, 10mg	C10AA0 7	ROSUVASTATIN TEVA PHARMA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Teva B.V.	100	N18-N18					
					50						
					75	I21-I22, Z45- Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10- E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78- E78, I11-I12					
1397099	rosuvastatiin, 20mg	C10AA0 7	ROSUCARD 20MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Zentiva k.s.	75	I21-I22, Z45- Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10- E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78- E78, I11-I12					
					100	N18-N18					
					50						
1397112	rosuvastatiin, 20mg	C10AA0 7	ROSUCARD 20MG, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Zentiva k.s.	75	I21-I22, Z45- Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10- E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78- E78, I11-I12					
					100	N18-N18					
					50						
1473476	rosuvastatiin, 20mg	C10AA0 7	ROXARDIO, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	I21-I22, Z45- Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10- E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78- E78, I11-I12					
					100	N18-N18					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1473511	rosuvastatiin, 20mg	C10AA0 7	ROXARDIO, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	I21-I22, Z45- Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10- E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78- E78, I11-I12					
					50						
					100	N18-N18					
1477481	rosuvastatiin, 20mg	C10AA0 7	ROSUVASTATIN TAD 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	TAD Pharma GmbH	50						
					100	N18-N18					
					75	I21-I22, Z45- Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10- E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78- E78, I11-I12					
1478190	rosuvastatiin, 20mg	C10AA0 7	ROSWERA 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	KRKA d.d. Novo mesto	100	N18-N18					
					50						
					75	I21-I22, Z45- Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10- E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78- E78, I11-I12					
1478213	rosuvastatiin, 20mg	C10AA0 7	ROSWERA 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	KRKA d.d. Novo mesto	75	I21-I22, Z45- Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10- E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78- E78, I11-I12					
					100	N18-N18					
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1587517	rosuvastatiin, 20mg	C10AA0 7	ROVASYN, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Medochemie Limited	100	N18-N18					
					75	I21-I22, Z45- Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10- E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78- E78, I11-I12					
					50						
1654321	rosuvastatiin, 20mg	C10AA0 7	ROSUVASTATIN ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare B.V.	75	I21-I22, Z45- Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10- E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78- E78, I11-I12					
					100	N18-N18					
					50						
1654365	rosuvastatiin, 20mg	C10AA0 7	ROSUVASTATIN ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Accord Healthcare B.V.	75	I21-I22, Z45- Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10- E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78- E78, I11-I12					
					50						
					100	N18-N18					
1684773	rosuvastatiin, 20mg	C10AA0 7	ROSUVASTATIN TEVA PHARMA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Teva B.V.	75	I21-I22, Z45- Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10- E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78- E78, I11-I12					
					50						
					100	N18-N18					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1890963	rosuvastatiin, 20mg	C10AA0 7	CRESTOR, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Ideal Trade Links UAB	75	I63-I63, I25-I25, I70.2-I70.2, I11- I12, E10-E11, I65-I66, I21-I22, Z95-Z95, E13- E14, Z45-Z45					
					100	N18-N18					
					50						
1477863	rosuvastatiin, 5mg	C10AA0 7	ROSWERA 5 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	KRKA d.d. Novo mesto	50						
					75	I21-I22, Z45- Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10- E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78- E78, I11-I12					
					100	N18-N18					
1653993	rosuvastatiin, 5mg	C10AA0 7	ROSUVASTATIN ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare B.V.	75	I21-I22, Z45- Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10- E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78- E78, I11-I12					
					50						
					100	N18-N18					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1620964	rosuvastatiin+eseti miib, 10mg+10mg	C10BA0 6	DELIPID PLUS, kõvakapsel, 30TK	Egis Pharmaceuticals PLC	100	N18-N18					patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					50						
					75	I70.2-I70.2, Z45- Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95					
					75	E10-E11, E13- E14					kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
1757921	rosuvastatiin+eseti miib, 10mg+10mg	C10BA0 6	ROSAZIMIB, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	KRKA, d.d., Novo mesto	75	E10-E11, E13- E14					kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					50						
					75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					100	N18-N18					patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	I70.2-I70.2, Z45- Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95					



Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1789870	rosuvastatiin+eseti miib, 10mg+10mg	C10BA0 6	ROZESTA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Zentiva k.s.	100	N18-N18					patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	E10-E11, E13- E14					kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	I70.2-I70.2, Z45- Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95					
					75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					50						
1879735	rosuvastatiin+eseti miib, 10mg+10mg	C10BA0 6	DELIPID PLUS, kõvakapsel, 30TK	Ideal Trade Links UAB	100	N18-N18					patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	E10-E11, E13- E14					kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					50						
					75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	I70.2-I70.2, Z45- Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1885428	rosuvastatiin+eseti miib, 10mg+10mg	C10BA0 6	ROSUVASTATIN/ EZETIMIBE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva B.V.	75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	E13-E14, E10-E11					kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					50						
					100	N18-N18					patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	I70.2-I70.2, Z45-Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95					
1621044	rosuvastatiin+eseti miib, 20mg+10mg	C10BA0 6	DELIPID PLUS, kõvakapsel, 30TK	Egis Pharmaceuticals PLC	50						
					75	E13-E14, E10-E11					kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					100	N18-N18					patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	I70.2-I70.2, Z45-Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1758102	rosuvastatiin+eseti miib, 20mg+10mg	C10BA0 6	ROSAZIMIB, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	KRKA, d.d., Novo mesto	100	N18-N18					patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					50						
					75	E10-E11, E13- E14					kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	I70.2-I70.2, Z45- Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95					
1789926	rosuvastatiin+eseti miib, 20mg+10mg	C10BA0 6	ROZESTA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Zentiva k.s.	100	N18-N18					patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	E10-E11, E13- E14					kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					50						
					75	I70.2-I70.2, Z45- Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95					
					75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1879803	rosuvastatiin+eseti miib, 20mg+10mg	C10BA0 6	DELIPID PLUS, kõvakapsel, 30TK	Ideal Trade Links UAB	75	I70.2-I70.2, Z45- Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95					
					75	E10-E11, E13- E14					kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					50						
					100	N18-N18					patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
1885462	rosuvastatiin+eseti miib, 20mg+10mg	C10BA0 6	ROSUVASTATIN/ EZETIMIBE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva B.V.	75	E13-E14, E10- E11					kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	I70.2-I70.2, Z45- Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95					
					50						
					100	N18-N18					patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1888386	rosuvastatiin+eseti miib, 20mg+10mg	C10BA0 6	DELIPID PLUS, kõvakapsel, 30TK	Lex Ano UAB	75	E13-E14, E10- E11					kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	I70.2-I70.2, Z45- Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95					
					50						
					100	N18-N18					patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
1621112	rosuvastatiin+eseti miib, 40mg+10mg	C10BA0 6	DELIPID PLUS, kõvakapsel, 30TK	Egis Pharmaceuticals PLC	75	I70.2-I70.2, Z45- Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95					
					50						
					75	E13-E14, E10- E11					kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					100	N18-N18					patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1758191	rosuvastatiin+eseti miib, 40mg+10mg	C10BA0 6	ROSAZIMIB, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	KRKA, d.d., Novo mesto	75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärgväärtust
					75	E10-E11, E13- E14					kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärgväärtust
					75	I70.2-I70.2, Z45- Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95					
					50						
					100	N18-N18					patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärgväärtust
1789959	rosuvastatiin+eseti miib, 40mg+10mg	C10BA0 6	ROZESTA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Zentiva k.s.	75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärgväärtust
					100	N18-N18					patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärgväärtust
					50						
					75	E10-E11, E13- E14					kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärgväärtust
					75	I70.2-I70.2, Z45- Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95					
1731136	rosuvastatiin+perin dopriil+indapamiid, 10mg+4mg+1,25m g	C10BX1 3	ROXIPER, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					kui samaaegselt on täidetud rosuvastatiini kõrgema soodusmääraga (75% või 100%) väljakirjutamise tingimused

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1731259	rosuvastatiin+perin dopriil+indapamiid, 10mg+8mg+2,5mg	C10BX1 3	ROXIPER, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	KRKA, d.d., Novo mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					kui samaaegselt on täidetud rosuvastatiini kõrgema soodusmääraga (75% või 100%) väljakirjutamise tingimused
					50						
1731192	rosuvastatiin+perin dopriil+indapamiid, 20mg+4mg+1,25m g	C10BX1 3	ROXIPER, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	KRKA, d.d., Novo mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					kui samaaegselt on täidetud rosuvastatiini kõrgema soodusmääraga (75% või 100%) väljakirjutamise tingimused
					50						
1731316	rosuvastatiin+perin dopriil+indapamiid, 20mg+8mg+2,5mg	C10BX1 3	ROXIPER, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	KRKA, d.d., Novo mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					kui samaaegselt on täidetud rosuvastatiini kõrgema soodusmääraga (75% või 100%) väljakirjutamise tingimused
					50						
1666021	ruksolitiniib, 10mg	L01EJ01	JAKAVI, tablett, 56TK	Novartis Europharm Limited	100	D45-D45	Hematoloog, Onkoloog	esmane			täiskasvanud patsientidele, kes on resistentsed või ei talu hüdroksüureat
1632901	ruksolitiniib, 15mg	L01EJ01	JAKAVI, tablett, 56TK	Novartis Europharm Limited	100	D47.1-D47.1	Hematoloog				konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi) otsuse alusel primaarse või sekundaarse müelofibroosi raviks keskmise-2 või kõrge riskiga (IPSS≥2) patsientidele, kellel eelnev ravi hüdroksüureaga (annuses vähemalt 2 g päevas vähemalt 3 kuu jooksul) on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks
1632934	ruksolitiniib, 20mg	L01EJ01	JAKAVI, tablett, 56TK	Novartis Europharm Limited	100	D47.1-D47.1	Hematoloog				konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi) otsuse alusel primaarse või sekundaarse müelofibroosi raviks keskmise-2 või kõrge riskiga (IPSS≥2) patsientidele, kellel eelnev ravi hüdroksüureaga (annuses vähemalt 2 g päevas vähemalt 3 kuu jooksul) on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks
1632877	ruksolitiniib, 5mg	L01EJ01	JAKAVI, tablett, 56TK	Novartis Europharm Limited	100	D45-D45	Hematoloog, Onkoloog	esmane			täiskasvanud patsientidele, kes on resistentsed või ei talu hüdroksüureat
					100	D47.1-D47.1	Hematoloog				konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) otsuse alusel primaarse või sekundaarse müelofibroosi raviks keskmise-2 või kõrge riskiga (IPSS≥2) patsientidele, kellel eelnev ravi hüdroksüureaga (annuses vähemalt 2 g päevas vähemalt 3 kuu jooksul) on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1456196	saksagliptiin, 5mg	A10BH03	ONGLYZA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Astrazeneca AB	75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud
					50						
1725522	saksagliptiin+dapa gliflosiin, 5mg+10mg	A10BD21	QTERN, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Astrazeneca AB	75	E11-E11, E14-E14					
					50						
1005512	salbutamool, 100mcg 1annus	R03AC02	VENTOLIN, inhalatsiooniaerosool, suspensioon, 200annus 1TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50						
					75	J45-J45					
					75	J44-J44, J43-J43	Pulmonoloog	esmane			
1031308	salbutamool, 200mcg 1annus	R03AC02	VENTOLIN DISKUS, inhalatsioonipulber, 60annus 1TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	75	J44-J44, J43-J43	Pulmonoloog	esmane			
					75	J45-J45					
					50						
1004319	salbutamool, 400mcg 1ml	R03CC02	VENTOLIN SYRUP, siirup, 150ml 1TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	75	J44-J44, J43-J43	Pulmonoloog	esmane			
					75	J45-J45					
					50						
1004948	salbutamool, 5000mcg 1ml	R03AC02	VENTOLIN, nebuliseeritav lahus, 20ml 1TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	75	J44-J44, J43-J43	Pulmonoloog	esmane			
					50						
					75	J45-J45					
1007907	salmeterool, 50mcg 1annus	R03AC12	SEREVENT DISKUS 50 MCG, inhalatsioonipulber, 60annus 1TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	75	J45-J45					
					75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			
					50						
1717219	salmeterool+flutika soon, 25mcg+125mcg	R03AK06	SERKEP, inhalatsiooniaerosool, suspensioon, 120annus 1TK	Viartis Limited	75	J45-J45					
					50						



Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1107346	salmeterool+flutika soon, 25mcg+125mcg 1annus	R03AK0 6	SERETIDE INHALER, inhalatsiooniaerosool, suspensioon, 120annus 1TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	75	J45-J45					
					50						
1717220	salmeterool+flutika soon, 25mcg+250mcg	R03AK0 6	SERKEP, inhalatsiooniaerosool, suspensioon, 120annus 1TK	Viatris Limited	75	J45-J45					
					50						
1107357	salmeterool+flutika soon, 25mcg+250mcg 1annus	R03AK0 6	SERETIDE INHALER, inhalatsiooniaerosool, suspensioon, 120annus 1TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50						
					75	J45-J45					
1107335	salmeterool+flutika soon, 25mcg+50mcg 1annus	R03AK0 6	SERETIDE INHALER, inhalatsiooniaerosool, suspensioon, 120annus 1TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	75	J45-J45					
					50						
1037607	salmeterool+flutika soon, 50mcg+100mcg 1annus	R03AK0 6	SERETIDE DISKUS 100, annustatud inhalatsioonipulber, 60annus 1TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50						
					75	J45-J45					
1636466	salmeterool+flutika soon, 50mcg+250mcg	R03AK0 6	AIRFLUSAL FORSPIRO, annustatud inhalatsioonipulber, 60annus 1TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	J45-J45					
1037595	salmeterool+flutika soon, 50mcg+250mcg 1annus	R03AK0 6	SERETIDE DISKUS 250, annustatud inhalatsioonipulber, 60annus 1TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	75	J45-J45					
					50						
1827514	salmeterool+flutika soon, 50mcg+250mcg 1annus	R03AK0 6	EVERIO AIRMASTER, annustatud inhalatsioonipulber, 60annus 1TK	Zentiva k.s.	50						
					75	J45-J45					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1636512	salmeterool+flutika soon, 50mcg+500mcg	R03AK0 6	AIRFLUSAL FORSPIRO, annustatud inhalatsioonipulber, 60annus 1TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	J45-J45					
					75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			C-D staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel eosinofiilide arv perifeerses veres on $\geq 100$ rakku/ $\mu$ L ning kellel on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasis ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga
					50						
1153167	salmeterool+flutika soon, 50mcg+500mcg 1annus	R03AK0 6	SERETIDE DISKUS 500, annustatud inhalatsioonipulber, 60annus 1TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	75	J45-J45					
					75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			C-D staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel eosinofiilide arv perifeerses veres on $\geq 100$ rakku/ $\mu$ L ning kellel on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasis ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga
					50						
1827558	salmeterool+flutika soon, 50mcg+500mcg 1annus	R03AK0 6	EVERIO AIRMASTER, annustatud inhalatsioonipulber, 60annus 1TK	Zentiva k.s.	50						
					75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			C-D staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel eosinofiilide arv perifeerses veres on $\geq 100$ rakku/L ning kellel on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasis ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga
					75	J45-J45					
1391789	sapropteriin, 100mg	A16AX0 7	KUVAN, lahustuv tablett, 120TK	BioMarin International Limited	100	E70.0-E70.1				18,00	konsiiliumi (vähemalt kahe pediaatri või meditsiinigeneetiku ühise) otsuse alusel järgmistel tingimustel: tegemist on biopteriinitundliku haigusvormiga ning dieedi järgimine ei ole taganud ravijuhendi kohase vere fenüülalaniini taseme eesmärkväärtuse saavutamist; ravi võib jätkata kuni 18. eluaastani patsiendil, kellel ravimi kasutamisega püsib fenüülalaniini tase eesmärkväärtuste piires

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1675649	sekukinumab, 150mg 1ml	L04AC1 0	COSENTYX, süstelahus pen-süstlis, 1ml 1TK	Novartis Europharm Limited	100	L40-L40	Dermatovenerol oog, Pediaater				patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus L40 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud.
					100	M45-M45, M46- M46	Reumatoloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus M45 ja M46 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud.
					100	M07.0-M07.3	Reumatoloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus M07.0–3 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud.

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1833960	sekukinumab, 300mg 2ml	L04AC1 0	COSENTYX, süstelahus pen-süstlis, 2ml 1TK	Novartis Europharm Limited	100	L40-L40	Dermatovenerol oog, Pediaater				patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus L40 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud.
					100	M07.0-M07.3	Pediaater, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus M07.0–3 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud.
					100	M45-M45, M46- M46	Pediaater, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus M45 ja M46 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud.

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1857034	sekukinumab, 75mg 0.5ml	L04AC1 0	COSENTYX, süstelahus süstlis, 0.5ml 1TK	Novartis Europharm Limited	100	M07.0-M07.3	Pediaater, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus M07.0–3 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud.
					100	L40-L40	Dermatovenerol oog, Pediaater				patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus L40 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud.
					100	M45-M45, M46- M46	Pediaater, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus M45 ja M46 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud.
1719031	seleksipaag, 1000mcg	B01AC2 7	UPTRAVI, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Janssen - Cilag International	100	I27.0-I27.0	Pediaater, Pulmonoloog, Reumatoloog, Kardioloog				NYHA III kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni kombineeritud raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui haiguse kontrolli all hoidmiseks ei piisa endoteliinireseptori antagonistist (ERA) ja 5. tüüpi fosfodiesteraasi (PDE-5) inhibiitorist
1719042	seleksipaag, 1200mcg	B01AC2 7	UPTRAVI, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Janssen - Cilag International	100	I27.0-I27.0	Pediaater, Pulmonoloog, Reumatoloog, Kardioloog				NYHA III kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni kombineeritud raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui haiguse kontrolli all hoidmiseks ei piisa endoteliinireseptori antagonistist (ERA) ja 5. tüüpi fosfodiesteraasi (PDE-5) inhibiitorist

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1719053	seleksipaag, 1400mcg	B01AC2 7	UPTRAVI, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Janssen - Cilag International	100	I27.0-I27.0	Pulmonoloog, Kardioloog, Pediaater, Reumatoloog				NYHA III kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni kombineeritud raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui haiguse kontrolli all hoidmiseks ei piisa endoteliinireseptori antagonistist (ERA) ja 5. tüüpi fosfodiesteraasi (PDE-5) inhibiitorist
1719064	seleksipaag, 1600mcg	B01AC2 7	UPTRAVI, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Janssen - Cilag International	100	I27.0-I27.0	Kardioloog, Pediaater, Pulmonoloog, Reumatoloog				NYHA III kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni kombineeritud raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui haiguse kontrolli all hoidmiseks ei piisa endoteliinireseptori antagonistist (ERA) ja 5. tüüpi fosfodiesteraasi (PDE-5) inhibiitorist
1718973	seleksipaag, 200mcg	B01AC2 7	UPTRAVI, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Janssen - Cilag International	100	I27.0-I27.0	Pediaater, Pulmonoloog, Kardioloog, Reumatoloog				NYHA III kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni kombineeritud raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui haiguse kontrolli all hoidmiseks ei piisa endoteliinireseptori antagonistist (ERA) ja 5. tüüpi fosfodiesteraasi (PDE-5) inhibiitorist
1718984	seleksipaag, 200mcg	B01AC2 7	UPTRAVI, õhukese polümeerikattega tablett, 140TK	Janssen - Cilag International	100	I27.0-I27.0	Pediaater, Pulmonoloog, Kardioloog, Reumatoloog				NYHA III kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni kombineeritud raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui haiguse kontrolli all hoidmiseks ei piisa endoteliinireseptori antagonistist (ERA) ja 5. tüüpi fosfodiesteraasi (PDE-5) inhibiitorist
1719008	seleksipaag, 400mcg	B01AC2 7	UPTRAVI, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Janssen - Cilag International	100	I27.0-I27.0	Pulmonoloog, Pediaater, Kardioloog, Reumatoloog				NYHA III kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni kombineeritud raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui haiguse kontrolli all hoidmiseks ei piisa endoteliinireseptori antagonistist (ERA) ja 5. tüüpi fosfodiesteraasi (PDE-5) inhibiitorist

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1719019	seleksipaag, 600mcg	B01AC2 7	UPTRAVI, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Janssen - Cilag International	100	I27.0-I27.0	Pediaater, Kardioloog, Pulmonoloog, Reumatoloog				NYHA III kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni kombineeritud raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui haiguse kontrolli all hoidmiseks ei piisa endoteliinireseptori antagonistist (ERA) ja 5. tüüpi fosfodiesteraasi (PDE-5) inhibiitorist
1719020	seleksipaag, 800mcg	B01AC2 7	UPTRAVI, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Janssen - Cilag International	100	I27.0-I27.0	Reumatoloog, Kardioloog, Pediaater, Pulmonoloog				NYHA III kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni kombineeritud raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui haiguse kontrolli all hoidmiseks ei piisa endoteliinireseptori antagonistist (ERA) ja 5. tüüpi fosfodiesteraasi (PDE-5) inhibiitorist
1851476	selumetiniib, 10mg	L01EE0 4	KOSELUGO, kõvakapsel, 60TK	Astrazeneca AB	100	Q85.0-Q85.0	Pediaater – hematoloog- onkoloog, Hematoloog, Neuroloog				monoteraapiana sümptomaatiliste mitte-opereeritavate pleksiformsete neurofibroomide raviks 3-aastastel ja vanematel lastel, kellel on 1. tüüpi neurofibromatoos
1851487	selumetiniib, 25mg	L01EE0 4	KOSELUGO, kõvakapsel, 60TK	Astrazeneca AB	100	Q85.0-Q85.0	Hematoloog, Pediaater – hematoloog- onkoloog, Neuroloog				monoteraapiana sümptomaatiliste mitte-opereeritavate pleksiformsete neurofibroomide raviks 3-aastastel ja vanematel lastel, kellel on 1. tüüpi neurofibromatoos
1788509	semaglutiid, 0,25mg 1annus	A10BJ06	OZEMPIC, süstelahus pen-süstlis, 4annus 1TK	Novo Nordisk A/S	50	E14-E14, E11- E11					II tüüpi diabeedi raviks juhul, kui ravi suukaudsete diabeediravimitega ei ole efektiivne või on vastunäidustatud
					75	E11-E11, E14- E14					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks rasvumusega patsientidel (KMI $\geq$ 30kg/m <sup>2</sup> ); kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud tingimusel, et eelnev ravi SGLT-2 inhibiitoriga maksimaalses talutavas annuses ei ole andnud rahuldavat efekti või on vastunäidustatud. Patsiendid, kelle ravi semaglutiidiga on alustatud enne 01.01.2023, võivad jätkata ravi tuginedes kuni 31.12.2022 kehtinud rakendustingimustele.

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1788510	semaglutiid, 0,5mg 1annus	A10BJ06	OZEMPIC, süstelahus pen-süstlis, 4annus 1TK	Novo Nordisk A/S	75	E14-E14, E11- E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks rasvumusega patsientidel (KMI $\geq$ 30kg/m <sup>2</sup> ); kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea prepararaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud tingimusel, et eelnev ravi SGLT-2 inhibiitoriga maksimaalses talutavas annuses ei ole andnud rahuldavat efekti või on vastunäidustatud. Patsiendid, kelle ravi semaglutiidiga on alustatud enne 01.01.2023, võivad jätkata ravi tuginedes kuni 31.12.2022 kehtinud rakendustingimustele.
					50	E14-E14, E11- E11					II tüüpi diabeedi raviks juhul, kui ravi suukaudsete diabeediravimitega ei ole efektiivne või on vastunäidustatud
1815892	semaglutiid, 14mg	A10BJ06	RYBELSUS, tablett, 30TK	Novo Nordisk A/S	50	E11-E11, E14- E14					kombinatsioonraviks või monoraviks, kui metformiin on vastunäidustatud
					75	E11-E11, E14- E14					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks patsientidel, kellel metformiin ja SGLT-2 inhibiitor ei ole andnud rahuldavat efekti või on vastunäidustatud.
1788521	semaglutiid, 1mg 1annus	A10BJ06	OZEMPIC, süstelahus pen-süstlis, 4annus 1TK	Novo Nordisk A/S	75	E14-E14, E11- E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks rasvumusega patsientidel (KMI $\geq$ 30kg/m <sup>2</sup> ); kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea prepararaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud tingimusel, et eelnev ravi SGLT-2 inhibiitoriga maksimaalses talutavas annuses ei ole andnud rahuldavat efekti või on vastunäidustatud. Patsiendid, kelle ravi semaglutiidiga on alustatud enne 01.01.2023, võivad jätkata ravi tuginedes kuni 31.12.2022 kehtinud rakendustingimustele.
					50	E14-E14, E11- E11					II tüüpi diabeedi raviks juhul, kui ravi suukaudsete diabeediravimitega ei ole efektiivne või on vastunäidustatud
1815825	semaglutiid, 3mg	A10BJ06	RYBELSUS, tablett, 30TK	Novo Nordisk A/S	75	E14-E14, E11- E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks patsientidel, kellel metformiin ja SGLT-2 inhibiitor ei ole andnud rahuldavat efekti või on vastunäidustatud.
					50	E14-E14, E11- E11					kombinatsioonraviks või monoraviks, kui metformiin on vastunäidustatud



Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1815869	semaglutiid, 7mg	A10BJ06	RYBELSUS, tablett, 30TK	Novo Nordisk A/S	50	E14-E14, E11- E11					kombinatsioonraviks või monoraviks, kui metformiin on vastunäidustatud
					75	E14-E14, E11- E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks patsientidel, kellel metformiin ja SGLT-2 inhibiitor ei ole andnud rahuldavat efekti või on vastunäidustatud.
1027066	sertindool, 12mg	N05AE0 3	SERDOLECT, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	H. Lundbeck A/S	100	F20-F29	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
					50						
1027077	sertindool, 16mg	N05AE0 3	SERDOLECT, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	H. Lundbeck A/S	50						
					100	F20-F29	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
1027088	sertindool, 20mg	N05AE0 3	SERDOLECT, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	H. Lundbeck A/S	50						
					100	F20-F29	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
1027055	sertindool, 4mg	N05AE0 3	SERDOLECT, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	H. Lundbeck A/S	100	F20-F29	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
					50						
1013746	sertraliin, 100mg	N06AB0 6	ASENTRA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA d.d. Novo mesto	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
1160615	sertraliin, 100mg	N06AB0 6	SERTRALINE LANNACHER, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	G.L. Pharma GmbH	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
1669989	sertraliin, 100mg	N06AB0 6	SERTRALINE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
1897612	sertraliin, 100mg	N06AB0 6	ASENTRA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Ideal Trade Links UAB	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1008638	sertraliin, 50mg	N06AB0 6	ZOLOFT, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Upjohn EESV	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1143100	sertraliin, 50mg	N06AB06	ASENTRA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA d.d. Novo mesto	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
1160569	sertraliin, 50mg	N06AB06	SERTRALINE LANNACHER, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	G.L. Pharma GmbH	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
1239218	sertraliin, 50mg	N06AB06	SERTRALINE-TEVA 50 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
1669888	sertraliin, 50mg	N06AB06	SERTRALINE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
1831968	sertraliin, 50mg	N06AB06	ZOLOFT, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Lex Ano UAB	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1484984	sevelameer, 800mg	V03AE02	SEVELAMER AUXILIA, õhukese polümeerikattega tablett, 180TK	Auxilia Pharma OÜ	100	N18-N18	Pediaater, Nefroloog				juhul, kui kaltsiumipõhine fosforisiduja on vastunäidustatud (seerumi kaltsiumisisaldus >2,54 mmol/l)
					50						
1221039	sildenafil, 20mg	G04BE03	REVATIO, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Upjohn EESV	50	I27.0-I27.0	Pediaater, Reumatoloog, Pulmonoloog, Kardioloog				
					100	I27.0-I27.0	Kardioloog, Pediaater, Reumatoloog, Pulmonoloog				NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1702987	sildenafil, 20mg	G04BE03	SILDENAFIL TEVA PHARMA, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Teva Pharma B.V.	100	I27.0-I27.0	Kardioloog, Reumatoloog, Pediaater, Pulmonoloog				NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel
					50	I27.0-I27.0	Pulmonoloog, Pediaater, Reumatoloog, Kardioloog				
1734117	sildenafil, 20mg	G04BE03	GRANPIDAM, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	I27.0-I27.0	Pulmonoloog, Pediaater, Reumatoloog, Kardioloog				NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel
					50	I27.0-I27.0	Pulmonoloog, Pediaater, Reumatoloog, Kardioloog				
1755378	sildenafil, 20mg	G04BE03	SILUNGO, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Norameda UAB	100	I27.0-I27.0	Pulmonoloog, Pediaater, Reumatoloog, Kardioloog				NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel
					50	I27.0-I27.0	Reumatoloog, Kardioloog, Pediaater, Pulmonoloog				
1080166	simvastatiin, 10mg	C10AA01	SIMVACOR, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Hexal AG	100	N18-N18					
					50						
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1594447	simvastatiin, 10mg	C10AA01	VASILIP, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	KRKA d.d. Novo mesto	100	N18-N18					
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
					50						
1010260	simvastatiin, 20mg	C10AA01	VASILIP, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA d.d. Novo mesto	50						
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
					100	N18-N18					
1080177	simvastatiin, 20mg	C10AA01	SIMVACOR, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Hexal AG	50						
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
					100	N18-N18					
1083956	simvastatiin, 20mg	C10AA01	SIMVASTATIN-RATIOPHARM, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Ratiopharm GmbH	75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
					50						
					100	N18-N18					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1594458	simvastatiin, 20mg	C10AA01	VASILIP, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	KRKA d.d. Novo mesto	100	N18-N18					
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
					50						
1621493	simvastatiin, 20mg	C10AA01	SIMVACOR, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Hexal AG	75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
					50						
					100	N18-N18					
1083978	simvastatiin, 40mg	C10AA01	SIMVASTATIN-RATIOPHARM, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Ratiopharm GmbH	50						
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
					100	N18-N18					
1129700	simvastatiin, 40mg	C10AA01	SIMVACOR, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Hexal AG	50						
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
					100	N18-N18					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1594469	simvastatiin, 40mg	C10AA01	VASILIP, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	KRKA d.d. Novo mesto	50						
					100	N18-N18					
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
1809873	siponimood, 0,25mg	L04AE03	MAYZENT, õhukese polümeerikattega tablett, 12TK	Novartis Europharm Limited	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel sekundaarse progresseeruva hulgiskleroosi aktiivse vormi, mida kinnitavad ägenemiste esinemise või piltidiagnostikal ilmnev põletikuline aktiivsus, raviks täiskasvanud patsientidele
1875810	siponimood, 1mg	L04AE03	MAYZENT, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Novartis Europharm Limited	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel sekundaarse progresseeruva hulgiskleroosi aktiivse vormi, mida kinnitavad ägenemiste esinemise või piltidiagnostikal ilmnev põletikuline aktiivsus, raviks täiskasvanud patsientidele
1809895	siponimood, 2mg	L04AE03	MAYZENT, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Novartis Europharm Limited	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel sekundaarse progresseeruva hulgiskleroosi aktiivse vormi, mida kinnitavad ägenemiste esinemise või piltidiagnostikal ilmnev põletikuline aktiivsus, raviks täiskasvanud patsientidele
1107739	sirollimus, 1mg	L04AH01	RAPAMUNE, kaetud tablett, 30TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	Z94-Z94, T86-T86					
					100	D18.1-D18.1	Pulmonoloog				lümfangioleiomyomato osi näidustusel
1286568	sitagliptiin, 100mg	A10BH01	JANUVIA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Merck Sharp & Dohme B.V.	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1680869	sitagliptiin, 100mg	A10BH01	SITAGLIPTIN TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Teva B.V.	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1817603	sitagliptiin, 100mg	A10BH01	JUZINA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Gedeon Richter Plc.	50						
					75	E11-E11, E14-E14					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1820753	sitagliptiin, 100mg	A10BH01	JAZETA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Zentiva k.s.	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1829707	sitagliptiin, 100mg	A10BH01	SITAGLIPTIN SANDOZ, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	E11-E11, E14-E14					
					50						
1831801	sitagliptiin, 100mg	A10BH01	SITAGLIPTIN GRINDEKS, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Grindeks AS	75	E11-E11, E14-E14					
					50						
1837953	sitagliptiin, 100mg	A10BH01	SITAGLIPTIN WÖRWAG PHARMA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Woerwag Pharma GmbH & Co. KG	75	E14-E14, E11-E11					
					50						
1837975	sitagliptiin, 100mg	A10BH01	SITAGLIPTIN WÖRWAG PHARMA, õhukese polümeerikattega tablett, 98TK	Woerwag Pharma GmbH & Co. KG	75	E14-E14, E11-E11					
					50						
1831744	sitagliptiin, 25mg	A10BH01	SITAGLIPTIN GRINDEKS, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Grindeks AS	50						
					75	E11-E11, E14-E14					
1286502	sitagliptiin, 50mg	A10BH01	JANUVIA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Merck Sharp & Dohme B.V.	50						
					75	E11-E11, E14-E14					
1820719	sitagliptiin, 50mg	A10BH01	JAZETA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Zentiva k.s.	50						
					75						
1829538	sitagliptiin, 50mg	A10BH01	SITAGLIPTIN SANDOZ, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	E11-E11, E14-E14					
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1831777	sitagliptiin, 50mg	A10BH01	SITAGLIPTIN GRINDEKS, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Grindeks AS	75	E11-E11, E14- E14					
					50						
1725825	sofosbuviiir+velpat asviir, 400mg+100mg	J05AP55	EPCLUSA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Gilead Sciences Ireland Unlimited Company	100	B18.2-B18.2	Gastroenteroloog, Infektsionist				kroonilise progresseeruva C-viirushepatiidi raviks
1751015	sofosbuviiir+velpat asviir+voksilaprevii r, 400mg+100mg+100 mg	J05AP56	VOSEVI, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Gilead Sciences Ireland Unlimited Company	100	B18.2-B18.2	Infektsionist, Gastroenteroloog				kroonilise progresseeruva C-viirushepatiidi kordusraviks tingimusel, et patsient ei ole eelneva otsese toimega viirusvastase raviga saavutanud püsivat viroloogilist ravivastust
1597440	solifenatsiin, 10mg	G04BD08	SOLIFENACIN PMCS 10MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Pro.Med.Cs Praha a.s.	50						
1686517	solifenatsiin, 10mg	G04BD08	TAMISTEN, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Medochemie Limited	50						
1597372	solifenatsiin, 5mg	G04BD08	SOLIFENACIN PMCS 5MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Pro.Med.Cs Praha a.s.	50						
1685932	solifenatsiin, 5mg	G04BD08	TAMISTEN, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Medochemie Limited	50						
1875900	somatrogoon, 24mg	H01AC08	NGENLA, süstelahus pen-süstlis, 1TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	E23-E23, E89.3- E89.3	Endokrinoloog, Pediaater – endokrinoloog				kuni kasvutsoonide sulgumiseni
1875911	somatrogoon, 60mg	H01AC08	NGENLA, süstelahus pen-süstlis, 1TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	E23-E23, E89.3- E89.3	Endokrinoloog, Pediaater – endokrinoloog				kuni kasvutsoonide sulgumiseni



Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1041185	somatropiin, 12mg	H01AC01	GENOTROPIN, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	Q87.1-Q87.1, Q96-Q96, E23.0-E23.0, E23.1-E23.1, E89.3-E89.3, E23.3-E23.3	Endokrinoloog				
					100	E89.3-E89.3, E23-E23, Q96-Q96, Q87.1-Q87.1, P05.1-P05.1, N18-N18	Pediaater – endokrinoloog, Endokrinoloog				kuni kasvutsoonide sulgumiseni
					50						
1369009	somatropiin, 3,3mg 1ml	H01AC01	OMNITROPE, süstelahus, 1.5ml 5TK	Sandoz GmbH	100	E89.3-E89.3, E23-E23, Q96-Q96, Q87.1-Q87.1, P05.1-P05.1, N18-N18	Endokrinoloog, Pediaater – endokrinoloog				kuni kasvutsoonide sulgumiseni
					100	Q87.1-Q87.1, Q96-Q96, E23.0-E23.0, E23.1-E23.1, E89.3-E89.3, E23.3-E23.3	Endokrinoloog				
					50						
1022072	somatropiin, 5,3mg	H01AC01	GENOTROPIN, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Pfizer Europe MA EEIG	50						
					100	E89.3-E89.3, E23-E23, Q96-Q96, Q87.1-Q87.1, P05.1-P05.1, N18-N18	Pediaater – endokrinoloog, Endokrinoloog				kuni kasvutsoonide sulgumiseni
					100	Q87.1-Q87.1, Q96-Q96, E23.0-E23.0, E23.1-E23.1, E89.3-E89.3, E23.3-E23.3	Endokrinoloog				

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1415528	somatropiin, 5,83mg 1ml	H01AC0 1	SAIZEN 5,83 MG/ML, süstelahus kolbampullis, 1.03ml 1TK	Merck Serono S.p.A.	50						
					100	Q87.1-Q87.1, Q96-Q96, E23.0-E23.0, E23.1-E23.1, E89.3-E89.3, E23.3-E23.3	Endokrinoloog				
					100	E89.3-E89.3, E23-E23, Q96- Q96, Q87.1- Q87.1, P05.1- P05.1, N18-N18	Endokrinoloog, Pediaater – endokrinoloog				kuni kasvatsoonide sulgumiseni
1369032	somatropiin, 6,7mg 1ml	H01AC0 1	OMNITROPE, süstelahus, 1.5ml 1TK	Sandoz GmbH	100	Q87.1-Q87.1, Q96-Q96, E23.0-E23.0, E23.1-E23.1, E89.3-E89.3, E23.3-E23.3	Endokrinoloog				
					50						
					100	E89.3-E89.3, E23-E23, Q96- Q96, Q87.1- Q87.1, P05.1- P05.1, N18-N18	Endokrinoloog, Pediaater – endokrinoloog				kuni kasvatsoonide sulgumiseni
1415540	somatropiin, 8mg 1ml	H01AC0 1	SAIZEN 8 MG/ML, süstelahus kolbampullis, 1.5ml 1TK	Merck Serono S.p.A.	100	Q96-Q96, Q87- Q87, E23.0- E23.0, E23.1- E23.1, E89.3- E89.3, E23.3- E23.3	Endokrinoloog				
					50		Endokrinoloog, Pediaater – endokrinoloog				
					100	E89.3-E89.3, E23-E23, Q96- Q96, Q87.1- Q87.1, P05.1- P05.1, N18-N18	Pediaater – endokrinoloog, Endokrinoloog				kuni kasvatsoonide sulgumiseni

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1249938	sorafeniib, 200mg	L01EX0 2	NEXAVAR, õhukese polümeerikattega tablett, 112TK	Bayer AG	100	C22-C22	Onkoloog				kuni haiguse progresseerumiseni, kui ravi alustamise sorafeniibiga on hinnatud konsiilium (vähemalt 3 onkoloogi) vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud kaugelearenenud hepatotsellulaarne kartsinoom, patsiendi üldseisund on hea (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi) ning maksa funktsioon ei ole oluliselt häiritud. Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi sorafeniibiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. oktoobrit 2010. a.
					100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumis heledarakulise neeru kartsinoomi teise rea ravina pärast interferooni sisaldava ravi ebaõnnestumist patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine sorafeniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt kahe onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1, haiguse prognoos Hengi kriteeriumide järgi hea või keskmine ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena
1756852	sorafeniib, 200mg	L01EX0 2	SORAFENIB TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 112TK	Teva B.V.	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumis heledarakulise neeru kartsinoomi teise rea ravina pärast interferooni sisaldava ravi ebaõnnestumist patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine sorafeniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1, haiguse prognoos Hengi kriteeriumide järgi hea või keskmine ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena.
					100	C22-C22	Onkoloog				kuni haiguse progresseerumiseni, kui ravi alustamise sorafeniibiga on hinnatud konsiilium (vähemalt 3 onkoloogi) vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud kaugelearenenud hepatotsellulaarne kartsinoom, patsiendi üldseisund on hea (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi) ning maksa funktsioon ei ole oluliselt häiritud.

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1794359	sorafeniib, 200mg	L01EX0 2	SORAFENIB SANDOZ, õhukese polümeerikattega tablett, 112TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	100	C22-C22	Onkoloog				kuni haiguse progresseerumiseni, kui ravi alustamise sorafeniibiga on hinnatud konsiilium (vähemalt 3 onkoloogi) vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud kaugelearenenud hepatotsellulaarne kartsinoom, patsiendi üldseisund on hea (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi) ning maksa funktsioon ei ole oluliselt häiritud.
					100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumis heledarakulise neeru kartsinoomi teise rea ravina pärast interferooni sisaldava ravi ebaõnnestumist patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine sorafeniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1, haiguse prognoos Hengi kriteeriumide järgi hea või keskmine ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena.
1806791	sorafeniib, 200mg	L01EX0 2	SORAFENIB ZENTIVA, õhukese polümeerikattega tablett, 112TK	Zentiva k.s.	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumis heledarakulise neeru kartsinoomi teise rea ravina pärast interferooni sisaldava ravi ebaõnnestumist patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine sorafeniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1, haiguse prognoos Hengi kriteeriumide järgi hea või keskmine ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena.
					100	C22-C22	Onkoloog				kuni haiguse progresseerumiseni, kui ravi alustamise sorafeniibiga on hinnatud konsiilium (vähemalt 3 onkoloogi) vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud kaugelearenenud hepatotsellulaarne kartsinoom, patsiendi üldseisund on hea (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi) ning maksa funktsioon ei ole oluliselt häiritud.

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1890839	sorafeniib, 200mg	L01EX0 2	SORAFENIB ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 112TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumis heledarakulise neeru kartsinoomi teise rea ravina pärast interferooni sisaldava ravi ebaõnnestumist patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine sorafeniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1, haiguse prognoos Hengi kriteeriumide järgi hea või keskmine ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena.
					100	C22-C22	Onkoloog				kuni haiguse progresseerumiseni, kui ravi alustamise sorafeniibiga on hinnatud konsiilium (vähemalt 3 onkoloogi) vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud kaugelearenenud hepatotsellulaarne kartsinoom, patsiendi üldseisund on hea (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi) ning maksa funktsioon ei ole oluliselt häiritud.
1071863	sotalool, 80mg	C07AA0 7	SOTAHEXAL 80 MG, tablett, 50TK	Hexal AG	75	I47-I49					
					50						
1001091	spironolaktoon, 100mg	C03DA0 1	SPIRIX, tablett, 20TK	Orifarm Healthcare A/S	75	I15-I15					
					50						
					75	I10-I13					
					100	I27.0-I27.0					
					75	I50-I50					
1689060	spironolaktoon, 100mg	C03DA0 1	SPIRONOLACTONE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					100	I27.0-I27.0					
1689071	spironolaktoon, 100mg	C03DA0 1	SPIRONOLACTONE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					100	I27.0-I27.0					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1000944	spironolaktoon, 25mg	C03DA0 1	SPIRIX, tablett, 20TK	Orifarm Healthcare A/S	75	I15-I15					
					100	I27.0-I27.0					
					75	I50-I50					
					75	I10-I13					
					50						
1688946	spironolaktoon, 25mg	C03DA0 1	SPIRONOLACTONE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	Accord Healthcare B.V.	100	I27.0-I27.0					
					50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1688957	spironolaktoon, 25mg	C03DA0 1	SPIRONOLACTONE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare B.V.	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					100	I27.0-I27.0					
					50						
1001013	spironolaktoon, 50mg	C03DA0 1	SPIRIX, tablett, 20TK	Orifarm Healthcare A/S	75	I50-I50					
					50						
					100	I27.0-I27.0					
					75	I15-I15					
					75	I10-I13					
1042018	spironolaktoon, 50mg	C03DA0 1	VEROSPIRON, kõvakapsel, 30TK	Gedeon Richter Plc.	75	I15-I15					
					100	I27.0-I27.0					
					75	I10-I13					
					50						
					75	I50-I50					
1071650	spironolaktoon, 50mg	C03DA0 1	SPIRIX, tablett, 100TK	Orifarm Healthcare A/S	100	I27.0-I27.0					
					50						
					75	I15-I15					
					75	I10-I13					
					75	I50-I50					
1689004	spironolaktoon, 50mg	C03DA0 1	SPIRONOLACTONE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	Accord Healthcare B.V.	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
					100	I27.0-I27.0					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1689015	spironolaktoon, 50mg	C03DA01	SPIRONOLACTONE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					100	I27.0-I27.0					
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1280056	stiripentool, 250mg	N03AX17	DIACOMIT, kõvakapsel, 60TK	Biocodex	100	G40-G40	Neuroloog				koos klobasaami ja valproaadiga väikelapse raske müoklooniilise epilepsia (SMEI, Dravet' sündroom) korral, kui kombinatsioonravi klobasaami ja valproaadiga on osutunud ebapiisavaks ning topiramaat ja levitiratsetaam on ebaefektiivsed või vastunäidustatud
1280146	stiripentool, 250mg	N03AX17	DIACOMIT, suukaudse suspensiooni pulber, 60TK	Biocodex	100	G40-G40	Neuroloog				koos klobasaami ja valproaadiga väikelapse raske müoklooniilise epilepsia (SMEI, Dravet' sündroom) korral, kui kombinatsioonravi klobasaami ja valproaadiga on osutunud ebapiisavaks ning topiramaat ja levitiratsetaam on ebaefektiivsed või vastunäidustatud
1280089	stiripentool, 500mg	N03AX17	DIACOMIT, kõvakapsel, 60TK	Biocodex	100	G40-G40	Neuroloog				koos klobasaami ja valproaadiga väikelapse raske müoklooniilise epilepsia (SMEI, Dravet' sündroom) korral, kui kombinatsioonravi klobasaami ja valproaadiga on osutunud ebapiisavaks ning topiramaat ja levitiratsetaam on ebaefektiivsed või vastunäidustatud
1280113	stiripentool, 500mg	N03AX17	DIACOMIT, suukaudse suspensiooni pulber, 60TK	Biocodex	100	G40-G40	Neuroloog				koos klobasaami ja valproaadiga väikelapse raske müoklooniilise epilepsia (SMEI, Dravet' sündroom) korral, kui kombinatsioonravi klobasaami ja valproaadiga on osutunud ebapiisavaks ning topiramaat ja levitiratsetaam on ebaefektiivsed või vastunäidustatud
1008818	sulfametoksasool+ trimetoprim, 40mg+8mg 1ml	J01EE01	BACTRIM, siirup, 100ml 1TK	Eumedica Pharmaceuticals GmbH	100	Z21-Z21, Z20.6- Z20.6, B20-B24	Infektsionist				
					50						
1023455	sulfasalasiin, 500mg	A07EC01	SALAZOPYRIN EN, gastroresistentne tablett, 100TK	Pfizer Europe MA EEIG	75	K51-K51, K50- K50	Gastroenteroloog, Pediaater				
					50						
					75	M08-M08, M45- M45, M06-M06, M05-M05, M46- M46	Reumatoloog, Pediaater	esmane			
1705115	sulpiriid, 100mg	N05AL01	BETAMAKS, tablett, 30TK	Grindeks AS	100	F20-F29	Psühhiaater				
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1705126	sulpiriid, 200mg	N05AL0 1	BETAMAKS, tablett, 30TK	Grindeks AS	100	F20-F29	Psühhiaater				
					50						
1705081	sulpiriid, 50mg	N05AL0 1	BETAMAKS, tablett, 30TK	Grindeks AS	100	F20-F29	Psühhiaater				
					50						
1018482	sultamitsilliin, 375mg	J01CR0 4	UNASYN, õhukese polümeerikattega tablett, 12TK	Pfizer Europe MA EEIG	50						
1139914	sumatriptaan, 100mg	N02CC0 1	IMIGRAN FDT, õhukese polümeerikattega tablett, 2TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	75	G43-G43					
					50						
1139947	sumatriptaan, 100mg	N02CC0 1	IMIGRAN FDT, õhukese polümeerikattega tablett, 6TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	75	G43-G43					
					50						
1234213	sumatriptaan, 100mg	N02CC0 1	CINIE 100 MG, tablett, 6TK	Zentiva k.s.	75	G43-G43					
					50						
1234505	sumatriptaan, 100mg	N02CC0 1	SUMATRIPTAN STADA, tablett, 6TK	Stada Arzneimittel AG	75	G43-G43					
					50						
1278053	sumatriptaan, 100mg	N02CC0 1	SUMATRIPTAN ACTAVIS, kaetud tablett, 6TK	Teva B.V.	75	G43-G43					
					50						
1139880	sumatriptaan, 50mg	N02CC0 1	IMIGRAN FDT, õhukese polümeerikattega tablett, 2TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	75	G43-G43					
					50						
1139903	sumatriptaan, 50mg	N02CC0 1	IMIGRAN FDT, õhukese polümeerikattega tablett, 6TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	75	G43-G43					
					50						
1234156	sumatriptaan, 50mg	N02CC0 1	CINIE 50 MG, tablett, 6TK	Zentiva k.s.	75	G43-G43					
					50						
1277995	sumatriptaan, 50mg	N02CC0 1	SUMATRIPTAN ACTAVIS, kaetud tablett, 6TK	Teva B.V.	75	G43-G43					
					50						
1835805	sumatriptaan+napr okseen, 85mg+500mg	N02CC5 1	MIGSUN, õhukese polümeerikattega tablett, 9TK	Orion Corporation	50						
					75	G43-G43					



Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1353305	sunitiniib, 12,5mg	L01EX0 1	SUTENT, kõvakapsel, 28TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks
1725263	sunitiniib, 12,5mg	L01EX0 1	SUNITINIB TEVA, kõvakapsel, 28TK	Teva B.V.	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks
1759103	sunitiniib, 12,5mg	L01EX0 1	SUNITINIB SANDOZ, kõvakapsel, 28TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks
1776854	sunitiniib, 12,5mg	L01EX0 1	SUNITINIB MYLAN, kõvakapsel, 28TK	Mylan Ireland Limited	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks
1803383	sunitiniib, 12,5mg	L01EX0 1	SUNITINIB ZENTIVA, kõvakapsel, 28TK	Zentiva k.s.	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks
1807792	sunitiniib, 12,5mg	L01EX0 1	SUNITINIB NORAMEDA, kõvakapsel, 28TK	Norameda UAB	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks
1842397	sunitiniib, 12,5mg	L01EX0 1	SUNITINIB ACCORD, kõvakapsel, 28TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks
1842409	sunitiniib, 12,5mg	L01EX0 1	SUNITINIB ACCORD, kõvakapsel, 28TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks
1858248	sunitiniib, 12,5mg	L01EX0 1	SUNITINIB STADA, kõvakapsel, 28TK	Stada Arzneimittel AG	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks
1353293	sunitiniib, 25mg	L01EX0 1	SUTENT, kõvakapsel, 28TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks
1834983	sunitiniib, 25mg	L01EX0 1	SUNITINIB VIASANA, kõvakapsel, 30TK	Viasana UAB	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks
1842421	sunitiniib, 25mg	L01EX0 1	SUNITINIB ACCORD, kõvakapsel, 28TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks
1842432	sunitiniib, 25mg	L01EX0 1	SUNITINIB ACCORD, kõvakapsel, 28TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks
1353282	sunitiniib, 50mg	L01EX0 1	SUTENT, kõvakapsel, 28TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks
1725308	sunitiniib, 50mg	L01EX0 1	SUNITINIB TEVA, kõvakapsel, 28TK	Teva B.V.	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks
1759169	sunitiniib, 50mg	L01EX0 1	SUNITINIB SANDOZ, kõvakapsel, 28TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1776876	sunitiniib, 50mg	L01EX0 1	SUNITINIB MYLAN, kõvakapsel, 28TK	Mylan Ireland Limited	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks
1803653	sunitiniib, 50mg	L01EX0 1	SUNITINIB ZENTIVA, kõvakapsel, 28TK	Zentiva k.s.	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks
1807826	sunitiniib, 50mg	L01EX0 1	SUNITINIB NORAMEDA, kõvakapsel, 28TK	Norameda UAB	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks
1835007	sunitiniib, 50mg	L01EX0 1	SUNITINIB VIASANA, kõvakapsel, 30TK	Viasana UAB	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks
1842487	sunitiniib, 50mg	L01EX0 1	SUNITINIB ACCORD, kõvakapsel, 28TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks
1842498	sunitiniib, 50mg	L01EX0 1	SUNITINIB ACCORD, kõvakapsel, 28TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks
1858361	sunitiniib, 50mg	L01EX0 1	SUNITINIB STADA, kõvakapsel, 28TK	Stada Arzneimittel AG	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks
1113422	zidovudiin, 10mg 1ml	J05AF01	RETROVIR, suukaudne lahus, 200ml 1TK	Viiv Healthcare B.V.	50		Infektsionist				HIV-nakkuse profülaktikaks, v a tööülesannete täitmisega seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega
1036460	zidovudiin+lamivu diin, 300mg+150mg	J05AR0 1	COMBIVIR, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Viiv Healthcare B.V.	50		Infektsionist				HIV-nakkuse profülaktikaks, v a tööülesannete täitmisega seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega
1005815	zuklopentiksool, 10mg	N05AF0 5	CISORDINOL, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	H. Lundbeck A/S	50						
					100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4- F11.7, F18.4- F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3- F60.3, F13.4- F13.7, F10.4- F10.7, F17.4- F17.7, F15.4- F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1006232	zuklopentiksool, 200mg 1ml	N05AF0 5	CISORDINOL DEPOT, süstelahus, 1ml 1TK	H. Lundbeck A/S	50						
					100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4- F11.7, F18.4- F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3- F60.3, F13.4- F13.7, F10.4- F10.7, F17.4- F17.7, F15.4- F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
1065226	zuklopentiksool, 200mg 1ml	N05AF0 5	CISORDINOL DEPOT, süstelahus, 1ml 10TK	H. Lundbeck A/S	100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4- F11.7, F18.4- F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3- F60.3, F13.4- F13.7, F10.4- F10.7, F17.4- F17.7, F15.4- F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1006322	zuklopentiksool, 50mg 1ml	N05AF0 5	CISORDINOL- ACUTARD, süstelahus, 1ml 10TK	H. Lundbeck A/S	50						
					100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4- F11.7, F18.4- F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3- F60.3, F13.4- F13.7, F10.4- F10.7, F17.4- F17.7, F15.4- F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
1679036	tadalafiil, 20mg	G04BE0 8	TADALAFIL ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Accord Healthcare B.V.	100	I27.0-I27.0	Pulmonoloog, Pediaater, Reumatoloog, Kardioloog				NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel
					50	I27.0-I27.0	Pediaater, Kardioloog, Reumatoloog, Pulmonoloog				
1849282	tadalafiil, 20mg	G04BE0 8	ZENAVIL, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Medochemie Limited	100	I27.0-I27.0	Pediaater, Kardioloog, Reumatoloog, Pulmonoloog				NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel
					50	I27.0-I27.0	Pediaater, Reumatoloog, Pulmonoloog, Kardioloog				

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1811630	tafamidis, 61mg	N07XX0 8	VYNDAQEL, pehmekapsel, 30TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	E85.4-E85.4, E85.0-E85.0	Kardioloog				patsiendile, kellel on dokumenteeritud transtüretiiniga seotud amüloidooosi kardiomüopaatia, NYHA I-III klassi südamepuudulikkuse esinemine, anamneesis südamepuudulikkus või südamepuudulikkuse kliinilised nähud, mis vajasis ravi diureetikumiga.
1753703	tafluprost, 0,015mg 1ml	S01EE0 5	TAFLOTAN, silmatilgad, lahus, 3ml 1TK	Santen Oy	100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			kui ravi jätkamine teiste glaukoomiravimitega on meditsiiniliselt vastunäidustatud bensalkooniumkloriidile tekkinud tõendatud ülitundlikkuse või olulise toksilise toime tõttu silma eesmisele osale
1870051	tafluprost, 0,015mg 1ml	S01EE0 5	TAFLOTAN, silmatilgad, lahus, 7ml 1TK	Santen Oy	100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			kui ravi jätkamine teiste glaukoomiravimitega on meditsiiniliselt vastunäidustatud bensalkooniumkloriidile tekkinud tõendatud ülitundlikkuse või olulise toksilise toime tõttu silma eesmisele osale
1179840	takroliimus, 0,3mg 1g	D11AH0 1	PROTOPIC, salv, 30g 1TK	LEO Pharma A/S	50						
1294646	takroliimus, 0,5mg	L04AD0 2	ADVAGRAF, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 50TK	Astellas Pharma Europe B.V.	100	Z94-Z94, T86- T86					patsientidele, kellel esineb kõrge immunoloogiline risk (PRA >20%), korduvsirdamise puhul, maksa- või kopsusiirdamise pihul, steroidresistentse ägeda äratõukereaktsiooni ravi järgselt ning müokardiinfarkti või müokardi revaskulariseeriva protseduuri järgselt
1776618	takroliimus, 0,5mg	L04AD0 2	DAILIPORT, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 50TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	100	Z94-Z94, T86- T86					patsientidele, kellel esineb kõrge immunoloogiline risk (PRA >20%), korduvsirdamise puhul, maksa- või kopsusiirdamise pihul, steroidresistentse ägeda äratõukereaktsiooni ravi järgselt ning müokardiinfarkti või müokardi revaskulariseeriva protseduuri järgselt
1661105	takroliimus, 0,75mg	L04AD0 2	ENVARISUS, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Chiesi Farmaceutici S.p.A.	100	Z94-Z94, T86- T86					patsientidele, kellel esineb kõrge immunoloogiline risk (PRA >20%), korduvsirdamise puhul, maksa- või kopsusiirdamise pihul, steroidresistentse ägeda äratõukereaktsiooni ravi järgselt ning müokardiinfarkti või müokardi revaskulariseeriva protseduuri järgselt
1294680	takroliimus, 1mg	L04AD0 2	ADVAGRAF, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 50TK	Astellas Pharma Europe B.V.	100	Z94-Z94, T86- T86					patsientidele, kellel esineb kõrge immunoloogiline risk (PRA >20%), korduvsirdamise puhul, maksa- või kopsusiirdamise pihul, steroidresistentse ägeda äratõukereaktsiooni ravi järgselt ning müokardiinfarkti või müokardi revaskulariseeriva protseduuri järgselt

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1661149	takroliimus, 1mg	L04AD0 2	ENVARUSUS, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	Chiesi Farmaceutici S.p.A.	100	Z94-Z94, T86- T86					patsientidele, kellel esineb kõrge immunoloogiline risk (PRA >20%), korduvsirdamise puhul, maksa- või kopsusiirdamise pihul, steroidresistentse ägeda äratõukereaktsiooni ravi järgselt ning müokardiinfarkti või müokardi revaskulariseeriva protseduuri järgselt
1776652	takroliimus, 1mg	L04AD0 2	DAILIPOINT, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 50TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	100	Z94-Z94, T86- T86					patsientidele, kellel esineb kõrge immunoloogiline risk (PRA >20%), korduvsirdamise puhul, maksa- või kopsusiirdamise pihul, steroidresistentse ägeda äratõukereaktsiooni ravi järgselt ning müokardiinfarkti või müokardi revaskulariseeriva protseduuri järgselt
1179851	takroliimus, 1mg 1g	D11AH0 1	PROTOPIC, salv, 30g 1TK	LEO Pharma A/S	50						
1665277	takroliimus, 1mg 1g	D11AH0 1	LEBSANAN, salv, 30g 1TK	Norameda UAB	50						
1488337	takroliimus, 3mg	L04AD0 2	ADVAGRAF, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 50TK	Astellas Pharma Europe B.V.	100	Z94-Z94, T86- T86					patsientidele, kellel esineb kõrge immunoloogiline risk (PRA >20%), korduvsirdamise puhul, maksa- või kopsusiirdamise pihul, steroidresistentse ägeda äratõukereaktsiooni ravi järgselt ning müokardiinfarkti või müokardi revaskulariseeriva protseduuri järgselt
1776731	takroliimus, 3mg	L04AD0 2	DAILIPOINT, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 50TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	100	Z94-Z94, T86- T86					patsientidele, kellel esineb kõrge immunoloogiline risk (PRA >20%), korduvsirdamise puhul, maksa- või kopsusiirdamise pihul, steroidresistentse ägeda äratõukereaktsiooni ravi järgselt ning müokardiinfarkti või müokardi revaskulariseeriva protseduuri järgselt
1661161	takroliimus, 4mg	L04AD0 2	ENVARUSUS, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Chiesi Farmaceutici S.p.A.	100	Z94-Z94, T86- T86					patsientidele, kellel esineb kõrge immunoloogiline risk (PRA >20%), korduvsirdamise puhul, maksa- või kopsusiirdamise pihul, steroidresistentse ägeda äratõukereaktsiooni ravi järgselt ning müokardiinfarkti või müokardi revaskulariseeriva protseduuri järgselt
1294668	takroliimus, 5mg	L04AD0 2	ADVAGRAF, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 50TK	Astellas Pharma Europe B.V.	100	Z94-Z94, T86- T86					patsientidele, kellel esineb kõrge immunoloogiline risk (PRA >20%), korduvsirdamise puhul, maksa- või kopsusiirdamise pihul, steroidresistentse ägeda äratõukereaktsiooni ravi järgselt ning müokardiinfarkti või müokardi revaskulariseeriva protseduuri järgselt

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1776775	takroliimus, 5mg	L04AD0 2	DAILIPOINT, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 50TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	100	Z94-Z94, T86- T86					patsientidele, kellel esineb kõrge immunoloogiline risk (PRA >20%), korduvsirdamise puhul, maksa- või kopsusiirdamise pihul, steroidresistentse ägeda äratõukereaktsiooni ravi järgselt ning müokardiinfarkti või müokardi revaskulariseeriva protseduuri järgselt
1347230	talidomiid, 50mg	L04AX0 2	THALIDOMIDE BMS, kõvakapsel, 28TK	Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG	100	C90.0-C90.0	Hematoloog				ravimi väljakirjutamise õigus hulgimüüloomi suukaudseks mono- või kombinatsioonraviks
1015704	tamoksifeen, 20mg	L02BA0 1	TAMOXIFEN "EBEWE", tablett, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	100	C50-C50	Günekoloog, Üldkirurg				rinnavähi adjuvantraviks
					50						
					100	D18.1-D18.1	Pulmonoloog, Onkoloog				
					100	C00-D48	Onkoloog				
1188143	tamsulosiin, 0,4mg	G04CA0 2	FLOSIN 0,4MG, toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	50						
1188378	tamsulosiin, 0,4mg	G04CA0 2	TAMSULOSIN AUXILIA, toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	Auxilia Pharma OÜ	50						
1188402	tamsulosiin, 0,4mg	G04CA0 2	TAMSULOSIN AUXILIA, toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel, 60TK	Auxilia Pharma OÜ	50						
1188480	tamsulosiin, 0,4mg	G04CA0 2	TAMSULOSIN LANNACHER, toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	G.L. Pharma GmbH	50						
1188659	tamsulosiin, 0,4mg	G04CA0 2	TAMSULOSIN STADA, toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel, 100TK	Stada Arzneimittel AG	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1195826	tamsulosiin, 0,4mg	G04CA02	OMSAL, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	Gedeon Richter Plc.	50						
1436015	tamsulosiin, 0,4mg	G04CA02	TANYZ ERAS 0.4MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	KRKA d.d. Novo mesto	50						
3041558	tamsulosiin, 0,4mg	G04CA02	FLOSIN 0,4MG, toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	Lex Ano UAB	50						
1390463	tamsulosiin+dutast eriid, 0,4mg+0,5mg	G04CA52	COMBODART, kõvakapsel, 30TK	GlaxoSmithKline Trading Services Limited	50						
1769609	tamsulosiin+dutast eriid, 0,4mg+0,5mg	G04CA52	DUTASTERIDE/TAMSU LOSIN OLAINFARM, kõvakapsel, 30TK	JSC Olainfarm	50						
1769632	tamsulosiin+dutast eriid, 0,4mg+0,5mg	G04CA52	DUTASTERIDE/TAMSU LOSIN VIATRIS, kõvakapsel, 30TK	Viartis Limited	50						
1769744	tamsulosiin+dutast eriid, 0,4mg+0,5mg	G04CA52	DUTROZEN, kõvakapsel, 30TK	Zentiva k.s.	50						
1776821	tamsulosiin+dutast eriid, 0,4mg+0,5mg	G04CA52	DUTASTERIDE/TAMSU LOSIN TEVA, kõvakapsel, 30TK	Teva B.V.	50						
1782660	tamsulosiin+dutast eriid, 0,4mg+0,5mg	G04CA52	TADUSTA, kõvakapsel, 30TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
1785089	tamsulosiin+dutast eriid, 0,4mg+0,5mg	G04CA52	DUTASTERIDE/TAMSU LOSIN EXELTIS, kõvakapsel, 30TK	Exeltis Baltics UAB	50						
1894226	tamsulosiin+dutast eriid, 0,4mg+0,5mg	G04CA52	COMBODART, kõvakapsel, 90TK	Ideal Trade Links UAB	50						



Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3000496	tamsulosiin+solife natsiin, 0,4mg+6mg	G04CA5 3	SOLITOMBO, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 60TK	Adamed Pharma S.A.	50						
1046292	telmisartaan, 40mg	C09CA0 7	MICARDIS, tablett, 28TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1395424	telmisartaan, 40mg	C09CA0 7	TELMISARTAN- RATIOPHARM 40MG, tablett, 28TK	Ratiopharm GmbH	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1430233	telmisartaan, 40mg	C09CA0 7	TELMISARTAN SANDOZ 40 MG, tablett, 28TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1482263	telmisartaan, 40mg	C09CA0 7	TOLURA, tablett, 30TK	KRKA d.d. Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1482274	telmisartaan, 40mg	C09CA0 7	TOLURA, tablett, 56TK	KRKA d.d. Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1046258	telmisartaan, 80mg	C09CA0 7	MICARDIS, tablett, 28TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1395569	telmisartaan, 80mg	C09CA0 7	TELMISARTAN- RATIOPHARM 80MG, tablett, 28TK	Ratiopharm GmbH	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1430389	telmisartaan, 80mg	C09CA0 7	TELMISARTAN SANDOZ 80 MG, tablett, 28TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1482331	telmisartaan, 80mg	C09CA0 7	TOLURA, tablett, 30TK	KRKA d.d. Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1482342	telmisartaan, 80mg	C09CA0 7	TOLURA, tablett, 56TK	KRKA d.d. Novo mesto	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1499452	telmisartaan+amlo dipiin, 80mg+10mg	C09DB0 4	TWYNSTA, tablett, 28TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	50						
					75	I10-I13, I15-I15					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1643161	telmisartaan+amlo dipiin, 80mg+10mg	C09DB0 4	MIXOR, tablett, 28TK	Zentiva k.s.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1707049	telmisartaan+amlo dipiin, 80mg+10mg	C09DB0 4	TELDIPIN, tablett, 28TK	KRKA, d.d., Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1499384	telmisartaan+amlo dipiin, 80mg+5mg	C09DB0 4	TWYNSTA, tablett, 28TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1643071	telmisartaan+amlo dipiin, 80mg+5mg	C09DB0 4	MIXOR, tablett, 28TK	Zentiva k.s.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1706969	telmisartaan+amlo dipiin, 80mg+5mg	C09DB0 4	TELDIPIN, tablett, 28TK	KRKA, d.d., Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1609613	telmisartaan+hüdr oklorotiasiid, 40mg+12,5mg	C09DA8 5	TOLUCOMBI, tablett, 56TK	KRKA d.d. Novo mesto	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1114793	telmisartaan+hüdr oklorotiasiid, 80mg+12,5mg	C09DA8 5	MICARDISPLUS, tablett, 28TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1566615	telmisartaan+hüdr oklorotiasiid, 80mg+12,5mg	C09DA8 5	TELMISARTAN/HYDRO CHLOROTHIAZIDE TAD, tablett, 30TK	TAD Pharma GmbH	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1566996	telmisartaan+hüdr oklorotiasiid, 80mg+12,5mg	C09DA8 5	TEZEO HCT 80 MG/12,5 MG, tablett, 28TK	Zentiva k.s.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1567267	telmisartaan+hüdr oklorotiasiid, 80mg+12,5mg	C09DA8 5	TELMISARTAN /HYDROCHLOROTHIA ZIDE SANDOZ, kaetud tablett, 28TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1609691	telmisartaan+hüdr oklorotiasiid, 80mg+12,5mg	C09DA8 5	TOLUCOMBI, tablett, 56TK	KRKA d.d. Novo mesto	50						
					75	I10-I13, I15-I15					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1612910	telmisartaan+hüdr oklorotiasiid, 80mg+12,5mg	C09DA8 5	TELMISARTAN/HYDRO CHLOROTHIAZIDE TEVA PHARMA, tablett, 28TK	Teva B.V.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1676954	telmisartaan+hüdr oklorotiasiid, 80mg+12,5mg	C09DA8 5	TELMISARTAN/HYDRO CHLOROTHIAZIDE ACCORD, tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1367524	telmisartaan+hüdr oklorotiasiid, 80mg+25mg	C09DA8 5	MICARDISPLUS, tablett, 28TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1566705	telmisartaan+hüdr oklorotiasiid, 80mg+25mg	C09DA8 5	TELMISARTAN/HYDRO CHLOROTHIAZIDE TAD, tablett, 30TK	TAD Pharma GmbH	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1567379	telmisartaan+hüdr oklorotiasiid, 80mg+25mg	C09DA8 5	TELMISARTAN /HYDROCHLOROTHIA ZIDE SANDOZ, kaetud tablett, 28TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1609770	telmisartaan+hüdr oklorotiasiid, 80mg+25mg	C09DA8 5	TOLUCOMBI, tablett, 56TK	KRKA d.d. Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1613045	telmisartaan+hüdr oklorotiasiid, 80mg+25mg	C09DA8 5	TELMISARTAN/HYDRO CHLOROTHIAZIDE TEVA PHARMA, tablett, 28TK	Teva B.V.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1677045	telmisartaan+hüdr oklorotiasiid, 80mg+25mg	C09DA8 5	TELMISARTAN/HYDRO CHLOROTHIAZIDE ACCORD, tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1458963	temosolomiid, 100mg	L01AX0 3	TEMOZOLOMIDE TEVA, kõvakapsel, 5TK	Teva B.V.	100	C71-C71	Pediaater – hematoloog- onkoloog, Onkoloog				konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel heas üldseisundis patsiendile (WHO funktsionaalne klass 0...1)
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1462115	temosolomiid, 100mg	L01AX0 3	TEMOZOLOMIDE ACCORD, kõvakapsel, 5TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	C71-C71	Pediaater – hematoloog- onkoloog, Onkoloog				konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel heas üldseisundis patsiendile (WHO funktsionaalne klass 0...1)
					50						
1534676	temosolomiid, 100mg	L01AX0 3	BLASTOMAT 100 MG, kõvakapsel, 5TK	Zentiva k.s.	100	C71-C71	Onkoloog, Pediaater – hematoloog- onkoloog				konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel heas üldseisundis patsiendile (WHO funktsionaalne klass 0...1)
					50						
1462137	temosolomiid, 140mg	L01AX0 3	TEMOZOLOMIDE ACCORD, kõvakapsel, 5TK	Accord Healthcare S.L.U.	50						
					100	C71-C71	Pediaater – hematoloog- onkoloog, Onkoloog				konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel heas üldseisundis patsiendile (WHO funktsionaalne klass 0...1)
1534698	temosolomiid, 140mg	L01AX0 3	BLASTOMAT 140 MG, kõvakapsel, 5TK	Zentiva k.s.	50						
					100	C71-C71	Pediaater – hematoloog- onkoloog, Onkoloog				konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel heas üldseisundis patsiendile (WHO funktsionaalne klass 0...1)
1458941	temosolomiid, 20mg	L01AX0 3	TEMOZOLOMIDE TEVA, kõvakapsel, 5TK	Teva B.V.	50						
					100	C71-C71	Pediaater – hematoloog- onkoloog, Onkoloog				konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel heas üldseisundis patsiendile (WHO funktsionaalne klass 0...1)
1462092	temosolomiid, 20mg	L01AX0 3	TEMOZOLOMIDE ACCORD, kõvakapsel, 5TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	C71-C71	Onkoloog, Pediaater – hematoloog- onkoloog				konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel heas üldseisundis patsiendile (WHO funktsionaalne klass 0...1)
					50						
1534654	temosolomiid, 20mg	L01AX0 3	BLASTOMAT 20 MG, kõvakapsel, 5TK	Zentiva k.s.	100	C71-C71	Onkoloog, Pediaater – hematoloog- onkoloog				konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel heas üldseisundis patsiendile (WHO funktsionaalne klass 0...1)
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1462171	temosolomiid, 250mg	L01AX0 3	TEMOZOLOMIDE ACCORD, kõvakapsel, 5TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	C71-C71	Pediaater – hematoloog- onkoloog, Onkoloog				konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel heas üldseisundis patsiendile (WHO funktsionaalne klass 0...1)
					50						
1736513	tenofoviiralafenami id, 25mg	J05AF13	VEMLIDY, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Gilead Sciences Ireland Unlimited Company	100	B18.0-B18.1	Infektsionist, Gastroenteroloo g				kroonilise progresseeruva kuluga B-viirushepatiidi raviks
1734825	tenofoviirdisoproks iil, 245mg	J05AF07	TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Mylan Pharmaceuticals Limited	100	B18.0-B18.1	Gastroenteroloo g, Infektsionist				kroonilise progresseeruva kuluga B-viirushepatiidi raviks
1678541	tenofoviirdisoproks iil+emtritsitabiin, 245mg+200mg	J05AR0 3	EMTRICITABINE/TENO FOVIR DISOPROXIL TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva B.V.	50	Z29.2-Z29.2	Infektsionist, Dermatovenerol oog, uroloogia androloogia lisapädevusega , sünnitusabi ja günekoloogia				kuni kolmeks kuuks kokkupuute-eelseks (PrEP) profülaktiliseks raviks HIV-infektsiooni nakatumise vältimiseks HIV-negatiivsele isikule
					100	Z20.6-Z20.6	Infektsionist				kokkupuute-järgseks (PEP) profülaktiliseks raviks HIV- infektsiooni nakatumise vältimiseks kuni 30-päevaks v.a tööülesannete täitmisega seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega
1760217	tenofoviirdisoproks iil+emtritsitabiin, 245mg+200mg	J05AR0 3	EMTRICITABINE/TENO FOVIR DISOPROXIL ACCORDPHARMA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare B.V.	100	Z20.6-Z20.6	Infektsionist				kokkupuute-järgseks (PEP) profülaktiliseks raviks HIV- infektsiooni nakatumise vältimiseks kuni 30-päevaks v.a tööülesannete täitmisega seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega
					50	Z29.2-Z29.2	sünnitusabi ja günekoloogia, uroloogia androloogia lisapädevusega , Infektsionist, Dermatovenerol oog				kuni kolmeks kuuks kokkupuute-eelseks (PrEP) profülaktiliseks raviks HIV-infektsiooni nakatumise vältimiseks HIV-negatiivsele isikule

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3039836	teofülliin, 200mg	R03DA04	TEOTARD, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 100TK	First Pharma OÜ	50						
					75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			
					75	J45-J45					
1158757	terbinafiin, 250mg	D01BA02	TERBINAFINE SANDOZ 250 MG, tablett, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
1176319	terbinafiin, 250mg	D01BA02	TERBINAFIN ACTAVIS, tablett, 28TK	Teva B.V.	50						
1176353	terbinafiin, 250mg	D01BA02	TERBINAFIN ACTAVIS, tablett, 56TK	Teva B.V.	50						
1681501	terbinafiin, 250mg	D01BA02	TERBINAFIN ACTAVIS, tablett, 28TK	First Pharma OÜ	50						
1873469	terbinafiin, 250mg	D01BA02	LAMISIL, tablett, 14TK	Ideal Trade Links UAB	50						
1882964	terbinafiin, 250mg	D01BA02	TERBINAFINE SANDOZ 250 MG, tablett, 30TK	Lex Ano UAB	50						
1882975	terbinafiin, 250mg	D01BA02	TERBINAFINE SANDOZ 250 MG, tablett, 60TK	Ideal Trade Links UAB	50						
1624092	teriflunomiid, 14mg	L04AK02	AUBAGIO, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Sanofi Winthrop Industrie	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel ägenemiste ja remissioonidega kulgeva hulgiskleroosi raviks
1858013	teriflunomiid, 14mg	L04AK02	TEREBYO, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel ägenemiste ja remissioonidega kulgeva hulgiskleroosi raviks
1858147	teriflunomiid, 14mg	L04AK02	TERIFLUNOMIDE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Teva B.V.	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel ägenemistega kulgeva hulgiskleroosi raviks
1891267	teriflunomiid, 14mg	L04AK02	TERIFLUNOMIDE MYLAN, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Mylan Pharmaceuticals Limited	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel ägenemiste ja remissioonidega kulgeva hulgiskleroosi raviks

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1022623	testosteroon, 250mg 1ml	G03BA0 3	SUSTANON, süstelahus, 1ml 1TK	Aspen Pharma Trading Limited	100	C00-D48	Onkoloog, Hematoloog				
					50						
					100	E29.1-E29.1, E89.5-E89.5, E23-E23, Q98- Q98	Günekoloog, Uroloog – androloog, Endokrinoloog, Pediaater – endokrinoloog				
1169445	testosteroon, 250mg 1ml	G03BA0 3	NEBIDO, süstelahus, 4ml 1TK	Bayer AG	100	E29.1-E29.1, E89.5-E89.5, E23-E23, Q98- Q98	Uroloog – androloog, Pediaater – endokrinoloog, Endokrinoloog, Günekoloog				
					50						
					100	C00-D48	Hematoloog, Onkoloog				
1343898	tetrabensiin, 25mg	N07XX0 6	TETMODIS, tablett, 112TK	AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH	100	G10-G10	Neuroloog	esmane			hüperkineetiliste motorsete häiretega Huntingtoni tõve raviks
1436835	tianeptiin, 12,5mg	N06AX1 4	SALYMBRA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
1436846	tianeptiin, 12,5mg	N06AX1 4	SALYMBRA, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
1506585	tikagreloor, 90mg	B01AC2 4	BRILIQUE, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Astrazeneca AB	50						
					75	Z95-Z95, I21- I22, I25.2-I25.2	Sisearst, Kardioloog	esmane			müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12 kuu vältel
1798375	tikagreloor, 90mg	B01AC2 4	TILOBRASTIL, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	I21-I22, I25.2- I25.2, Z95-Z95	Sisearst, Kardioloog	esmane			müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12 kuu vältel

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1808467	tikagreloor, 90mg	B01AC2 4	ATIXARSO, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	KRKA d.d. Novo mesto	50						
					75	Z95-Z95, I21- I22, I25.2-I25.2	Kardioloog, Sisearst	esmane			müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12 kuu vältel
1038956	timolool, 1mg 1g	S01ED0 1	TIMOSAN, silmageel, 5g 1TK	Santen Oy	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
1252976	timolool+bimatopr ost, 5mg+0,3mg 1ml	S01ED8 2	GANFORT, silmatilgad, lahus, 3ml 1TK	AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
1720134	timolool+bimatopr ost, 5mg+0,3mg 1ml	S01ED8 2	BIMATOPROST/TIMOL OL TEVA, silmatilgad, lahus, 3ml 1TK	Teva B.V.	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
1720145	timolool+bimatopr ost, 5mg+0,3mg 1ml	S01ED8 2	BIMATOPROST/TIMOL OL TEVA, silmatilgad, lahus, 3ml 3TK	Teva B.V.	100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
					50						
1720178	timolool+bimatopr ost, 5mg+0,3mg 1ml	S01ED8 2	BIMATOPROST/TIMOL OL MYLAN, silmatilgad, lahus, 3ml 1TK	Mylan Pharmaceuticals Limited	100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
					50						
1801561	timolool+bimatopr ost, 5mg+0,3mg 1ml	S01ED8 2	BIMATOPROST/TIMOL OL ZENTIVA, silmatilgad, lahus, 3ml 1TK	Zentiva k.s.	100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
					50						
1843084	timolool+bimatopr ost, 5mg+0,3mg 1ml	S01ED8 2	BIMATOPROST/TIMOL OL ELVIM, silmatilgad, lahus, 3ml 1TK	SIA Elvim	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
1392207	timolool+brinsolam iid, 5mg+10mg 1ml	S01ED8 3	AZARGA, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK	Novartis Europharm Limited	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
1759372	timolool+brinsolam iid, 5mg+10mg 1ml	S01ED8 3	BRINZOLAMIDE/TIMOL OL STADA, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK	Stada Arzneimittel AG	100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
					50						
1799208	timolool+brinsolam iid, 5mg+10mg 1ml	S01ED8 3	BRINZOLAMIDE/TIMOL OL ACCORD, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			



Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1860645	timolool+brinsolamiid, 5mg+10mg 1ml	S01ED83	BRINZOLAMIDE/TIMOLOL ZENTIVA, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK	Zentiva k.s.	100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
					50						
1039799	timolool+dorsolamiid, 5mg+20mg 1ml	S01ED80	COSOPT, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK	Santen Oy	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
1420243	timolool+dorsolamiid, 5mg+20mg 1ml	S01ED80	DORZOLAMIDE/TIMOLOL ELVIM, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK	SIA Elvim	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
1755503	timolool+dorsolamiid, 5mg+20mg 1ml	S01ED80	VIZIDOR DUO, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK	Bausch + Lomb Ireland Limited	100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
					50						
1088254	timolool+latanoprost, 5mg+50mcg 1ml	S01ED84	XALACOM, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK	Upjohn EESV	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
1445161	timolool+latanoprost, 5mg+50mcg 1ml	S01ED84	LATIRA, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK	Ratiopharm GmbH	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
1445172	timolool+latanoprost, 5mg+50mcg 1ml	S01ED84	LATIRA, silmatilgad, lahus, 2.5ml 3TK	Ratiopharm GmbH	100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
					50						
1791255	timolool+latanoprost, 5mg+50mcg 1ml	S01ED84	LATANOPROST/TIMOLOL ELVIM, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK	SIA Elvim	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
1618141	timolool+tafluprost, 5mg+15mcg 1ml	S01ED85	TAPTIQOM, silmatilgad, lahus üheannuselises konteineris, 0.3ml 30TK	Santen Oy	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			kui ravi jätkamine teiste glaukoomiravimitega on meditsiiniliselt vastunäidustatud bensalkooniumkloriidile tekkinud tõendatud ülitundlikkuse või olulise toksilise toime tõttu silma eesmisele osale ning monoteeraapia säilitusaine vaba prostaglandiini analoogiga ei ole langetanud piisavalt silma siserõhku

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1792289	timolool+tafluprost, 5mg+15mcg 1ml	S01ED8 5	TAPTIQOM SINE, silmatilgad, lahus, 7ml 1TK	Santen Oy	100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			kui ravi jätkamine teiste glaukoomiravimitega on meditsiiniliselt vastunäidustatud bensalkooniumkloriidile tekkinud tõendatud ülitundlikkuse või olulise toksilise toime tõttu silma eesmisele osale ning monoteeraapia säilitusaine vaba prostaglandiini analoogiga ei ole langetanud piisavalt silma siserõhku
					50						
1243763	timolool+travopros t, 5mg+40mcg 1ml	S01ED8 1	DUOTRAV, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK	Novartis Europharm Limited	100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
					50						
1716656	timolool+travopros t, 5mg+40mcg 1ml	S01ED8 1	TRAVOPROST/TIMOLO L MYLAN, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK	Mylan Pharmaceuticals Limited	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
1832453	timolool+travopros t, 5mg+40mcg 1ml	S01ED8 1	TRAVOPROST/TIMOLO L ELVIM, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK	SIA Elvim	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
1004375	tioguaniiin, 40mg	L01BB0 3	LANVIS, tablett, 25TK	Aspen Pharma Trading Limited	50						
1111341	tiokthape, 600mg	A16AX0 1	THIOCTACID HR, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Meda Pharma GmbH & Co. KG	50						
1303276	tiokthape, 600mg	A16AX0 1	THIOGAMMA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Woerwag Pharma GmbH & Co. KG	50						
1511301	tiotroopium, 2,5mcg 1annus	R03BB0 4	SPIRIVA RESPIMAT, inhalatsioonilahus, 60annus 1TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			
					50						
1173822	tisanidiin, 2mg	M03BX0 2	SIRDALUD, tablett, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	G82-G82, G81- G81					
1839191	tisanidiin, 2mg	M03BX0 2	SIRDALUD, tablett, 30TK	Lex Ano UAB	50						
					75	G82-G82, G81- G81					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1865550	tisanidiin, 2mg	M03BX0 2	SIRDALUD, tablett, 30TK	Ideal Trade Links UAB	50						
					75	G82-G82, G81- G81					
1894282	tisanidiin, 2mg	M03BX0 2	SIRDALUD, tablett, 30TK	Ideal Trade Links UAB	50						
					75	G81-G81, G82- G82					
1211599	tisanidiin, 4mg	M03BX0 2	SIRDALUD, tablett, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	G82-G82, G81- G81					
1854952	tisanidiin, 4mg	M03BX0 2	SIRDALUD, tablett, 30TK	Ideal Trade Links UAB	75	G81-G81, G82- G82					
					50						
1894305	tisanidiin, 4mg	M03BX0 2	SIRDALUD, tablett, 30TK	Ideal Trade Links UAB	75	G82-G82, G81- G81					
					50						
1553880	tobramütsiin, 28mg	J01GB0 1	TOBI PODHALER, inhalatsioonipulber kõvakapslis, 224TK	VIATRIS HEALTHCARE Limited	100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater				Pseudomonas aeruginosa põhjustatud kroonilise kopsuinfektsiooni supressiivseks raviks tsüstilise fibroosiga patsientidel
1646827	tobramütsiin, 300mg 5ml	J01GB0 1	TOBRAMYCIN VIA PHARMA, nebuliseeritav lahus, 56TK	Via Pharma UAB	100	E84-E84	Pediaater, Pulmonoloog				Pseudomonas aeruginosa põhjustatud kroonilise kopsuinfektsiooni supressiivseks raviks tsüstilise fibroosiga patsientidel
1012543	tobramütsiin, 3mg 1g	S01AA1 2	TOBREX, silmasalv, 3.5g 1TK	Novartis Baltics SIA	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1809075	tofatsitiniib, 11mg	L04AF01	XELJANZ, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	M45-M46, M07.0-M07.3	Pediaater, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud
					100	M05-M06, M08- M08	Reumatoloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt kahe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud
					100	K51-K51	Gastroenteroloog, Pediaater, Pediaater – gastroenteroloog				ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt kahe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1859991	tofatsitiniib, 1mg 1ml	L04AF01	XELJANZ, suukaudne lahus, 240ml 1TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	M08-M08, M05- M06	Pediaater, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt kahe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud
					100	M07.0-M07.3, M45-M46	Reumatoloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud
					100	K51-K51	Gastroenteroloog, Pediaater, Pediaater – gastroenteroloog				ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt kahe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1742497	tofatsitiniib, 5mg	L04AF01	XELJANZ, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	M08-M08, M05- M06	Reumatoloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt kahe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud
					100	M07.0-M07.3, M45-M46	Reumatoloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF- alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud
					100	K51-K51	Gastroenteroloog, Pediaater – gastroenteroloog , Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt kahe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud
7000119	toitained ilma fenüülalaniinita,		PHLEXY-10 DRINK MIX , pulber, 20g N30	SHS International	50						
					100	E70.0-E70.1					
7000131	toitained ilma fenüülalaniinita,		XP MAXAMAID (ORANGE FLAVOURED) pulber, pulber, 500g N4	SHS International	50						
					100	E70.0-E70.1					
7000142	toitained ilma fenüülalaniinita,		XP MAXAMAID (UNFLAVOURED) pulber, pulber, 500g N4	SHS International	100	E70.0-E70.1					
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
7000153	toitained ilma fenüülalaniinita,		XP MAXAMUM (ORANGE FLAVOURED) pulber, pulber, 500g N4	SHS International	50						
					100	E70.0-E70.1					
7000164	toitained ilma fenüülalaniinita,		XP MAXAMUM (UNFLAVOURED) pulber, pulber, 500g N4	SHS International	50						
					100	E70.0-E70.1					
7000186	toitained ilma fenüülalaniinita,		DUOCAL Supersoluble , pulber, 400 g	SHS	100	E70.0-E70.1					
					50						
7002504	toitained ilma fenüülalaniinita,		PKU-EXPRESS, pulber, 25g N30	Vitaflo International Ltd.	100	E70.0-E70.1					
7002515	toitained ilma fenüülalaniinita,		PKU-GEL, pulber, 20g N30	Vitaflo International Ltd.	100	E70.0-E70.1					
7002896	toitained ilma fenüülalaniinita,		PKU ANAMIX INFANT, pulber, 400g	SHS International Ltd	100	E70.1-E70.1, E70.0-E70.0					
7015755	toitained ilma fenüülalaniinita,		PKU Lophlex LQ Juicy berries 10, suukaudne lahus, 62,5ml N60	SHS International Ltd	100	E70.0-E70.1					
7004922	toitained ilma fenüülalaniinita,		PKU Squeezie, suukaudne pasta, 85 g manustamisvalmis toitainesegu kotikeses, ühes karbis on 30 kotikest (2550 g)	Vitaflo International Ltd.	100	E70.0-E70.1					
7017577	toitained ilma fenüülalaniinita,		COMIDA PKU A Formula, pulber, 400g N1	Vitaflo International Ltd.	100	E70.1-E70.1, E70.0-E70.0					
7017588	toitained ilma fenüülalaniinita,		COMIDA PKU B Formula, pulber, 500g N1	Vitaflo International Ltd.	100	E70.1-E70.1, E70.0-E70.0					
7017982	toitained ilma fenüülalaniinita,		Milupa PKU 2-mix , pulber, 400g x 2	Nutricia Cuijk bv	100	E70.0-E70.0, E70.1-E70.1					
7017599	toitained ilma fenüülalaniinita,		COMIDA PKU B Formula Orange, pulber, 500g N1	Vitaflo International Ltd.	100	E70.1-E70.1, E70.0-E70.0					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
7015777	toitained ilma fenüülalaniinita,		PKU Lophlex LQ Juicy tropical 10, suukaudne lahus, 62,5ml N60	SHS International Ltd	100	E70.0-E70.1					
7015744	toitained ilma fenüülalaniinita,		PKU Lophlex LQ Juicy berries 20, suukaudne lahus, 125ml N30	SHS International Ltd	100	E70.0-E70.1					
7015766	toitained ilma fenüülalaniinita,		PKU Lophlex LQ Juicy tropical 20, suukaudne lahus, 125ml N30	SHS International Ltd	100	E70.0-E70.1					
1371248	tokofersolaan, 50mg 1ml	A11HA0 8	VEDROP, suukaudne lahus, 60ml 1TK	Recordati Rare Diseases	100	E84-E84, Q44- Q44	Pediaater			19,00	raske kroonilise kolestaasi raviks kuni 18-aastastele patsientidele konsiiliumi (vähemalt kahe pediaatri ühise) otsuse alusel
1430086	tokofersolaan, 50mg 1ml	A11HA0 8	VEDROP, suukaudne lahus, 20ml 1TK	Recordati Rare Diseases	100	E84-E84, Q44- Q44	Pediaater			19,00	raske kroonilise kolestaasi raviks kuni 18-aastastele patsientidele konsiiliumi (vähemalt kahe pediaatri ühise) otsuse alusel
1284498	tolterodiin, 2mg	G04BD0 7	UROFLOW 2 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Zentiva k.s.	50						
1795877	tolterodiin, 2mg	G04BD0 7	UROFLOW 2 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	First Pharma OÜ	50						
1503762	tolterodiin, 4mg	G04BD0 7	UROFLOW 4MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 28TK	Zentiva k.s.	50						
1076778	topiramaat, 100mg	N03AX1 1	TOPAMAX, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Johnson & Johnson UAB	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					75	G43-G43					
					50						
1309878	topiramaat, 100mg	N03AX1 1	TOPIRAMATE ORION, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Orion Corporation	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					75	G43-G43					



Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1456488	topiramaat, 100mg	N03AX1 1	TOPIRAMATE ELVIM, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	SIA Elvim	75	G43-G43					
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50						
1076846	topiramaat, 200mg	N03AX1 1	TOPAMAX, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Johnson & Johnson UAB	50						
					75	G43-G43					
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
1076688	topiramaat, 25mg	N03AX1 1	TOPAMAX, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Johnson & Johnson UAB	75	G43-G43					
					50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
1309812	topiramaat, 25mg	N03AX1 1	TOPIRAMATE ORION, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Orion Corporation	50						
					75	G43-G43					
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
1456444	topiramaat, 25mg	N03AX1 1	TOPIRAMATE ELVIM, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	SIA Elvim	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					75	G43-G43					
1076734	topiramaat, 50mg	N03AX1 1	TOPAMAX, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Johnson & Johnson UAB	75	G43-G43					
					50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
1309834	topiramaat, 50mg	N03AX1 1	TOPIRAMATE ORION, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Orion Corporation	50						
					75	G43-G43					
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
1456466	topiramaat, 50mg	N03AX1 1	TOPIRAMATE ELVIM, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	SIA Elvim	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					75	G43-G43					
1158050	torasemiid, 100mg	C03CA0 4	TORASEMIDE HEXAL 100 MG, tablett, 30TK	Hexal AG	50						
1771332	torasemiid, 100mg	C03CA0 4	TORASEMIDE HEXAL 100 MG, tablett, 30TK	First Pharma OÜ	50						
1843769	torasemiid, 100mg	C03CA0 4	TORASEMIDE HEXAL 100 MG, tablett, 30TK	Lex Ano UAB	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1852512	torasemiid, 100mg	C03CA04	TORASEMIDE HEXAL 100 MG, tablett, 30TK	Ideal Trade Links UAB	50						
1032332	torasemiid, 10mg	C03CA04	TRIFAS 10 MG, tablett, 30TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	50						
1166015	torasemiid, 10mg	C03CA04	TORASEMIDE TEVA, tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	50						
1422717	torasemiid, 10mg	C03CA04	TORASEMIDE HEXAL, tablett, 30TK	Hexal AG	50						
1770892	torasemiid, 10mg	C03CA04	TORASEMIDE HEXAL, tablett, 30TK	First Pharma OÜ	50						
1770904	torasemiid, 10mg	C03CA04	TORASEMIDE HEXAL, tablett, 50TK	First Pharma OÜ	50						
1866461	torasemiid, 10mg	C03CA04	TORASEMIDE HEXAL, tablett, 30TK	Lex Ano UAB	50						
1873852	torasemiid, 10mg	C03CA04	TRIFAS 10 MG, tablett, 60TK	Ideal Trade Links UAB	50						
1888454	torasemiid, 10mg	C03CA04	TRIFAS 10 MG, tablett, 30TK	Lex Ano UAB	50						
3002511	torasemiid, 10mg	C03CA04	TORASEMIDE ZENTIVA, tablett, 30TK	Zentiva k.s.	50						
1032321	torasemiid, 200mg	C03CA04	TRIFAS 200 MG, tablett, 30TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	50						
1158106	torasemiid, 200mg	C03CA04	TORASEMIDE HEXAL 200 MG, tablett, 30TK	Hexal AG	50						
1854985	torasemiid, 200mg	C03CA04	TORASEMIDE HEXAL 200 MG, tablett, 30TK	Ideal Trade Links UAB	50						
1861927	torasemiid, 200mg	C03CA04	TORASEMIDE HEXAL 200 MG, tablett, 30TK	First Pharma OÜ	50						
1165957	torasemiid, 5mg	C03CA04	TORASEMIDE TEVA, tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1043525	tramadool, 100mg	N02AX02	TRAMADOL KRKA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	KRKA d.d. Novo mesto	50						
1075665	tramadool, 100mg	N02AX02	TRAMADOL LANNACHER 100 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	G.L. Pharma GmbH	50						
1174621	tramadool, 100mg	N02AX02	MABRON RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Medochemie Ltd	50						
1085857	tramadool, 150mg	N02AX02	TRAMADOL LANNACHER 150MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	G.L. Pharma GmbH	50						
1174632	tramadool, 150mg	N02AX02	MABRON RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Medochemie Ltd	50						
1759743	tramadool, 150mg	N02AX02	OLTERON, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	KRKA d.d. Novo mesto	50						
1085879	tramadool, 200mg	N02AX02	TRAMADOL LANNACHER 200 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	G.L. Pharma GmbH	50						
1174643	tramadool, 200mg	N02AX02	MABRON RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Medochemie Ltd	50						
1759822	tramadool, 200mg	N02AX02	OLTERON, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	KRKA d.d. Novo mesto	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1015580	tramadool, 50mg	N02AX02	TRAMADOL KRKA, kõvakapsel, 20TK	KRKA d.d. Novo mesto	50						
1032679	tramadool, 50mg	N02AX02	TRAMADOL LANNACHER, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	G.L. Pharma GmbH	50						
1656952	trametiniib, 0,5mg	L01EE01	MEKINIST, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Novartis Europharm Limited	100	C43-C43	Onkoloog				konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) otsuse alusel BRAF V600 mutatsiooniga kauglearenenud mitteresetseeritava või metastaatilise (IIIc-IV st) melanoomi raviks juhul, kui patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1 ja 3-kuulise intervalliga hinnatuna püsib haigus vähemalt stabiilsena (KT- või/ja muu asjakohase uuringu alusel hinnatuna haiguse progressiooni ei esine)
1656985	trametiniib, 2mg	L01EE01	MEKINIST, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Novartis Europharm Limited	100	C43-C43	Onkoloog				konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) otsuse alusel BRAF V600 mutatsiooniga kauglearenenud mitteresetseeritava või metastaatilise (IIIc-IV st) melanoomi raviks juhul, kui patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1 ja 3-kuulise intervalliga hinnatuna püsib haigus vähemalt stabiilsena (KT- või/ja muu asjakohase uuringu alusel hinnatuna haiguse progressiooni ei esine)
1074765	trandolapriil, 2mg	C09AA10	GOPTEN, kõvakapsel, 28TK	Viatris SIA	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1327520	trandolapriil, 4mg	C09AA10	GOPTEN, kõvakapsel, 28TK	Viatris SIA	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1233290	trandolapriil+verapamiil, 2mg+180mg	C09BB10	TARKA, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 28TK	Viatris SIA	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1377660	trandolapriil+verapamiil, 4mg+240mg	C09BB10	TARKA, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 28TK	Viatris SIA	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1083316	traneksaamhape, 500mg	B02AA02	CYKLOKAPRON, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	Meda AB	50						
1130454	travoprost, 40mcg 1ml	S01EE04	TRAVATAN, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK	Novartis Europharm Limited	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1608027	travoprost, 40mcg 1ml	S01EE0 4	TRAVOPROST ZENTIVA, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK	Zentiva k.s.	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
1798050	travoprost, 40mcg 1ml	S01EE0 4	TRAVOPROST ELVIM, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK	SIA Elvim	100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
					50						
1799433	travoprost, 40mcg 1ml	S01EE0 4	VIZITRAV, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK	Bausch + Lomb Ireland Limited	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
1815634	treprostiniil, 10mg 1ml	B01AC2 1	TREPULMIX, infusioonilahus, 10ml 1TK	Scipharm S.a.r.l.	100	I27.0-I27.0	Kardioloog, Pediaater, Pulmonoloog, Reumatoloog				konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel kroonilise trombemboolilise pulmonaalhüpertensiooniga patsiendile, kellel kirurgiline ravi ei ole teostatav või kellel haigus kirurgilise ravi järel püsib või taastekib ning kelle seisund vastab NYHA III-IV funktsionaalsele klassile
1186040	treprostiniil, 1mg 1ml	B01AC2 1	REMODULIN, infusioonilahus, 20ml 1TK	Ferrer Internacional S.A.	100	I27.0-I27.0	Kardioloog, Pediaater, Pulmonoloog				NYHA III või IV kl idiopaatilise või päriliku pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel patsiendile, kellel muud ravivõimalused on ebapiisavad või ravimvormi tõttu sobimatud
1815601	treprostiniil, 1mg 1ml	B01AC2 1	TREPULMIX, infusioonilahus, 10ml 1TK	Scipharm S.a.r.l.	100	I27.0-I27.0	Kardioloog, Pulmonoloog, Pediaater, Reumatoloog				konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel kroonilise trombemboolilise pulmonaalhüpertensiooniga patsiendile, kellel kirurgiline ravi ei ole teostatav või kellel haigus kirurgilise ravi järel püsib või taastekib ning kelle seisund vastab NYHA III-IV funktsionaalsele klassile
1186062	treprostiniil, 2,5mg 1ml	B01AC2 1	REMODULIN, infusioonilahus, 20ml 1TK	Ferrer Internacional S.A.	100	I27.0-I27.0	Pulmonoloog, Pediaater, Kardioloog				NYHA III või IV kl idiopaatilise või päriliku pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel patsiendile, kellel muud ravivõimalused on ebapiisavad või ravimvormi tõttu sobimatud
1815612	treprostiniil, 2,5mg 1ml	B01AC2 1	TREPULMIX, infusioonilahus, 10ml 1TK	Scipharm S.a.r.l.	100	I27.0-I27.0	Reumatoloog, Pediaater, Pulmonoloog, Kardioloog				konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel kroonilise trombemboolilise pulmonaalhüpertensiooniga patsiendile, kellel kirurgiline ravi ei ole teostatav või kellel haigus kirurgilise ravi järel püsib või taastekib ning kelle seisund vastab NYHA III-IV funktsionaalsele klassile

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1186073	treprostiniil, 5mg 1ml	B01AC2 1	REMODULIN, infusioonilahus, 20ml 1TK	Ferrer Internacional S.A.	100	I27.0-I27.0	Kardioloog, Pulmonoloog, Pediaater				NYHA III või IV kl idiopaatilise või päriliku pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel patsiendile, kellel muud ravivõimalused on ebapiisavad või ravimvormi tõttu sobimatud
1815623	treprostiniil, 5mg 1ml	B01AC2 1	TREPULMIX, infusioonilahus, 10ml 1TK	Scipharm S.a.r.l.	100	I27.0-I27.0	Kardioloog, Pediaater, Reumatoloog, Pulmonoloog				konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel kroonilise trombemboolilise pulmonaalhüpertensiooniga patsiendile, kellel kirurgiline ravi ei ole teostatav või kellel haigus kirurgilise ravi järel püsib või taastekib ning kelle seisund vastab NYHA III-IV funktsionaalsele klassile
1008425	triamtsinoloon, 40mg 1ml	H02AB0 8	KENALOG, süstesuspensioon, 1ml 5TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
1716319	trifluridiin+tipiratsiil , 15mg+6,14mg	L01BC8 3	LONSURF, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	Les Laboratoires Servier	100	C18-C20	Onkoloog				III ravireas kuni haiguse progressioonini metastaatilise kolorektaalvähiga täiskasvanud patsientidele, keda on eelnevalt ravitud olemasolevate ravimeetoditega sealhulgas fluoropürimidiini, oksaliplatiini ja irinotekaani põhiste kemoteraapiatega, anti-VEGF raviga või kellele need ravimeetodid on vastunäidustatud või osutunud talumatuks
1716331	trifluridiin+tipiratsiil , 15mg+6,14mg	L01BC8 3	LONSURF, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Les Laboratoires Servier	100	C18-C20	Onkoloog				III ravireas kuni haiguse progressioonini metastaatilise kolorektaalvähiga täiskasvanud patsientidele, keda on eelnevalt ravitud olemasolevate ravimeetoditega sealhulgas fluoropürimidiini, oksaliplatiini ja irinotekaani põhiste kemoteraapiatega, anti-VEGF raviga või kellele need ravimeetodid on vastunäidustatud või osutunud talumatuks
1716342	trifluridiin+tipiratsiil , 20mg+8,19mg	L01BC8 3	LONSURF, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	Les Laboratoires Servier	100	C18-C20	Onkoloog				III ravireas kuni haiguse progressioonini metastaatilise kolorektaalvähiga täiskasvanud patsientidele, keda on eelnevalt ravitud olemasolevate ravimeetoditega sealhulgas fluoropürimidiini, oksaliplatiini ja irinotekaani põhiste kemoteraapiatega, anti-VEGF raviga või kellele need ravimeetodid on vastunäidustatud või osutunud talumatuks

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1716364	trifluridiin+tipiratsiil , 20mg+8,19mg	L01BC8 3	LONSURF, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Les Laboratoires Servier	100	C18-C20	Onkoloog				III ravireas kuni haiguse progressioonini metastaatilise kolorektaalvähiga täiskasvanud patsientidele, keda on eelnevalt ravitud olemasolevate ravimeetoditega sealhulgas fluoropürimidiini, oksaliplatiini ja irinotekaanipõhiste kemoteraapiatega, anti-VEGF raviga või kellele need ravimeetodid on vastunäidustatud või osutunud talumatuks
1014422	triheksüfenidüül, 2mg	N04AA0 1	CYCLODOL, tablett, 50TK	Grindeks AS	50						
1109641	trimetasidiin, 35mg	C01EB1 5	PREDUCTAL MR, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 60TK	Les Laboratoires Servier	50						
1293162	trimetasidiin, 35mg	C01EB1 5	TRIMETAZIDINE TEVA 35MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	Teva Pharma B.V.	50						
1401411	trimetasidiin, 35mg	C01EB1 5	TRIMETAZIDINE RIVOPHARM, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 60TK	Rivopharm Limited	50						
1016312	trimetoprim, 100mg	J01EA01	TRIMETOP 100MG, tablett, 30TK	Vitabalans Oy	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1400421	triptoreliin, 11,25mg	L02AE0 4	DIPHERELINE 11,25 MG, toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahusti, 1TK	Ipsen Pharma	100	C61-C61	Uroloog, Onkoloog				lokaalse või lokaalselt levinud kõrge riskiga (kliiniline staadium >=T2c või Gleasoni skoor 8-10 või PSA >=20 ng/ml või regionaalsete lümfisõlmede haaratus või positiivne resektsioonipiir) multimodaalse ravi osana kuni 2 aasta vältel ning metastaseerunud eesnäärmevähiga patsientidele
					75	N80-N80	Günekoloog				III-IV astme endometrioosi põdevatele patsientidele
					50						
					75	E22.8-E22.8	Pediaater, Pediaater – endokrinoloog, Endokrinoloog				
					75	D25-D25	Günekoloog	esmane			mõõdukate kuni raskete sümptomitega patsientidele, kellel esmavaliku ravimid (traneksaanhape, hormonaalsed kontratseptiivid, emakasisesed rasestumisvastased vahendid) on ebaefektiivsed või talumatud.
					100	N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks



Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1822968	triptoreliin, 11,25mg	L02AE0 4	DIPHERELINE 11,25 MG, toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahusti, 1TK	First Pharma OÜ	100	N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks
					50						
					100	C61-C61	Uroloog, Onkoloog				lokaalse või lokaalselt levinud kõrge riskiga (kliiniline staadium >=T2c või Gleasoni skoor 8-10 või PSA >=20 ng/ml või regionaalsete lümfisõlmede haaratus või positiivne resektsioonipiir) multimodaalse ravi osana kuni 2 aasta vältel ning metastaseerunud eesnäärmevähiga patsientidele
					75	D25-D25	Günekoloog	esmane			mõõdukate kuni raskete sümptomitega patsientidele, kellel esmavaliku ravimid (traneksaamhape, hormonaalsed kontratseptiivid, emakasisesed rasestumisvastased vahendid) on ebaefektiivsed või talumatud.
					75	N80-N80	Günekoloog				III-IV astme endometrioosi põdevatele patsientidele
					75	E22.8-E22.8	Pediaater – endokrinoloog, Endokrinoloog, Pediaater				

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1818604	triptoreliin, 22,5mg	L02AE04	DIPHERELINE 22,5 MG, toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahusti, 1TK	Ipsen Pharma	100	C61-C61	Uroloog, Onkoloog				lokaalse või lokaalselt levinud kõrge riskiga (kliiniline staadium >=T2c või Gleasoni skoor 8-10 või PSA >=20 ng/ml või regionaalsete lümfisõlmede haaratus või positiivne resektsioonipiir) multimodaalse ravi osana kuni 2 aasta vältel ning metastaseerunud eesnäärmevähiga patsientidele
					75	E22.8-E22.8	Pediaater – endokrinoloog, Pediaater, Endokrinoloog				
					75	N80-N80	Günekoloog				III-IV astme endometrioosi põdevatele patsientidele
					50						
					100	N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks
					75	D25-D25	Günekoloog	esmane			mõõdukate kuni raskete sümptomitega patsientidele, kellel esmavaliku ravimid (traneksaanhape, hormonaalsed kontratseptiivid, emakasisesed rasestumisvastased vahendid) on ebaefektiivsed või talumatud.

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1040397	triptoreliin, 3,75mg	L02AE04	DIPHERELINE 3,75 MG, toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahusti, 1TK	Ipsen Pharma	75	E22.8-E22.8	Pediaater, Pediaater – endokrinoloog, Endokrinoloog				
					100	C61-C61	Uroloog, Onkoloog				lokaalse või lokaalselt levinud kõrge riskiga (kliiniline staadium >=T2c või Gleasoni skoor 8-10 või PSA >=20 ng/ml või regionaalsete lümfisõlmede haaratus või positiivne resektsioonipiir) multimodaalse ravi osana kuni 2 aasta vältel ning metastaseerunud eesnäärmevähiga patsientidele
					75	N80-N80	Günekoloog				III-IV astme endometrioosi põdevatele patsientidele
					75	D25-D25	Günekoloog	esmane			mõõdukate kuni raskete sümptomitega patsientidele, kellel esmavaliku ravimid (traneksaamhape, hormonaalsed kontratseptiivid, emakasisesed rasestumisvastased vahendid) on ebaefektiivsed või talumatud.
					50						
					100	N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks
1090189	trospiumkloriid, 15mg	G04BD09	SPASMED 15, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Pro.Med.Cs Praha a.s.	50						
1025064	tsefadroksiil, 1g	J01DB05	DURACEF, lahustuv tablett, 10TK	Bausch Health Ireland Limited	50						
1027134	tsefadroksiil, 500mg	J01DB05	DURACEF, kõvakapsel, 12TK	Bausch Health Ireland Limited	50						
1067318	tsefadroksiil, 50mg 1ml	J01DB05	DURACEF, suukaudse suspensiooni pulber, 100ml 1TK	Bausch Health Ireland Limited	50						
3030466	tsefadroksiil, 50mg 1ml	J01DB05	DURACEF, suukaudse suspensiooni pulber, 60ml 1TK	Ideal Trade Links UAB	50						
1068320	tsefprosiil, 250mg	J01DC10	CEFZIL, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Bausch Health Ireland Limited	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1068375	tsefprosiil, 500mg	J01DC1 0	CEFZIL, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Bausch Health Ireland Limited	50						
1028506	tsefprosiil, 50mg 1ml	J01DC1 0	CEFZIL, suukaudse suspensiooni pulber, 60ml 1TK	Bausch Health Ireland Limited	50						
1007110	tsefuroksiim, 250mg	J01DC0 2	ZINNAT, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
1438387	tsefuroksiim, 250mg	J01DC0 2	AXETINE, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Medochemie Limited	50						
1659922	tsefuroksiim, 250mg	J01DC0 2	FUROCEF, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	KRKA d.d. Novo mesto	50						
1841307	tsefuroksiim, 250mg	J01DC0 2	ZINNAT, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Ideal Trade Links UAB	50						
1137350	tsefuroksiim, 25mg 1ml	J01DC0 2	ZINNAT, suukaudse suspensiooni graanulid, 100ml 1TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
1007143	tsefuroksiim, 500mg	J01DC0 2	ZINNAT, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
1287840	tsefuroksiim, 500mg	J01DC0 2	ZINNAT, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
1438398	tsefuroksiim, 500mg	J01DC0 2	AXETINE, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Medochemie Limited	50						
1580947	tsefuroksiim, 500mg	J01DC0 2	AXETINE, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Medochemie Limited	50						
1659988	tsefuroksiim, 500mg	J01DC0 2	FUROCEF, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	KRKA d.d. Novo mesto	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1660003	tsefuroksiim, 500mg	J01DC0 2	FUROCEF, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	KRKA d.d. Novo mesto	50						
1841318	tsefuroksiim, 500mg	J01DC0 2	ZINNAT, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Ideal Trade Links UAB	50						
1862827	tsefuroksiim, 500mg	J01DC0 2	ZINNAT, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Lex Ano UAB	50						
3048117	tsefuroksiim, 500mg	J01DC0 2	ZINNAT, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Lex Ano UAB	50						
1073641	tselekoksiib, 100mg	M01AH0 1	CELEBREX, kõvakapsel, 20TK	Upjohn EESV	50						
1596719	tselekoksiib, 100mg	M01AH0 1	ACLEXA, kõvakapsel, 30TK	KRKA d.d. Novo mesto	50						
1819335	tselekoksiib, 100mg	M01AH0 1	CELECOXIB ACCORD, kõvakapsel, 30TK	Accord Healthcare B.V.	50						
1596797	tselekoksiib, 200mg	M01AH0 1	ACLEXA, kõvakapsel, 30TK	KRKA d.d. Novo mesto	50						
1815443	tselekoksiib, 200mg	M01AH0 1	ACLEXA, kõvakapsel, 30TK	First Pharma OÜ	50						
1819425	tselekoksiib, 200mg	M01AH0 1	CELECOXIB ACCORD, kõvakapsel, 30TK	Accord Healthcare B.V.	50						
1861365	tselekoksiib, 200mg	M01AH0 1	ACLEXA, kõvakapsel, 30TK	Ideal Trade Links UAB	50						
1684560	tsetiriniib, 150mg	L01ED0 2	ZYKADIA, kõvakapsel, 150TK	Novartis Europharm Limited	100	C34-C34	Onkoloog				anaplastilise lümfoomkineaaspositiivse kauglearenenud varem ravimata mitteväikerakk-kopsuvähi raviks heas üldseisundis (ECOG 0-2) täiskasvanud patsientidele
1077836	tsetirisiin, 10mg	R06AE0 7	ZYRTEC, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	UCB Pharma Oy Finland	50						
1098918	tsetirisiin, 10mg	R06AE0 7	CETIRIZIN ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva B.V.	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1430750	tsetirisiin, 10mg	R06AE07	CETRIX 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Vitabalans Oy	50						
1430772	tsetirisiin, 10mg	R06AE07	CETRIX 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Vitabalans Oy	50						
1828537	tsetirisiin, 10mg	R06AE07	ZYRTEC, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Lex Ano UAB	50						
1022869	tsetirisiin, 10mg 1ml	R06AE07	ZYRTEC, suukaudsed tilgad, lahus, 20ml 1TK	UCB Pharma Oy Finland	50						
1826580	tsetirisiin, 10mg 1ml	R06AE07	ZYRTEC, suukaudsed tilgad, lahus, 20ml 1TK	Lex Ano UAB	50						
1895799	tsetirisiin, 10mg 1ml	R06AE07	ZYRTEC, suukaudsed tilgad, lahus, 20ml 1TK	Ideal Trade Links UAB	50						
1043356	tsetroreliks, 0,25mg	H01CC02	CETROTIDE, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Merck Europe B.V.	100	N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks
					50						
1667370	tsinakaltseet, 30mg	H05BX01	CINACALCET TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Teva B.V.	50						
					100	N18-N18	Nefroloog, Pediaater				hemo- või peritoneaaldialüüsil olevatele patsientidele, kelle ravi vitamiin D analoogidega on ebaõnnestunud (seerumi parathormooni taseme eesmärgväärtust <=300 pg/ml ei saavutata) või kellele on vitamiin D analoogid vastunäidustatud
1667538	tsinakaltseet, 30mg	H05BX01	CINACALCET ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	100	N18-N18	Nefroloog, Pediaater				hemo- või peritoneaaldialüüsil olevatele patsientidele, kelle ravi vitamiin D analoogidega on ebaõnnestunud (seerumi parathormooni taseme eesmärgväärtust <=300 pg/ml ei saavutata) või kellele on vitamiin D analoogid vastunäidustatud
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1815656	tsinakaltseet, 30mg	H05BX0 1	CINACALCET ACCORDPHARMA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare S.L.U.	50						
					100	N18-N18	Pediaater, Nefroloog				hemo- või peritoneaaldialüüsil olevatele patsientidele, kelle ravi vitamiin D analoogidega on ebaõnnestunud (seerumi parathormooni taseme eesmärgväärtust <=300 pg/ml ei saavutata) või kellele on vitamiin D analoogid vastunäidustatud
1667572	tsinakaltseet, 60mg	H05BX0 1	CINACALCET ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					100	N18-N18	Nefroloog, Pediaater				hemo- või peritoneaaldialüüsil olevatele patsientidele, kelle ravi vitamiin D analoogidega on ebaõnnestunud (seerumi parathormooni taseme eesmärgväärtust <=300 pg/ml ei saavutata) või kellele on vitamiin D analoogid vastunäidustatud
1815689	tsinakaltseet, 60mg	H05BX0 1	CINACALCET ACCORDPHARMA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare S.L.U.	50						
					100	N18-N18	Pediaater, Nefroloog				hemo- või peritoneaaldialüüsil olevatele patsientidele, kelle ravi vitamiin D analoogidega on ebaõnnestunud (seerumi parathormooni taseme eesmärgväärtust <=300 pg/ml ei saavutata) või kellele on vitamiin D analoogid vastunäidustatud
1667606	tsinakaltseet, 90mg	H05BX0 1	CINACALCET ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					100	N18-N18	Pediaater, Nefroloog				hemo- või peritoneaaldialüüsil olevatele patsientidele, kelle ravi vitamiin D analoogidega on ebaõnnestunud (seerumi parathormooni taseme eesmärgväärtust <=300 pg/ml ei saavutata) või kellele on vitamiin D analoogid vastunäidustatud
1815713	tsinakaltseet, 90mg	H05BX0 1	CINACALCET ACCORDPHARMA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare S.L.U.	50						
					100	N18-N18	Pediaater, Nefroloog				hemo- või peritoneaaldialüüsil olevatele patsientidele, kelle ravi vitamiin D analoogidega on ebaõnnestunud (seerumi parathormooni taseme eesmärgväärtust <=300 pg/ml ei saavutata) või kellele on vitamiin D analoogid vastunäidustatud
1196388	tsink, 25mg	A16AX0 5	WILZIN, kõvakapsel, 250TK	Recordati Rare Diseases	100	E83.0-E83.0	Gastroenteroloo g, Neuroloog	esmane			
1196377	tsink, 50mg	A16AX0 5	WILZIN, kõvakapsel, 250TK	Recordati Rare Diseases	100	E83.0-E83.0	Gastroenteroloo g, Neuroloog	esmane			

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1005488	tsiprofloksatsiin, 250mg	J01MA0 2	CIPRINOL, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	KRKA, d.d., Novo mesto	100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater				
					100	D60-D64	Pediaater, Hematoloog				
					50						
1042827	tsiprofloksatsiin, 3mg 1ml	S01AE0 3	CILOXAN, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK	Novartis Baltics SIA	50						
1005545	tsiprofloksatsiin, 500mg	J01MA0 2	CIPRINOL, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	KRKA, d.d., Novo mesto	100	E84-E84	Pediaater, Pulmonoloog				
					50						
					100	D60-D64	Pediaater, Hematoloog				
1223929	tsiprofloksatsiin, 500mg	J01MA0 2	CIPROFLOXACIN SANDOZ 500MG, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					100	E84-E84	Pediaater, Pulmonoloog				
					100	D60-D64	Hematoloog, Pediaater				
1500994	tsiprofloksatsiin, 500mg	J01MA0 2	CIPROFLOXACIN OLAINFARM, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Olainfarm AS	50						
					100	D60-D64	Pediaater, Hematoloog				
					100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater				
1218361	tsitalopraam, 10mg	N06AB0 4	CITALOPRAM - TEVA 10MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
1083563	tsitalopraam, 20mg	N06AB0 4	CITALEC 20, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Zentiva k.s.	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1112937	tsitalopraam, 20mg	N06AB0 4	CIRAL 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						



Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1185409	tsitalopraam, 20mg	N06AB0 4	CITALOPRAM ACTAVIS 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Actavis Group Ptc ehf.	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
1218462	tsitalopraam, 20mg	N06AB0 4	CITALOPRAM - TEVA 20MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
1443631	tsitalopraam, 20mg	N06AB0 4	CITALOPRAM VITABALANS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Vitabalans Oy	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1218563	tsitalopraam, 40mg	N06AB0 4	CITALOPRAM - TEVA 40MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1021790	tsüklofosfamiid, 50mg	L01AA0 1	ENDOXAN, kaetud tablett, 50TK	OÜ Baxter Estonia	75	N00-N08	Pediaater, Nefroloog				
					50						
					75	M45-M46, M08- M08, M30-M35, M05-M06	Pediaater, Reumatoloog				
					100	C00-D48	Hematoloog, Onkoloog				
1123760	tsüklopentolaat, 10mg 1ml	S01FA0 4	CYCLOGYL, silmatilgad, lahus, 15ml 1TK	Alcon Farmaceutika d.o.o.	50						silmahaiguste ambulatoorseks raviks

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1008559	tsüklosporiin, 100mg	L04AD0 1	SANDIMMUN NEORAL, pehmekapsel, 50TK	Novartis Baltics SIA	100	Z94-Z94, T86- T86					
					100	D60-D64	Pediaater, Pediaater – hematoloog- onkoloog, Hematoloog				
					75	L50.8-L50.9, L50.1-L50.5					
					75	L20-L20	Dermatovenerol oog				
					50						
					75	L43-L43	Pediaater, Pediaater – hematoloog- onkoloog, Dermatovenerol oog				
					75	L40-L40	Dermatovenerol oog, Pediaater – hematoloog- onkoloog, Pediaater, Reumatoloog				
					75	N00-N08	Nefroloog, Pediaater – hematoloog- onkoloog, Pediaater				
					75	M45-M46, M30- M35, M05-M08	Pediaater, Reumatoloog, Pediaater – hematoloog- onkoloog				
					100	D46-D46	Hematoloog				

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1098840	tsüklosporiin, 100mg	L04AD0 1	EQUORAL 100 MG, pehmekapsel, 50TK	Teva B.V.	50						
					75	L40-L40	Pediaater – hematoloog- onkoloog, Pediaater, Dermatovenerol oog, Reumatoloog				
					75	L50.8-L50.9, L50.1-L50.5					
					100	D60-D64	Hematoloog, Pediaater – hematoloog- onkoloog, Pediaater				
					75	L43-L43	Pediaater, Dermatovenerol oog, Pediaater – hematoloog- onkoloog				
					75	L20-L20	Dermatovenerol oog				
					100	Z94-Z94, T86- T86					
					100	D46-D46	Hematoloog				
					75	N00-N08	Pediaater – hematoloog- onkoloog, Pediaater, Nefroloog				
					75	M30-M35, M05- M08, M45-M46	Reumatoloog, Pediaater, Pediaater – hematoloog- onkoloog				

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1683097	tsüklosporiin, 1mg 1ml	S01XA1 8	IKERVIS, silmatilgad, emulsioon, 0.3ml 30TK	Santen Oy	75	M35.0-M35.0, H19.3-H19.3, H04.1-H04.1, H11.1-H11.1	Oftalmoloog				raske kuiva silma sündroomiga patsientidele, kellel on vaatamata vähemalt kolm kuud kestnud ravile niisutavate tilkadega punktkeratopaatia või konjunktivi punktitaoline värvumine. Ravivastust hinnatakse peale kolme ravikuud alates esimese soodusretsepti kirjutamist ning soodustusega väljakirjutamise õigus jätkub patsientidele, kellel raviarsti hinnangul on dokumenteeritult sarvkesta ja/või konjunktivi värvumine ravi mõjul oluliselt paranenud või subjektiivsed kaebused oluliselt vähenenud.

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1008526	tsüklosporiin, 25mg	L04AD0 1	SANDIMMUN NEORAL, pehmekapsel, 50TK	Novartis Baltics SIA	75	M45-M46, M05- M08, M30-M35	Reumatoloog, Pediaater – hematoloog- onkoloog, Pediaater				
					100	D46-D46	Hematoloog				
					100	Z94-Z94, T86- T86					
					75	L43-L43	Dermatovenerol oog, Pediaater – hematoloog- onkoloog, Pediaater				
					75	L40-L40	Pediaater – hematoloog- onkoloog, Dermatovenerol oog, Reumatoloog, Pediaater				
					100	D60-D64	Hematoloog, Pediaater, Pediaater – hematoloog- onkoloog				
					50						
					75	L20-L20	Dermatovenerol oog				
					75	N00-N08	Pediaater, Nefroloog, Pediaater – hematoloog- onkoloog				
					75	L50.1-L50.5, L50.8-L50.9					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1008548	tsüklosporiin, 50mg	L04AD0 1	SANDIMMUN NEORAL, pehmekapsel, 50TK	Novartis Baltics SIA	75	L50.1-L50.5, L50.8-L50.9					
					75	L20-L20	Dermatovenerol oog				
					75	N00-N08	Nefroloog, Pediaater – hematoloog- onkoloog, Pediaater				
					75	L40-L40	Reumatoloog, Pediaater, Dermatovenerol oog, Pediaater – hematoloog- onkoloog				
					100	D46-D46	Hematoloog				
					50						
					75	L43-L43	Pediaater, Pediaater – hematoloog- onkoloog, Dermatovenerol oog				
					100	Z94-Z94, T86- T86					
					100	D60-D64	Hematoloog, Pediaater, Pediaater – hematoloog- onkoloog				
					75	M05-M08, M30- M35, M45-M46	Pediaater – hematoloog- onkoloog, Pediaater, Reumatoloog				

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1064124	tsüproteroon, 50mg	G03HA0 1	ANDROCUR, tablett, 50TK	Bayer AG	100	C61-C61	Onkoloog, Uroloog				juhul, kui haigus on pärast kirurgilist või medikamentooset kastratsiooni progresseerunud, metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravi alustamisel LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul, kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest või medikamentoosest kastratsioonist)
					50						
1014488	tsüproteroon+östro geen, 2mg+0,035mg	G03HB0 1	DIANE, kaetud tablett, 21TK	Bayer AG	50						
1818288	tsüproteroon+östro geen, 2mg+0,035mg	G03HB0 1	DIANE, kaetud tablett, 21TK	Ideal Trade Links UAB	50						
1820179	tsüproteroon+östro geen, 2mg+0,035mg	G03HB0 1	DIANE, kaetud tablett, 21TK	Lex Ano UAB	50						
1891391	tsüproteroon+östro geen, 2mg+0,035mg	G03HB0 1	DIANE, kaetud tablett, 21TK	Ideal Trade Links UAB	50						
1891414	tsüproteroon+östro geen, 2mg+0,035mg	G03HB0 1	DIANE, kaetud tablett, 63TK	Ideal Trade Links UAB	50						
1557435	ulipristaal, 5mg	G03XB0 2	ESMYA, tablett, 28TK	Gedeon Richter Plc.	50						
					75	D25-D25	Günekoloog				patsientidele, kes soovivad rasestuda või kellele on kirurgiline ravi vastunäidustatud ning kirurgilise ravi eelselt fibroomi mõõtmete vähendamiseks
1646940	umekliidiinium, 55mcg 1mõõtannus	R03BB0 7	INCRUSE ELLIPTA, annustatud inhalatsioonipulber, 30mõõtannus 1TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50						
					75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1808951	upadatsitiniib, 15mg	L04AF03	RINVOQ, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK	AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG	100	M05-M06	Reumatoloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt kahe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud
					100	L20.8-L20.8, L20.9-L20.9	Dermatovenerol oog, Allergoloog- immunoloog, Pediaater				mõõduka või raske haigusega (EASI≥16, DLQI≥10) patsiendile, kes ei allu süsteemsele konventsionaalsele ravile tsüklosporiiniga 8–12 nädala jooksul või kellele see on vastunäidustatud või põhjustanud talumatuid kõrvaltoimeid
					100	M07.0-M07.3, M45-M46	Pediaater, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud
					100	K50-K51	Pediaater – gastroenteroloog , Pediaater, Gastroenteroloog				ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt kahe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud



Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1860588	upadatsitiniib, 30mg	L04AF03	RINVOQ, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK	AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG	100	L20.8-L20.8, L20.9-L20.9	Dermatovenerol oog, Pediaater, Allergoloog- immunoloog				mõõduka või raske haigusega (EASI $\geq$ 16, DLQI $\geq$ 10) patsiendile, kes ei allu süsteemsele konventsionaalsele ravile tsüklosporiiniga 8–12 nädala jooksul või kellele see on vastunäidustatud või põhjustanud talumatuid kõrvaltoimeid
					100	K50-K51	Pediaater – gastroenteroloog , Gastroenteroloo g, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt kahe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud
1887857	upadatsitiniib, 45mg	L04AF03	RINVOQ, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK	AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG	100	K50-K51	Gastroenteroloo g, Pediaater, Pediaater – gastroenteroloog				ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt kahe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud
1016985	ursodeoksükoolha pe, 250mg	A05AA0 2	URSOSAN, kõvakapsel, 50TK	Pro.Med.Cs Praha a.s.	50						
					75	K74-K74, K73- K73	Gastroenteroloo g, Pediaater	esmane			
1709401	ursodeoksükoolha pe, 250mg	A05AA0 2	URSOGRIX, kõvakapsel, 50TK	Grindeks AS	75	K74-K74, K73- K73	Pediaater, Gastroenteroloo g	esmane			
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1462395	ustekinumab, 45mg 0.5ml	L04AC0 5	STELARA, süstelahus süstlis, 0.5ml 1TK	Janssen - Cilag International	100	L40-L40	Dermatovenerol oog, Pediaater				patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus L40 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud. Lisaks laieneb soodustus patsientidele, kelle ravi ustekinumabiga on Tervisekassa rahastusel alustatud enne 01.01.2022.
					100	M07.0-M07.3	Pediaater, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus M07.0–3 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud.
3040669	ustekinumab, 45mg 0.5ml	L04AC0 5	STELARA, süstelahus pen-süstlis, 0.5ml 1TK	Janssen - Cilag International	100	M07.0-M07.3	Pediaater, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus M07.0-3 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud
					100	L40-L40	Dermatovenerol oog, Pediaater				patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus L40 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud. Lisaks laieneb soodustus patsientidele, kelle ravi ustekinumabiga on Tervisekassa rahastusel alustatud enne 01.01.2022.

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3062977	ustekinumab, 45mg 0.5ml	L04AC0 5	UZPRUVO, süstelahus süstlis, 0.5ml 1TK	Stada Arzneimittel AG	100	M07.0-M07.3	Reumatoloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus M07.0–3 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud.
					100	L40-L40	Pediaater, Dermatovenerol oog				patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus L40 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud. Lisaks laieneb soodustus patsientidele, kelle ravi ustekinumabiga on Tervisekassa rahastusel alustatud enne 01.01.2022.
1462407	ustekinumab, 90mg 1ml	L04AC0 5	STELARA, süstelahus süstlis, 1ml 1TK	Janssen - Cilag International	100	L40-L40	Dermatovenerol oog, Pediaater				patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus L40 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud. Lisaks laieneb soodustus patsientidele, kelle ravi ustekinumabiga on Tervisekassa rahastusel alustatud enne 01.01.2022.
					100	M07.0-M07.3	Reumatoloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus M07.0–3 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud.

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
3040670	ustekinumab, 90mg 1ml	L04AC0 5	STELARA, süstelahus pen-süstlis, 1ml 1TK	Janssen - Cilag International	100	L40-L40	Pediaater, Dermatovenerol oog				patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus L40 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud. Lisaks laieneb soodustus patsientidele, kelle ravi ustekinumabiga on Tervisekassa rahastusel alustatud enne 01.01.2022.
					100	M07.0-M07.3	Reumatoloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus M07.0-3 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud
3062988	ustekinumab, 90mg 1ml	L04AC0 5	UZPRUVO, süstelahus süstlis, 1ml 1TK	Stada Arzneimittel AG	100	M07.0-M07.3	Pediaater, Reumatoloog				ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus M07.0–3 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud.
					100	L40-L40	Pediaater, Dermatovenerol oog				patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus L40 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud. Lisaks laieneb soodustus patsientidele, kelle ravi ustekinumabiga on Tervisekassa rahastusel alustatud enne 01.01.2022.

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1301094	valatsikloviir, 1000mg	J05AB11	VALACICLOVIR ACTAVIS 1000MG, õhukese polümeerikattega tablett, 21TK	Teva B.V.	50						
1016301	valatsikloviir, 500mg	J05AB11	VALTREX, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50						
1300936	valatsikloviir, 500mg	J05AB11	VALACICLOVIR ACTAVIS 500MG, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Teva B.V.	50						
1369593	valatsikloviir, 500mg	J05AB11	VALACICLOVIR ELVIM, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	SIA Elvim	50						
1831003	valatsikloviir, 500mg	J05AB11	VALTREX, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Ideal Trade Links UAB	50						
1888904	valatsikloviir, 500mg	J05AB11	VALTREX, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Lex Ano UAB	50						
3028025	valatsikloviir, 500mg	J05AB11	VALTREX, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Lex Ano UAB	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1076419	valproehape, 150mg	N03AG01	ORFIRIL LONG 150 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 100TK	Desitin Arzneimittel GmbH	100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
					50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
1108246	valproehape, 150mg	N03AG01	ORFIRIL 150, gastroresistentne tablett, 100TK	Desitin Arzneimittel GmbH	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1043604	valproehape, 300mg	N03AG01	CONVULEX 300 MG, gastroresistentne pehmekapsel, 100TK	G.L. Pharma GmbH	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50						
					100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4- F11.7, F18.4- F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3- F60.3, F13.4- F13.7, F10.4- F10.7, F17.4- F17.7, F15.4- F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
1077308	valproehape, 300mg	N03AG01	ORFIRIL LONG 300 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 100TK	Desitin Arzneimittel GmbH	100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4- F11.7, F18.4- F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3- F60.3, F13.4- F13.7, F10.4- F10.7, F17.4- F17.7, F15.4- F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
					50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1086555	valproehape, 300mg	N03AG0 1	DEPAKINE CHRONO 300 mg, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	Sanofi Winthrop Industrie	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50						
					100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4- F11.7, F18.4- F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3- F60.3, F13.4- F13.7, F10.4- F10.7, F17.4- F17.7, F15.4- F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
1108257	valproehape, 300mg	N03AG0 1	ORFIRIL 300, gastroresistentne tablett, 100TK	Desitin Arzneimittel GmbH	50						
					100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4- F11.7, F18.4- F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3- F60.3, F13.4- F13.7, F10.4- F10.7, F17.4- F17.7, F15.4- F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			



Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1128934	valproehape, 300mg	N03AG01	CONVULEX RETARD 300MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	G.L. Pharma GmbH	100	F10.4-F10.7, F20-F29, F17.4-F17.7, F00-F09, F30-F31, F70-F79, F12.4-F12.7, F15.4-F15.7, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F14.4-F14.7, F19.4-F19.7, F16.4-F16.7, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F32.2-F32.3, F33.2-F33.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
1076341	valproehape, 500mg	N03AG01	ORFIRIL LONG 500 MG, toimeainet prolongeeritult vabastavad graanulid, 100TK	Desitin Arzneimittel GmbH	50						
					100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1086544	valproehape, 500mg	N03AG01	DEPAKINE CHRONO 500 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Sanofi Winthrop Industrie	100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4- F11.7, F18.4- F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3- F60.3, F13.4- F13.7, F10.4- F10.7, F17.4- F17.7, F15.4- F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
					50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
1128945	valproehape, 500mg	N03AG01	CONVULEX RETARD 500MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 50TK	G.L. Pharma GmbH	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50						
					100	F10.4-F10.7, F20-F29, F17.4- F17.7, F00-F09, F30-F31, F70- F79, F12.4- F12.7, F15.4- F15.7, F11.4- F11.7, F18.4- F18.7, F14.4- F14.7, F19.4- F19.7, F16.4- F16.7, F60.3- F60.3, F13.4- F13.7, F32.2- F32.3, F33.2- F33.3	Psühhiaater	esmane			

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1224672	valproehape, 500mg	N03AG01	VALPROATE SODIUM SANDOZ 500MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4- F11.7, F18.4- F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3- F60.3, F13.4- F13.7, F10.4- F10.7, F17.4- F17.7, F15.4- F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
1836109	valproehape, 500mg	N03AG01	DEPAKINE CHRONO 500 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Ideal Trade Links UAB	50						
					100	F11.4-F11.7, F60.3-F60.3, F32.2-F32.3, F15.4-F15.7, F13.4-F13.7, F12.4-F12.7, F20-F29, F16.4- F16.7, F00-F09, F70-F79, F10.4- F10.7, F19.4- F19.7, F30-F31, F18.4-F18.7, F33.2-F33.3, F17.4-F17.7, F14.4-F14.7	Psühhiaater	esmane			
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1043581	valproehape, 50mg 1ml	N03AG0 1	CONVULEX, siirup, 100ml 1TK	G.L. Pharma GmbH	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50						
					100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4- F11.7, F18.4- F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3- F60.3, F13.4- F13.7, F10.4- F10.7, F17.4- F17.7, F15.4- F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
1108268	valproehape, 600mg	N03AG0 1	ORFIRIL 600, gastroresistentne tablett, 50TK	Desitin Arzneimittel GmbH	100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4- F11.7, F18.4- F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3- F60.3, F13.4- F13.7, F10.4- F10.7, F17.4- F17.7, F15.4- F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1025536	valproehape, 60mg 1ml	N03AG01	ORFIRIL SAFT, suukaudne lahus, 250ml 1TK	Desitin Arzneimittel GmbH	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4- F11.7, F18.4- F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3- F60.3, F13.4- F13.7, F10.4- F10.7, F17.4- F17.7, F15.4- F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
1092844	valsartaan, 160mg	C09CA03	DIOVAN, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Novartis Baltics SIA	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1250378	valsartaan, 160mg	C09CA03	VALSACOR, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA, d.d., Novo mesto	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1250389	valsartaan, 160mg	C09CA03	VALSACOR, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	KRKA, d.d., Novo mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1434495	valsartaan, 160mg	C09CA03	VALZAP, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Zentiva k.s.	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1515057	valsartaan, 160mg	C09CA03	VALSARTAN MEDOCHEMIE, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Medochemie Limited	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1515079	valsartaan, 160mg	C09CA03	VALSARTAN MEDOCHEMIE, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Medochemie Limited	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1421233	valsartaan, 320mg	C09CA03	VALSACOR, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA, d.d., Novo mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1250323	valsartaan, 80mg	C09CA03	VALSACOR, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA, d.d., Novo mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1434473	valsartaan, 80mg	C09CA03	VALZAP, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Zentiva k.s.	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1514854	valsartaan, 80mg	C09CA03	VALSARTAN MEDOCHEMIE, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Medochemie Limited	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1514876	valsartaan, 80mg	C09CA03	VALSARTAN MEDOCHEMIE, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Medochemie Limited	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1675324	valsartaan+amlodi piin, 160mg+10mg	C09DB01	WAMLOX, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	KRKA, d.d., Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1675234	valsartaan+amlodi piin, 160mg+5mg	C09DB01	WAMLOX, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	KRKA, d.d., Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1324314	valsartaan+hüdrok lorotiasiid, 160mg+12,5mg	C09DA82	VALSACOMBI, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA, d.d., Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1434518	valsartaan+hüdrok lorotiasiid, 160mg+12,5mg	C09DA82	VALZAP H, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Zentiva k.s.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1324235	valsartaan+hüdrok lorotiasiid, 160mg+25mg	C09DA8 2	VALSACOMBI, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA, d.d., Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1457557	valsartaan+hüdrok lorotiasiid, 320mg+12,5mg	C09DA8 2	VALSACOMBI, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA, d.d., Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1324156	valsartaan+hüdrok lorotiasiid, 80mg+12,5mg	C09DA8 2	VALSACOMBI, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA, d.d., Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1434530	valsartaan+hüdrok lorotiasiid, 80mg+12,5mg	C09DA8 2	VALZAP H, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Zentiva k.s.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1704181	valsartaan+sakubit riil, 103mg+97mg	C09DX0 4	ENTRESTO, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Novartis Europharm Limited	75	I50-I50					ravimi väljakirjutamise õigus patsientidele, kes vastavad kõigile järgnevatele kriteeriumitele: kellel on vähenenud vasaku vatsakese väljutusfraktsioon (LVEF<=40%), kes kuuluvad NYHA II-IV funktsionaalklassi, kellel ravikoostöö on hea, keda on eelnevalt vähemalt 3 kuud püsivalt ravitud AKE-inhibiitori või ARB eesmärkannusega (selle dokumenteeritud talumatuse korral vähemalt keskmise annusega või maksimaalselt talutava annusega), kombinatsioonis maksimaalses talutavas annuses beetablokaatoriga ning kellel kaksikravile mineralokortikoidireseptori antagonist lisamise järgselt südamepuudulikkuse sümptomid endiselt püsivad või süvenevad
1704147	valsartaan+sakubit riil, 26mg+24mg	C09DX0 4	ENTRESTO, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Novartis Europharm Limited	75	I50-I50					ravimi väljakirjutamise õigus patsientidele, kes vastavad kõigile järgnevatele kriteeriumitele: kellel on vähenenud vasaku vatsakese väljutusfraktsioon (LVEF<=40%), kes kuuluvad NYHA II-IV funktsionaalklassi, kellel ravikoostöö on hea, keda on eelnevalt vähemalt 3 kuud püsivalt ravitud AKE-inhibiitori või ARB eesmärkannusega (selle dokumenteeritud talumatuse korral vähemalt keskmise annusega või maksimaalselt talutava annusega), kombinatsioonis maksimaalses talutavas annuses beetablokaatoriga ning kellel kaksikravile mineralokortikoidireseptori antagonist lisamise järgselt südamepuudulikkuse sümptomid endiselt püsivad või süvenevad

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1704169	valsartaan+sakubitril, 51mg+49mg	C09DX04	ENTRESTO, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Novartis Europharm Limited	75	I50-I50					ravimi väljakirjutamise õigus patsientidele, kes vastavad kõigile järgnevatele kriteeriumitele: kellel on vähenenud vasaku vatsakese väljutusfraktsioon (LVEF<=40%), kes kuuluvad NYHA II-IV funktsionaalklassi, kellel ravikoostöö on hea, keda on eelnevalt vähemalt 3 kuud püsivalt ravitud AKE-inhibiitori või ARB eesmärkannusega (selle dokumenteeritud talumatuse korral vähemalt keskmise annusega või maksimaalselt talutava annusega), kombinatsioonis maksimaalses talutavas annuses beetablokaatoriga ning kellel kaksikravile mineralokortikoidireseptori antagonistiga lisamise järgselt südamepuudulikkuse sümptomid endiselt püsivad või süvenevad
1008335	varfariin, 3mg	B01AA03	MAREVAN, tablett, 100TK	Orion Corporation	75	I47-I49					
					50						
					100	I80-I82, Z95.2-Z95.2, I26-I26, T82-T82, I67.6-I67.6, I27.0-I27.0					
1847831	varfariin, 3mg	B01AA03	MAREVAN, tablett, 100TK	Ideal Trade Links UAB	75	I47-I49					
					50						
					100	I80-I82, Z95.2-Z95.2, I26-I26, T82-T82, I67.6-I67.6, I27.0-I27.0					
1008368	varfariin, 5mg	B01AA03	MAREVAN FORTE, tablett, 100TK	Orion Corporation	50						
					100	I80-I82, Z95.2-Z95.2, I26-I26, T82-T82, I67.6-I67.6, I27.0-I27.0					
					75	I47-I49					



Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1734421	venetoklaks, 100mg	L01XX5 2	VENCLYXTO, õhukese polümeerikattega tablett, 7TK	AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG	100	C91.1-C91.1	Hematoloog				kombinatsioonis ibrutiniibiga patsientidele, kes ei ole eelnevalt ravi saanud. Kombinatsioonravi pikkus on 15 tsükli. Lisaks kombinatsioonis obinutuzumabiga eelnevalt ravimata patsientidele, kellele ravi fludarabiinil baseeruvate skeemidega on vastunäidustatud ning kombinatsioonis rituksimabiga patsientidele, kes on eelnevalt saanud vähemalt ühte ravi. Soodustus kehtib kõikidele kombinatsioonidele alates 5. ravinädalast.
1734432	venetoklaks, 100mg	L01XX5 2	VENCLYXTO, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG	100	C91.1-C91.1	Hematoloog				kombinatsioonis ibrutiniibiga patsientidele, kes ei ole eelnevalt ravi saanud. Kombinatsioonravi pikkus on 15 tsükli. Lisaks kombinatsioonis obinutuzumabiga eelnevalt ravimata patsientidele, kellele ravi fludarabiinil baseeruvate skeemidega on vastunäidustatud ning kombinatsioonis rituksimabiga patsientidele, kes on eelnevalt saanud vähemalt ühte ravi. Soodustus kehtib kõikidele kombinatsioonidele alates 5. ravinädalast.
1734443	venetoklaks, 100mg	L01XX5 2	VENCLYXTO, õhukese polümeerikattega tablett, 112TK	AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG	100	C91.1-C91.1	Hematoloog				kombinatsioonis ibrutiniibiga patsientidele, kes ei ole eelnevalt ravi saanud. Kombinatsioonravi pikkus on 15 tsükli. Lisaks kombinatsioonis obinutuzumabiga eelnevalt ravimata patsientidele, kellele ravi fludarabiinil baseeruvate skeemidega on vastunäidustatud ning kombinatsioonis rituksimabiga patsientidele, kes on eelnevalt saanud vähemalt ühte ravi. Soodustus kehtib kõikidele kombinatsioonidele alates 5. ravinädalast.
					100	C92-C92	Hematoloog, Onkoloog				kombinatsioonis hüpomütüüliiva ainega äsja diagnoositud ägeda müeloidleukeemiaga patsientidele, kellele ei sobi intensiivne keemiaravi
1734397	venetoklaks, 10mg	L01XX5 2	VENCLYXTO, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG	100	C91.1-C91.1	Hematoloog				kombinatsioonis ibrutiniibiga patsientidele, kes ei ole eelnevalt ravi saanud. Kombinatsioonravi pikkus on 15 tsükli. Lisaks kombinatsioonis obinutuzumabiga eelnevalt ravimata patsientidele, kellele ravi fludarabiinil baseeruvate skeemidega on vastunäidustatud ning kombinatsioonis rituksimabiga patsientidele, kes on eelnevalt saanud vähemalt ühte ravi. Soodustus kehtib kõikidele kombinatsioonidele alates 5. ravinädalast.

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1734410	venetoklaks, 50mg	L01XX5 2	VENCLYXTO, õhukese polümeerikattega tablett, 7TK	AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG	100	C91.1-C91.1	Hematoloog				kombinatsioonis ibrutiniibiga patsientidele, kes ei ole eelnevalt ravi saanud. Kombinatsioonravi pikkus on 15 tsükli. Lisaks kombinatsioonis obinutuzumabiga eelnevalt ravimata patsientidele, kellele ravi fludarabiinil baseeruvate skeemidega on vastunäidustatud ning kombinatsioonis rituksimabiga patsientidele, kes on eelnevalt saanud vähemalt ühte ravi. Soodustus kehtib kõikidele kombinatsioonidele alates 5. ravinädalast.
1232468	venlafaksiin, 150mg	N06AX1 6	ALVENTA, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 28TK	KRKA d.d. Novo mesto	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					75	G43-G43					
1261741	venlafaksiin, 150mg	N06AX1 6	VENLAFAXIN MEDOCHEMIE XR 150 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 28TK	Medochemie Limited	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
					75	G43-G43					
1306325	venlafaksiin, 150mg	N06AX1 6	VENLAGAMMA 150 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	Woerwag Pharma GmbH & Co. KG	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
					75	G43-G43					
1316405	venlafaksiin, 150mg	N06AX1 6	ARGOFAN 150 SR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Zentiva k.s.	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					75	G43-G43					
					50						
1435205	venlafaksiin, 150mg	N06AX1 6	VENLAFAXINE ELVIM, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 28TK	SIA Elvim	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
					75	G43-G43					
1786833	venlafaksiin, 150mg	N06AX1 6	ALVENTA, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	First Pharma OÜ	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
					75	G43-G43					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1839607	venlafaksiin, 150mg	N06AX1 6	ALVENTA, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	Ideal Trade Links UAB	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
					75	G43-G43					
1853805	venlafaksiin, 150mg	N06AX1 6	ALVENTA, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	Ideal Trade Links UAB	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					75	G43-G43					
					50						
1232266	venlafaksiin, 37,5mg	N06AX1 6	ALVENTA, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 28TK	KRKA d.d. Novo mesto	50						
					75	G43-G43					
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
1232367	venlafaksiin, 75mg	N06AX1 6	ALVENTA, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 28TK	KRKA d.d. Novo mesto	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
					75	G43-G43					
1261684	venlafaksiin, 75mg	N06AX1 6	VENLAFAXIN MEDOCHEMIE XR 75 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 28TK	Medochemie Limited	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
					75	G43-G43					
1306246	venlafaksiin, 75mg	N06AX1 6	VENLAGAMMA 75 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	Woerwag Pharma GmbH & Co. KG	50						
					75	G43-G43					
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
1316371	venlafaksiin, 75mg	N06AX1 6	ARGOFAN 75 SR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Zentiva k.s.	75	G43-G43					
					50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
1435182	venlafaksiin, 75mg	N06AX1 6	VENLAFAXINE ELVIM, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 28TK	SIA Elvim	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					75	G43-G43					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1839551	venlafaksiin, 75mg	N06AX1 6	ALVENTA, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	Ideal Trade Links UAB	75	G43-G43					
					50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
1853759	venlafaksiin, 75mg	N06AX1 6	ALVENTA, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	Ideal Trade Links UAB	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					75	G43-G43					
1073157	verapamiil, 120mg	C08DA0 1	ISOPTIN RETARD 120 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	Viatris SIA	50						
					75	I47-I49	Kardioloog, Pediaater	esmane			
					75	I10-I13, I15-I15					
1073405	verapamiil, 80mg	C08DA0 1	VERAPAMIL- RATIOPHARM 80 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	Ratiopharm GmbH	75	I10-I13, I15-I15					
					75	I47-I49	Pediaater, Kardioloog	esmane			
					50						
1856044	veritsiguaat, 10mg	C01DX2 2	VERQUVO, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Bayer AG	75	I50-I50					sümptomaatilise kroonilise südamepuudulikkusega patsiendile, kellel on vähenenud vasaku vatsakese väljutusfraktsioon (LVEF<=40%), kes kuulub NYHA II-IV funktsionaalklassi, kes juba saab ravi eesmärkannuses või maksimaalses talutavas annuses AKE/ARB/ARNI ja beeta-blokaatori ja mineralokortikoidretseptori antagonisti ja SGLT-2 inhibiitoriga ning kes on viimase 6 kuu jooksul vaatamata eelnevale optimaalsele südamepuudulikkuse ravile hospitaliseeritud südamepuudulikkuse dekompensatsiooni tõttu ja vajanud dekompensatsiooni tõttu intravenooset ravi diureetikumi, vasodilataatori või inotroopse ravimiga

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1855919	veritsiguaat, 2,5mg	C01DX2 2	VERQUVO, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Bayer AG	75	I50-I50					sümptomaatilise kroonilise südamepuudulikkusega patsiendile, kellel on vähenenud vasaku vatsakese väljutusfraktsioon (LVEF<=40%), kes kuulub NYHA II-IV funktsionaalklassi, kes juba saab ravi eesmärkannuses või maksimaalses talutavas annuses AKE/ARB/ARNI ja beeta-blokaatori ja mineralokortikoidretseptori antagonisti ja SGLT-2 inhibiitoriga ning kes on viimase 6 kuu jooksul vaatamata eelnevale optimaalsele südamepuudulikkuse ravile hospitaliseeritud südamepuudulikkuse decompensatsiooni tõttu ja vajanud decompensatsiooni tõttu intravenooset ravi diureetikumi, vasodilataatori või inotroopse ravimiga
1855975	veritsiguaat, 5mg	C01DX2 2	VERQUVO, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Bayer AG	75	I50-I50					sümptomaatilise kroonilise südamepuudulikkusega patsiendile, kellel on vähenenud vasaku vatsakese väljutusfraktsioon (LVEF<=40%), kes kuulub NYHA II-IV funktsionaalklassi, kes juba saab ravi eesmärkannuses või maksimaalses talutavas annuses AKE/ARB/ARNI ja beeta-blokaatori ja mineralokortikoidretseptori antagonisti ja SGLT-2 inhibiitoriga ning kes on viimase 6 kuu jooksul vaatamata eelnevale optimaalsele südamepuudulikkuse ravile hospitaliseeritud südamepuudulikkuse decompensatsiooni tõttu ja vajanud decompensatsiooni tõttu intravenooset ravi diureetikumi, vasodilataatori või inotroopse ravimiga
1780321	vigabatriin, 100mg	N03AG0 4	KIGABEQ, lahustuv tablett, 100TK	Orphelia Pharma	100	G40.4-G40.4	Pediaater – neuroloog, Neuroloog				imikutele ja lastele vanuses 1 kuu kuni 7 aastat infantilsete spasmide (Westi sündroom) raviks või kombinatsioonis teiste epilepsiaravimitega raviresistentse partsiaalse epilepsia (fokaalne epileptiline hoog) raviks, kui kõik muud sobivad ravimikombinatsioonid on osutunud ebapiisavaks või ei ole olnud talutavad.
1780332	vigabatriin, 500mg	N03AG0 4	KIGABEQ, lahustuv tablett, 50TK	Orphelia Pharma	100	G40.4-G40.4	Neuroloog, Pediaater – neuroloog				imikutele ja lastele vanuses 1 kuu kuni 7 aastat infantilsete spasmide (Westi sündroom) raviks või kombinatsioonis teiste epilepsiaravimitega raviresistentse partsiaalse epilepsia (fokaalne epileptiline hoog) raviks, kui kõik muud sobivad ravimikombinatsioonid on osutunud ebapiisavaks või ei ole olnud talutavad.

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1552856	VIII hüübimisfaktor, 1000RÜ	B02BD0 2	ADVATE, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Takeda Manufacturing Austria AG	100	D66-D66	Pediaater, Hematoloog, Pediaater – hematoloog- onkoloog				
1633508	VIII hüübimisfaktor, 1000RÜ	B02BD0 2	NOVOEIGHT, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Novo Nordisk A/S	100	D66-D66	Pediaater, Pediaater – hematoloog- onkoloog, Hematoloog				
1657593	VIII hüübimisfaktor, 1000RÜ	B02BD0 2	NUWIQ, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Octapharma AB	100	D66-D66	Pediaater, Pediaater – hematoloog- onkoloog, Hematoloog				
1704260	VIII hüübimisfaktor, 1000RÜ	B02BD0 2	ELOCTA, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)	100	D66-D66	Pediaater – hematoloog- onkoloog, Hematoloog, Pediaater				
1762499	VIII hüübimisfaktor, 1000RÜ	B02BD0 2	ADYNOVI, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Baxalta Innovations GmbH	100	D66-D66	Pediaater – hematoloog- onkoloog, Hematoloog, Pediaater				
1783100	VIII hüübimisfaktor, 1000RÜ	B02BD0 2	JIVI, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Bayer AG	100	D66-D66	Pediaater – hematoloog- onkoloog, Pediaater, Hematoloog				
1798577	VIII hüübimisfaktor, 1000RÜ	B02BD0 2	ESPEROCT, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Novo Nordisk A/S	100	D66-D66	Hematoloog, Pediaater, Pediaater – hematoloog- onkoloog				

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1799309	VIII hüübimisfaktor, 1000RÜ	B02BD0 2	BERIATE, süste- /infusioonilahuse pulber ja lahusti, 1TK	CSL Behring GmbH	100	D66-D66	Pediaater, Pediaater – hematoloog- onkoloog, Hematoloog				
1552867	VIII hüübimisfaktor, 1500RÜ	B02BD0 2	ADVATE, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Takeda Manufacturing Austria AG	100	D66-D66	Pediaater – hematoloog- onkoloog, Pediaater, Hematoloog				
1704271	VIII hüübimisfaktor, 1500RÜ	B02BD0 2	ELOCTA, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)	100	D66-D66	Pediaater – hematoloog- onkoloog, Hematoloog, Pediaater				
1704282	VIII hüübimisfaktor, 2000RÜ	B02BD0 2	ELOCTA, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)	100	D66-D66	Pediaater, Hematoloog, Pediaater – hematoloog- onkoloog				
1762501	VIII hüübimisfaktor, 2000RÜ	B02BD0 2	ADYNOVI, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Baxalta Innovations GmbH	100	D66-D66	Hematoloog, Pediaater – hematoloog- onkoloog, Pediaater				
1783111	VIII hüübimisfaktor, 2000RÜ	B02BD0 2	JIVI, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Bayer AG	100	D66-D66	Hematoloog, Pediaater – hematoloog- onkoloog, Pediaater				
1798601	VIII hüübimisfaktor, 2000RÜ	B02BD0 2	ESPEROCT, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Novo Nordisk A/S	100	D66-D66	Hematoloog, Pediaater – hematoloog- onkoloog, Pediaater				

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1799310	VIII hüübimisfaktor, 2000RÜ	B02BD0 2	BERIATE, süste- /infusioonilahuse pulber ja lahusti, 1TK	CSL Behring GmbH	100	D66-D66	Pediaater, Pediaater – hematoloog- onkoloog, Hematoloog				
1552834	VIII hüübimisfaktor, 250RÜ	B02BD0 2	ADVATE, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Takeda Manufacturing Austria AG	100	D66-D66	Pediaater – hematoloog- onkoloog, Pediaater, Hematoloog				
1657571	VIII hüübimisfaktor, 250RÜ	B02BD0 2	NUWIQ, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Octapharma AB	100	D66-D66	Pediaater, Pediaater – hematoloog- onkoloog, Hematoloog				
1704237	VIII hüübimisfaktor, 250RÜ	B02BD0 2	ELOCTA, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)	100	D66-D66	Pediaater, Pediaater – hematoloog- onkoloog, Hematoloog				
1799286	VIII hüübimisfaktor, 250RÜ	B02BD0 2	BERIATE, süste- /infusioonilahuse pulber ja lahusti, 1TK	CSL Behring GmbH	100	D66-D66	Hematoloog, Pediaater – hematoloog- onkoloog, Pediaater				
1704293	VIII hüübimisfaktor, 3000RÜ	B02BD0 2	ELOCTA, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)	100	D66-D66	Hematoloog, Pediaater – hematoloog- onkoloog, Pediaater				
1783122	VIII hüübimisfaktor, 3000RÜ	B02BD0 2	JIVI, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Bayer AG	100	D66-D66	Pediaater, Hematoloog, Pediaater – hematoloog- onkoloog				



Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1552845	VIII hüübimisfaktor, 500RÜ	B02BD0 2	ADVATE, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Takeda Manufacturing Austria AG	100	D66-D66	Pediaater, Hematoloog, Pediaater – hematoloog- onkoloog				
1657582	VIII hüübimisfaktor, 500RÜ	B02BD0 2	NUWIQ, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Octapharma AB	100	D66-D66	Hematoloog, Pediaater, Pediaater – hematoloog- onkoloog				
1704248	VIII hüübimisfaktor, 500RÜ	B02BD0 2	ELOCTA, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)	100	D66-D66	Hematoloog, Pediaater, Pediaater – hematoloog- onkoloog				
1762477	VIII hüübimisfaktor, 500RÜ	B02BD0 2	ADYNOVI, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Baxalta Innovations GmbH	100	D66-D66	Hematoloog, Pediaater, Pediaater – hematoloog- onkoloog				
1783098	VIII hüübimisfaktor, 500RÜ	B02BD0 2	JIVI, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Bayer AG	100	D66-D66	Hematoloog, Pediaater, Pediaater – hematoloog- onkoloog				
1798566	VIII hüübimisfaktor, 500RÜ	B02BD0 2	ESPEROCT, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Novo Nordisk A/S	100	D66-D66	Hematoloog, Pediaater, Pediaater – hematoloog- onkoloog				
1799297	VIII hüübimisfaktor, 500RÜ	B02BD0 2	BERIATE, süste- /infusioonilahuse pulber ja lahusti, 1TK	CSL Behring GmbH	100	D66-D66	Hematoloog, Pediaater – hematoloog- onkoloog, Pediaater				

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1632361	vilanterool+flutikas oonfuroaat, 22mcg+184mcg 1mõõttannus	R03AK1 0	RELVAR ELLIPTA, annustatud inhalatsioonipulber, 30mõõttannus 1TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50						
					75	J45-J45					
1632338	vilanterool+flutikas oonfuroaat, 22mcg+92mcg 1mõõttannus	R03AK1 0	RELVAR ELLIPTA, annustatud inhalatsioonipulber, 30mõõttannus 1TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			C-D staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel eosinofiilide arv perifeerses veres on $\geq 100$ rakku/ $\mu$ L ning kellel on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasis ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga
					75	J45-J45					
					50						
1649224	vilanterool+umekli diinium, 22mcg+55mcg 1mõõttannus	R03AL0 3	ANORO ELLIPTA, annustatud inhalatsioonipulber, 30mõõttannus 1TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50						
					75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			
1756436	vilanterool+umekli diinium+flutikasoo nfuroaat, 22mcg+55mcg+92 mcg 1mõõttannus	R03AL0 8	TRELEGY ELLIPTA, annustatud inhalatsioonipulber, 30mõõttannus 1TK	GlaxoSmithKline Trading Services Limited	75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			patsiendile, kelle eosinofiilide arv perifeerses veres on $\geq 100$ rakku ning IKS/LABA või LAMA/LABA kaksikraviga on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasis ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga; või kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsiendile, kes saab IKS+LAMA+LABA toimeaineid avatud kombinatsioonis (e. kolmikraviga erinevatest inhalaatoritest); või kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsiendile, kelle eosinofiilide arv perifeerses veres on $\geq 300$ rakku ning LABA või LAMA monoterapiaga on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasis ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga
					50						
1316326	vildagliptiin, 50mg	A10BH0 2	GALVUS, tablett, 60TK	Novartis Europharm Limited	50						
					75	E11-E11, E14- E14					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1712438	vildagliptiin, 50mg	A10BH0 2	SAXOTIN, tablett, 60TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	E11-E11, E14- E14					
					50						
1714160	vildagliptiin, 50mg	A10BH0 2	DALMEVIN, tablett, 60TK	Medochemie Limited	50						
					75	E11-E11, E14- E14					
1729436	vildagliptiin, 50mg	A10BH0 2	GLYPVIL0, tablett, 60TK	KRKA d.d. Novo mesto	50						
					75	E11-E11, E14- E14					
1038091	von Willebrandi faktor+VIII hüübimisfaktor, 375RÜ+500RÜ	B02BD0 6	IMMUNATE 500 RÜ/375 RÜ, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Baxalta Innovations GmbH	100	D66-D66, D68.4-D68.4, D68.0-D68.0	Hematoloog, Pediaater, Pediaater – hematoloog- onkoloog				
1349232	von Willebrandi faktor+VIII hüübimisfaktor, 750RÜ+1000RÜ	B02BD0 6	IMMUNATE 1000 RÜ/750 RÜ, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Baxalta Innovations GmbH	100	D68.0-D68.0, D66-D66, D68.4-D68.4	Pediaater – hematoloog- onkoloog, Hematoloog, Pediaater				
1107975	vorikonasool, 200mg	J02AC0 3	VFEND, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	B44-B44					patsientidele, kellel invasiivse seeninfektsiooni ravi on alustatud haiglas
					100	B45-B45, B48.2- B48.2, B48.8- B48.8, B37-B37					väljakirjutamise õigus kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks, kui muud suukaudsed seenevastased ravimid on ebaefektiivsed või vastunäidustatud
1561823	vorikonasool, 200mg	J02AC0 3	VORICONAZOLE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Teva Pharma B.V.	100	B45-B45, B48.2- B48.2, B48.8- B48.8, B37-B37					väljakirjutamise õigus kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks, kui muud suukaudsed seenevastased ravimid on ebaefektiivsed või vastunäidustatud
					100	B44-B44					patsientidele, kellel invasiivse seeninfektsiooni ravi on alustatud haiglas

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1615902	vorikonasool, 200mg	J02AC0 3	VORICONAZOLE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	B44-B44					patsientidele, kellel invasiivse seeninfektsiooni ravi on alustatud haiglas
					100	B45-B45, B48.2- B48.2, B48.8- B48.8, B37-B37					väljakirjutamise õigus kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks, kui muud suukaudsed seenevastased ravimid on ebaefektiivsed või vastunäidustatud
1722305	vorikonasool, 200mg	J02AC0 3	VERRIA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Medochemie Limited	100	B44-B44					patsientidele, kellel invasiivse seeninfektsiooni ravi on alustatud haiglas
					100	B45-B45, B48.2- B48.2, B48.8- B48.8, B37-B37					väljakirjutamise õigus kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks, kui muud suukaudsed seenevastased ravimid on ebaefektiivsed või vastunäidustatud
1031746	östradiool, 100mcg 1g	G03CA0 3	LINOLADIOL N, kreem, 25g 1TK	Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel	50						
3017393	östradiool, 100mcg 1g	G03CA0 3	LINOLADIOL N, kreem, 25g 1TK	Ideal Trade Links UAB	50						
1380721	östradiool, 10mcg	G03CA0 3	VAGIFEM, vaginaaltablett, 18TK	Novo Nordisk A/S	50						
1794113	östradiool, 10mcg	G03CA0 3	VAGIRUX, vaginaaltablett, 18TK	Gedeon Richter Plc.	50						
1030442	östradiool, 1mg	G03CA0 3	ESTROFEM, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Novo Nordisk A/S	50						
					100	E89.4-E89.4, E28.3-E28.3, E23.0-E23.0, Q96-Q97	Endokrinoloog, Günekoloog, Pediaater – endokrinoloog	esmane		50,00	haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient on alla 50. eluaasta vana
1063415	östradiool, 1mg 1g	G03CA0 3	DIVIGEL, transdermaalne geel, 1g 28TK	Orion Corporation	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1030431	östradiool, 2mg	G03CA03	ESTROFEM, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Novo Nordisk A/S	50						
					100	E89.4-E89.4, E28.3-E28.3, E23.0-E23.0, Q96-Q97	Günekoloog, Pediaater – endokrinoloog, Endokrinoloog	esmane		50,00	haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient on alla 50. eluaasta vana
1684111	östradiool, 2mg	G03CA03	ESTROFEM, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	First Pharma OÜ	50						
					100	E89.4-E89.4, E28.3-E28.3, E23.0-E23.0, Q96-Q97	Günekoloog, Endokrinoloog, Pediaater – endokrinoloog	esmane		50,00	haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient on alla 50. eluaasta vana
1829752	östradiool, 2mg	G03CA03	ESTROFEM, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Lex Ano UAB	100	E89.4-E89.4, E28.3-E28.3, E23.0-E23.0, Q96-Q97	Endokrinoloog, Pediaater – endokrinoloog, Günekoloog	esmane		50,00	haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient on alla 50. eluaasta vana
					50						
1848393	östradiool, 2mg	G03CA03	ESTROFEM, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Ideal Trade Links UAB	100	E89.4-E89.4, E28.3-E28.3, E23.0-E23.0, Q96-Q97	Pediaater – endokrinoloog, Günekoloog, Endokrinoloog	esmane		50,00	haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient on alla 50. eluaasta vana
					50						
1031735	östradiool+prednisoloon, 0,05mg+4mg 1g	G03CA80	LINOLADIOL-H N, kreem, 25g 1TK	Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel	50						
1022634	östriool, 500mcg	G03CA04	OVESTIN, vaginaalsuposiit, 15TK	Aspen Pharma Trading Limited	50						